蒙古産産牛蠅 *HYPODERMA* SP. ノ食道粘 膜下寄生時代ノ蛆毒素ノ毒物學的研究

寺田 文 次 郎 小 野 定 雄

(滿州醫科大學藥物學教室 主任：久保田教授)
(奉天滿鐵獸疫研究所 所長：葛西教授)

(昭和5年7月18日受附)

目 次

緒 言	2. 炭酸瓦斯ニヨル沈降試験
A. 蛆毒素ノ作用	3. 硫酸あんもにうむ半飽和 溶液ニヨル沈降試験
I. 蛆毒素ニヨル一般症狀及蛆毒素ノ 血壓ニ及ボス影響	4. 純あるこほーるニヨル處置
II. 蛆毒素ニヨル大動物血壓下降ノ原 因	5. えーてるニヨル處置
1. 心臟機能ニ及ボス作用	6. 毒素ノ透過性ノ實驗
2. 血管ニ及ボス作用	7. 毒素ノ吸着試験
3. 肺血行ニ及ボス作用	8. 毒素ハ有機物ナリヤ無機 物ナリヤ
III. 蛆毒素ノ諸臟器平滑筋ニ及ボス作 用	9. 毒力ノ時間的變化
1. 剔出小腸ニ及ボス作用	10. 毒力ノ熱ニヨル變化
2. 剔出子宮ニ及ボス作用	11. 毒力ノ乾燥ニヨル影響
B. 蛆毒素ノ本態	II. 毒素ノ本態ニ關スル考察
I. 蛆毒素ノ性狀	C. 總 括
1. 蛆毒素ヲ N/500 硫酸溶液ヲ以テ 處置セル實驗	文 獻

緒 言

著者ノ一人小野ハ蒙古産牛蠅ノ蛆ガ牛ノ食道粘膜下ニ寄生スル時代ニハ其ノ體內ニ猛毒ノ物質ヲ含有スルモ背部皮下ニ移行シ稍々成長セルモノニハ殆ド認メラレザルコトヲ發見シ之ガ生物學的研究ノ大要ヲ本年4月開催ノ日本獸醫學會大會ニ報告セリコノ蛆毒素ハ淡綠色ぐりせりん様ノ液體ニシテ之ニ少量ノ水ヲ加ヘあるこーるニテ沈澱セシムレバ少シク黃色ヲ帶ビタル粉末ヲ得該物質ニ就キ毒物學的研究ヲ行ヒタレバ其ノ大略ヲコ、ニ報告セント欲ス

A. 蛆毒素ノ作用

I. 蛆毒素ニヨル一般症狀及ビ蛆毒素ノ血壓ニ及ボス影響

實驗動物トシテハ主トシテ家兎ヲ用ヒ時トシテハ猫ヲモ使用セリ家兎ノ耳

靜脈内ニ 0.5% 毒素食鹽水溶液ノ一定量ヲ注射シテ一般症狀ヲ觀察スルニ直ニ不安狀態、呼吸困難、口唇ちあの一ゼヲ來タシ甚シキ場合ハ痙攣ヲ起シテ斃ル致死量ハ體重 1 kg. ニツキ 3 mg. 内外ナリ此際水銀まのめ一タヲ用ヒ頸動脈ニ於テ血壓ヲ測定スルニ血壓ノ急激ニ下降スルヲ見ル若シ毒力強キ場合ハ血壓ハ零線ニ達シテ死ノ轉歸ヲトル（第1圖參照）以下余等ハ血壓下降現象ヲ標準トシテ種々ノ檢索ヲ試ミタリ

II. 蛆毒素ニヨル大動脈血壓下降ノ原因

蛆毒素ヲ注射スレバ頸動脈ノ血壓ヲ下降セシムルコトヲ知レリ茲ニ於テ余等ハ蛆毒素ガ血壓下降ヲ來ス可キ機轉如何ヲ攻究セント欲シタリ

1. 心臟機能ニ及ボス作用

心臟機能ノ障害ヲ來タス時血壓ノ下降スルコトハ周知ノ事實ナリ

余等ハ蛆毒素ガ心臟機能ニ及ボス影響ヲ檢セントシ墓ノ心臟ヲ剔出シ之ヲ八木式心臟營養裝置ニヨリりんぢャー氏液ヲ以テ營養甦生セシメ次デソノ營養液 10 c.c. 中ニ 0.5% 蛆毒素液ヲ注入シテ心臟機能ニ及ボス作用ヲ觀察セリ其ノ結果ハ 0.1 c.c. ノ少量ニテモ 1 c.c. ノ大量ニテモ認ムベキ影響ヲ來タサズ（第2圖參照）

從ツテ蛆毒素ニヨル血壓下降ノ原因ヲ心臟障害ニ求ムルハ至當ナラズ

2. 血管ニ及ボス作用

血管ノ擴張ガ血壓下降ヲ來タスコトモ明カナル事實ナリ

故ニ余等ハ蛆毒素ガ末稍血管ニ如何ナル作用ヲ及ボスヤヲ檢セントシ墓後肢血管灌流實驗ヲ行ヒタリ即チ Læwen-Trendelenburg ノ方法ニ從ヒ墓ノ後肢血管灌流實驗ヲ行ヒコレニ 0.5% 蛆毒素溶液 0.1 c.c. ヲ注入スレバ其灌流液ノ流出滴數ハ初メ徐々ニ減少スルモ後暫時ニシテ流出滴數舊ニ復ス更ニ大量 0.3 c.c. ヲ注入スレバ滴數ノ減少ハ少シク急激ニ行ハレ流出滴數零トナリ數十分ヲ經過スルモ灌流液ノ流出ヲ見ズ（第3圖參照）即チ此實驗ニ依リテ灌流液流出滴數ノ減少ハ明カニ蛆毒素ニヨリ血管ノ收縮セル結果ナルコトヲ知レリ

之ヲ以テ見ルニ蛆毒素ノ血壓下降ヲ來ス原因ハ末稍血管ヲ擴張スルタメニモ非ザルコト明カナリ

3. 肺血行ニ及ボス作用

以上ノ實驗成績ニヨリ蛆毒素ニヨル大動脈血壓下降ノ原因ハ心臟ノ機能障害ニモアラス亦末梢血管擴張ノ爲ニモ非ザルコト明カトナレリ然ラバ血壓ノ下降ハ如何ナル機轉ニヨルモノナリヤ阿部⁽¹⁾ハ肺臓えきす、宮崎⁽²⁾ハはぶ蛇毒、平野⁽³⁾ハ蛔虫體腔液ニヨル血壓ノ下降ヲ肺血行ノ障害ニ依ルモノナリト報告セリ然ラバ蛆毒素モ亦肺血行ノ障害ヲ來タスモノニアラザルカ

コノ推定ノ下ニ余等ハ肺動脈血壓ト頸動脈血壓トノ關係ヲ知ラント欲セリ家兎ニ人工呼吸ヲ施シツツ左胸部ヲ披キ左肺ヲ露出シ左肺下葉ニ到ル肺動脈ニ動脈カニうれヲ挿入シ之ヲ水銀まのめーたニ連結シ血壓測定裝置ヲ施セリ次デ頸動脈ニモ同様血壓測定裝置ヲ施シ肺動脈血壓ト頸動脈血壓トヲ同時ニきもぐらふいおんノ煤煙紙上ニ描寫セシメ蛆毒素ヲ徐々ニ耳翼靜脈ヨリ注射シテソノ兩動脈ノ血壓ニ及ボス影響ヲ觀察セリ然ルニ實驗ノ結果ハ肺動脈血壓ノ著シキ上昇ニ伴ヒテ頸動脈血壓ノ下降ヲ示セリ（第4圖參照）即チ阿部ノ肺臓えきす、平野ノ蛔虫體腔液ヲ以テ行ヒタル實驗ト同一ノ成績ヲ得タリ

故ニ本實驗ニヨル頸動脈ノ血壓下降ハ肺血行ノ著シク障害セラレタル結果ナリト信ズ

III. 蛆毒素ノ諸臓器滑平筋ニ及ボス作用

肺血行ノ障害ヲ來ス臓器えきす等ハ臓器滑平筋ヲ收縮セシムト平野⁽³⁾ハ報告セリ故ニ余等モ蛆毒素ノ諸臓器滑平筋ニ及ボス作用ヲ檢シタリ

1. 剔出小腸ニ及ボス作用

剔出家兎小腸ヲ體溫りんぢやー氏液 100 c.c. 中ニ甦生セシメコレニ 0.5% 蛆毒素溶液 0.5—1.0 c.c. ヲ添加スレバ蠕動運動ハ盛トナリ緊張度ヲ増ス（第5圖參照）

2. 剔出子宮ニ及ボス作用

小腸ノ如クシテ 100 c.c. りんぢやー氏液ニ甦生セシメタル子宮ニ 0.2—0.5 c.c. ノ蛆毒素溶液ヲ注加スレバ子宮ノ著シキ收縮ヲ來タス即チ小腸ヨリモ少量ニテ收縮ヲ來タス（第6圖參照）以上ノ成績ニヨリ蛆毒素ハ小腸、子宮ノ滑平筋ニ對シテ收縮作用アルコトヲ知レリ

B. 蛆毒素ノ本態

余等ハ A = 於テ本毒素ノ毒作用 = 就テ論ジタレバ更ニ進ンデ其ノ有毒物質ノ本態 = 就テ檢索ヲ進メタリ

I. 蛆毒素ノ性狀

上述シタルガ如ク蛆體内液ハ透明ぐりせりん様ニシテ淡綠色ノモノナリ
蛆毒素ノ最小致死量ハ家兎ノ個性ニヨリ差異アレ共余等ノ經驗セルトコロ
= 依レバ體重 1 kg. = 就キ 3—5 mg. ナリ

1. 蛆毒素ヲ N/500 硫酸溶液ヲ以テ處置セル實驗

曩ニ石崎⁽⁴⁾ハ諸臓器浸出液ノ有毒物質ハ N/500 硫酸溶液ニヨリテ完全ニ沈澱セラルル事ヲ報告セルヲ以テ余等モ此ノ方法ヲ蛆毒素ニ試ミント欲シタノ實驗ヲ行ヒタリ

先ヅ 0.5% 溶液ノ一定量ヲトリ之ニ N/250 硫酸溶液ヲ等分ニ注加シ放置スルトキハ少シク渾濁ヲ生ズ此ヲ遠心分離シテ得タル上清液及沈澱物ヲ水ニテ原液量ニ等シカラシメ兩者ノ血壓ニ及ボス作用ヲ比較觀察セリコノ實驗ノ結果ハ沈澱物ニハ血壓下降物質ヲ證明シ得ザリシモ上清液ニ存在スルヲ確メ得タリ

即チ N/500 硫酸溶液ニテハ蛆毒素ハ沈澱セラレズ

2. 炭酸瓦斯ニヨル沈降試験

石崎⁽⁴⁾ハ臓器浸出液中ノ有毒物質ハ炭酸瓦斯ニヨリテ沈降スルコトヲ實驗報告セリ余等モ之ト比較研究ヲ行ハンガ爲メニ 蛆毒素ニ就キ Liefman 氏炭酸沈降法ヲ行ヒタリ

即チ蛆毒素ノ 0.5% 液ニ炭酸瓦斯ヲ通ズルコト 30 分ニシテコレヲ遠心分離シ上清液ト沈澱物トニツキテ檢スルニ上清液ニハ毒作用ナキモ沈澱物ヲ水ヲ以テ原液量トナシ之ヲ注射スルトキハ操作セザル毒素ト同様ノ血壓下降ヲ示スヲ見タリ

即チ蛆毒素ハ炭酸瓦斯ヲ 30 分間通ズルコトニヨリ完全ニ沈降セラル

3. 硫酸あんもにうむ半飽和溶液ニヨル沈降試験

石崎⁽⁴⁾次デ甲斐等ハ臓器毒ノ本態ハ硫酸あんもにうむノ半飽和溶液ニヨリテ沈澱スル物質中ニアリト報告セリ余等ハコレヲ蛆毒素ニ試ミタリ

即チ蛆毒素ノ一定量ヲ採リコレニ飽和硫酸あんもにうむ液ヲ等量ニ加フル時ハ白濁ヲ生ズコレヲ遠心分離シテ上清液及沈澱物ヲ共ニ少量ノ水ニテ稀釋シ兩者ヲ硫酸いおんノ消失スル迄濾膜滲透ヲ行ヒソノ量ヲ等シカラシメ斯クシテ血壓ニ及ボス作用ヲ觀察スルニ上清液ニハ毒作用ナクシテ沈澱物中ニノミ存スルコトヲ知レリ

即チ蛆毒素ハ半飽和硫酸あんもにうむ液ニテ完全ニ沈澱セシムルコトヲ得

4. 純あるこぼーるニヨル處置

粉末蛆毒素ニ純あるこぼーるヲ加ヘテヨク攪拌震盪スルモあるこぼーるニ溶解スルモノナシ

5. えーてるニヨル處置

粉末蛆毒素ニ就テ數回えーてる震盪ヲ行フモえーてるニ溶解スルモノナシ

6. 毒素ノ透過性ニ就テノ實驗

動物膜ノ透過性ノ有無ヲ檢セントシ 0.5% 蛆毒素溶液ヲ動物膜内ニ入レ其ノ内容ト等シキ蒸溜水ヲ盛レル器ニ之ヲ容レ 1—2 日經過セン後外液ニツキテ實驗シタルニ外液ヲ注射シタル動物ニ輕度ナレ共血壓ノ下降ヲ認メタリ

即チ蛆毒素ハ多少動物膜ヲ透過スルモノナリ

7. 毒素ノ吸着試驗

平野⁽³⁾ハ蛔虫體腔液ニツキテ吸着ニヨル毒力ノ變化ヲ檢シ又蛔虫毒ハ骨炭末ニ吸着セシメラルル事ヲ實驗報告セリ

余等ハ 0.5% 蛆毒素溶液ニ骨炭末ヲ加ヘコレヲ數回震盪シテ 30 分間後ニ遠心分離シ上清液ニツキテ檢スルニ尙毒作用ハ殆ド衰ヘザルヲ知レリ故ニ 24 時間放置セル後ニ前記ノ方法ニヨリテ上清液ヲ得再ビ同一ノ試驗ヲ試ムルニ最早其毒作用ヲ認メズ

即チ本毒素ハ 24 時間ニシテ完全ニ骨炭ニ吸着セラル

8. 蛆毒素ハ有機物ナルヤ無機物ナルヤ

更ニ本毒素ガ有機物ナリヤ無機物ナリヤヲ明カニスル要アルヲ以テ毒素ノ一定量ヲ燃燒シテ得タル灰分ヲ生理的食鹽水ノ一定量ニ溶解シ之ヲ家兎ニ注射スルニ血壓下降作用ヲ見ズ即チ本毒素ハ無機物質ニ非ザルヲ知レリ

9. 毒力ノ時間的變化

蛆毒素ヲ 0.5% ノ溶液トシテ氷室ニ放置スルニ 48 — 72 時間ヲ經過スルモ尙毒力ニ變化ヲ見ズ

10. 毒力ノ熱ニヨル變化

諸家ノ報告ニヨレバ臓器浸出液ノ有毒成分ハ熱ニ對シテ抵抗力弱ク 56°C — 70°C = 30—60 分間熱スレバ其毒作用ヲ失フモノノ如シ

然ラバ蛆毒素ノ熱ニ對スル抵抗力如何ト云フニ實驗結果ハ 60°C 30 分間加熱ノモノノ血壓下降度ハ對照無處置毒ノモノノ下降度ト同一ナルモ 100°C 30 分間加熱シタルモノハ全ク血壓ノ下降作用ヲ消失ス

11. 毒力ノ乾燥ニヨル影響

あるこほ一ニテ沈澱セシメタル本毒素含有粉末ヲ乾燥シテ貯藏スルニ數ヶ月後ニ至ルモ其ノ毒作用ニ變化ナシ即チ蛆毒素ハ乾燥ニ對シ抵抗力頗ル大ナルヲ知レリ

II. 毒素ノ本態ニ關スル考察

以上數項ニ亙ル實驗ノ結果ヨリ觀レバ蛆毒素ノ有毒成分ハぐろぶりん様物質ナリ而シテ弱耐熱性ニシテ放置ニ耐ヘあるこほ一、えーてるニ移行セズ輕度ニ動物膜ヲ透過スル性質ヲ有ス又本毒素ハ無機物質ニアラズ常ニびゆーれつと反應ヲ呈スルモノナリ即チ本毒素ハ比較的分子量ノ小ナル窒素化合物ナルヲ想像シ得ルガ如シ

C. 總 括

食道粘膜下寄生時代牛蠅蛆ハソノ囊狀體ニ強毒ナル液體ヲ包含シ該液體ヲ家兎ノ靜脈内ニ注入スレバ過敏性震盪症様症狀ノ下ニ之ヲ斃死セシム余等ハソノ有毒成分ノ本態ヲ鮮明ニシ次デ之ニヨル中毒症狀特ニ頸動脈血壓下降ノ機轉ヲ攻究セント欲シ本試驗ヲ開始セリ余等ノ得タル成績ヲ總括スレバ次ノ如シ

(1) 食道粘膜下牛蠅蛆ノ囊狀體内ノ内容ハぐりせりん様液體ニシテソノ有毒成分ハ酒精及えーてるヲ以テ沈降セラル之ヲ乾燥シ貯藏スル時ハ能クソノ毒力ヲ保持ス

(2) 該有毒沈澱物ノ最小致死量ハ靜脈内注射ニ於テ家兎體重 1 kg. ニ對シ 3—5 mg. ナリ

- (3) 該有毒成分ハソノ稀釋溶液ニ於テ N/500 硫酸溶液ニヨリ沈降セザルモ炭酸瓦斯並ニ硫酸あこもにうむノ半飽和溶液ニヨリテ沈降ス
- (4) 本毒素ハ動物膜ヲ僅カニ通過シ骨炭末ニヨリテ吸着セラル
- (5) 本毒素ハ 60°C ニ30分間ノ加熱ニヨリテハ變化ナキモ 100°C ニ30分間加熱スレバ毒力ヲ失フ
- (6) 本毒素ノ燃燒ニヨリテ得ルニ灰分ハ毒作用ヲ有セス
- (7) 以上ノ實驗結果ヲ綜合スルニ牛蠅蛆毒素ハぐろぶりん様蛋白質ニ近似スルモノト考フルヲ得ベシ
- (8) 毒素ノ家兎靜脈内注入ニヨル頸動脈ノ急激ナル血壓下降(第1圖)ハ肺動脈ニ於ケル血壓ノ著明ナル上昇(第4圖)ニ歸因ス
- (9) 本毒素ハ家兎ノ剔出小腸並ニ子宮ニ作用シ之ヲ夫々緊張(第5圖)收縮(第6圖)セシム即チ本毒素ハ臟器滑平筋ヲ收縮スル作用ヲ有ス

擱筆ニ臨ミ久保田教授並ニ葛西所長ノ御指導及御校閱ヲ深謝ス

文 獻

- (1) 阿部勝馬：東北醫學會雜誌，大正8年，VIII，19.
- (2) 宮崎三郎：慶應醫學，大正10年，I，1041.
- (3) 平野多賀治：慶應醫學，昭和3年，VIII，657.
- (4) 石崎仲三郎：慶應醫學，大正11年，II，1439；II，1455；大正12年III，41.

THE TOXICOLOGICAL INVESTIGATION IN THE
TOXIC SUBSTANCE OBTAINED FROM THE
LARVAE OF *HYPODERMA* SP. OF
MONGOLIAN CATTLE AT THE
OESOPHAGEAL STAGE.

B. TERADA

(From the Laboratory of Pharmacology, Manchuria
Medical College. Chief: Prof. S. Kubota)

and S. ONO

(From the Mukden Institute for Infectious Diseases of Animals,
S. M. R. Co. Director: Dr. K. Kasai.)

(Received for publication July, 18 1930)

The larvae of *Hypoderma* sp. of cattle parasitic in the sub-mucosa of the oesophagus contain a highly toxic fluid in its body, and the rabbit, if intravenously injected with it, reacts to it showing symptom like the anaphylactic shock. We tried to elucidate the nature of this toxic substance as well as the mechanism of the shock caused by it, especially the sudden fall of blood pressure in the carotid artery. The results obtained by us are summarized as follows:

(1) The toxic principle contained in the larval body is precipitated by alcohol or ether. The precipitate thus produced, if dried, retains its toxicity for several months.

(2) The minimum lethal dose of this toxic precipitate in the rabbit is 3—5 mg. per kg. by the intravenous injection.

(3) This toxic substance in the dilute solution is precipitated by CO_2 gas and the half-saturated $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, but not by $\text{N}/500 \text{ H}_2\text{SO}_4$.

(4) The present substance is slightly dialyzable and adsorbed by the bone charcoal.

(5) The toxin resists heat at 60°C for 30 minutes, but it

is destroyed at 100°C.

(6) The ash of this toxin shows no toxic action.

(7) From the above stated results, the larval toxin of *Hypoderma* sp. seems to be closely related to the globulin.

(8) The sudden fall of the blood pressure in the carotid artery (Fig. 1), which is manifested by intravenous injection of the toxin, is due to the marked rise of the blood pressure in the pulmonary artery (Fig. 4).

(9) The toxin raises the tonicity of the excised small intestine of the rabbit (Fig. 5) and the contraction of the excised uterus (Fig. 6). Namely it has an action which contracts the smooth muscles of the organs.

(Authors' abstract from their Japanese paper).

EXPLANATION OF PLATES

- Fig. 1. Action of the toxin upon the blood pressure of the carotid artery of the rabbit.
Fig. 2. Action of the toxin upon the heart of the toad.
Fig. 3. Action of the toxin upon the blood vessel of the hind leg of the toad.
Fig. 4. Action of the toxin upon the blood pressure of the carotid artery and the pulmonary artery.
Fig. 5. Action of the toxin upon the excised small intestine of the rabbit.
Fig. 6. Action of the toxin upon the excised uterus of the rabbit.

第 1 圖

家兎頸動脈血圧曲線 (0.5% 蛆毒素溶液 0.5 c.c. 静脈内注射)

第 2 圖

養別出甦生心臓ノ曲線(八木式灌流法)

(灌流りんぢやー氏液 10 c.c.)

第 3 圖

莖後肢血管灌流實驗成績
(Läwen-Trendelenburg 氏法)

第 4 圖

上曲線：肺動脈血壓

下曲線：頸動脈血壓

直 線：頸動脈血壓 0 線

時標(6 秒)

(0.5% 蛆毒素溶液 0.5c c.

靜脈內注射)

第 5 圖

家兔剔出小腸ノ緊張曲線

第 6 圖

家兔剔出子宮ノ收縮曲線