中央獸醫學雜誌

第50年 第11號

論 說

馬に於ける自律神経系、特に脊髓 副交感神経系に就て

木 全 春 生

EIN BEITRAG ZUM AUTONOMEN NERVENSYSTEM BESONDERS ÜBER SPINALEFFERENTE FASERN AM PFERDE.

H. KIMATA.

(Aus dem physiologischen Institut der veterinären Abteilung der kaiserlichen
Universität zu Tokyo. Vorstand : Prof. Torai Shimamura)

目 次

I. 緒 論	4. 第5腰髓後根切斷成績
II. 動物實驗	5. 實驗成績並に考按
1. 實驗動物及實驗方法	IV. 馬腰髓後根神經纖維の組織學的檢
索
2. 固定法及染色法	1. 緒 論
III. 實驗成績	2. 實驗材料固定及染色
1. 第2腰髓後根切斷成績	3. 實驗成績並に考按
2. 第3腰髓後根切斷成績	V. 馬脊髓前根及後根神經纖維並に後
肢末梢神經幹の組織學的檢索
3. 第4腰髓後根切斷成績	

1. 緒 論	VI. 總括竝に考按
2. 實驗材料固定及染色	VII. 結 論
3. 實驗成績竝に考按	文 献
附. 馬尾神經麻痺症馬の脊髓後根神經纖維象の1例に就て	附 圖 說 明

I. 緒 論

自律神経系に關する研究業績は、輒近相繼ぎて發表せられ其の闡明せられしもの亦尠からず。今脊髓に於ける自律神経系の研究に關する業績文獻を涉獵するに1876年 Stricker氏⁽¹⁾が脊髓後根中に血管擴張神經を含む事を證明せしに始まる。即ち氏は犬に於て切斷せし第6及第7腰髓神經の後根神經末梢部を電氣的或は機械的に刺戟せしに、後肢趾に於て血管擴張竝に溫度の上昇を認めたり。この成績は其の後 Gärtner,⁽²⁾ Morat,⁽³⁾ Weiziloff,⁽⁴⁾ Cossy,⁽⁵⁾ Hasterlik,⁽⁶⁾ Benuzzi,⁽⁷⁾ Bornezzi氏⁽⁸⁾等により追試せられしも、Vulpian,⁽⁹⁾ Kühlwetter氏⁽¹⁰⁾等は同様の成績を得ずとして之に反對せり。次で Bayliss⁽¹¹⁾及 Langley氏⁽¹²⁾等は Stricker氏の認めたる脊髓後根の刺戟によりて起れる血管擴張現象は特殊なる神経纖維の存在に依るものにあらずして、刺戟が知覺神経纖維を逆に傳はりて其の終末部に於て或種の新陳代謝作用を起し、こゝに生ぜし新陳代謝産物が血管擴張を起す、即ち所謂逆傳導説を唱へたり。惟ふに第6第7腰髓神經後根の刺戟が後肢血管の擴張を起すとの事實は、一般生理學者により認められたりとは雖も、尙血管擴張神経は本來の性質より言はば、副交感神経に屬するものなりと豫想され居り且逆傳導なる現象が不可思議なりと思惟され居りしを以て、Stricker氏の謂ふ如く脊髓後根中に血管擴張神経の存在する事は依然疑問視せられたり。

L. R. Müller氏⁽¹³⁾は其の著「生活神経」中に於て理論的見地より考ふる時は、血管擴張神経は胸髓及腰髓上部の後角より發し、後根竝に脊髓神經節を遠心性に走行すと推定さる。従つて血管擴張神経は副交感神経に屬すべきものなれども、未だ之が組織學的證明を爲せしものは無しと述べたり。又 Schiff氏⁽¹⁴⁾は血管擴張神経に就き論じたる後、前者同様此れは當然副交感神経なるべき苦なるも、現在⁽¹⁵⁾に於ては尙其の然ると云ふ根據なしと言へり。T. Lewis氏は後根刺戟によりて

認めらるゝ血管擴張現象は刺戟に際して神経末梢部に生ずるヒスタミン様物質が血管に働きて惹起せらるるものなりとしたり。

Dale氏⁽¹⁶⁾は頸部交感神経に就きて、Rogowicz氏⁽¹⁷⁾現象は恐らく頸部交感神経中に脊髄後根より出る血管擴張性神経繊維の存在するに依るものならん、而して頸部交感神経中に於てこの現象を惹起する繊維は其の作用の點竝にアセチル・ヒョリンが後根刺戟に際して其の末梢部に發生し、この作用の中介を爲す點より推理して、該神経繊維は副交感神経に屬するものなるやも知れずと述べ、頸部交感神経中に副交感神経繊維の含有する事の可能なを唱へたり。然れども Euler 及 Gaddum兩氏⁽¹⁸⁾は頸部交感神経刺戟による上口唇の假性運動性收縮試験を追試し、假性運動收縮を顔面筋に惹起すべき無髓神経繊維は頸部交感神経節上節に介在神経節を有し、之は Dastre 及 Morat兩氏⁽¹⁹⁾の證明せる血管擴張神経に一致すと述べ、Rogowicz 氏現象に對するアセチル・ヒョリン、エゼリン、アドレナリン、エルゴトキシン等の作用を見て本現象は解剖學的には交感神経性にして、藥理學的には副交感神経性なる事恰も汗腺の自律神経支配の如しと稱せり。

脊髄後根が皮膚、骨及關節等の組織の榮養支配と關係を有する事は從來屢々唱へられたる所にして、實驗的に之が證明を企てたるは Vulpian氏⁽²⁰⁾なり。氏は1878年犬の一側性脊髄後根切斷實驗を行ひ手術側の肘關節に變形關節炎の起るを認め、脊髄後根は關節の榮養と密接なる關係ありと唱へたるも、一般に承認さる所とならず、Samuel氏⁽⁹⁶⁾は始めて榮養神経なる名稱を附けしも、次で1887年に至り Joseph氏⁽²¹⁾は猫の第2頸髄後根の一側に於て、後根神経節上部にて反對側にては上部に於て切斷したるに、前者は外耳及後頭部附近の皮膚に脱毛を來すも、後者には何等の變化を認めず、又兩側第2頸髄後根神経節剔出を行ふ時は兩側外耳及後頭部附近の皮膚に左右對稱的に脱毛を生じ、同時に該部皮膚の滑澤となれるを認めたり。こゝに於て同氏は後根神経節が榮養神経の起始點なるか或は然らずとするも榮養と何等かの關係を有すと主張せり。Gaule氏⁽²²⁾は蛙に就き一側脊髄後根神経節に損傷を加へ、手術側皮膚に榮養障礙を惹起せしめ、後根神経節の部分的損傷は組織榮養障礙を惹起する有力なる刺戟となるものにして、かゝる刺戟は神経節剔出による脱落現象よりも強力なる事を認めたり。次で氏は家兎の頸部交感神経節に就き同様の結果を得たり。

G. Köster⁽²³⁾氏は1994年犬及猫を用ひて前述 Joseph の實驗を追試し脊髓後根と栄養との間に密接なる關係あるを主張せり。1904年に至り W. Trendenburg⁽²⁴⁾氏は鳩を用ひて一側脊髓後根の切斷により、術側後趾の著明なる肥厚及趾の一部缺損、脱落症狀を觀察せり。又一方 Charcot⁽²⁵⁾氏は臨牀上より脊髓後根を通ずる神経纖維中には知覚神経の外に少數の反射機能を營む神経纖維の存する事より、遠心性神経纖維を推理し之が皮膚の栄養支配に直接關係を有すべく、然もかゝる栄養神経は分泌神経と等しく神経終末の分布領域の栄養を支配し、これが缺如によりて栄養障礙を惹起するものにして、脊髓後根神経節或は之に相當する頸部神経の神経節より起るものならんと言へり。Eulenburg⁽²⁶⁾氏は皮膚の栄養を支配する神経纖維は知覚神経纖維と共に脊髓後根中を走り、脊髓後根索に入り更に後角に至り灰白質の中部及後部に達すと説けり。Böwing, Helmut⁽²⁷⁾氏は組織の栄養問題を論じ、脊髓癆患者の皮膚、筋肉、骨及關節等の栄養障礙は脊髓後根及脊髓後索の侵さるゝに依ると説明せり。又一方隨意筋の副交感神経緊張を主張せる Frank⁽²⁸⁾氏は1919年に至り組織學的檢索を行ふ事なくして副交感神経は脊髓後根を通じて筋に至るものにして、其の経路は知覚神経と全く同一なりとし、之を Parasympatisch-sensible Nervenfaser と命名せしも、其の後緊張神経は血管擴張神経と同一経路をとるものと改めたり。

以上の如く脊髓に於ける自律神経に關する諸問題は長く學界の謎として未解決の儘今日に至れり。然るに1922年以降各脊髓節に互りて、脊髓後根の系統的組織學的檢索を行ひ、副交感神経は脊髓後根を遠心性に通過すと謂ふ事實を組織學的に證明せしは實に吳教授及其門下なり。該研究の成果は Stricker⁽¹⁾以來懸案たりし血管擴張の問題を一氣に解決し、其知覚神経との別を明にせり。今や之によりて Langley⁽²⁾氏の antidrome-Leitung なるものは最早假定するを要せざるに至れり。今吳教授及其門下により築かれたる脊髓副交感神経に關する赫々たる業績の跡を尋ねるに次の如し。

曩に吳教授は其の門下と共に十數年來隨意筋の自律神経支配に關し研究し、幾多の動物實驗及臨牀的論據により、隨意筋の栄養竝に緊張は腦脊髓神経、交感神経、副交感神経及錐體路外導路性神経の4種により支配を受くる事を明にし、且此の四者は官能的には相互に代償するものなりとの學説を樹立せり。斯くして

Samuel 氏以來の難問題とされたる脊髄後根中の所謂營養神經なるものは、吳教授により完全に組織學的に證明せられたり。翻て副交感神経に關する諸研究を觀るに之亦吳教授並に其の門下による十餘年の久しきに互る生理學的並に組織學的研究により幾多の學者が其の解決に苦み且常に論争の因を醸せし脊髄に於ける副交感神経に關する諸問題を解決するに至れり。

吳⁽²⁹⁾教授は波多野、篠崎及永野氏等と共に動物實驗により、相當せる脊髄後根の切斷が腹部交感神経節剔出による筋ジストロフキ様變化を促進する事を證明し、これが原因を後根切斷による副交感神経性支配の減退による爲めなりとせり。又副交感神経纖維が筋緊張に對して、腦脊髄神経及交感神経と同一方面に向ひ亢進的に支配するものなる事は⁽³⁰⁾荒木、⁽³¹⁾藤田、⁽³²⁾⁽³³⁾加地及前野、辻⁽³⁴⁾諸氏の研究により明となれり。更に吳教授は副交感神経と隨意筋營養との關係を究明せんとして從來副交感神経として知られたる神経纖維を除去し、之が營養に及ぼす影響を検索せり。即ち吳教授室に於て今川⁽³⁴⁾氏は犬及猫に就き副交感神経の經路たる鼓索神経の切斷によりて舌筋にジストロフキ様變化を起さしめ、須永氏⁽³⁵⁾は毛様神経節摘出乃至は破壊により動眼筋にジストロフキ様變化を認め、小島氏⁽³⁶⁾も之を再試し同一結果に達せり。櫻澤氏⁽³⁷⁾は蝴蝶口蓋神経節の剔出により口唇筋にジストロフキ様變化を發せしめ得たり。又白石氏⁽³⁸⁾は動眼筋を支配する副交感神経纖維は小徑有髓神経纖維より成り、其の節後纖維も小徑有髓神経纖維より成ることを明にせり。尙櫻澤氏は口唇筋に至る副交感神経纖維は小徑有髓神経纖維にして⁽³⁹⁾其の節後神経も亦小徑有髓神経纖維なる事を確めたり。前田氏は舌神経中に舌筋の營養に關係せる副交感神経纖維の存在せるを證明せり。又中尾氏⁽⁴⁰⁾は舌咽神経が主として舌の後半の營養に關係ある副交感神経纖維を含む事を證明せり。中澤氏⁽⁴¹⁾は人屍及犬に就き其の脊髄神経及末梢神経中の小徑有髓纖維の分布を精細に検索せる後、下肢筋に至るや小徑有髓神経纖維の3分の2以上は後根性起原なる事を確めたり。尙同氏は進行性筋ジストロフキ患者の末梢神経筋肉枝中の小徑有髓神経纖維を検索せるに、健康人屍筋肉枝中の夫に比し3分の1乃至2分の1に減少せる事を認めたり。以上の事實より此種後根性起原を有する小徑有髓神経纖維は副交感神経ならんとの推定を益々深むるに至れり。茲に⁽⁴²⁾於て吳教授は松浦氏と共に脊髄後根中に果して隨意筋に對する副交感神経性の

栄養支配神経繊維存するか、若し存すとせばかゝる官能を有する繊維は脊髓より直接に筋肉に達するや、或は一度後根神経節に終るものなりやを決定せんとして實驗を行ひしに、其結果後根を通ずる栄養神経は後根神経節内に介在神経節を有するものなるが如く、且後根切斷のみにてても亦栄養に影響を及ぼすものなりと説明せり。更に吳教授は從來組織栄養と關係ありとせられたる後根中に含まるゝ小徑有髓神経纖維中に副交感神経に屬するものあるに非ずや、即ち此の後根中に含まるゝ栄養神経は果して副交感神経纖維なりや、或は知覚神経纖維にして、隨意筋に對しては Bayliss 及 Langley 氏等の言ふ如く逆傳導により栄養を司るものなりやを決定せんとし、其門下新田、辻、白石、末永⁽⁴³⁾の諸氏と共に犬に就き腰髄後根神経節を剔出又は後根を切斷せられし結果後根中に多數の遠心性小徑有髓神経纖維の存する事を認めたり。更に其の原始細胞に關しては、川口氏⁽⁴⁴⁾により又神経纖維に關しては三枝氏⁽⁴⁵⁾により殆ど脊髓全般に互りて精細に研究せられたり。即ち多數の動物實驗の結果犬腰髄に於ては脊髓後根中の小徑有髓神経纖維の殆ど全部が脊髓性の副交感神経纖維に屬し、之に反し第1薦髄後根にては、其の後根小徑有髓神経纖維の約5分の1が脊髓性の副交感神経に屬し、第2薦髄に於ては其の後根小徑有髓神経纖維の6分の1乃至7分の1のみが脊髓性副交感神経に屬する事明となれり。冲中氏⁽⁴⁶⁾は三枝氏の實驗を補ひ第4頸髄以下第8頸髄後根に至る迄の動物實驗に成功せり。この結果頸髄後根に於ても脊髓遠心性小徑有髓神経纖維を證明し、少きは後根小徑有髓神経纖維の約10%が脊髓性の副交感神経に屬し、多きは後根小徑有髓神経纖維の80%乃至殆ど全部が之に屬し、40%乃至60%を占むるもの最も多きを認めたり。

之等の諸事實より Stricker 氏以來疑問とされたる副交感神経は脊髓遠心性小徑有髓神経纖維なるべしと推論せらるゝに至れり。尙新田氏⁽⁴⁷⁾は犬及猫に就き之が脊髓核に關する研究を行ひ主として灰白質の前角及後角の内層に位する小神経細胞が脊髓中樞と見做さるべきものなるべしと主張せり。斯の如く頸髄より薦髄に互る凡ての脊髓後根中に副交感神経纖維存在し、且其の中樞は前角と後角膠様質の間に存在し、之は脊髓後根中を遠心性に走る小徑有髓神経にして一旦後根神経節内の神経細胞に終り、之より出る節後纖維も亦小徑有髓性神経纖維なる事を發見せられ、吳教授⁽⁴⁸⁾は之を脊髓副交感神経と命名せられたり。

尙吳教授は臨牀上栄養障碍を伴ふ疾患と脊髓副交感神経との關係に就き其の門下と共に次の如く研究を試みられたり。猿渡氏⁽⁴⁹⁾は脊髓癱患者の後根中の小徑有髓神経纖維の著しき減少を認め、之より脊髓後根中の小徑有髓神経纖維が組織栄養と關係あるを認め、川口氏⁽⁵⁰⁾は脊髓空洞症患者の剖検に就き、渡邊氏⁽⁵¹⁾は癲患者屍に就き何れも脊髓後根中の小徑有髓神経纖維の組織栄養と密接なる關係ある事を立證せり。山縣氏⁽⁵²⁾は鞏皮症は副交感神経性栄養支配障碍に因る事を認め、更に同氏は凍傷が副交感神経性緊張減退による疾患ならんとの推定の下に、ピロカルピンが治療的豫防的效果あるを認め、山縣氏⁽⁵²⁾は鼻組織栄養の神経支配に就き研究し副交感神経が該組織の栄養に關與する事を認めたり。此の遠心性小徑有髓神経纖維は以上の如く隨意筋緊張竝に栄養及血管擴張を司るの外に腹腔内諸臓器を脊髓副交感神経として支配する事も亦其後吳教授及其門下により相繼ぎて證明せらるゝに至れり。市古氏⁽⁵⁴⁾の小腸運動に於ける、石川氏⁽⁵⁵⁾の胃運動に於ける、和田氏⁽⁵⁶⁾の副腎に於ける、神田氏⁽⁵⁷⁾及若林氏⁽⁵⁸⁾の腎臓に於ける、藤井氏⁽⁵⁹⁾の腎臓外分泌竝に膀胱運動に於ける、谷島氏⁽⁶⁰⁾の膀胱内分泌に於ける、塚田氏⁽⁶¹⁾の噴門運動に於ける、更に池田氏⁽⁶²⁾は肺臓血管に、橋本氏⁽⁶³⁾は舌血管に、田中氏⁽⁶⁴⁾は陰莖血管に夫々脊髓副交感神経支配を認め、中川氏⁽⁶⁵⁾は脊髓副交感神経と組織栄養支配に關する實驗的研究を、大島氏⁽⁶⁶⁾は脊髓副交感神経が筋デストロフィー發生に重要な關係を有する事を證明し、既述せし松浦氏⁽⁴²⁾、中澤兩氏⁽⁴⁰⁾の業績を再認識せり。

大越氏⁽⁶⁷⁾は從来自律神経に關する諸問題は主として犬又は猫の如き小動物に限られたりしが、大動物殊に馬の末梢神経幹に就きて組織學的檢索を行へり。氏によれば馬前肢末梢神経幹に於ける神経纖維像の特異とする所は、犬の場合に比し頗る多數の無髓神経纖維の存する事なり。即ち犬に於て前肢末梢神経幹就正中中、尺骨神経に於ける神経纖維像は殆ど有髓神経纖維にして、無髓神経纖維は其の間に散在して極めて少數に之を認むるのみなり、更に有髓神経纖維の主なるものは中徑有髓神経纖維にして、之に比較的少數の大徑有髓神経纖維と可成り多數の小徑有髓神経纖維なる事等他の一般動物同様の所見と異ならず。然るに馬に於ける前肢末梢神経幹主として正中、尺骨神経に於ては、之に反し有髓神経纖維の大部分は大徑有髓神経纖維にして、中徑有髓神経に小徑有髓神経纖維は頗る少

數なり。更に無髓神経纖維は有髓神経纖維の 1.5 乃至 2 倍に及ぶを認め得べしと謂ふ。更に精しく馬前肢末梢有髓神経纖維を區分して、正中神経に於ては大徑有髓神経纖維は65乃至70%、中徑有髓神経は11%内外、小徑有髓神経纖維は22%内外にして、尺骨神経は大徑有髓神経纖維は55乃至70%、中徑有髓神経纖維は15%内外、小徑有髓神経纖維は約30%なりと。以上の成績より馬前肢末梢神経幹に於ては、無髓神経に關しては、他動物に比し著しく多く、有髓神経中小徑有髓神経⁽⁴¹⁾に就て觀るも、先に中澤氏⁽⁴¹⁾が人及犬に就きて行ひたる業績と比較する時、正中神経に於ける小徑有髓神経纖維は約30%、尺骨神経に於ては30乃至40%なり、而も之等神経に於ては随意筋に至る筋枝を含み、筋緊張竝に栄養神経なる小徑有髓神経纖維と共に、より多數なる筋緊張竝に運動神経たる大徑有髓神経纖維を含むを以て、之を馬に於けるが如く、筋枝を除外して考ふる時は小徑有髓神経纖維の割合は馬の其に比し遙に之より大なるものと思ふを得べし。換言せば馬前肢末梢神経幹に於ける小徑有髓神経纖維中の副交感神経纖維の割合は他動物の其に比し頗る少きものと認むるを得べしと謂へり。

以上の如く脊髓副交感神経に關する吳教授及其門下の長年月に亙る研究業績は愈々出で、愈々明に本態が闡明せられ、今や一步又一步他の追従を許さざる金字塔の完成に近づきつゝあり。而して大越氏の研究により馬の前肢末梢自律神経中交感神経及び副交感神経は他の諸動物に比し著しく相違せる事を明にせられたり。依て余は馬の脊髓副交感神経竝に無髓神経に於ても果して然るや否やに就き吳教授御指導の下に研究を進め小知見を得たるを以て茲に報告せんとす。

II. 腰 髓 後 根 切 斷 實 驗

1. 實驗動物及實驗方法

實驗動物は凡て馬を使用せり、體重は多く 400 斤内外のものにして、比較的幼齡馬即ち 4 乃至 6 歳のものを選択せり。合計 12 頭に就き腰髓に於て後根神経切斷手術を行ひしも、僅か一後根の切斷を行ふにも手術創深く、從つて創面は頗る大となるため、手術に長時間を要し、この爲多量の出血を來し、或は術後馬匹の體力を著しく減少せしめ、衰弱甚しく加はり、術部の完全なる快癒迄には 2 ヶ月内外を要する等他の小動物の場合に比し實驗の條件極めて悪く、多數の實驗動物を

獲られざるに拘らず、實驗中途にて斃死するもの多く、最後迄標本を作製するを得たるは僅に6頭に過ぎず。

馬を大なるゴム製褥上に横臥保定し、先づナルコポンを馬體重に應じ0.3乃至0.4瓦を生理的食塩水10匁に溶解し、頸側皮下に注射す。次で著者考案の馬匹用エーテル麻醉器を使用し300乃至500匁の麻醉用エーテルを以て馬を全身麻醉せしむ。一方手術部位を20×30匁の廣さに剃毛し、エーテル、酒精及マーキュロクロームを以て充分に消毒したる後、清潔なる有窓ガーゼにて手術部位を露出し他の部は被ふ。次で3%ノボカイン50乃至60匁を以て術部の皮下及筋肉内に注射したる後、一側背面所望の高さの腰髓部に先づ脊柱に平行に約5乃至10匁、これを底邊とせる高さ15乃至20匁の二等邊三角形の大きさの切皮を施す。該部の皮膚は爾後の操作上障碍大なる爲剝離除去せり。次で皮下筋、背長筋をも略皮膚創と同じく筋繊維を横斷し、血管を結紮し、神経を避けつゝ筋肉を除去し遂に横突起に達す。其の深さ8乃至10匁なるを普通とす。馬の腰椎は犬に比し1個少く6個なり、而して横突起は大にして、長く側方に挺出し、就中第1、第2腰椎は少しく後方に向ひ、第3腰椎に於て最も長く、略正しく外方に向ふ。第4腰椎以下は少しく前方に向ふ、従て各横突起起始部後面内に存する脊髓神経節の位置も横突起の方向に依り異る、依つて今横突起起始部、椎弓の後縁に於て骨鑿を以て小指頭大の骨片を除去す。この際骨に密著して走行する静脈を毎常損傷するが故に、止血を充分ならしむ。附近の骨片を排除せば脂肪組織により包まれたる米粒大乃至小豆大の脊髓後根神経節を發見す。その際脊髓後根神経節を若干持ち擧ぐる時は神経節より脊髓に近き部は全部脊髓後根神経纖維束なれば、その下面に特種の長柄附鋭利なる刀を挿入し、後根を脊髓硬膜と脊髓神経節の間に於て切斷す。切斷後は必ず通常鑷子を以て脊髓神経節を把持し、後根が完全に切斷せられあるや否やを確む。若し完全に切斷さるゝ場合は脊髓神経節は外方に反轉し得るが故にそれと知るを得べし。

目的を果さば、切斷面を清潔にして充分に止血す。手術の操作上附近の皮膚及筋肉を除去する爲、大なる空洞を形成するに至る。その儘内部にヨードフォルム・ガーゼを填充し、上をコロヂウムにて包攝したる後動物を起立せしむ。爾後は創液の排泄を圖るを専らとし、毎日リヴァノールにて洗滌しヨードフォルム・ガ

一ゼを交換し、手術5乃至7日以降肉芽の新生始る頃より紫外線又は赤外線を1日30乃至40分間交互に照射し肉芽の發生を促す。一方手術後強心處置としてリンゲル氏液、ロツク氏液又は高張葡萄糖液にデキタミンを混じ静脈内に注射す。

馬の第6腰椎は解剖上その後半部は腸骨の兩内角に完全に被はるゝが故に、第6腰髓の後根に達せんには、腸骨内角を除去するに非れば到達するを得ず、爲めに該手術は極めて困難にして余の實驗に於ても常に手術中亡血死を來さしめ、遂に1頭の第6腰髓後根切斷手術に成功せしものなし。

2. 検査方法

上述せる如き手術を施せる馬匹が斃死し、或は一定時日間生存せしめたる後放血致死せしめ、速に剖検に附せり。生存日數長時期に亙るものは、術部附近の結締組織の増殖著明にして、硬固となり、時として軟骨様の硬さを呈するものあり。毎常附近の脊髓硬膜は肥厚せり、依て腰椎部の筋肉を出来る限り除去し、馬體より採り出し、次で棘上突起を鋸斷し、骨鑿にて脊髓硬膜を露出し、後根の切斷確實なりや否やを確めたる後、注意しつつ脊髓硬膜を縦に割きて、切斷後根中樞部を採り、健側後根の同一節より同じく検査材料を採り、直ちに小紙片毎に眞直に貼り、ホルマリン液中にて固定す。一方切斷末梢端は先づ手術側脊髓神経節を發見し、周到なる注意の下に附近増殖結締組織を除き去り、後根末梢部を採り同様の方法にて検査材料に供せり。

固定法竝に包埋法

採出せる神経纖維を約1×2浬の大きさに切りたる濾紙片上に眞直に貼りつけ、次でホルマリン溶液中に浸す。材料固定には10%ホルマリン水溶液を使用せり。通常約1週間にて固定の目的を達するを以て、其後流水にて水洗し約1晝夜の後所望の太さに神経を分離せり。分離せる神経は約1.5乃至2.0浬の長さに切除し第1及第2普通酒精に浸漬せしむること各1晝夜なり。余は多くの標本は特に媒染を行はずして、直ちにワイゲルト氏の染色過程に移りしも、時として標本の仕上り不良の爲計算分類上困難を感じ場合ありしを以て、屢々ワイゲルト氏の髓鞘媒染劑にて約7日間媒染を行ひて後染色せしに良好の成績を収めたり。

普通酒精の浸漬終らば、神経纖維片を馬の肝臓中に挿入せり。茲に使用せし肝臓は亡血致死せしめたる健康馬の新鮮なる肝臓を10%ホルマリン水溶液にて1

週間以上固定し、後水洗して、70%酒精より純酒精迄移して、貯蔵せるものなり。この際肝臓片は出来る限り邊緣部を使用せり。邊緣部は質緻密にして菲薄なる切片標本を製するに便なればなり。肝臓に垂直に挿入せる神経標本を第1及第2の無水酒精並にエーテル、無水酒精等分液に浸漬すること各1晝夜なり。次にツェロイデン包埋を施す。2—4—10%ツェロイデンに各々1週間宛浸漬し、次で肝臓挿入材料を木片上に貼布し可及的徐々に乾燥せしめたり。概ね10乃至12時間後適當の硬さとなるが故にそれを普通酒精に12乃至24時間浸漬し、ミクロトームにかけ10ミクロンの厚さに横斷切片を製せり。

染 色 法

殆ど全部の標本にワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン髓鞘染色を施したり、時にワンギーソン氏染色法を併せ行ひ、専らシュワン氏核の判別に供せり。標本を次の染色液に浸漬す。第1原液はヘマトキシリン 1.0瓦、純酒精99.0瓦より成り。第1原液は調製液3乃至25日以内の新しきものを使用せり。第2原液は過クロール鐵 4.0瓦、蒸餾水96.0瓦より成る。使用直前に第1原液と第2原液とを3:2.5の容量比に混じ充分に振蕩して濃紫色を呈するに至らしむ。染色は室温にて24時間を要し、次に染色槽より取り出したる切片標本を清水にて水洗し、次の分化液に浸漬す。其の組成は關砂 2.5瓦、赤血鹽 2.0瓦、蒸餾水 100.0瓦にして原液の儘にて使用す。約8乃至20分間。普通15分間にて大體の分化を行ひ、其の都度鏡檢により、分化の適度を判定せり。分化を終へたる切片は液より引き上げ清水中にて充分水洗す。普通24時間を要す。水洗完了せば切片は普通酒精2回、無水酒精1回を通過せしめたる後、オブジェクト硝子板上にて水分を除去し、バルサムにて封鎖せり。

計 算 法

有髓神経纖維の計算法は從來吳較室にて採用されたる中澤氏の案出せる方法に依れり。即ち油浸裝置にてユールリツヒ氏方形接眼盲窓を用ひ、盲窓を最少方形に絞りて、視野を小區域に分割しつつ標本を左より右へ、上より下へ移動しつつ、全視野の有髓神経纖維を數探り器を使用して計算し、全標本の和をとりて該後根の有髓神経纖維の總數とせり。然る後接眼レンズにオクラー・ミクロメーターを入れ各有髓纖維の直徑を測定し3種に分類せり。尙特に中徑有髓神経纖維に屬

するものは、往々大徑有髓神経の小なるものとの區別困難なる場合あるに依り、この際にはオクラール・シュラウベンマイクロメーターを使用して其の正確を期せり。神経纖維の大きさは吳教室の慣習に倣ひ之を次の3種に分別せり。即ち直徑5ミクロン及5ミクロン以上のものを大徑有髓神経纖維、3ミクロン及3ミクロン以下のものを小徑有髓神経纖維、この中間のもの即ち5ミクロンより3ミクロン迄のものを中徑有髓神経纖維とせり。標本により時として斷面楕圓形を爲せる神経纖維を見ることあり、この際は其の最短徑を以上諸神経纖維の直徑として測定分類せり。

III. 實 驗 成 績

1. 第2腰髓後根切斷成績

第1例 馬名 烏花、毛色 栗、性 騾、年齢 6歳、體重 425斤、昭和11年7月31日右側第2腰髓に於て脊髓後根神経節と脊髓との中間に於て切斷す。手術中稍出血多量なりし爲め、手術操作に約4時間を要したり。創内はリヴァノールにて洗滌し後ヨードフォルムガーゼを挿入す、5%葡萄糖液1000cc及ヂキタミン10ccを靜脈内に注射す。手術第7日目より體溫上昇し爾後 39.5°乃至 40.5°の高溫持續せしも約1週間後漸次減退し、一般症狀も良好となり元氣恢復す。術部の肉芽發生良好に進み約2ヶ月後完全に治癒せり。

昭和12年1月14日 殺處分、生存日數 168日。

剖 檢 的 所 見

創面は完全に治癒し、僅に皮膚の一部に若干陥凹せるを認むるのみなり。左側腰髓外側部附近に於て鶏卵大の結締組織の増殖せるを認む、殊に脊髓神経節附近に於て硬固となれり。脊髓硬膜も亦肥厚せり。注意しつゝ結締組織を剝離し檢するに左第2腰髓後根は脊髓硬膜及後根神経節の中間に於て完全に切斷せられ、切斷中樞は萎縮し、肥厚せる硬膜に癒著す。切斷末梢部は神経節に近く且増殖せる結締組織と共に緊密に癒著し、之より材料を採取するに聊か困難を感じたり。

脊髓硬膜内の中樞片を見るに細き木綿糸大の神経纖維 7乃至8本に分れ、淡黃褐色を呈し健側に比し著しく萎縮し脆弱となれるを認む。依て丁寧に各枝毎に切除し濾紙上に眞直に貼布、固定せり。反對側第2腰髓後根を同様の方法にて採取

と比較対象に供せり。

組織學的所見

(1) 健側

弱擴大にて檢するに各神経纖維は美麗なる黒紫色に染色せられ、大なる神経纖維最も明瞭に視野中に現はる。更に注意して檢すれば小にして點狀を爲して密集的に存在する無數の神経纖維の配布せらるゝを認む。今油浸装置によりて、強擴大にして檢するに大徑有髓神経殊に10乃至15ミクロンの直徑を有する神経纖維は廣く點在し、其の各々は厚さ2乃至3ミクロンの車輻狀の髓鞘を有す。時には菲薄なる髓鞘を有するもの、淡紫色に著染せるもの等あり。中徑有髓神経纖維に於ても前者より髓鞘の厚さ稍々薄きも、何れも規則正しき車輻像を呈す。小徑有髓神経纖維は大中徑有髓神経纖維間に或は集約的に、或は散發的に存在し、其の形態概ね正圓形環狀を呈し、髓鞘の厚さは前二者に比し著しく薄きも何れも一様の幅を有す。直徑2乃至2.5ミクロンのもの最も多數を占む。

脊髄後根神経纖維總數は12897本にして、大徑有髓神経纖維數3288本、中徑有髓神経纖維數1226本、小徑有髓神経纖維數8383本にして全有髓神経纖維數の64.9%に相當す。

(2) 切斷側中樞片

始め弱擴大にて鏡檢するに、全視野黒紫色を呈し一見神経纖維なるを疑はしむ。更に注意して檢すれば、相密接したる黒紫色の無數の小點の集合にして、健側所見に比し全く其の趣を異にす。染色の程度は健側と同様にする時は常に鮮明の程度不足す。依て余は種々の程度に染色の時間を増加し、或は分化の程度を減少せしも尙健側に比し組織像の鮮明を缺けり。

而して油浸装置を以て之を檢するに全視野は殆ど全く小徑有髓神経纖維のみより成り、健側の所見とは大なる差異あるを一見して認む。其の髓鞘は菲薄に見ゆるも、仔細に檢すれば健側の小徑有髓神経纖維と變りなく、夫々車輻狀の髓鞘を有し其の厚さは一定にして環狀を爲す。形態は正圓形に近く其の直徑をオクラー・シュラウベンマイクロメーターにて測定するに大なるは2.8ミクロン、小なるは0.8ミクロン又はそれ以下にして、一般に2乃至2.5ミクロンのもの最も多し。所々に高度の結締組織の増殖を認め、且これ等多數の小徑有髓神経纖維間に淡褐色

卵圓形又は圓形のシュワン氏核の多數に増殖せるを認む。大徑有髓神經纖維は全視野中僅に23本を發見せしのみなり。然もその中3本は何れも高度の變性像を示し、満足なる髓鞘を備ふるものなく、髓鞘の破壊せるもの不規則なる髓鞘の厚さを有し、其の一部に染色液を強く吸収せるものあり。組織の邊緣に近く多數の圓形の空隙の存在を認む、其の大きさは5ミクロン以上、20ミクロンのものにして、恐くは大徑有髓神經纖維の變性吸収せられたる跡なるべし。中徑有髓神經纖維は僅に11本を認めしに過ぎず、これも髓鞘破壊し變性の途中にあるもの多し。而して健全なる小徑有髓神經纖維は8148本にして健側に於ける小徑有髓神經纖維數8383本に對し97.3%に達す。

(3) 切斷側末梢片

弱擴大にして檢するに灰白色の基質面上に明瞭なる黒紫色に濃染せる圓形纖維の存在するを認め、更に注意すれば、その間隙の所々に小なる黒紫色小點の散在せるを認む。油浸裝置にて強擴大すれば、先に明瞭に黒紫色に濃染せる圓形纖維は全部大及中徑有髓神經纖維にして、然もその大部分は大徑有髓神經纖維なり。これ等の中には神經纖維の腫大せるものありて、大なるは25ミクロンを越ゆるものあり。然れども何れも美麗なる車軸線狀の厚さ一様なる髓鞘を有し形態も概ね圓形を呈す。依てこれを健側のものに比し大なる差異あるを認めざるなり。5乃至7本宛密集せるもの、1乃至2本宛散在的に存する等其の配置の状態も亦健側の夫れに異ならず。中徑有髓神經纖維も略々前者に同じ所見なり。反之小徑有髓神經纖維は甚しく減少し、健側にて認めし如き全視野を被へる小徑有髓神經纖維は、この場合極めて減數し所々に散在せるのみなり。然も殘存せるものも多くは萎縮變形し、1ミクロン又はこれ以下のもの多く、正しく圓形車軸狀の形態を備ふるもの少く、髓鞘の厚さも一様ならず、中には極めて菲薄にして辛じて輪廓をそれと認め得る程度のものあり。結締組織の増殖著明ならざるも、シュワン氏核の増生著大なり。

大徑有髓神經纖維2911本にして健側の88.5%に相當す。中徑有髓神經纖維は869本にして健側の70.9%に相當す。而して小徑有髓神經纖維は僅に401本にして、健側の8383本に對し僅に約20分の1以下に達するのみなり。

2. 第3腰髓後根切斷成績

第1例 馬名 陸良、毛色 栗、性 騾、年齢 6歳、體重 418kg、昭和11年8月26日手術。

右側臥として左第3腰髓部に於て脊髄後根を切斷す。手術中屢々騷擾せる爲め出血量多く手術比較的困難なるも約4.5時間にて終了せり。約2立の輸血を3日間連續實施す。其他強心處置として5%葡萄糖液1000cc、デキタミン10ccを靜脈注射す。術部にはヨードフォルムガーゼを挿入す。5日目より術部に赤外線及紫外線を30乃至40分間宛照射す。17日目より體溫 40° 以上に上昇し、元氣頗る沈衰し、食慾減損し心臟衰弱加はる。9月24日に至り一般症狀急に悪化し遂に斃死す。昭和11年9月24日斃死、生存日數30日。

解剖的所見

術部は尙肉芽を以て填充するに至らず。腰髓下部の硬膜は輕度に肥厚し、左腰髓外側部は結締組織の増殖を認めらる。注意しつゝ結締組織を剝離するに、第3腰髓後根は有髓硬膜と神経節との間に於て完全に切斷せらる。中樞部斷端は僅か腫脹し、末梢片は神経節に極めて接近して切斷せられ加ふるに萎縮變性せる爲め標本を製するに至らず。硬膜内に第3腰髓後根を求むるに數本に分枝せる小枝は何れも退縮脆弱となれり。反對側同節の後根を對象として標本を製せり。

組織學的所見

(1) 健側

一見して健全なる大及小徑有髓神經纖維は濃紫色に著染し、小徑有髓神經纖維は密發的に存在し、その間に大及中徑有髓神經纖維は散在す。大徑有髓神經纖維中には一部髓鞘の崩壊せるものを認むるも、之は死後の變狀なるものゝ如し。

神經總纖維數13442本にして、大徑有髓神經纖維數2836本、中徑有髓神經纖維數1774本、小徑有髓神經纖維數8832本にして小徑有髓神經纖維數は全有髓神經纖維數の65.7%に當れり。

(2) 切斷側中樞片

油浸装置にて檢するに視野の大部分を占むるものは小徑有髓神經纖維にして、所々に退行性變性の過程にある大徑有髓神經纖維並少數の中徑有髓神經纖維を認む。小徑有髓神經纖維の髓鞘を仔細に檢するに何れも健全にして、反對健側のも

のに比し異なる所なし。大徑有髄神経纖維は之と著しく所見を異にし、多くは髄鞘極めて菲薄となりて僅に輪廓を認め得るもの。反之局部的に腫脹肥大して不規則なる圓形を呈し、染色液濃染せるもの或は又殆ど髄鞘の崩壊一塊となれる如きものののみなり。シュワン氏核の増殖著明なり、結締組織の増殖も比較的高度なり。本例は生存日数少きため、神経纖維の變性過程は特に著しからず。

大徑有髄神経纖維1002本なるも其の約半數 502本は高度の變性像を呈す。中徑有髄神経纖維は 301本にして變性途上にある 132本を除けば 189本の少きに至る。反之小徑有髄神経纖維は 8468本の多きに達し健側同節の 8823本に對し 95.8% に相當せり。

第2例 馬名 岡飛、毛色 栗、性 騾、年齢 6歳、體重 415kg、昭和11年7月13日手術。

右側臥とし深麻酔を施し、更に局所にノボカイン注射を行ふ。第3腰髓部に於て脊髄後根神経を脊髄硬膜と神経節との間に於て切斷す。手術中稍々出血多量なりし爲め止血に時間を要し約 4.5時間にて目的を達せり。創内はヨードフォルムガーゼにて填充し、創縁にはピクリン酸酒精を塗布す。5%葡萄糖液 500cc宛1週間持續す。8日目より赤外線及紫外線を以て交互に創内を照射し肉芽の新生を促せり。経過順調にして48日を以て完全に治癒せり。歩様に異狀を認めず。

昭和12年2月4日 殺處分、生存日数 206日。

剖 檢 的 所 見

手術部は完全に治癒し僅に拇指頭大の陷凹部を認むるも被毛にて全く被はる左腰髓外側部の硬膜は肥厚し、附近は結締組織の増殖夥し。丁寧に分離すれば左第3腰髓部の硬膜と神経節の中間に於て後根神経纖維は完全に切斷しあり。硬膜を縦割すれば手術側後根中樞部神経纖維は數枝に分れ、稍々濕潤し淡黄褐色に著色され、著しく菲薄となりその性質脆弱なり。これを毎本採取して標本に製す。末梢片は比較的容易に神経節を發見するを得たるを以て切斷せる後根神経末梢片を見出し標本を作製せり。反對側同節後根神経纖維を對象として採取す。

組 織 學 的 所 見

(1) 健 側

大中徑有髄神経纖維は整然配列し何れも相密接して各々は車輪像著明なり。多

数の健全なる小徑有髓神経纖維はその間に密集的に或は散在的に存在す。大徑有髓神経纖維中髓鞘の一部僅に缺損又は崩壊に瀕せんとするを認む。死後の變化ならん。中及小徑有髓神経纖維にはかゝることなし。

後根中の有髓神経纖維總數 17286本にして、大徑有髓神経纖維數は5401本、中徑有髓神経纖維數2298本、小徑有髓神経纖維數は9567本にして、小徑有髓神経纖維數は全數の55.5%に相當す。

(2) 切斷側中樞片

弱擴大にて檢するに、全視野は灰白色を呈し恰も無構造の組織にして、一見神経纖維なるやを疑はしむ。中に多數の黒紫色の小白點を認む。之を油浸裝置にて強擴大すれば黒紫色の小白點は殆ど凡て小徑有髓神経纖維にして、何れも完全なる髓鞘を備へ、其の形態も正常のものに近し。大さは2乃至2.5ミクロン又は其れ以下のもの大部分を占む。稀に髓鞘菲薄となりてその外形のみを存するものあり。大及中徑有髓神経纖維は極めて稀にして殘存せるものも、髓鞘の車輻狀をなすものなり、多くは崩壊せるもの、髓鞘の厚さ不等のもの等なり。灰白色の基質の隨所に圓形の空洞を認む、其の直徑は多くは10ミクロン以上のものなり。恐く大徑有髓神経纖維の變性吸收せられたる跡なるべし。シュワン氏核の増殖特に著明なり。結締組織の增生亦強大なり。大徑有髓神経纖維數は55本、中徑有髓神経纖維數本18、小徑有髓神経纖維數は8711本にして健側同節の小徑有髓神経纖維に對し91.0%の多きに達す。

(3) 切斷側末梢片

一見大中及小徑有髓神経纖維を含有するを認むるも、仔細に檢すれば大徑有髓神経纖維は最大多數を占め、其の髓鞘の厚さ少々腫脹せるもの存するも形態は健常のものと同ならず。中徑有髓神経纖維之に次ぎ特殊なる變化を認めず。然るに小徑有髓神経纖維は健側に比し著しく其數を減少し然も大半は輕度の變性像を呈し、その半數は重度の變性像を示す。而して菲薄なるか或は不平等なる髓鞘を有するもの多く、中には僅か纖細なる輪廓によりて、辛じてその存在を認むるのみものあり。結締組織の增生著大なり。シュワン氏核も増殖す。

小徑有髓神経纖維數は 278本 なるも 117本は變性す。中徑有髓神経纖維數は 1513本、大徑有髓神経纖維數は 3967本にして健側同節後根神経に對し 73.4%に

相當す。

第3例 馬名 傳市・毛色 鹿・性 騾・年齢 5歳・體重 483匁・昭和11年5月26日手術。

左側第3腰椎脊髄後根神経の切断を行ふ。比較的出血量少く約3.5時間にして手術を終了す。爾後術部はリヴァノールにて洗滌し創内にはヨードフォルムガーゼを填充して包攝す。5%葡萄糖溶液500匁、デキタミン10匁を靜脈内注射す。手術5日後より赤外線並紫外線を毎日30分間照射す。経過順調にして55日目に創面全く癒合し一般症状に變化なし。

昭和12年1月29日 殺處分・生存日數 249日。

剖 檢 的 所 見

手術部は完全に治癒し若干陥凹部を残せしも、外景上被毛の爲め殆ど健康のものと變らず。

有髄硬膜は左腰髄外側部に於て著しく肥厚せるを認む。而して切断後根纖維は増殖せる結締織中に埋沒せり。注意して結締織を剝離するに該腰髄後根纖維は完全に切断せられあるを確認せり。硬膜内中樞部は之を健側に比すれば著しく菲薄となり、且脆弱化せり。色彩も淡黄褐色を呈す。末梢後根神経纖維は神経節に餘りに接近して切断せられ且萎縮變性著明なる爲め遂に標本を製するに至らず。

組 織 學 的 所 見

(1) 健 側

弱擴大にて見るに全般的に明るき青紫色に染色せられたる有髄神経纖維の相接近して配列するを認む。強擴大にして檢するに大中有髄神経纖維は正しき圓形を呈し、何れも整然たる車輻像を呈す。大徑有髄神経纖維中には若干髓鞘の崩壊せんとするものあり。是等の間に數本乃至10數本相集りて多數の小徑有髄神経纖維を認む。總纖維數12866本にして、大徑有髄神経纖維數2907本、中徑有髄神経纖維數1409本、而して小徑有髄神経纖維は8550本にして有髄神経纖維總數の66.4%に相當す。

(2) 切断側中樞片

弱擴大にて檢するに、全視野は灰白色の無構造の組織より成り、一見して神経組織なるか否かを疑はしむ。然るに油浸裝置にて強擴大すれば、灰白質に見へた

る部分は殆ど結締組織の著明なる増殖にして、シュワン氏核の増殖亦高度なり。而して黒紫色に染色せるの神経繊維は殆ど全部小徑有髄神経繊維にして、その形態竝に髄鞘の状態は健側のものに異ならず。多くは2ミクロン又はそれ以下のもののみなり。一方大中徑有髄神経繊維は全視野中辛じて數本を認め得るのみにして、その中にて多くは髄鞘の厚さ不平等なるもの、一部崩壊せるものを認め、其の基質の所々に白色空洞部の多數に存在するを認む。これ殆ど凡てが大中徑有髄神経繊維の變性吸収せられたる痕なるべし。

大徑有髄神経繊維數は僅に13本、中徑有髄神経繊維數は6本に過ぎず。反之、小徑有髄神経繊維數は7902本の多きに達し、健側同節有髄神経繊維の92.4%に相當す。

3. 第4腰髄後根切断成績

第1例 馬名 信浪、毛色 栗、性 騾、年齢 6歳、體重 445斤、昭和11年6月16日手術。

左側第4腰髄に於て、脊髄神経後根切断手術を實施す。手術に際し神経節附近の血管を損傷し止血困難なる爲め、手術に時間を要し約4.5時間を費せり。創内にはヨードフォルムガーゼを挿入し、翌日よりリヴァノールにて洗滌す。5%葡萄糖液 500cc、5%クロールカルチウム溶液 200ccを連日注射す。手術5日目より約40度の發熱あり、漸次元氣食慾不振となり、一般症狀も悪化を續け遂に7月20日に至り斃死す。

昭和11年7月20日斃死、生存日數35日。

剖檢的所見

手術部は殆ど肉芽にて填充せらるゝも、尙快癒するに至らず。腰髄外部には結締組織増殖あるも附近の硬膜肥厚甚しからず。左側第4腰髄後根神経は硬膜と脊髄神経節間に於て完全に切断せられあるを確認せり。硬膜内の後根神経は少々菲薄の狀を呈し、淡褐色に變色す。末梢部は極めて短く且萎縮せる爲標本を製するに至らず。反對側同節神経後根の標本を對象として採取す。

組織學的所見

(1) 健側

大徑有髄神経繊維は正しき車輻像を呈し、全視野に或は密集し、或は散在す。

髄鞘の厚さ何れも一樣にして黒紫色に染色す。中徑有髓神経纖維は其の構造何れも健常にして、比較的少數散在す。小徑有髓神経纖維は全數の半以上に達し、薄き髄鞘を有し2乃至2.5ミクロンのもの最も多し。

有髓神経纖維總數14249本にして、大徑有髓神経纖維數3176本、中徑有髓神経纖維數1669本、小徑有髓神経纖維數9404本にして、總有髓神経纖維數の66%に相當す。

(2) 切斷側中樞片

弱擴大にて見るに一面灰白色を呈する基質中に多數の相接近せる小黑點の存するを認む。油浸裝置にて強擴大するに、視野の全面は小徑有髓神経纖維にして、その間に點在せるは大中徑有髓神経纖維なり。而して結締織の増殖と共にシュワン氏核の増殖も重度なるを認む。所々に點在せる大徑有髓神経纖維は完全なるもの少く、多くは髄鞘の厚さ不平等にして、一部分は厚く他の部は菲薄となり、或は又髄鞘の染色不充分にして半透明に近く光線を通過するもの、時には空洞のみを残すもの等を認む。中徑有髓神経纖維は更に少く、同様の變性過程にあるを認めらる。大徑有髓神経纖維數573本を算し、中164本は變性し健全に近きもの409本を存するのみ。中徑有髓神経纖維數は157本にして變性せるもの23本を除けば134本となる。反之小徑有髓神経纖維數は9013本の多きに達し、健側同節小徑有髓神経纖維に對し95.8%に達す。

4. 第5腰髓後根切斷成績

第1例 馬名 茂浦、毛色 鹿、性 騾、年齢 5歳、體重 487斤、昭和11年6月22日手術。

左側第5腰髓部に於て脊髓後根神経を切斷す。手術中出血量少く、比較的容易に操作を終へ約3時間にて目的を達せり。創底に貯溜せる創液の排泄を計る爲め創底部を外方に向け開通せしめたり。ヨードフォルムガーゼを挿入す。創縁にグリテールパスタを塗布し消炎を充分ならしむ。葡萄糖500珎デキタミン10珎を靜脈内に注射す。8日目より1日1回30分乃至40分間赤外線及紫外線を照射す。経過良好にして40日にして手術部完全に癒合す。歩様に異狀なし。

昭和12年1月22日 殺處分、生存日數 215日。

剖檢的所見

手術部は完全に治癒し僅に拇指頭大に陥凹するを認む。第5腰髄外側部に於て有髄硬膜の肥厚著明なり。該腰髄部附近は稍高度の結締織の増殖を認む。丁寧に結締織を剝離するに、左第5腰髄後根は有髄硬膜と脊髄神経節との間にて完全に切斷されあるを確認せり。硬膜内中樞片は健側に比し著しく菲薄脆弱にして、且淡黄褐色を呈す。依て注意しつつ各本毎に標本作製す。末梢部は脊髄神経節を結締織中に見出し、次で切斷末梢片を求め標本作製す。反對同節後根神経纖維は對象として採取す。

組織學的所見

(1) 健側

大中徑有髄神経纖維は何れも健全に多數に相接近して存在す。髓鞘は比較的厚く、美麗なる車輪像著明なり。其等の間に多數の健全なる小徑有髄神経纖維は集約的或は散發的に存在す。各神経纖維は相接近す。

脊髄後根中の有髄神経纖維總數は23741本にして、大徑有髄神経纖維數6576本、中徑有髄神経纖維數1685本、小徑有髄神経纖維數15480本にして、小徑有髄神経纖維數は總有髄神経纖維の65.2%に相當す。

(2) 切斷側中樞片

始め弱擴大にて檢するに、全體は無構造にして、灰白色の基質上に一面に黒紫色の無數の小點の密發するを認むるのみなり。油浸裝置を以て強擴大にて檢するに無數の小點の密發せる如きは殆ど全部小徑有髄神経纖維にして、仔細に檢すれば何れも正常なる髓鞘を有し、その厚さは一樣にして形態も正圓形に近し。その直徑大なるは3ミクロン、小なるは1ミクロン又はそれ以下にして、最も多きは2ミクロン又はそれ以下のものなり。基質の灰白色を呈せるは、結締織の増殖にして、所々に直徑7乃至14ミクロンの圓形空洞部の散在せるを認む。これ大徑有髄神経纖維の變性吸收せられたる痕跡なるべく、中には原形に近き形態を保持するものもあるも、其他の大徑有髄神経纖維は髓鞘の厚さ不平等にして、一部缺損せるもの、菲薄となれるもの等ありて完全なるもの數本あるのみ。中徑有髄神経纖維の場合も略前者と同様の變性像を認む。シュワン氏核の増生特に著しからず。大徑有髄神経纖維數は94本にして、中82本は變性し、中徑有髄神経纖維數は36本にして中31本は變性せり。反之小徑有髄神経纖維は14993本にして反對健側小徑

有髓神経繊維の93.8%に相當す。

(3) 切斷側末梢片

始め弱擴大にて檢すれば、神経纖維周圍の結締織著しく増殖す。一樣に灰白質を呈せる中に暗紫色の明瞭に弱擴大にても認め得る圓形像が視野全面に配列せるを認む。油浸装置にて強擴大するに先に見えし圓形黒紫色の著明なる像は殆ど凡て大中徑有髓神経纖維にして、就中大徑有髓神経纖維は特に多數を占むるを認め得べし。切斷側中樞片にては稀に發見せるに比し、末梢片にありては何れの視野にも多數認め得べし。然も何れも車輻像を呈し、髓鞘の厚さも殆ど健側のものに異ならず。ただ中には髓鞘の稍腫脹せるもの若干認むるのみ。反之小徑有髓神経纖維は中樞片と反對に極めて稀に散在するに留まり、然も菲薄不正圓形の髓鞘を有するもの多く、所々に基質中に圓形像のみを留め、全く變性吸收されたるものを認む。結締織及シュワン氏核の増殖著明なり。

大徑有髓神経纖維數は5301本、中徑有髓神経纖維數は1378本、小徑有髓神経纖維數は353本にして健側の概ね40分の1に相當す。而して大徑有髓神経纖維は健側同節神経纖維の80.6%に相當す。

5. 實驗成績竝に考按

従來育髓後根神経纖維に關する諸實驗は主として、犬猫又はそれ以下の小動物のみに限られたり。これは大動物が實驗上種々の不便あると、經濟的に實驗例を得られざる等の原因に歸するを得べし。然るに曩に武藤氏は馬に於ける汗腺支配は他動物と全く反對にして、交感神経毒たるアドレナリンに敏感に反應して、副交感神経毒なるピロカルピンには反應微弱なること、又大越氏は馬末梢神経はアドレナリンに對し收縮作用を呈することは他動物と同様なれども、副交感神経毒なるアセチルヒヨリンに對しては逆反應とも稱すべき反應を呈し、副交感毒本來の作用はピロカルピンとの共働作用に於て僅に之を見るのみに過ぎざる等の點より、馬に於ては他動物に比較し其の末梢血管は特異なる自律神経支配を有することを認めたり。更に同氏は馬末梢神経幹神経像を組織學的に檢索して、無髓神経纖維は有髓神経纖維より頗る優勢にして、その數前者は後者の1.5乃至2倍に及べること、又末梢神経幹中の有髓神経纖維を分類するに、大徑有髓神経纖維を主とし、正中神経に在りては65乃至70%、尺骨神経に在りては55乃至70%の多數

を占め、中徑有髓神経纖維並に小徑有髓神経纖維は頗る少數にして、小徑有髓神経纖維は正中神経に在りては僅に22%内外、尺骨神経に在りては30%弱なるを認めて、馬前肢末梢神経幹に於ては他動物に比し交感神経纖維の割合著大にして、副交感神経纖維の割合は頗る小なるを認めたり。以上の如く馬に於ては汗腺に對する自律神経支配の特殊なる、血管自律神経支配の特別なる等を考ふる時は馬に於ける自律神経支配の關係は他動物に比し極めて興味ある特殊のものなりと考ふるを得べし。

依て吳教授は余に命ずるに馬に於ける脊髓後根神経纖維に於ても果して他動物と相違あるや否やに就きて研究すべきを以てせらる。然るに馬匹の體重は普通400乃至500匁を有し、犬に約100倍し人に約10倍す。従て實驗手術を施すに當りても、倒馬、麻酔、手術及後療法等に多數の人手並に多量の器材を必要とし、且長期間繋畜飼養するは他の小動物の場合と異り種々の困難を伴ふ。加ふるに幼齡馬のみを獲ることは種々の障礙ありて苦心を要せり、然れども之等の障礙を排除し、12頭の馬匹に就きて實驗するを得たれども、辛じて最後の實驗成績を得たるは僅に6頭に過ぎず。他は手術中出血多量の爲め、又は手術後衰弱加はり斃死せり。以下實驗成績を總括して述べんとす。

第I表に示すものは馬匹腰髓後根の切斷後30乃至249日を經過したる6頭に就き脊髓後根中有髓神経纖維を組織學的に檢索せる成績なり。表中第I例(第2腰髓)に於ては、生存日數168日を經過したるものなるが、切斷中樞片の小徑有髓神経纖維は8143本にして、健側小徑有髓神経纖維の8383本に對し97.3%に相當す。之に依りて見るに後根中の小徑有髓神経纖維の殆ど全部は馬にありても脊髓遠心性なるを知るべし。一方切斷側末梢片中には尙401本の小徑有髓神経纖維を含有し、健側に對し4.7%に相當す。之によりて觀るに馬の腰髓後根中の小徑有髓神経中には若干の脊髓求心性纖維を含むを知る。而して切斷側中樞片の大徑有髓神経纖維は僅に23本を残すのみにして、殆ど全部が脊髓求心性知覚纖維なるを知れり。中徑有髓神経纖維に於ても亦同じ。反之切斷側末梢片に在りては大徑有髓神経纖維は2911本の多數に存し以上の求心性なることを證明す。

第II例(第3腰髓)にありては生存日數僅に30日を經過したるのみなるも、尙切斷側中樞片には8438本の小徑有髓神経纖維を有し、健側の8832本に對し95.8%

第I表 馬匹腰髄後根神経切断實驗成績

	脊 髓 節	生存 日数	纖 維 總 數	5ミクロン以上 大徑有髓神經纖維	5—3ミクロン 中徑有髓神經纖維	3ミクロン以下 小徑有髓神經纖維
I 鳥 花 號	第2腰髄 手術側中樞部 手術側末梢部 健側 後根	168日	8152 4131 12397	23 (變性 3) 2911 (變性209) 3233 (26.8%)	11 (變性 1) 369 (變性173) 1226 (9.7%)	8143 401 (變性 66) 8333 (64.9%)
II 陸 良 號	第3腰髄 手術側中樞部 手術側末梢部 健側 後根	30日 標本不頁	9771 13442	1002 (變性502) 2336 (21.1%)	301 (變性132) 1774 (13.2%)	8463 8832 (65.7%)
III 岡 飛 號	第3腰髄 手術側中樞部 手術側末梢部 健側 後根	206日	3784 5753 17266	55 (變性 31) 3967 (變性101) 5401 (31.3%)	13 (變性 9) 1513 (變性 94) 2293 (13.3%)	8711 (變性 13) 273 (變性117) 9597 (55.4%)
IV 傳 市 號	第3腰髄 手術側中樞部 手術側末梢部 健側 後根	249日 標本不頁	7921 12366	13 (變性 4) 2907 (22.7%)	6 (變性 2) 1409 (10.9%)	7902 8550 (66.4%)
V 信 浪 號	第4腰髄 手術側中樞部 手術側末梢部 健側 後根	55日 標本不頁	9743 14249	573 (變性164) 3176 (22.3%)	157 (變性 23) 1669 (11.7%)	9013 9409 (66.0%)
VI 茂 浦 號	第5腰髄 手術側中樞部 手術側末梢部 健側 後根	215日	15123 7035 23741	94 (變性 82) 5301 (變性525) 6576 (27.7%)	36 (變性 31) 1378 (變性176) 1635 (7.1%)	14993 356 (變性 76) 15430 (65.2%)

に相當する脊髓遠心性小徑有髓神經を認むるに反し、大徑有髓神經纖維は既に1002本に減少し中502本は變性せるにより健全なるは僅に500本にして健側の約5分1に達せり。第III及第IV例(第3腰髄)は何れも200日以上を生存せしめたるものにして、第II例にありては小徑有髓神經纖維は中樞片にありては8711本にして末梢片にありても278本を残せり。前者は健側の9567本に對し91%、後者は2.8%に達し、こゝにも其の大半は脊髓遠心性にして、その若干は脊髓求心性小

徑有髓神経纖維あるを認めたり。第IV例にありても中樞片の小徑有髓神経纖維は7902本を算し健側の8550本に對し92.4%は脊髓遠心性纖維なるを知れり。第V例(第4腰髄)に於ては僅に35日を生存せるのみなるも、大徑有髓神経纖維は中樞片に於ては既に573本に減じ、中164本は既に變性の途中にあるが故に健全なるは409本の少きにあり、健側の3176本に對し8分の1に達せり。然るに小徑有髓神経纖維は中樞片に於て9013本の多數を算し、健側の9409本に對し95.7%に達せり。

第VI例(第5腰髄)に於ては215日の生存日數を経過せしものなるも切斷側中樞片の小徑有髓神経纖維は14993本にして、末梢片中にも356本の小徑有髓神経

第II表 脊髓後根切斷實驗比率表

馬名	節		大徑有髓神經纖維比率	中徑有髓神經纖維比率	小徑有髓神經纖維比率
鳥花	I	有髓遠心性纖維			97.3%
		有髓求心性纖維	88.5%	70.8%	4.7%
		對照	100.0%	100.0%	100.0%
陸良	II	有髓遠心性纖維			95.8%
		對照	100.0%	100.0%	100.0%
岡飛	III	有髓遠心性纖維			91.0%
		有髓求心性纖維	73.4%	65.8%	2.8%
		對照	100.0%	100.0%	100.0%
傳市	IV	有髓遠心性纖維			92.4%
		對照	100.0%	100.0%	100.0%
信浪	V	有髓遠心性纖維			95.7%
		對照	100.0%	100.0%	100.0%
茂浦	IV	有髓遠心性纖維			96.9%
		有髓求心性纖維	80.6%	81.7%	2.2%
		對照	100.0%	100.0%	100.0%

繊維を認めたり。前者は健側の 15480 本に對し 96.9%、後者は 2.2% に相當す。その和は 99.1% にしてこの例に於ても殆ど大多數は脊髓遠心性纖維なるも少數の脊髓求心性纖維を含むを認めたり。一方大徑有髓神經纖維は中樞片に於て僅に 94 本なるに、末梢片にありては 5301 本の多數を占め、健側の 6576 本に對し 80.6% は脊髓求心性知覺纖維なるを認めたり。又中徑有髓神經纖維は中樞片の 33 本の少きに反し、末梢片中に 1378 本を認め、健側の 1685 本に對し 81.7% の求心性知覺纖維を認めたり。

以上の實驗成績を比率にて現はせば第 II 表の如し。

第 II 表により馬に於ける腰髓後根の小徑有髓神經纖維は其の 91 乃至 97% は脊髓遠心性副交感神經纖維に屬し、外に 2 乃至 4% の脊髓求心性の小徑有髓神經纖維を含むことを知れり。

川口氏が犬の腰髓各節に就き研究し、曩に新田氏により確められたる副交感神經が單に腰髓第 6、第 7 のみならず、總ての腰髓中に存在することを確認し、然も其の數は遠心性小徑有髓神經纖維の多寡に一致せり。而して三枝氏により犬の腰髓後根中小徑有髓神經纖維は殆ど全部副交感神經性遠心性纖維に屬することを證明せられたり。余は馬に於ても腰髓後根中大半は脊髓遠心性副交感神經纖維に屬すること、尙若干の脊髓求心性知覺性副交感神經纖維をも含むことを證明せり、之吳教授が犬に於ける腰髓後根中には 100 本以上の脊髓求心性の小徑有髓神經纖維の存在するを主張せられたると同じ所見を得たり。

IV. 馬腰髓後根神經纖維の組織學的檢索

1. 總 論

曩に吳教授は三枝氏と共に犬に就き脊髓の種々なる高さに於ける、後根中の小徑有髓神經纖維數並にこの纖維と他の神經纖維との割合を知る爲め、脊髓各節に於ける後根を組織的に檢索せり。其の成績に徴するに、犬の脊髓後根中有髓神經纖維數は 1821 本乃至 12724 本にして、小徑有髓神經纖維は頸髓、胸髓及腰髓に於ては 34.9 乃至 56.7% に達せり。而して頸髓に於ける小徑有髓神經纖維の平均値は 43.8% 胸髓に於て 47.2% 腰髓にありては 43.0%、薦髓第 1 後根に於ては 51.9% 薦髓第 2 後根にては 74.2% 薦髓第 3 後根にては 61.9% に達す。更に腰髓後根中の小

徑有髓神経纖維は殆ど全部は脊髓遠心性の副交感神経なり。犬腰髄後根中の有髓神経纖維總數は2571乃至12127本にして、これに對し小徑有髓神経纖維は39.4乃至51.1%、平均43%に相當す。即ち犬の各腰髄後根中には約43%の脊髓遠心性副交感神経纖維を含むこと明となれり。又一方川口氏の研究により、脊髓中の副交感神経核が明にせられ、副交感神経核の數は大體に於て副交感神経纖維數の多寡と一致し、第6, 7, 8 頸髓及第1 胸髓に於て多く、第2 胸髓より減少し下部胸髓に於て著しく減少し、第4 腰髓より増加を始め、第6, 7 腰髓に最も多く、薦髓に於ては他の自律神経核の現はるる爲明瞭ならざることを明にせり。人間の副交感神経系に關しては、猿渡、川口及山縣氏等の健全なる屍體に於ける脊髓後根を檢査し其の中に含まるる有髓神経纖維を檢せり。即ち猿渡氏の成績によれば人間第1 及第2 腰髄後根神経纖維數は7477乃至9910本にして、小徑有髓神経纖維數は40.3乃至50.2%なり。川口氏によれば人間の頸髓及上部胸髄後根中には小徑有髓神経纖維は其の數及百分率は人屍によりて、或は脊髓の高さによりて多少の差異を認むるも、頸髄後根神経纖維數は2052乃至37858本にして、小徑有髓神経纖維は平均52.6%に達すと云ふ。

又山縣氏によれば、正常人體に於ける脊髓後根中の小徑有髓神経纖維は犬に於けるものに比し甚しく多數にして、且個體により著しき差異あるを認めたり。人間腰髄後根有髓神経纖維數は9567乃至25133本を算し、小徑有髓神経纖維は48.5乃至70.6%、平均62.5%なるを認めたり。

三枝氏の犬に於ける實驗成績に依れば、脊髓後根中の全ての小徑有髓神経必ずしも遠心性ならずして、此中には求心性知覺性神経纖維も亦存すと云ふ。此事實より推論して人體後根中の小徑有髓神経中にも亦脊髓副交感神経纖維多數に存在する事は疑ひを容れざる所なり。而して小徑有髓神経纖維の盡く或は幾何かが遠心性脊髓副交感神経纖維に屬するやに關しては尙人體實驗を缺かせる今日正確なる數値を擧ぐる事を得ず。ただ O. Gagel⁽⁸¹⁾氏は生前脊髓後根切斷手術を行ひし人屍に就き脊髓後根を組織的に檢査し、其の切斷中樞部には唯小徑有髓神経纖維のみ殘存するを見て、人體脊髓後根中には遠心性小徑有髓神経纖維の存在するを主張せるを見るのみなり。要之脊髓副交感神経纖維は、各人により可なりの差異を示すものにして、或人には副交感神経纖維の發達著しく大に、又或人には其の發

達充分ならずと考へらる。而して一般に人類に於ては犬に比し脊髓副交感神経の數多き事は上述の諸氏の實驗成績より明なる事實なり。

余は馬腰髓各節に於ける後根有髓神経纖維數及各種神経纖維の分布殊に小徑有髓神経纖維は人間及犬に對し如何なる關係にあるやを知らんと欲して検索せり。

2. 實驗材料固定及染色

材料は6乃至8歳の幼駒馬にして、脊髓に疾患を有せざる馬匹9頭を選択検索せり。中3頭は前記の條件を備へたる馬匹を實驗の爲放血致死せしめ、腰髓各節の後根神経纖維を標本として採取し、他の6頭は腰髓後根切斷手術を施したる實驗馬の對照側より標本を採取せる材料を用ひたり。

固定は屠殺又は斃死後速に採取せる材料を、濾紙小片上に1乃至2厘の長さに眞直に貼布し、直ちに10%フォルマリン液中に固定す。2乃至3日後濾紙より剝離し、兩端を切り約1厘の長さとし、更に固定を繼續す。余は多くの標本は始めワイゲルト氏髓鞘媒染劑にて處理したる後、馬肝臓片中に挿入し、ツェロイデン包埋法を施し、10ミクロン内外の切片を作り、之をワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン髓鞘染色法を以て24時間染色を行ひ、次で赤色血滴塩礬砂液を以て分化したる標本に就き觀察せり。

有髓神経纖維の計算に當りては、油浸裝置により、接眼レンズに小方形盲窓を附したるオクラールマイクロメーターを入れ、標本を移動盤により左右上下に移動しつつ全神経纖維數を3種に區別しつつ計測せり。

3. 實驗成績竝に考按

余の馬9頭に於ける腰髓後根神経纖維に於ける神経纖維像を見るに第III表に示す如く馬腰髓後根神経纖維總數は馬匹の個體により差異を有するも、其の數8452乃至34884本なり。而して一般に腰髓前節に於けるより後節に多く第5及第6腰髓に於て最大多數を示せり。三枝氏の犬の腰髓後根神経纖維總數の檢査成績によれば、2571乃至12127本にして馬匹は犬に比し著しく多きを認めたり。而して川口氏の人間に於ける腰髓後根神経纖維數を檢査せし成績によるに其の數9567乃至25133本にして馬匹に於ける腰髓後根の有髓神経纖維數に略々近し。

馬の腰髓後根有髓神経纖維中、有髓神経纖維の百分率は第III表の如し、

第III表 馬腰髄に於ける脊髓後根神経纖維

馬名	節	有髓神経纖維全数	5ミクロン以上 (%)	5—3ミクロン (%)	3及3ミクロン 以下 (%)
絹澤	左腰 I	10357	2661 (25.7)	1346 (13.0)	6350 (60.3)
	左腰 II	11603	2960 (25.5)	1555 (13.4)	7093 (61.1)
	左腰 III	13663	3020 (22.1)	2227 (16.3)	8421 (61.6)
	左腰 IV	15965	4092 (25.6)	2014 (12.6)	9879 (61.8)
	左腰 V	19596	3510 (27.1)	3154 (16.1)	11182 (56.8)
	左腰 VI	21611	6072 (28.1)	2506 (11.6)	13033 (60.3)
平藤	右腰 I	8452	3107 (41.5)	1057 (12.5)	4288 (46.0)
	右腰 II	12785	5331 (41.7)	1573 (12.3)	5877 (46.0)
	右腰 III	13630	4333 (35.7)	1533 (11.2)	7264 (53.1)
	右腰 IV	15171	4953 (36.6)	2633 (13.4)	7585 (50.0)
	右腰 V	20061	8253 (41.1)	2731 (13.9)	9097 (45.2)
	右腰 VI	25294	9637 (38.3)	2333 (11.4)	12724 (50.3)
信良	右腰 I	21534	7316 (33.9)	1664 (9.1)	12604 (57.0)
	右腰 II	22502	7330 (22.8)	1935 (8.6)	13187 (58.6)
	右腰 III	23613	6990 (29.6)	2432 (10.3)	14191 (60.1)
	右腰 IV	25123	8190 (32.6)	2392 (9.8)	14541 (57.6)
	右腰 V	29531	9064 (30.8)	2532 (9.8)	17935 (60.8)
	右腰 VI	34339	11690 (33.5)	2390 (8.8)	20309 (57.7)
鳥花陸奥飛傳市信浪茂浦	左腰 II	12397	3233 (25.8)	1226 (9.7)	6338 (64.9)
	左腰 III	13442	2336 (21.1)	1774 (13.2)	8832 (65.2)
	左腰 III	17266	5401 (31.3)	2293 (13.2)	9567 (55.4)
	左腰 III	12365	2907 (22.7)	1409 (10.9)	8550 (66.4)
	左腰 IV	14249	3176 (22.3)	1669 (11.7)	9409 (66.0)
	左腰 V	23741	6576 (27.7)	1635 (7.1)	15430 (65.2)
	平均		30.7%	11.6%	57.7%

余の検索成績によれば、46.0%乃至66.4%にして、平均57.7%の多きに達せり。之を三枝氏の犬に於ける腰髄後根中小徑有髓神経纖維の検索成績たる39.4%乃至51.1%平均43.0%に比する時、馬の腰髄後根中小徑有髓神経纖維は犬の其れに比し、約15%の多きを認めたり。又山縣氏の人間に於ける腰髄後根中小徑有髓神経纖維の検索成績たる48.5%乃至70.6%平均62.5%に比する時、馬の其れは稍少く即ち人間は馬の腰髄後根小徑有髓神経纖維より約5%多き事を認めたり。而して三枝氏によれば、犬に於ては腰髄後根小徑有髓神経纖維の殆ど全部は脊髓遠心性副交感神経纖維なることを證明せられたるも、余も馬に於ては腰髄後根小徑有髓神経纖維の91%乃至97%は脊髓遠心性副交感神経纖維にして、外に2%乃至4%の少數の脊髓求心性知覚性小徑有髓神経纖維を混在することを證明し得たり。人間に於ては尙之を實驗的に證明すること能はざるも、犬又は馬の脊髓後根に於けると同様、人間脊髓後根中小徑有髓神経纖維の殆ど全部は脊髓遠心性副交感神経纖維なるべく、若干の脊髓求心性知覚性小徑有髓神経纖維をも混有するならんとは、容易に肯定し得らるる所なり。

要之馬の腰髄後根中有髓神経纖維總數竝に各種有髓神経纖維數竝に脊髓遠心性副交感神経纖維の數は人間の夫等に僅に劣り、犬の其等に比し著しく優れるを認めたり。

脊髓後根中無髓神経纖維に關しては Ranson⁽⁸²⁾氏 及 Windle⁽⁸³⁾氏によれば、後根中には無髓神経纖維存在を主唱せり。三枝氏は犬後根中には遂に無髓神経纖維を發見するを得ざりしも、最近吳教室 楠⁽⁸⁴⁾氏は犬の脊髓後根中に數百本の無髓神経纖維の存在するを證明せり。更に Lugaro⁽⁸⁵⁾氏は脊髓後根内に遠心性無髓神経纖維あるを發表せり。三枝氏は之を認むるを得ざりしも、最近楠⁽⁸⁴⁾氏は犬後根切斷中樞部に遠心性無髓神経纖維を發見し、後根内無髓神経纖維の殆ど全部は遠心性なる事を實驗證明せり。余も又馬の腰髄後根内に數百本の無髓神経纖維の存在するを認め、その大半は脊髓遠心性無髓神経纖維なるを證明するを得たり。

而して馬腰髄後根中無髓神経纖維の配列狀態は一般に多數有髓神経纖維の粗に配列せる間隙に於て、普通2乃至3本宛、多き時には3乃至4本の集團を爲すことあり、或は屢々單獨に存在す。其の太さは小徑有髓神経纖維の1ミクロン又は1ミクロン以下のものより遙に細くして、ミクロシラウベを僅に上下するも常

に其の太さを變ずることなく、光線を強く屈折し基質内に灰白色に微に光る小點となりて認めらる。切斷中樞片にありては多くは附近にシュワン氏核の存在するを認む。

要之馬の腰髓後根内には多數の脊髓遠心性副交感神経と數百本の脊髓遠心性交感神経の混在するを認むるを得たり。

V. 馬脊髓前根神経纖維竝に後肢末梢 神経幹の組織學的檢索

1. 緒 論

脊髓前根中の小髄神経纖維に特種性を與へしは Gaskell⁽⁸⁶⁾ にして 1886 年、氏は脊髓前根中に集團を爲せる直徑 1.8 乃至 3.6 ミクロンの小髄神経纖維と區別し之を以て内臟諸器官に分布する交感神経纖維の節前纖維と見做せり。Gaskell 氏は此の小髄神経纖維の存することを以て内臟諸器官は交感神経纖維を送る前根の特徴とせり。然るに其の後 Langley⁽⁸⁷⁾ 氏は胸髓のみならず、頸髓及腰髓前根中にも小髄神経纖維の存することを認め、交感神経纖維を有せざる脊髓前根は其前根が小髄神経纖維を有せざることにより決定さるべきものにあらすして、小徑有髄神経纖維 (2 乃至 3 ミクロン) を有する事少きにより決せらるべきものなりと言へり。即ち Langley 氏によれば、脊髓各節前根中には小徑有髄神経纖維を有し、交感神経纖維を送ること多き前根は多數の小髄神経纖維を含有することとなる。

Scherrington⁽⁸⁸⁾ 氏は腰髓下部に於ても小徑有髄神経纖維の存する事を見、Dale⁽⁸⁹⁾ 氏は薦髓前根に於ても少數の小徑有髄神経纖維を見たり。

沖中⁽⁹⁰⁾ 氏が健常人體に於て見たる所によるに、各脊髓前根を通じ小徑有髄神経纖維を多數に見、殊に胸髓及上部腰髓前根に於て最も多數を占め、頸部下段、腰髓及薦髓前根に於ても可成り多數の小徑有髄神経纖維を認めたり。又市古⁽⁵⁴⁾ 氏の研究によれば犬の脊髓前根に於ても人類の其れに類似の所見を得たり。沖中氏も亦犬に於てこれを確めたり。此の脊髓前根中の小徑有髄神経纖維の一部は Gaskell⁽⁸⁶⁾ 氏以來認められたる、交感神経纖維にして、交通枝を通りて交感神経節状索

に至るものなり。小徑有髓神経纖維の他の一部は 中澤氏⁽⁴¹⁾の研究により、途中に介在神経節を有せず直接筋肉に至ることを明にせられたり。

次に末梢神経内に於ける各種神経の分布に關して知られたる所は次の如し。脊髓前根を通じて出でたる節前纖維は節状索中の神経細胞に終り、此の細胞より出でたる無髓性なる節後纖維は再び交通枝を通じて末梢神経に入る。此の末梢神経内に入りたる無髓纖維の運命に關しては Müller氏⁽¹²⁾ 及 Stör氏⁽⁹⁷⁾ 等は無髓神経纖維が集束して末梢神経に入り、尙ほ暫しの間は集束となりて走行するを認め得るも、其の後の走行は恐くは後に髓鞘を得るに至るならんと。然るに 青柳氏⁽⁹²⁾ は最初横隔膜神経中に無髓神経纖維が大小の集束となりて走行するを認め、次で 新保氏⁽⁹⁵⁾ は各種の末梢神経中には無髓神経纖維は大小の集束を爲して走行するを證明し、更に 波多野氏⁽⁹⁹⁾ も亦之を證明し、之が交感神経纖維なることを確めたり。

其後 Langley氏⁽⁹⁴⁾ によりても同様の所見を得たり。而して肢末梢神経内に於ける無髓神経纖維は交感神経纖維にして、其の中には血管收縮神経、隨意筋緊張並に營養神経、汗分泌神経並に立毛神経を含み、小徑有髓神経は主として副交感神経纖維にして、この中には血管擴張神経、皮膚、骨及關節等の營養神経、汗分泌神経及立毛神経等を含むことは、既に吳教室幾多の業績により闡明せられたる所なり。更に小徑有髓神経纖維中には小徑有髓性知覚神経纖維をも含み、大徑有髓神経纖維は運動神経並に知覚神経なることも衆知の事實なり。今 大越氏⁽⁶⁷⁾ の馬前肢末梢神経幹に於ける神経纖維像の成績に徴するに、犬の其れに比し無髓神経の頗る多數にして、其の數有髓神経纖維の1.5乃至2倍に及び、犬の前肢末梢神経に比し頗る著大なる所見を得たり。又大越氏は更に馬前肢末梢神経内の各種有髓神経纖維の分布状態を正中及尺骨兩末梢神経幹に就きて計測檢索せしに、小徑有髓神経纖維中の副交感神経纖維の割合は、他動物に比し頗る少きを認めたり。斯の如くの馬前肢末梢神経に於ける自律神経支配に關しては、他動物に比し特異なる關係にあることを認めたり。依て余は馬後肢の末梢神経幹に在りても無髓神経纖維と有髓神経纖維の關係は然るや、馬後肢末梢神経幹中に於ける各種有髓神経纖維の状態は前肢の如き關係にあるや否や、更に脊髓前根及後根に於ける自律神経との關係如何に就きて檢索せり。

2. 實驗材料固定及染色

材料は比較的幼齡馬即ち5歳乃至9歳の馬4頭を選び、生前神経性疾患を有せざる健康馬を放血致死せしめ、夫々の馬の一侧脊髓に於て第6及7頸髓前根、第17及18胸髓前根、第5及6腰髓前根及後根、第1薦髓後根並に同側後肢の深腓骨神経、浅腓骨神経並に脛骨神経幹より採取せる材料を検索に供せり。

採取せる材料は濾紙小片上に眞直に貼布緊張せしめ、10%フォルマリン液中に固定しツエロイデン包埋法を行ひ、10ミクロンの切片としワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン髓鞘染色液を以て染色し、赤色血濁鹽硼砂液を以て分化したる標本を油浸装置により觀察せり。計算法はエールリッヒ氏の盲窓にて視野を區劃しつつ全神経纖維を區分し計測せり。

3. 實驗成績並に考按

馬後肢末梢神経幹の神経纖維像を見て、最も特異なるは無髓神経纖維の極めて多數なる事なり、有髓纖維間に於て或は散在的に、或は集束を爲して存し、其の數有髓神経纖維の2乃至3倍の多數に達す。一方馬脊髓前根中無髓神経纖維を見るに、略々有髓神経纖維の數に近きを認め、腰髓後根中無髓神経纖維の十數本の小數なるに反し興味ある點なり。又前根中有髓神経纖維は其の大部分が大徑有髓神経纖維にして、小徑有髓神経纖維は極めて少數にして、稀に認め得る程度なるも他動物に比し甚だ特異とする點なり。

第IV表 健常馬深及浅腓骨神経幹中各種有髓神経纖維

馬名	種類	有髓神経纖維全數	5ミクロン以上(%)	5乃至3ミクロン3及3ミクロン以下(%)
昇忠	深腓	5327	3222 (55.3)	384 (6.6) 2221 (38.1)
	浅腓	7021	4037 (53.2)	688 (9.8) 2246 (32.0)
大川	深腓	4605	2527 (54.9)	366 (7.9) 1712 (37.2)
	浅腓	6637	3333 (56.7)	630 (10.2) 2114 (33.1)
豐大	深腓	4655	2735 (59.9)	370 (7.9) 1500 (32.2)
	浅腓	6752	4513 (56.9)	661 (9.3) 1573 (33.3)
青花	深腓	3396	2154 (55.3)	342 (8.8) 1400 (35.9)
	浅腓	5733	3578 (58.3)	579 (10.1) 1686 (31.6)
平均			56.9%	8.9% 34.2%

以下各々の検索成績に就きて説述すれば、健常馬後肢の深及浅腓骨神経幹中の無髓神経繊維は有髓神経繊維の2乃至2.5倍の多数を占め、諸所に集束を爲し、或は個々に有髓神経繊維間に位す。各種有髓神経繊維を分別するに、

大徑有髓神経繊維は約半数以上を占め、54%乃至59%平均56.9%に達す。大徑有髓神経繊維の直徑は比較的少にして、一般に5乃至10ミクロンのもの最も多し。中徑有髓神経繊維は平均8.9%なり。小徑有髓神経繊維は31乃至38%、平均34.2%にして、大徑有髓神経の2分の1以上なり。深及浅腓骨神経繊維の配列の割合は特に著しき差異を認めず。只其の總數に於て常に浅腓骨神経繊維は深腓骨神経繊維の約1.5倍の優勢なるのみなり。

脛骨神経幹に於ける無髓神経繊維は腓骨神経幹に比し僅に多く、有髓神経の約2乃至3倍に達す。何れも散在或は一束を爲して有髓神経間に存す。各種有髓神

第V表 健常馬脛骨神経中各種有髓神経繊維

馬名	種類	有髓神経繊維全數	5ミクロン以上(%)	5乃至3ミクロン3及3ミクロン以下(%)	3ミクロン以下(%)
豊忠	脛骨	31233	19143 (61.3)	2467 (7.9)	9623 (30.8)
大川	脛骨	34151	19654 (57.1)	3775 (11.5)	10522 (30.4)
豊大	脛骨	30345	17631 (58.1)	3095 (10.2)	9619 (31.7)
青花	脛骨	21963	12104 (55.1)	2154 (9.8)	7710 (35.1)
平均			53.2%	9.8%	32.0%

神経繊維を分類するに、約半数以上は大徑有髓神経繊維にして其數55乃至61%、平均58.2%に達す。其の直徑餘り大ならずして一般に5乃至10ミクロンの間にあり、中徑有髓神経繊維は平均9.8%小徑有髓神経繊維は30乃至35%にして、平均32.0%に達し、小徑有髓神経繊維の割合は腓骨神経幹の場合と大差なきものと認めたり。

次に同一馬に就きて頸髓前根末梢節中の無髓神経繊維を見るに、其の數有髓神経繊維の數に近き多數を認めたり。前根中有髓神経繊維の比較を見るに、大徑有髓神経繊維は著しく多數にして、その大部分を占む。即ち88乃至95%、平均91.2%の多數にして、直徑10乃至15ミクロンの大なるもの多し。中徑有髓神経繊維は

平均 4.2%。小徑有髓神経纖維は極めて少數にして、僅に 3 乃至 6%、平均 4.6% に過ぎずして、大徑有髓神経纖維の約 20 分の 1 の少數なり。

胸髓前根に於ける無髓神経纖維は頸髓に比し稍々少く、其の數有髓神経纖維の約半數に達するのみなり。前根有髓神経纖維の配列を見るに頸髓前根とは甚しく趣を異にし、大徑有髓神経纖維は少く、小徑有髓神経は前者に比し著明なる多數を認め得べし。大徑有髓神経纖維は 52 乃至 61%、平均 58.2% を占め、其直徑 17 乃至 20 ミクロンの大なるもの多し。中徑有髓神経纖維は平均 8.4% にして、小徑有髓神経纖維は可成り多く 29 乃至 38%、平均 33.4% を占め、全脊髓前根中最も多數の小徑有髓神経纖維を含む。

第 VI 表 健常馬頸髓前根中各種有髓神経纖維

馬名	種類	有髓神経纖維全數	5 ミクロン以上 (%)	5 乃至 3 ミクロン 3 及 3 ミクロン以下 (%)
界忠	頸前 VI	3632	3379 (90.3)	599 (6.1)
	頸前 VII	11569	10378 (89.7)	632 (5.9)
大川	頸前 VI	8166	7265 (89.1)	413 (5.0)
	頸前 VII	10735	9511 (88.3)	557 (5.1)
豐大	頸前 VI	13933	13214 (94.8)	292 (2.1)
	頸前 VII	16333	15552 (95.4)	222 (1.3)
青花	頸前 VI	11327	10656 (90.1)	450 (3.8)
	頸前 VII	14504	13393 (92.3)	623 (4.3)
平均			91.2%	4.2%
				4.6%

腰髓前根中の無髓神経纖維は有髓神経纖維と略々同數を有す。前根中有髓神経纖維の比例を見るに大徑有髓神経は著しく多數にして、他の前根に見ざる所見なり。其の數 92 乃至 95%、平均 94.1% を占め、直徑は 15 乃至 17 ミクロンの大なるもの最も多し。中徑有髓神経纖維は平均 2.4% なり。而して小徑有髓神経纖維は甚しく少數にして、大徑有髓神経纖維間に所々に散在するのみにして、2—4% 平均 3.5% にしてその數大徑有髓神経纖維の約 30 分の 1 にして、其の直徑多くは 2 ミクロン以下のものなり。腰髓後根中無髓神経纖維は既述せし如く極めて少數に

第VII表 健常馬胸髓前根中各種有髄神経纖維

馬名	種 類	有髄神経纖維全数	5 ミクロン以上 (%)	5 乃至 3 ミクロン 3 及 3 ミクロン 以下 (%)
昇 忠	胸前 XVII	8327	5022 (60.3)	841 (10.1)
	胸前 XVIII	9071	5289 (58.3)	843 (9.3)
大 川	胸前 XVII	7336	3382 (52.5)	692 (9.3)
	胸前 XVIII	7762	4364 (56.2)	624 (8.0)
豊 大	胸前 XVII	5602	3412 (60.9)	236 (5.1)
	胸前 XVIII	6931	4250 (61.3)	415 (6.0)
青 花	胸前 XVII	4838	2322 (53.8)	449 (9.3)
	胸前 XVIII	6007	3473 (57.8)	618 (10.3)
平均			53.2%	8.4%

して、其の數僅に數百本を有するのみなり。後根中有髄神経纖維の比例は前述せし所なるも、同一馬の同一側に於ける同一節の前後根を比較するに、其處に兩者間に著しき配列の差あるを認め得べし。即ち後根大徑有髄神経纖維は29—41%平均34.5%にして前根の約3分の1の少數なり、中徑有髄神経纖維は平均 8.6%に

第VIII表 健常馬腰髓前根中各種有髄纖維

馬名	種 類	有髄神経纖維全数	5 ミクロン以上 (%)	5 乃至 3 ミクロン 3 及 3 ミクロン 以下 (%)
昇 忠	腰前 V	12356	11556 (93.5)	259 (2.1)
	腰前 VI	14208	13537 (95.3)	255 (1.8)
大 川	腰前 V	9830	9240 (94.0)	234 (2.9)
	腰前 VI	11204	10715 (95.4)	135 (1.2)
豊 大	腰前 V	14672	13562 (92.4)	472 (3.2)
	腰前 VI	15196	14365 (94.1)	347 (2.2)
青 花	腰前 V	9873	9291 (94.1)	276 (2.8)
	腰前 VI	10782	10113 (93.8)	335 (3.1)
平均			94.1%	2.4%

第IX表 健常馬腰髄後根中各種有髄神経纖維

馬名	種 類	有髄神経纖維全数	5ミクロン以上 (%)	5乃至3ミクロン (%)	3及3ミクロン以下 (%)
昇忠	腰後V	23571	9435 (33.2)	2932 (10.3)	16154 (56.5)
	腰後VI	31276	9226 (29.5)	3065 (9.8)	18985 (60.7)
大川	腰後V	30761	12365 (40.2)	2401 (7.8)	15995 (52.0)
	腰後VI	34112	14259 (41.8)	2456 (7.2)	17397 (51.0)
豊大	腰後V	28371	11537 (35.1)	2399 (7.3)	18935 (57.6)
	腰後VI	37665	14430 (38.3)	2106 (5.6)	21127 (56.1)
青花	腰後V	23776	7623 (23.3)	2963 (10.2)	16352 (60.7)
	腰後VI	26983	7623 (23.3)	2963 (11.0)	16352 (60.7)
平均			34.5%	8.6%	56.9%

して稍多きも、小徑有髄神経纖維は極めて多く、51乃至60%、平均53.9%にして前根の約15倍の多数に及べり。

最後に薦髄前根中無髄神経纖維を見るに腰髄前根に於けるが如く、有髄神経纖維に略々同数なるを認めたり。前根中有髄神経纖維を区分すれば、大徑有髄神経著しく多数を占め、91乃至95%、平均93.6%の多きに達すること腰髄前根の場合に近し。其の直径も10乃至15ミクロンのもの最も普通なり。中徑有髄神経は平均3.6%、小徑有髄神経纖維は1.7乃至4.0%平均2.8%を占め、腰髄前根同様極

第X表 健常馬薦髄前根中各種有髄神経纖維

馬名	種 類	有髄神経纖維全数	5ミクロン以上 (%)	5乃至3ミクロン (%)	3及3ミクロン以下 (%)
昇忠	薦前I	15630	14700 (94.1)	463 (3.0)	452 (2.9)
大川	薦前I	17335	17037 (95.3)	445 (2.5)	303 (1.7)
豊大	薦前I	15537	14496 (91.1)	590 (3.0)	451 (3.9)
青花	薦前I	18267	16641 (91.1)	913 (3.0)	713 (3.9)
平均			92.6%	3.6%	2.8%

めて少数なり。

薦髄後根中無髓神経纖維は若干本の少数を含有するのみなること腰髄の場合に同じ。後根有髓神経纖維の比例を見るに、大徑有髓神経纖維は33乃至40%、平均36.6%、中徑有髓神経纖維は平均8.6%、小徑有髓神経纖維は51乃至57%、平均54.8%に達せり。纖維總數に於ては腰髄後根神経纖維を遙に凌駕するも、其の比例は薦髄前節に關する限り、腰髄末節に甚だ接近せる數を示せり。

第XI表 健常馬薦髄後根中各種有髓神経纖維

馬名	種 類	有髓神経纖維全數	5ミクロン以上 (%)	5乃至3ミクロン (%)	3及3ミクロン以下 (%)
昇忠	薦後 I	53827	13035 (33.6)	4393 (9.1)	30344 (57.3)
大川	薦後 I	43906	19611 (40.1)	4059 (8.3)	25236 (51.6)
豐大	薦後 I	42963	16363 (38.1)	3351 (7.3)	23244 (54.1)
青花	薦後 I	60696	21009 (34.5)	5663 (9.3)	34224 (56.2)
平均			36.6%	8.6%	54.8%

以上の検索成績より之を考察するに。

馬後肢末梢神経幹内に於ける無髓神経纖維の數は、他動物の夫に比し極めて多數なるも知り得べし。⁽⁹⁵⁾新保、⁽⁸⁶⁾波多野兩氏の研究によれば末梢神経内の無髓神経纖維の量即ち有髓神経纖維と無髓神経纖維との比例は末梢神経幹の種類により差異を有するも、馬以外の他動物に於ては常に有髓神経纖維は無髓神経纖維より優勢にして、他動物にては腓骨神経及脛骨神経の如きは無髓神経纖維の相當數を含む末梢神経中に挙げたるも、馬の夫に比し著しく少く、尙波多野氏によれば、深腓骨神経幹に於ては有髓神経纖維7115に對し、無髓神経纖維は5592なり。又淺腓骨神経にありては、有髓神経纖維5956に對し、無髓神経纖維5711にして、大體に於て有髓神経纖維と無髓神経纖維との數は略々相半ばせる程度なることを明にせり。然るに馬後肢末梢神経中の無髓神経纖維は無髓神経纖維に比し遙に多く、一般に2乃至3倍の大量を含有するは、他動物に比し著しく相違する點なりとす。曩に大越氏⁽⁸⁷⁾が馬前肢末梢神経幹中の無髓神経纖維の割合を検索して、有髓神経纖維の約1.5乃至2倍に及べることを認めたと其成績一致せり。而して馬

前肢下部に於ては他の部に比し汗腺の發達少き部分なるが故に、之に至る少數の汗分泌神経と立毛神経とを除ける大部分は、末梢血管支配神経にして、之を人為的に脱落せしむる時は交感神経血管運動支配即ち血管收縮緊張脱落により、血管は擴張状態に保持せられ従つて之れが神経支配區域に於ける血行は盛となりて遂に他側健康蹄に比し、著しく蹄の發育を促進せしめらることは、既に大越氏により實驗證明せられたる所なるも、余亦馬後肢に於ても常に同一の事實を認め居る所より推して同氏の見解に賛意を表するものなり。

次に中澤氏⁽⁴¹⁾の人間及犬に於ける末梢神経幹中の小徑有髓神経纖維(5ミクロン以下)の検索成績によれば、人及犬共脛骨神経幹にありては約42%、深淺腓骨神経幹にては約40%の小徑有髓神経纖維を含有せるを認めたり。余の馬後肢に於ける末梢神経幹中の小徑有髓神経纖維は、脛骨神経幹に於て約32%、深及淺の腓骨神経幹に於て約34%なるに比し、馬は他動物に比し可成少數なるを認めたり。且中澤氏の検索せしものは隨意筋に至る筋枝を含み、小徑有髓神経纖維と共に、多數の大徑有髓神経纖維をも含むを以て、馬の場合の如く筋枝を除外せんには小徑有髓神経纖維の割合は之より遙に多くなるものと思ふを得べく、従つて馬の後肢末梢神経幹内の小徑有髓神経纖維は他動物に比し頗る少きものと云ふを得べし。之を大越氏の検索せる馬前肢の末梢神経中の小徑有髓神経纖維に比し後肢は僅にその數多きも、他動物に比し馬の肢末梢神経幹内の小徑有髓神経纖維が著しく少數なる事は一致せる所なり。

更に馬脊髄神経纖維の比例を見るに、頸髄、腰髄及薦髄何れの前根中にありても、大徑有髓神経纖維が壓倒的多數なるに反し、小徑有髓神経纖維は極めて少數にして、殆ど稀に存在する程度なるは之亦馬の前根の特異とする所なり。ただ胸髄前根のみは小徑有髓神経纖維は他節に比し遙に優勢なる例外あり。

沖中氏が人間に於て各脊髄前根を検索せる成績を見るに、前根中には多數の小徑有髓神経纖維を認め、殊に胸髄及上部腰髄に於ては約70%の多數を占め、頸髄、下部腰髄、薦髄前根に於ても夫々15乃至25%のかなり多數の小徑有髓神経纖維を認めたり。又中澤氏及市古氏は犬脊髄前根に於ても人間と類似の所見あることを等しく認め居れり。然るに獨り馬脊髄前根中の小徑有髓神経纖維は胸髄前根を除きて僅か3乃至4%の極めて微々たる少數を認め得るなり。之等馬胸髄前根

中の小徑有髓神経纖維の一部は Gaskell 氏以來認められたる交感神経纖維の節前纖維に關係を有すべく、交通枝を通りて交感神経節状索に至り、他の一部は中澤氏の研究によれば、途中に介在神経節を有せず直接筋肉内に至るものなり。

今同一馬に於ける同一側の同一節に於ける腰薦髓前後根中の有髓神経纖維並に無髓神経纖維を觀察し、同側後肢末梢神経幹中の夫等と相併せ考ふる時、後根中有髓神経纖維の比例は前根と異り、小徑有髓神経纖維の數著しく優勢にして、又前根中無髓神経纖維は後根に比し殆ど絶對的多數なる點より、馬後肢末梢神経幹中の小徑有髓神経纖維の殆ど大部分は脊髓後根性副交感神経纖維にして、末梢神経幹中無髓神経纖維の殆ど凡ては脊髓前根性交感神経纖維ならんとは上述の諸檢索の結果により明なり。中澤氏が人屍及犬に就き其の脊髓神経及末梢神経中の小徑有髓神経纖維の分布を檢索せし後、下肢筋に至る小徑有髓神経纖維の約3分の2以上は後根性起原なる事を確めたと比較し馬の後肢末梢神経、有髓、無髓神経纖維の分布は甚だ特殊なるものと謂ふを得べし。

附. 馬尾神経麻痺症馬の脊髓後根神経纖維像の I 例に就て

緒 言

脊髓後根が組織營養と關係あることを始めて認めしは Vulpian 氏⁽⁹⁾にして 1878 年犬の脊髓後根を切斷せるに同側肢關係に變形性關節炎の起るを認め、脊髓後根神経は營養と密接なる關係あるを主張せり。Samuel 氏^(9c)は始めて營養神経なる名稱を與へし人にして、鳩の腋窩神経叢を切斷する時、翼羽毛の發育不完全なることを認め、之を以て營養神経支配脱落に歸し、其他臨床上の所見とを合せて組織の營養は特別なる營養神経によりて支配せらるゝものなりと主張せり。然るに其の後氏の說に對し異說を唱ふる學者多く輩出するに至れり。然れども Samuel 氏の說に對し反對を唱ふる學者も、營養を支配する神経の存在することを否定するものなく、只其作用を司るべき特殊なる營養神経の存在を組織學的に證明するを得ざるを以ての反對なりき。然るに吳教授及其門下は隨意筋の自律神経支配に就き研究し、動物實驗並に臨床的論據により隨意筋の營養並に緊張は腦脊髓神経、交感神経、副交感神経及錐體路外導路性神経の 4 種神経支配を受くることを明に

し、此等4種の神経は官能的には相互に代償するものなりとの學説を樹立せり。而して隨意筋の榮養と脊髄副交感神経纖維との關係を明にせるは先に川口氏あり。氏は脊髄空洞症患者の組織榮養障礙を伴へる者の脊髄後根にては、其の副交感神経纖維は正常の約4分の1乃至15分の1に減少せること、榮養障礙を伴はざるものにありては、神経纖維に何等變化を認めざることにより、脊髄副交感神経の生理的機能は血管擴張、汗腺分泌、筋の榮養及緊張等を司る外組織の榮養を司るものなるを證明せり。猿渡氏⁽⁴⁶⁾は脊髄病患者の脊髄後根に於て、組織榮養障礙を主徴とせる患者にありては小徑有髓神経纖維の高度なる減少を認め、渡邊氏⁽⁴⁷⁾は癲患者に於て、組織の榮養は脊髄後根中小徑有髓神経纖維と密接なる關係にあることを認め、山縣氏⁽⁴⁸⁾亦本症患者の脊髄副交感神経細胞に就き檢索し、本症患者は一般に細胞數の減少を來すも、之を以て直接成因にあらずして素質の存在を疑ふものと結論せり。山田氏⁽⁴⁹⁾は鼻組織の榮養が副交感神経の支配によることを認め、中川氏⁽⁵⁰⁾は猫に於て、脊髄後根中の遠心性脊髄副交感神経が榮養神経として直接に組織の榮養を支配し之が障礙により皮膚、筋肉等の榮養障礙を來すことを明にせり。

以上吳教授及其門下が10餘年の長きに亘り實驗的並に臨床的方面より遂行せられたる、生理學的並に組織學的の業績により Samuel氏 以來問題とされたりし脊髄後根中の所謂榮養神経なることは組織學的に證明せられたり。

余は偶々偏側性臀筋萎縮を來せる馬尾神経麻痺症馬の1例に遭遇したるを以て、腰薦髓後根の組織學的檢索を行ひたる上述の吳教授の業績に關聯して聊か有意義なる所見を得たるを以て、本論文に附記して報告せんとす。

病 例。 駒澤號、鹿毛、騾、8歳、乘馬。

臨床診斷。 馬尾神経麻痺症及顔面神経麻痺症。

發病及經過。 本馬は昭和11年9月初旬より右後肢の歩様異常を認めたるも、其儘乗用として使役に服せしめ居たり。然るに同年11月21日に至り高さ約80厘の障礙飛越を行はじめて以來、頻繁に排尿姿勢をとり、其都度疼痛を訴へざるも少量の無氣力性排尿を爲すに至れり。常歩せしむれば右後肢を外轉せしめ、前方提出困難なる異常跛行を認めたり。當時體溫40°、脈搏60、一般に元氣沈衰し稍々憂鬱の狀を呈す。背腰の知覺は鈍麻し、尾力は減少し右臀部附近に局限して反射的に

過敏部あり。尙同側臀部の知覺鈍麻し、電氣的刺激に對して反應鈍し。爾後時間の経過と共に漸次同筋の萎縮を認め、腰髓の知覺亦鈍なり。殊に右側臀筋の萎縮著明となれり。以上の諸症候の外に、咀嚼筋の麻痺症狀を有し、採食困難にして、殊に上唇は左側に偏倚し、干草類は殆ど採食すること能はず、僅に穀實のみを緩徐に少量宛採食し得る程度なり。爲めに發病時 480 疋の體量を有せしものが、約 1 箇月に 60 疋餘の減量を示せり。糞中には穀物の咀嚼不充分にして殆ど不消化麥粒を排泄するを認む。

現症。患馬の體格中等、栄養亦中等なり。頭部には何等異常なきも、右顔面殊に上唇の麻痺著明にして、上唇は左側に屈曲偏倚し、常に舌を口外に露出す。眼瞼裂左右同大、瞳孔亦その状態に變狀なく、對光反射及調節反應、眼球反應何れも異常を認めず。

運動障礙。右後肢は歩行に當り稍々前方短縮を來し、常歩に於ては肢を外轉著地す。速歩に於ては一層跛行著明にして、後肢は左右に動搖し、前方提舉は困難なり。

栄養障礙。前軀諸筋肉には何等變化なきも、右後軀に著明なる筋萎縮を認む。殊に中臀筋は左側の同部に比し、凹陷に近き迄筋萎縮を認めらる。其他に二頭股筋及半膜様筋の筋頭部附近にも同様の萎縮を認めたり。

知覺障礙。肛門、會厭部、直腸部の知覺鈍麻し、電氣刺激を與ふるも反射運動極めて鈍し。

尾。駐立間は殆ど尾を動かすことなし、退歩に於ても無力に股間に垂下し、時に僅かに左側に動かすを認め得るのみなり。尾筋に萎縮を認む。

肛門。肛門括約筋は弛緩し、肛門常に哆開し、糞塊の半葉露出するを常とす。肛門周圍の反射機能鈍麻す。運動に當り後軀の振動に伴ひ屢々糞塊を落下す。直腸内には多量の糞塊の堆積乾固するあり。人爲的に排除せざれば生理的排糞は望み得ず。

排尿。排尿は無意識的にして、他動的運動即ち退歩、横臥に當り腹壓の爲め少量宛尿淋瀝す。膀胱内には中等量以下の堆尿あり。膀胱壁は常に弛緩す。尿は弱酸性、透明、蛋白、尿圓柱、血色素及細菌を證明し得ず。比重 1.030、インデカン 51 ミリグラム・デンシツトル、クロール 430 ミリグラム・デンシツトルなり。

経過。昭和11年12月17日入廐。右側中臀筋、二頭股筋及半膜様筋に電気刺激を連日與ふ。消化剤として、酵母及人工カルルス泉鹽を適用す。毎日人工的に堆糞の排除を行ひ、練飼を給するも漸次瘦削す。右臀部の瘦削一層著明となる。昭和12年2月16日放血致死せしむ。發病以來165日を経過す。

剖検所見。肉眼的に右側中臀筋、半膜様筋及二頭股筋の著明なる筋萎縮を認むる以外著變なし。脊髓後根神経を左右比較するに、肉眼的には腰髄部には變狀なし。僅に脊髓硬膜内に於て右薦髓後根の神経束の分枝数が2乃至3少く、且褪色し菲薄となれるを認めしのみなり。

脊髓後根神経纖維

第5及第6腰髄後根並に第1薦髓後根の左右兩側標本を採りて觀察せる成績次の如し。

第XII表 右側馬尾神経麻痺症馬腰薦髓後根神経纖維像 (駒澤號)

節	側 別	有髓神経 纖維全數	5ミクロン以上 (%)	5乃至3ミクロン3及3ミクロン以下 (%)	3ミクロン以下 (%)
L5	左	29635	7379 (24.9)	2904 (9.9)	19352 (65.3)
	右	29073	7471 (25.7)	2413 (8.3)	19189 (66.0)
L6	左	31653	3969 (12.3)	3355 (10.6)	19334 (61.1)
	右	30075	3022 (10.0)	3097 (10.3)	16956 (56.4)
S1	左	43700	15349 (35.1)	3156 (7.2)	25195 (57.7)
	右	26515	14052 (53.0)	1857 (7.0)	10306 (39.0)

第5腰髄後根中有髓神経纖維の配列比例を見るに、小徑有髓神経纖維は左19352本にして65.3%に當り、右19189本にして66.0%に當り特に左右の變化あるを認めず。第6腰髄後根中小徑有髓神経纖維は左19334本にして61.1%、右16956本、56.4%にして、右側に於て約2300本、比例に於て約2%の減少を認めたり。即ち本症馬の腰髄後根にありては、左右に著變を認めず、僅に右第6腰髄後根に於ける小徑有髓神経纖維約2%の減少を認めしのみなり。然るに第1薦髓後根を見るに左側に於ては小徑有髓神経纖維數25195本にして、全數の57.7%に相當するが故に殆ど健常状態にあるものと考へらる。然るに右側後根にありては小徑有

随神経纖維は僅に 10606本の少数となり、左側の約40%以下に激減しあるを認めたり。而して消失せる半数以上の小徑有髓神経纖維の跡には、結締組織並にシュワン氏核の増殖填充せられ、獨り大徑有髓神経纖維のみは残存せる状態は先に行へる腰髓後根切斷實驗時の末梢片の所見に似たるものあり。以上の所見より考察して脊髓後根中を走る脊髓副交感神経纖維が組織の榮養と密接相離るべからざる關係にあることを認め得たり。而してこの脊髓副交感神経纖維は Samuel氏 以來問題となれる榮養神経なりとは既に吳教授及其の門下により實驗的並に臨床的に闡明せられたる所なり。今余は1例の臀筋萎縮を主徴とせる馬尾神経麻痺症馬の脊髓後根神経纖維を観察し、患側脊髓副交感神経纖維の著明なる減少を認め、馬に於ても吳教授の主張せられたる説の眞なることを證明するを得たり。

VI. 總括並に考按

余は12頭の馬に就きて腰髓後根切斷實驗を行ひ、6頭の馬に於て馬腰髓後根中の小徑有髓神経纖維の殆ど大部分は脊髓遠心性副交感神経纖維にして、若干の脊髓求心性知覺性小徑有髓神経纖維の外、數百本の脊髓遠心性無髓神経纖維の存在することを證明せり。尙14頭の健康馬に於て脊髓前根及後根並に後肢末梢神経幹中の自律神経を組織學的に檢索し、馬後肢末梢神経内の交感神経の殆ど大部分は脊髓前根性交感神経なること及び同肢中の小徑有髓神経纖維の大半は脊髓後根性交感神経性なることを主張せんとするものなり。

廬に 吳教授^(4,5)は其の門下新田、辻、白石、末永氏等と共に腰髓後根中を副交感神経纖維が走行することを組織學的に證明せられたり。即ち犬に就て其の第7腰髓後根を切斷し、10數日を経過せしめたる後致死せしめ、其の脊髓後根中の神経纖維を組織學的に檢索せしに後根中の大徑有髓神経纖維は變性に陥れるに反し、小徑有髓神経纖維は殆ど全部健存し、脊髓其他に變化を見ざる所なり。是等多數の小徑有髓神経纖維は脊髓遠心性にして、Stricker氏⁽⁶⁾以來疑問とせられたる副交感神経纖維に外ならざるべしと推論せられたり。次で新田氏^(4,7)はこの副交感神経纖維脊髓核に就て、犬及猫の第4乃至第7腰髓後根及第1薦髓後根を切斷し之を組織學的に檢索せしに、灰白質の前角及後角膠様質の中間に位する小神経細胞に急性並に慢性逆行性變性に類似せる變化を認め、此の小神経細胞は上述の副交感

神経の脊髓中樞と見做せり。又中澤氏^(4.1)は人屍及犬を材料とし末梢神経並に脊髓神神中に於ける小徑有髓神経纖維の分布を研究し、更に犬に於て脊髓後根神経節を剔出すれば當該随意筋肉神経中の小徑有髓神経纖維は全數の約3分の1に減じ又下部腰髓以下の脊髓前根剔出を行へば當該筋肉神経枝中の小徑有髓神経纖維は全數の約3分の2に減少す。即ち下肢に至る小徑有髓神経纖維中其3分の2以上後根性起原なることを發見せり。更に三枝氏^(4.5)、沖中氏^(4.6)等は副交感神経は腰髓のみならず頸髓、胸髓後根中にも多數に存在することを證明し、更に健康犬の各脊髓各節に於ける後根中の神経纖維を検索し其の小徑有髓神経の含有數は著しく多數に有することを闡明せり。又川口氏^(4.4)は上述副交感神経の原始細胞は腰髓のみならず脊髓の殆ど全長に亘りて存する事を證明し、且各脊髓節に於ける其の神経細胞數は三枝氏により證明せられたる各脊髓後根中の小徑有髓神経纖維數と其の關係一致するを認めたり。余は馬に於て腰髓後根中を走る小徑有髓神経纖維數の約95%の多數は脊髓遠心性副交感神経纖維にして、他の残りは脊髓求心性知覺性小徑有髓神経纖維吳教授の所謂副交感神経性知覺性神経纖維なることを證明せり。又健康馬腰髓後根並に薦髓後根中の小徑有髓神経纖維數を検索するに、其の數著しく多數にして、犬の夫れより約15%多く、人間の夫れに比し略々等しきことを確めたり。

脊髓副交感神経の生理的機能に關し考察するに脊髓後根が血管擴張作用に關係あることを始めて主張せしは Stricker氏⁽¹⁾にして、氏は犬の第6第7腰髓後根を切斷し、其の末梢部の電氣的或は機械的刺戟を加ふる時は、後肢の溫度上昇するを認め、腰髓後根中には同側後肢の血管擴張神経を含むものならんと主張せしに始まる。其の後同氏の實驗成績に對し二、三學者の反駁ありたるも、Bayliss氏^(1.1)及 Langley氏^(1.2)等相次いで之を再試し、其の眞なることを證明するに及び、脊髓後根内に血管擴張神経の存在することが一般に承認せらるる機運を醸せり。然れども之等の研究は生理學的實驗にのみ立脚せる結論にして、組織學的には未だ何等脊髓後根中に血管擴張神経の存在を證明せし學者なし、従て Bayliss 及 Langley 氏等の脊髓後根の刺戟により生ずる血管擴張作用は特別なる神経纖維の存在するにあらずして、知覺神経の所謂逆傳導作用によるなりとの説明行はれたり。其後 Müller氏^(1.3)は血管擴張神経が脊髓後角より出るとの考へは充分なる根據あるが如

しと唱へ、Schiff氏⁽⁴⁾は血管擴張神経に就て論じたる後、これは副交感神経に属すべき筈なるも、然ると謂ふ根據なきを論ぜり。今や吳教授及其門下により脊髓副交感神経の發見せらるるに至り、Stricker氏以來多年の懸案たる脊髓後根内の血管擴張神経は遂に組織學的に證明せられ、Langley氏等により唱へられたる逆傳導説も其の存在を沒するに至れり。

脊髓後根と筋緊張の關係に關してはFrank氏⁽⁹⁾が脊髓癱患者に就き、脊髓後根が侵さる時は著明なる筋緊張の減退を示し、又錐體路外障礙により起れる痙攣或は攣縮並に震顫麻痺患者の強直及頸直等は脊髓後根切斷により全く消失することを認め、脊髓後根は筋緊張に對し促進的に作用す、而して其作用が司る神経は副交感神経に属すべき筈なるが、組織學的には特別なる神経の存在するに非ず、知覺神経纖維の逆傳導によるなることを主張せり。其後Ranson氏⁽³²⁾も亦同様の考へを主張せり。然るに吳教授は種々の實驗的論據により隨意筋緊張の四重支配説を樹立せらる。即ち隨意筋は腦脊髓神経、交感神経、副交感神経及錐體路外導路性神経の4種の支配を受け、官能的には相互に代償し得んことを明にせられたり。

又一方吳教授は隨意筋と自律神経との關係に關する研究を行はれ、副交感神経と隨意筋榮養との關係を明かにせんとせられ、從來副交感神経として知られたる神経纖維を除去し、之が筋榮養に及ぼす影響を檢索せり。即ち辻氏⁽³⁰⁾は三叉神経第2枝を下眼窩孔の部に於て切斷し、一定時日の後上口唇提舉筋に筋デストロフキ様の變化を惹起せしめ得たり、又今川氏⁽³⁴⁾は鼓索神経を切除し又は兩側舌下神経切斷に一側鼓索神経切斷を併せて行ひ舌筋に、須永氏⁽³⁵⁾は毛様神経節隨出により眼筋に、櫻澤氏⁽³⁷⁾は三叉神経第2枝を切斷して一定時の後口唇筋に、何れも筋デストロフキ様變化の發生を證明し得たり。更に松浦氏⁽⁴²⁾は同一犬に就き一側に於ては脊髓後根を後根神経節より上方に於て切斷し、他側に於ては後根神経節を別出し、一定時の後後根神経節を別出したる側の總趾伸筋に著明なる筋デストロフキ様變化を、又他側には輕度の變化を認めたり。猿渡氏⁽⁴⁹⁾は脊髓癱患者に就き、川口氏⁽⁴⁴⁾は神經空洞症患者に就き其の後根を檢索せるに、生前重篤なる組織の榮養障礙を伴へる患者の脊髓後根に於ては其の副交感神経纖維數は著しく減少し、生前知覺障礙を主徴とし、榮養障礙を伴はざるものにありては、其の後

根中大、中徑有髓神経纖維は高度の變性像を呈せるを認めたり。⁽⁸⁷⁾渡邊氏⁽⁸⁷⁾は多數の癩患者に就きて同様の成績を得たり。中川氏⁽⁸⁵⁾は一側腰薦部後根切斷並に後根神経節を壓碎或は後根神経節を除ける猫に於て、手術側後肢に潰瘍の發生を見たり。沖中氏等は進行性筋ジストロフィー症患者に就て、脊髓の副交感神経細胞交感神経質状態中の無髓神経纖維の變性及消失、筋肉神経枝の無髓神経纖維の變化を認めたり。之等の諸研究により遠心性に走る脊髓副交感神経が栄養神経として、直接筋組織の栄養を支配することが立證せられ、Samuel氏⁽⁹⁶⁾が始めて鳩の腋窩神経叢を切斷し、翼羽毛の發育不完全となれることを認め、栄養神経説を唱へて以來、學界多年の問題とせられたるも、吳教授により脊髓副交感神経が発見せられて以來、之が隨意筋の栄養神経なる事が組織學的に明にせらるるに至れり。

余も亦1例の馬尾神経麻痺症馬に於て、臀筋萎縮を主徴とせる場合は、患側の薦髓後根中の小徑有髓神経纖維が2分の1以下に激減せるを認むるを得たり。

脊髓後根中無髓神経纖維を含有するや否やに就きては種々論議せらるる所なるも、Ranson氏⁽⁸²⁾及 Windle氏⁽⁸⁵⁾は後根中には無髓神経纖維の存在することを主張し、更に Lugo氏⁽⁸⁵⁾は後根内に遠心性無髓神経纖維の存在を主張せしも、何れも組織學的檢索を缺けり。三枝氏⁽⁴⁵⁾は多數の犬に就き檢索せるも遂に無髓神経を認むるを得ざりき。最近楠木氏⁽⁸⁴⁾は犬の後根中に、猿渡氏⁽⁸⁴⁾は猫に於て數百本の脊髓遠心性無髓神経纖維の存在することを證明せり。余は馬の腰髓後根中にも數百本の無髓神経纖維を認め、その殆ど凡てが脊髓遠心性交感神経なることを證明するを得たり。

次に脊髓前根中に存在する小徑有髓神経纖維に特殊性を與へしは Gaskell氏⁽⁸⁶⁾にして、氏は前根中に集團を爲せる直徑1.8乃至3.6ミクロンの小徑有髓神経纖維(中、小徑有髓神経)を他の大有髓神経纖維と區別し之を以て内臟諸器官に分布する交感神経の節前纖維となせり。Langley氏⁽⁸⁷⁾は臍髓のみならず頸髓、腰髓前根中も小有髓神経纖維の存するを見、交感神経纖維を送ること多き前根中には多數の小有髓神経纖維を含有すと云へり。Sherrington氏⁽⁸⁸⁾は腰髓下部に於て同様の小有髓神経纖維の存在するを見、Dale氏⁽⁸⁹⁾も薦髓前根に於て少數の小有髓神経を見たり。沖中氏⁽⁹⁰⁾は健常人體に於て各脊髓前根を通じて多數の小徑有髓神経纖維を認め、殊に臍髓及上部、腰髓前根に於て可成多數の小徑有髓神経纖維を認め

たり。市古氏⁽⁵⁴⁾の研究によれば犬の脊髓前根に於ても人類と類似の所見ありと云ふ。此の脊髓前根中の小徑有髓神経纖維は Gaskell 氏以來認めたる交感神経の節前纖維にして、交通枝を通りて交感神経節状態に至るものなり。小徑有髓神経纖維の他の一部は中澤氏⁽⁴¹⁾の研究により途中に介在神経節を有せず直接に筋肉に至ることを明にせり。沖中氏の研究によれば胸髓前根中の多數の小徑有髓神経纖維中、直接末梢に至るものは極めて少く、一方腰髓下部の脊髓前根中、小徑有髓神経纖維は胸髓前根に比し少きも、其の大部分は直接末梢に至り、其の數胸髓に於けるより遙かに多數なりと云ふ。即ち腰髓下部及頸髓前根に於ては交感神経纖維少く、錐體路外導路性小徑有髓神経纖維大部分を占め、胸髓に在りては比較的少きことを證明せり。余は馬の頸、腰及薦髓前根中の小徑有髓神経纖維は他動物に比し頗る少數にして其の大部分は大徑有髓神経纖維なるを認めたり。但し胸髓前根に於ては比較的多數の小徑有髓神経纖維を含むこと、並に各脊髓前根中の無髓神経纖維數は略々有髓神経纖維數に匹敵する數を含有するを認めたり。考ふるに馬胸髓前根中に存する比較的多數の小徑有髓神経纖維の大部分は恐く節前交感神経纖維と關係を有するものなるべし。大越氏⁽⁶⁷⁾は馬前肢末梢神経中の自律神経に就きて研究し、馬前肢末梢神経幹中の交感神経纖維の割合は、他動物殊に人間及犬に比し著しく多數にして、之に反し副交感神経纖維の割合は頗る少數なるを認め、この交感神経纖維の大部分血管支配神経にして、副交感神経纖維は諸種組織に對する營養神経を含み、血管支配神経は其の幾分に過ぎず、即ち馬前肢末梢神経幹内の血管支配神経は他動物に比し、交感神経の勢力甚しく優勢にして、副交感神経は著しく劣勢なるを主張せり。余は馬後肢末梢神経幹中の自律神経像に於ても、大越氏に一致せる所見を得たり。而して有髓神経纖維中の比較的多數の小徑有髓神経纖維の一部は吳教授の唱ふる錐體路外導路性神経纖維に屬すべきものなるべし。而して馬脊髓前根中、無髓神経纖維は後根の夫れに比し殆ど絶對數に近き多數を占むる點並に脊髓後根中の小徑有髓神経纖維は前根の夫れに比し約50倍に近き優勢なる點よりして、馬後肢末梢神経幹中の無髓神経纖維の殆ど全部は脊髓神经性交感神経にして、末梢神経中の小徑有髓神経纖維の大部分は脊髓後根性副交感神経ならんと主張せんとす。馬前肢末梢神経幹に於ても同様のことを云ひ得べし。馬脊髓前根中に存する多數の無髓神経纖維は恐らく二、三學者の唱ふ

る節前神経繊維なるべし。以上の成績並に考按の結果余は次の如き結論を得たり。

VII. 結 論

- (1) 馬腰髄後根中に在する小徑有髓神経纖維数は總有髓神経纖維数の46.0乃至65.0%、平均57.7%の多數に達す。
- (2) 馬腰髄後根中小徑有髓神経纖維数の91乃至97%、平均94.8%の多數は脊髓遠心性副交感神経纖維に屬し、2乃至4%、平均3.2%は脊髓求心性知覚性小徑有髓神経纖維(所謂副交感神経性知覚性神経纖維)なり。之を犬の腰髄後根遠心性副交感神経纖維數に比し著しく多數なるも、人間の夫れに比し少數なるが如し。
- (3) 馬腰髄後根神経纖維中には數百本の無髓神経纖維を含み、その殆ど凡ては脊髓遠心性交感神経なり。
- (4) 馬後肢末梢神経幹中には有髓神経纖維の約2乃至3倍の夥しき多數の無髓神経纖維を含む。有髓神経纖維中小徑有髓神経纖維数は平均33.4%に達す。大越氏の馬前肢末梢神経幹中の自律神経像の所見に一致す。
- (5) 馬頸髄、腰髄及薦髄前根中の無髓神経纖維数は有髓神経纖維數と略々同數を含む。有髓神経纖維中の小徑有髓神経纖維数は極めて少數にして、總有髓神経纖維數の平均3.8%を含むのみに反し、大徑有髓神経纖維は頗る優勢にして、平均97.8%を占む。但し胸髄前根中、小徑有髓神経纖維数は33.4%の多數を占む。
- (6) 馬後肢末梢神経幹中の小徑有髓神経纖維の大部分は脊髓後根性副交感神経にして、無髓神経纖維の殆ど凡ては脊髓前根性交感神経纖維なり。
- (7) 偏側性髂筋萎縮を主徴とせる馬尾神経麻痺症馬1例の薦髄後根中の小徑有髓神経纖維数は健側に比し約2分の1以下に變性減少せるを認めたり。

擧筆するに臨み、本研究を余に命ぜられ、終始御懇篤なる御指導と御鞭撻を賜はり、公務御多忙中にも拘らず、周到なる御校閲を賜はりたる吳教授に深甚の謝意を捧げ、本研究中常に多大の御指導、御助力を賜はりたる沖中博士に深謝し、前田、植木外吳教室諸氏の御親切なる御助言を謝し、吉村、宮本、矢島、市井、若松諸氏の御助言並に加藤、勝又兩

氏の助力に禮す。

文 獻

- (1) Stricker : *Sitzungsber. d. K. Akad. Wissensch.*, Wien, 74, Abt. III (1876).
- (2) Gärtner : *Wiener Kl. Wochenschr.*, 980 (1893).
- (3) Morat : *Arch. Physiol.*, 689 (1896).
- (4) Werzilloff : *Zbl. Physiol.*, 10, 194 (1896).
- (5) Cossy : *Arch. Physiol.*, 892 (1876).
- (6) Hasterlik u. Biedle : *Wiener Kl. Wochenschr.*, 43, 7 (1893).
- (7) Bornezzi : *Bull. Reale. Acad. Med. Roma* 13, 539, Abst. in *Zentralbl. Physiol.*, 501 (1887).
- (8) Bornezzi : *Med. Jahrb.*, 473 (1885).
- (9) Vulpian : *Arch. Physiol.*, 338 (1878).
- (10) Kühlwetter : *Eckhard's Beiträge*, 11, 25 (1885).
- (11) Bayliss : *J. Physiol.*, 26, 173 (1901).
- (12) Langley : *J. Physiol.*, 57, 423, 58, 1924 (1923).
- (13) Müller L. R. : *Die Lebensnerven*, 70 (1934).
- (14) Schilf : *Das autonome Nervensystem* (1926).
- (15) Lewis, T. : *Die Blutgefäße der menschl. Haut u. ihre Verhaltenegegen Reize.* Berlin.
- (16) Dale, H. : *J. Physiol.*, 70, 109 (1930).
- (17) Rogowicz : *Pflüger's Arch.*, 36, 1 (1885).
- (18) Euler a. Gaddum : *J. Physiol.*, 73, 54 (1931).
- (19) Dastre u. Morat : *Zi. nach. Tigerstedt*. Bd. IV, 199.
- (20) Vulpian : *Zit nach Müllr* (1818).
- (21) Joseph : *Vir. Arch.*, 107, 119 (1887).
- (22) Gaule : *Berl. Kl. Wochenschr.*, 44, 45 (1907-8).
- (23) Köster G. : *Neurol. Zentralbl.*, 25, 237 (1906).
- (24) Trendenberg W. : *Neurol. Zentralbl.*, (1906).
- (25) Charcot : *Klin. Vorträge über Krankh. d. Nervensystems* (1874).
- (26) Eulenburg : *Lehrbuch d. Nervenkrankh.*, (1878).
- (27) Böwig u. Helmut : *Deutsch. Z. Nervenheilk.*, 76, 71 (1923).
- (28) Frank : *Berl. Kl. Woch.*, 45, 46. (1908-9).
- (29) 吳, 波多野, 甲斐, 篠崎, 永野 : *東京醫學會雜誌*, 39, 4 (1925).
- (30) 荒 木 : *東京醫學會雜誌*, 39, 5 (1925).

- (31) 藤 田 : 東京醫學會雜誌, 37, 12, 38, 1, 7 (1924).
- (32) 加地, 前野 : 東京醫學會雜誌, 38, 12 (1924).
- (33) 辻 : 東京醫學會雜誌, 38, 11 (1924).
- (34) 今 川 : 東京醫學會雜誌, 40, 1330 (1929).
- (35) 須 永 : 東京醫學會雜誌, 41, 1615 (1927).
- (36) 小 島 : 東京醫學會雜誌, 42, 1969 (1928).
- (37) 櫻 澤 : 東京醫學會雜誌, 42, 2456 (1923).
- (38) 白 石 : 東京醫學會雜誌, 41, 3037 (1927).
- (39) 前 田 : 東京醫學會雜誌, 40, 1330 (1926).
- (40) 中 尾 : 東京醫學會雜誌, 44, 1465 (1930).
- (41) 中 澤 : 東京醫學會雜誌, 42, 1017 (1928).
- (42) 吳, 松 浦 : 東京醫學會雜誌, 41, 3042 (1927).
- (43) 新田, 辻, 白石, 末永 : *Pflügers Arch.*, 218, 5/6.
- (44) 川 口 : 東京醫學會雜誌, 44, 996 (1930).
- (45) 三 枝 : 東京醫學會雜誌, 45, 1364 (1931).
- (46) 沖 中 : 東京醫學會雜誌, 43, 9 (1934).
- (47) 新 田 : 東京醫學會雜誌, 43, 610 (1932).
- (48) 吳 : Über den Spinalparasymphikus. Beno Schwalde Basal (1931).
- (49) 猿 渡 : 東京醫學會雜誌, 46, 1165 (1932).
- (50) 一 色 : 東京醫學會雜誌, 44, 543 (1930).
- (51) 渡 邊 : 東京醫學會雜誌, 44, 155 (1930).
- (52) 山 縣 : 東京醫學會雜誌, 46, 1535 (1932).
- (53) 山 田 : 東京醫學會雜誌, 43, 12 (1934).
- (54) 市 古 : 東京醫學會雜誌, 45, 1239 (1931).
- (55) 石 川 : 東京醫學會雜誌, 46, 616 (1932).
- (56) 和 田 : 東京醫學會雜誌, 46, 1815 (1932).
- (57) 神 田 : 東京醫學會雜誌, 47, 693 (1933).
- (58) 若 林 : 東京醫學會雜誌, 47, 1726 (1933).
- (59) 藤 井 : 東京醫學會雜誌, 47, 1249 (1933).
- (60) 谷 島 : 東京醫學會雜誌, 43, 7 (1934).
- (61) 塚 田 : 東京醫學會雜誌, 46, 11 (1932).
- (62) Kuré : *Carl. J. exp. Physiol.*, 22, 339 (1933).
- (63) 橋 本 : 東京醫學會雜誌, 48, 7 (1934).
- (64) 田 中 : 東京醫學會雜誌, 48, 10 (1934).
- (65) 中 川 : 東京醫學會雜誌, 49, 3 (1935).
- (66) 大 島 : 東京醫學會雜誌, (近日發表)
- (67) 大 越 : 東京醫學會雜誌, 48, 8 (1934).

- (68) kiss Franz u. Peter v. Mihálik : *Z. Anat. Entw.*, **68**, 112 (1929).
- (69) Wallen : Zit. nach Karl Kleist.
- (70) Vegas P. : Ein Beitrag z. Anat. u. Physiol. d. Spinalgangl. J. D. München (1889).
- (71) Joseph : *Arch. Physiol.*, (1887).
- (72) Sherrington : *J. Physiol.*, **17**, 211 (1894-95).
- (73) Langley : *J. Physiol.*, **21**, (1897).
- (74) Ranon'y Cajal : *Anat. Anzeiger*, **85**, 111 (1890).
- (75) Van Gehuchten : *Anat. Anzeiger*, **8**, 215 (1893).
- (76) Retzius : *Biologische Untersuch.*, V (1893).
- (77) Karl Kleist : *Virchow Archiv*, **175**, 331 (1904).
- (78) Dogiel : *Der Bau. u. Spinalganglien d. Menschen u. Säugetiere* (1904).
- (79) 新保 : 東京醫學會雜誌, **39**, 4 (1935).
- (80) 波多野 : 福岡醫科大學雜誌, **17**, 10.
- (81) Gagel O. : *Z. Neurol.*, **126**, 3/4 (1930).
- (82) Ranson : *Amer. J. Anat.*, **12**, 1 (1911).
- (83) Windle : *J. Anat.*, **57**, 360 (1923).
- (84) 楠木, 猿渡 : 東京醫學會雜誌, (近日發表.)
- (85) Lugaro : *Arch. Luiss Neurolog. et Phych*, **31** (1906).
- (86) Gaskell : *J. Physiol.*, **7**, 1 (1886).
- (87) Langley, : *J. Physiol.*, **56**, 382 (1922).
- (88) Sherrington : *J. Physiol.*, **4**.
- (89) Dale H. H. : *J. Physiol.*, **25**, 196 (1899-1900).
- (90) 冲中 : 東京醫學會雜誌, **46**, 5 (1932).
- (91) Stör : *Mikroskop. Anat. d. Vegetat. Nervensys.*, Berlin (1928).
- (92) 青柳 : *Mitt. Med. Facultät d. Kaiserl. Univ. Tokyo*, **10**, 3 (1912).
- (93) 新保 : *Pflügers Arch.*, **195**, 617 (1922).
- (94) Langley : *Naturwissenschaften*, **10**, 583 (1922).
- (95) 新保 : 東京醫學會雜誌, **35**, 11 (1921).
- (96) Samuel : Zit. nach Joseph.
- (97) 冲中, 梶山, 大島 : 東京醫學會雜誌, **50**, 12 (1936).

附 圖 說 明

第1圖 鳥花號。左側第2 頸髓後根切斷後 165日を經過したるものなり。

甲圖 切斷側末梢片横斷標本。擴大 630倍。ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。

G——輕度の逆行性變性を早せる大徑有髓神經纖維 (2911本)。

K——殘存せる一部の小徑有髓神經纖維 (401本)。

SK——シュワン氏核

乙圖 切斷側中樞片横斷標本。擴大 630倍。ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。

K——小徑有髓神經纖維 (3143本)。

丙圖 健側後根横斷標本。擴大 630倍。ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。總數 12397本。

G——大徑有髓神經纖維 (3268本)。

M——中徑有髓神經纖維 (1226本)。

K——小徑有髓神經纖維 (3333本)。

第2圖 岡飛號。左側第3 腰髓後根切斷後 206日を經過したるものなり。

甲圖 切斷側末梢片横斷標本。擴大 630倍。ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。

G——健存せる大徑有髓神經纖維 (3967本)。

K——變性せる小徑有髓神經纖維 (278本)。

SK——シュワン氏核

乙圖 切斷側中樞片横斷標本。擴大 630倍。ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。

K——健存せる小徑有髓神經纖維 (3711本)。

丙圖 健側後根横斷標本。擴大 630倍。ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。總數 17266本。

G——大徑有髓神經纖維 (5401本)。

M——中徑有髓神經纖維 (2293本)。

K——小徑有髓神經纖維 (9567本)。

第3圖 傳市號。左側第3 腰髓後根切斷後 249日を經過したるものなり。

甲圖 切斷側末梢片横斷標本。擴大 630倍。ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。

K——健存せる小徑有髓神經纖維 (7902本)。

乙圖 健側後根横斷標本。擴大 630倍。ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。總數 12366本。

G——大徑有髓神經纖維 (2907本)。

M——中徑有髓神經纖維 (1309本)。

K——小徑有髓神經纖維 (3550本)。

第4圖 信浪號。左側第4 腰髓後根切斷後35日を經過したるものなり。

甲圖 切斷側末梢片横斷標本。擴大 630倍。ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。

G——變性せる大徑有髓神經纖維 (573本)。

K——健存せる小徑有髓神経纖維 (9013本).

乙圖 健側後根横斷標本. 擴大 630倍. ヲイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色. 總數 14249本.

G——大徑有髓神経纖維 (3176本).

M——中徑有髓神経纖維 (1669本).

K——小徑有髓神経纖維 (9409本).

第5圖 茂浦號. 左側第5腰髓後根切斷後 215日を經過したるものなり.

甲圖 切斷側末梢片横斷標本. 擴大 630倍. ヲイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色.

G——健存せる大徑有髓神経纖維 (5301本).

K——變性殘存せる小徑有髓神経纖維 (356本).

乙圖 切斷側中樞片横斷標本. 擴大 630倍. ヲイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色.

K——健存せる小徑有髓神経纖維 (14993本).

丙圖 健側後根横斷標本. 擴大 630倍. ヲイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色. 總數 23741本.

G——大徑有髓神経纖維 (6576本).

M——中徑有髓神経纖維 (1635本).

K——小徑有髓神経纖維 (15430本).

第6圖 茂浦號. 左側第5腰髓後根中に於ける交感神経纖維

甲圖 擴大1250倍. ヲイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色.

S——交感神経纖維

G——大徑有髓神経纖維

K——小徑有髓神経纖維

乙圖 切斷側中樞片中に於ける交感神経纖維.

擴大1250倍. ヲイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色.

S——交感神経纖維

K——小徑有髓神経纖維

SK— シュロン氏核

第7圖 大川號. 左側脊髓前根. 後根及豎脊. 腓骨神経纖維.

甲圖 第7頸髓前根神経纖維. 擴大 630倍. ヲイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色.

G——大徑有髓神経纖維 (9511本).

K——小徑有髓神経纖維 (717本).

乙圖 第13胸髓前根神経纖維. 擴大 630倍. ヲイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色.

G——大徑有髓神経纖維 (4364本).

M——中徑有髓神経纖維 (624本).

K——小徑有髓神経纖維 (2773本).

丙圖 第6腰髓前根神経纖維. 擴大 630倍. ヲイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色.

G——大徑有髓神経纖維 (10715本).

丁圖 第6腰髓後根神経纖維，擴大 630倍，ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。

G——大徑有髓神経纖維 (14259本)。

M——中徑有髓神経纖維 (2458本)。

K——小徑有髓神経纖維 (17397本)。

戊圖 第1薦髓前根神経纖維，擴大 630倍，ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。

G——大徑有髓神経纖維 (17087本)。

M——中徑有髓神経纖維 (445本)。

K——小徑有髓神経纖維 (303本)。

己圖 第1薦髓後根神経纖維，擴大 630倍，ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。

G——大徑有髓神経纖維 (19611本)。

M——中徑有髓神経纖維 (4059本)。

K——小徑有髓神経纖維 (25236本)。

庚圖 深腓骨神経纖維，擴大 630倍，ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。

S——交感神経纖維

G——大徑有髓神経纖維 (2527本)。

K——小徑有髓神経纖維 (1712本)。

申圖 脛骨神経纖維，擴大 630倍，ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。

S——交感神経纖維

G——大徑有髓神経纖維 (19854本)。

K——小徑有髓神経纖維 (10522本)。

第8圖 駒澤號。右側馬尾神経麻痺症馬腰，薦髓後根神経纖維像

甲圖 右側第1薦髓後根神経纖維，擴大 630倍，ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。

G——大徑有髓神経纖維 (14052本)。

SK——シュワン氏核

乙圖 左側第1薦髓後根神経纖維，擴大 630倍，ワイゲルト氏鐵ヘマトキシリン染色。

G——大徑有髓神経纖維 (15349本)。

M——中徑有髓神経纖維 (5156本)。

K——小徑有髓神経纖維 (25195本)。

木全論文附圖 (I)

第 1 圖

第 2 圖

木全論文附圖(Ⅲ)

第 3 圖

第 4 圖

木全論文附圖(Ⅲ)

第 5 圖

木全論文附圖 (V)

第 6 圖

木全論文附圖 (Ⅴ)

第 7 圖ノ 1

木全論文附圖 (VII)

第 7 圖 / 2

木全論文附圖 (VIII)

第 8 圖