原 著

鼠癩ノ補體結合反應ニ就テ

市原 鶴雄

(熊本醫科大學微生物學教室，主任：太田原教授，及
朝鮮總督府癩療養所小鹿島更生園，主任：周防園長)

(昭和 14 年 8 月 26 日受附)

I. 緒 言

癩ノ補體結合反應ニ關シテハ既ニ多數ノ業績發表セラレ枚舉ニ遑ナキモ鼠癩ノ血清反應ニ至リテハソノ業績實ニ寥々タリコレ鼠癩ノ動物實驗ニ於テ鼠癩ノ確定的變化ノ發現マデニ長時日ヲ要スルノミナラズ比較的の多量ノ血清ヲ得ルコト困難ニシテ從ツテ同一血清ニ就テ各種ノ試驗ヲ實施スルコト不可能ナルニ起因スルニ非ザルヤ今試ミニ 2, 3 研究者ノ報告ヲ引證スベシ

河村ハ鼠癩抗原ヲ用ヒ結核及ビ癩血清ニ就キ補體結合反應ヲ試ミタルニ夫々一程度ノ陽性反應ヲ呈セシモ鼠癩血清ニ就テハ之ガ試驗ヲ施行セザリキ SCHMITT モ亦同様ノ方法ヲ用ヒ略々同様ノ結果ヲ納メタリ

内田ハ鼠癩血清ノ血清學的諸性狀ニ關シ詳細ナル研究ヲ行ヘリ即チ氏ニ依レバ鼠癩血清ハ健常白鼠血清ニ比シ稍々溶血性補體減少乃至缺除シ又少數ニ於テ抗補體作用ヲ認メ得レ共特ニ高率トハ云フヲ得ズ更ニ鼠癩血清ニ就キわ氏反應ヲ試ミ鼠癩ノ 5% ニ於テ陽性反應ヲ呈シつべるくりんヲ抗原トスル補體結合反應ニ於テハ鼠癩ノ約半數ニ於テ陽性反應ヲ呈セリ鼠癩結節浸出液並ニ自家培養抗酸性菌ヲ抗原トセル實驗ニ於テモ極メテ低率トハ云ヘ或ル程度ノ陽性成績ヲ得タリト報ゼリ佐藤ハ更ニ詳細ナル研究ヲ行ヘリ即チ鼠癩結節ヨリ種々ナル抗原ヲ創製シ癩及ビ鼠癩血清ニ就キ補體結合反應ヲ試ミタリ即チ抗原トシテ水溶性抗原，酒精浸出抗原，えーてる可溶性抗原 (BROWNING 氏法) 及ビつべるくりん等ヲ用ヒタリ水溶性抗原ハ鼠癩血清 20 例中 5 例 (25%) ニ，結節混合癩血清 5 例中 5 例 (100%) ニ，斑紋神經癩血清 20 例中 5 例 (25%) ニ，黴毒血清 20 例中 7 例 (35%) ニ夫々陽性反應ヲ呈セリ酒精浸出抗原ハ鼠癩血清 33 例中 2 例 (6%) ニ，結節混合癩血清 8 例中 4 例 (50%) ニ，斑紋神經癩血清 26 例中 7 例 (27%) ニ，黴毒血清 20 例中 7 例 (35%) ニ陽性ヲ呈セリえーてる可溶性抗原ハ鼠癩血清ニ對シテハ陰性ヲ呈セリ然ルニ之

ニ反シ癩患者血清ニ於テハ結節混合癩血清 5 例中 3 例 (60%) ニ、斑紋神經癩血清 21 例中 4 例 (19%) ニ、黴毒血清 20 例中 1 例 (5%) ニ於テ陽性ヲ呈セリわ氏抗原ハ鼠癩血清 48 例中 2 例 (4%) ニ、斑紋神經癩血清 41 例中 6 例 (14%) ニ、黴毒血清 50 例中 50 例 (100%) ニ於テ陽性反應ヲ呈セリつべるくりんヲ抗原トスル時ハ鼠癩血清 11 例中 5 例 (45%) ニ、結節混合癩血清 2 例中 1 例 (50%) ニ、黴毒血清 20 例中 14 例 (70%) ニ陽性ヲ呈セリ鼠癩血清ハ水性抗原ト酒精抗原トノ兩者ニ低率乍ラ補體結合反應陽性ヲ呈シ酒精抗原ノ結合能力ハこれすてりんノ適當ナル追加ニヨリ抗原能力ノ增強ヲ來セリ其他わ氏抗原モ補體結合反應陽性ヲ呈スルコトアルヲ認メつべるくりんヲ抗原トスル時ハ他抗原ニ比シ比較的高率ニ陽性ヲ呈セリト報ゼリ以上ノ外本問題ニ關シテハ太田及ビ寺田等ノ報告アリ

曩ニ余ハ太田原教授ト共ニ癩及ビ鼠癩ノ純粹培養法研究中之等材料中ヨリ多數株ノ抗酸性菌ヲ分離シ之等分離セル抗酸性菌及ビ土壤中ヨリ分離セル抗酸性菌株中ヨリソノ形態、染色狀態等ガ癩及ビ鼠癩菌ニ類似セルモノヲ擇ビ抗原トナシ癩、結核及ビ黴毒並ニ健康血清ニ就キ補體結合反應ヲ試ミシニ實驗ニ供セシ菌株中鼠癩材料ヨリ分離セル 920 號ナル菌株ハ癩患者血清ニ對シ 88.9% ノ高率ニ陽性反應ヲ呈シ殊ニソノ反應ハ輕症癩ニ於テモ頗ル高率ニ陽性ヲ呈シ他面結核患者血清ニ於テモ 35.2% ノ陽性率ヲ呈シ本菌ニヨル補體結合反應ハ特異的反應ニ非ズシテ一種ノ非特異性反應ナルヲ知レリ茲ニ於テ余等ハ本菌株ニ或種ノ操作ヲ加フレバ癩血清ニ特異的ニ反應スル抗原ヲ創製シ得ルモノニ非ズヤトノ考ヘニ到達シ本菌ヲ木精ニテ一定期間浸出シタル浸出菌殘渣ハ癩血清ニ對シ特異的ニ反應シ比較的高率ニ陽性反應ヲ呈スルコトヲ知り得タリ而シテ更ニ余等ハ榊原ノ提唱セル癩血清ニ特異的ニ反應シ非癩血清ニ絶對ニ反應セザルけふありんヲ本抗原ニ添加スルコトニヨリ癩血清ニ對シ高率ニシテ非癩血清ニ絶對ニ反應セザル特異的優秀ナル抗原ヲ創製シ既ニ數回ニ亙リ報告セリ余ハ周防園長ト共ニ本抗原ガ潛伏癩ノ診斷ニ幾何程度ノ意義アルカヲ知ラント欲シ未感兒童血清 34 例ニ就キ補體結合反應ヲ試ミタルニ 34 例中 2 例 (5.9%) ニ反應ヲ呈シ本抗原ハ癩ノ診斷上意義アル抗原ナルコトヲ第 12 回日本癩學會ニ於テ發表セリ

茲ニ報告シテ先輩諸家ノ批判叱正ヲ抑ガントスルモノハ癩ニ極メテ酷似セル鼠癩血清ニ對シ本抗原ガ血清學的ニ幾何程度ノ關係ヲ有スルヤヲ知ラント欲シ實驗ヲ試ミタルモノナリ

II. 實 驗

1. 實 驗 方 法

(a) 供 試 鼠 癩 菌

實驗ニ供セル鼠癩菌ハ余ガ太田原教授ト共ニ熊本市内ニ於テ捕獲セル癩

家鼠ヨリ白鼠ニ累代接種セル 753 XII_G, 576 VII_G, 167 XIII_G, 394 IX_G, 133 XI_G, 758 XI_G, 673 X_G, 203 VII_G, 856 VIII_G, 及ビ更ニ余ガ周防園長ト共ニ小鹿島更生園病舎地帯ニ於テ捕獲シ白鼠ヘ累代接種セル 66 II_G, ノ 10 株ナリ

各鼠癩菌株別ニ夫々結節ヲ剔出シ滅菌しやーれ内ニテ細切シ滅菌乳鉢内ニ移シ充分搗碎シ 5% 硫酸水ヲ滴下シツツ磨碎シ乳劑トナス該乳劑ヲ試験管ニ注ギ暫次放置スルコトニヨリ生ズル粗大ナル組織片ノ沈澱ヲ除去シ 37°C 孵卵器内ニ 30 分間納置シタル後直チニ遠心沈澱シ上層液ヲ除去シ滅菌生理的食鹽水ニテ洗滌スルコト 3 回ノ後生理的食鹽水ヲ以テ 0.5% れちちん浮游液ノ濃度ニ等シキ菌浮游液ヲ製ス

斯クシテ製セル鼠癩菌浮游液ヲ體重 100 g 前後ノ白鼠ノ右側胸腹部皮下ニ夫々 1.0 cc 宛接種セリ

(b) 抗原ノ調製法

抗原ノ調製法ハ前述セル抗酸性菌株 920 號ヲ SÖHNGEN 氏液鶏卵培地 (SÖHNGEN 氏液 300.0 cc ニ鶏卵 700.0 cc ヲ加ヘ更ニぐりせりん 40.0 cc ヲ加ヘ充分混和攪拌シ滅菌ガーゼニテ濾過シ試験管ニ分注シ之ヲ血清凝固器ヲ以テ 80°C 2 時間 5 日間斜面ニ凝固滅菌セルモノ) ニ約 1 ケ月間培養セル菌ヲ搔集秤量シ木精 1.0 cc ニ對シ 80 mg ノ割ニ混和浮游シ時々振盪シツツ約 5 日間室温ニ放置セリ次デソノ上清液ヲ採取シ更ニ木精ヲ加ヘ 5 日間前同様浸出シ木精ヲ去リ滅菌生理的食鹽水ヲ以テ菌残渣ヲ無菌的操作ノモトニ數回洗滌シ木精量ト同量ノ滅菌食鹽水ヲ以テ稀釋シ其ノ抗補體價ヲ測定セルニ 1.0 cc 迄ニ於テハ抗補體作用ナキヲ知レリ次デ該抗原ヲ用ヒ癩, 結核及ビ微毒血清ニ就キ抗原量 0.1 cc, 0.095 cc, 0.09 cc, 0.08 cc, 0.07 cc, 0.06 cc 及ビ 0.05 cc ノ 7 種ヲ以テ補體結合反應ヲ試ミタルニ 0.1 cc ニ於テハ稀ニ非癩血清ニ反應スルモ 0.09 cc 以下ニ於テハ絶對ニ非癩血清ニ對シ反應ヲ呈セザリキ (熊本醫學會雜誌, 第 11 卷, 第 10 號, 昭和 10 年; 同誌, 第 12 卷, 第 10 號, 昭和 11 年)

次ニ 1% 牛腦けふありんえーてる溶液 1 分ヲ試験管ニ取りソレニ 1 分ノ生理的食鹽水ヲ加へびつとヲ以テ數回送氣攪拌シえーてる臭ノ消失スル迄えーてるヲ發散セシム更ニ生理的食鹽水ヲ以テ之ヲ 11 倍ニ稀釋シ重湯煎中ニテ 40°C~45°C ニ加溫シツツ完全ニえーてるヲ驅出セルモノヲけふありん抗原ノ原液トシ其ノ抗補體作用ヲ測定シ抗補體下量ノ半量ヲけふありんノ添加量トセリ今若シけふありんノ抗補體下量 0.25 cc ナリトセバ前述セル如ク 920 號抗原ノ使用量ハ 0.09 cc ナルヲ以テ次ノ如ク混和セリ即チ

920 號抗原	0.09 cc
けふありん (抗補體下量ノ半量)	0.25 cc
生理的食鹽水	0.16 cc

充分混和シ室温ニ 30 分間放置セル後ソノ 0.5 cc ヲ使用セリ

本抗原調製ニ當リ最モ注意スベキハ菌量及ビけふありんノ添加量ニシテ
癩血清ニ對シ高率ニシテ非癩血清ニ絶對ニ反應セザル様意ヲ注ギ可及的多
數ノ癩及ビ非癩血清ニ就キ對照試驗ヲ行フ可キコト論ヲ俟タズ

(c) 補體結合反應

本實驗ニ於テ鼠癩菌 10 株中 167 XIII_G, 394 IX_G, 133 XI_G, 758 XI_G, 673
X_G, 203 VII_G 及ビ 856 VIII_G ノ各血清群ニ於ケル白鼠中鼠癩菌接種後原因
不明ノ疾患ニヨリ極メテ早期ニ斃死セルモノヲ除キ 49 頭ニ就キ檢索セリ

實驗ニ先ダチ各健常白鼠血清ニ就キ血清ノ抗補體作用ノ有無ヲ檢シタル
ニ鼠癩材料接種前ニ於テハ何レノ白鼠ニ於テモ血清ニ抗補體作用無キヲ知
レリ依リテ鼠癩菌乳劑ヲ健常白鼠ニ夫々接種シ接種後 1 ケ月ヨリ 12 ケ月
ニ至ル期間ニ於テ 1 ケ月毎ニ心臟穿刺ニヨリ所要量ノ血液ヲ採取血清ヲ分
離シ非動性トナセリ

先ヅ血清 1 例ニ就キ試験管 5 本ヲ取り之ニ夫々 0.1 cc, 0.05 cc, 0.025 cc, 0.0125
cc, 0.00625 cc ノ非動性血清ガ含マルルガ如ク夫々生理的食鹽水ニテ稀釋セルモノ
0.5 cc ヲ分注シ之ニ抗原 0.5 cc ヲ加ヘ補體トシテハ新鮮海溟血清ヲ用ヒソノ補體
2 單位ガ恰モ 0.5 cc ニ含マルルガ如ク稀釋セルモノ 0.5 cc ヲ加ヘ良ク振盪シ 37°
C ニ 1 時間放置シ然ル後之ニ牛血球ヘモリじん 2 單位ヲ以テ感作セル 3% 牛血球浮
游液ヲ加ヘ振盪シ 37°C ニ 2 時間放置スソレヨリ之ヲ取り出シ 1 夜氷室ニ靜置シ翌
日成績ヲ判定記載セリ本試驗ニ於テ毎常可檢血清, 抗原及ビ溶血系統ニ嚴密ナル對
照ヲ置キ成績判定ニ誤認ナキヲ期セリ

2. 實 驗 成 績

實驗成績ハ第 1 表ニ示スガ如シ

即チ第 1 表ニ就テ見ルニ熊本系 753 XII_G 血清群ニ於テハ鼠癩菌接種後
90 日迄ニ於テハ陽性ヲ呈セザルモ原因不明ノ疾患ニヨリ斃死セル 8 號ヲ
除キ 120 日ニ至リテ 1, 4, 5, 7, 9 及ビ 10 號ノ 6 例ハ何レモ陽性反應ヲ
呈セリ之ニ反シ 2 及ビ 6 號ハナヲ陰性ナルモ 150 日ニ至リテ陽性反應ヲ發
現セリ 576 VII_G 血清群ニ於テハ原因不明ノ疾患ニヨリ斃死セル 13, 14,
17, 18 及ビ 20 號ヲ除キ 150 日迄ニ 11, 12 及ビ 15 號ハ何レモ陽性ヲ呈

セリト雖モ 19 號ハナヲ陰性ニシテ 180 日ニ至リテ陽性反應ヲ發現セリ 167 XIIIg 血清群ニ於テハ原因不明ノ疾患ニヨリ斃死セル 22 號ヲ除キ 210 日ニ至リテ何レモ陽性ヲ呈セリ 394 IXg 血清群ニ於テハ 120 日ニ至リテ何レモ陽性反應ヲ發現セリ 133 XIg 血清群ニ於テハ原因不明ノ疾患ニヨリ斃死セル 26 及ビ 28 號ヲ除キ何レモ陽性反應ヲ呈セリ 758 XIg 血清群ニ於テハ 180 日ニ至リテ何レモ陽性反應ヲ呈セリ 673 Xg 血清群ニ於テハ 150 日迄ニハ何レモ陽性反應ヲ呈セズ 180 日ニ至リテ 35 號ハ陽性反應ヲ呈セリト雖モ 36 號ニ於テハナヲ陰性ヲ示シ 210 日ニ至リテ陽性反應ヲ發現セリ 203 VIIg 血清群ニ於テハ 38 號ハ 180 日ニ至リテ陽性反應ヲ呈セルモ 37 號ニ於テハナヲ陰性ニシテ 210 日ニ至リテ陽性反應ヲ發現セリ 856 VIIIg 血清群ニ於テハ 150 日ニ至リテ陽性反應ヲ發現セリ 小鹿島系 66 IIg 血清群ニ於テハ原因不明ノ疾患ニヨリ斃死セル 1', 3', 5', 6' 號ヲ除キ 210 日ニ至リテ何レモ陽性反應ヲ呈セリ

由是觀之各株鼠癩菌接種後第 2 表ニ示スガ如ク 753 XIIg 血清ハ 120 日, 576 VIIg 血清ハ 150 日, 167 XIIIg 血清ハ 210 日, 394 IXg 血清ハ 120 日, 133 XIg 血清ハ 150 日, 758 XIg 血清ハ 180 日, 673 Xg 血清ハ 180 日, 203 VIIg 血清ハ 180 日, 856 VIIIg 血清ハ 150 日及ビ小鹿島系 66 IIg 血清ハ 210 日ニ於テ夫々陽性ヲ招來シ日數ノ經過ト共ニソノ陽性數ヲ増加シ遂ニハ悉ク陽性ヲ示スモ強度ノ陽性(完全溶血阻止)ヲ呈セシモノハ極メテ少シ即チ菌株ニヨリ早キハ 120 日, 遅キハ 210 日以内ニ於テ夫々陽性反應ヲ發現セリ

第 2 表

鼠 癩 菌 株	菌接種后陽性反應ヲ發現シ來ル迄ノ經過日數	鼠 癩 菌 株	菌接種后陽性反應ヲ發現シ來ル迄ノ經過日數
熊本系 753 XIIg	120 日	熊本系 758 XIg	180 日
熊本系 576 VIIg	150 日	熊本系 673 Xg	180 日
熊本系 167 XIIIg	210 日	熊本系 203 VIIg	180 日
熊本系 394 IXg	120 日	熊本系 856 VIIIg	150 日
熊本系 133 XIg	150 日	小鹿島系 66 IIg	210 日

III. 總 括 及 結 論

1872 年 HANSEN ニヨリ癩菌發見セラレ次デ 1903 年 STEFANSKY ニヨリ鼠癩菌發見セラレシ以來之ガ純粹培養乃至動物實驗ニ關シ先進諸賢ノ眞劍ナル研究ニモ不拘今日未ダ成功ヲ見ズト雖モ之ニ關スル業績枚舉ニ遑アラズ而シテソノ血清學的方面ニ於テモ漸次闡明セラレ就中癩血清ノ抗體殊ニ補體結合反應ニ關シテハ近時興味アル知見相加ヘラレツツアリ然ルニ鼠癩ノ補體結合反應ニ至リテハ之ガ檢討未ダ充分ナラズ

曩ニ余ハ太田原教授ト共ニ癩乃至鼠癩菌ノ培養法研究中鼠癩材料ヨリ分離セル 920 號ナル菌株ヲ用ヒ癩患者血清ニ就キ補體結合反應ヲ檢セルニ比較的高率ニ陽性ヲ呈シタリ又他面非癩血清ニ對シテモ反應シ本菌ニヨル補體結合反應ハ特異的反應ニ非ズシテ一種ノ非特異的反應ナルコトヲ知リ得タリ更ニ余等ハ緒言ニ於テ述ベタルガ如キ方法ニヨリ癩血清ニ對シ特異的ニ反應スル抗原ヲ創製シ得タリ茲ニ於テ余等ハ更ニ榊原ノ唱ヘタルけふありんヲ適當ナル比ニ本抗原ニ添加セルニ癩血清ニ特異的ニ反應スル優秀ナル抗原ヲ創製スルコトヲ得テ之ヲ用ヒタル實驗成績ヲ既ニ數次ニ亘リ報告セリ更ニ余ハ周防園長ト共ニ本抗原ヲ用ヒ潜伏癩ノ診斷ニ資シ得ルモノナリヤヲ知ラント欲シ未感兒童血清ニ就キ實驗ヲ試ミ極メテ興味アル成績ヲ得發表スル所アリタリ余ハ本抗原ガ人癩ニ極メテ酷似セル鼠癩ニ就キ血清學的ニ如何ナル關係ヲ有スルヤヲ知ラントシ實驗セルニ熊本系 753 XIIg 菌株血清 120 日, 576 VIIg 菌株血清 150 日, 167 XIIIg 菌株血清 210 日, 394 IXg 菌株血清 120 日, 133 XIg 菌株血清 150 日, 758 XIg 菌株血清 180 日, 673 Xg 菌株血清 180 日, 203 VIIg 菌株血清 180 日, 856 VIIIg 菌株血清 150 日及ビ小鹿島系 66 IIg 菌株血清 210 日ニ於テ夫々陽性反應ヲ發現シ接種後ノ日數經過ト共ニソノ陽性數ヲ増加シ遂ニハ何レモ陽性ヲ呈スルヲ見タリ即チ早キハ 120 日ヨリ遅キハ 210 日ヨリ陽性反應ヲ發現セリ

由是觀之鼠癩血清中ノ補體結合反應物質ハ白鼠ノ個體ニヨリ抗體產生ニ差異ヲ認メ得可ク亦鼠癩菌株間ニ於テモ毒力ニ差異アル如ク抗體產生ニ差異ヲ認メ得タリ

稿ヲ終ルニ當リ終始指導鞭撻並ニ校閲ノ勞ヲ賜リタル恩師太田原教授並ニ周防園長閣下ニ對シ滿腔ノ敬意ヲ表ス

尙ホ本研究ハ大日本癩豫防協會並ニ朝鮮癩豫防協會ヨリノ研究費補助ニヨリナサレタルモノナリ茲ニ附記シテ謝意ヲ表ス

文 獻

- (1) 太田, 佐藤: れぷら, 8, 235 (1937).
- (2) 太田原, 六反田, 市原: 熊本醫學會雜誌, 11, 1225 (1935).
- (3) 太田原, 六反田, 市原: 熊本醫學會雜誌, 11, 1241 (1935).
- (4) 太田原, 六反田, 市原: 熊本醫學會雜誌, 12, 1 (1936).
- (5) 太田原, 多田, 鈴木, 市原: れぷら, 10, 134 (1939).
- (6) 佐藤(勝): 皮膚科泌尿器科學誌, 43, 26 (1938).
- (7) 周防, 市原: れぷら, 10, 134 (1939).
- (8) 寺田, 中村: れぷら, 8, 239 (1937).
- (9) 内田(三千太郎): 細菌學雜誌, 第 330 號, 191 (1923).

ÜBER DIE KOMPLEMENTBINDUNG BEI RATTENLEPRA.

TURUO ITIHARA.

*(Aus dem mikrobiologischen Institut der Medizinischen Fakultät zu Kumamoto,
Leiter: Prof. Dr. T. Ohtawara, und dem Leprosorium Koseien des
Generalgouvernements Chosen auf Shoroku'o, Leiter: Dr. M. Suwo.)*

In den früheren Mitteilungen habe ich mit Prof. Dr. T. OHTAWARA nachgewiesen, daß das aus dem Bazillenstamm Nr. 920 hergestellte Antigen gegenüber den Seren Lepröser ganz spezifisch reagiert, und daß der Zusatz von Kephalin den positiven Ausfall verstärkt.

Es interessiert mich sehr zu erfahren, wie die Sera von leprösen Ratten mit diesem Antigen reagieren, da die Rattenlepra der menschlichen sehr ähnlich (verwandt) ist, und zwar Stamm Nr. 920 aus Rattenlepra-Material isoliert wurde. Ich habe daher die Komplementbindungsversuche mit diesem OHTAWARA-Antigen bei Rattenlepra ausgeführt, und bin dabei zu interessanten Ergebnissen gekommen.

Als Rattenlepra-Stämme wurden 9 in Kumamoto gesammelte Stämme, nämlich 753 XIIg, 576 VIIg, 167 XIIg, 394 IXg, 133 XIg, 758 XIg, 673 Xg, 203 VIIg, und 856 VIIIg, und ein auf Shorokuto gefundener Stamm, 66 IIg, benützt, die bis heute mehrere Generationen hindurch gelungen sind. Mit diesen Stämmen wurden gesunde weiße Ratten geimpft, und die Komplementbindungsversuche wurden, abgesehen von den an intercurrenten Krankheiten gestorbenen Ratten, an 49 Impfratten allmonatlich ein Jahr hindurch durchgeführt.

Von den untersuchten Stämmen ergaben 753 XIIg, und 394 IXg in 120 Tagen, 576 VIIg, 133 XIg und 856 VIIIg in 150 Tagen, 758 XIg, 673 Xg, und 203 VIIg in 180 Tagen, 167 XIIg und 66 IIg in 210 Tagen eine positive Reaktion und im weiteren Verlaufe kam es bei allen Versuchstieren zu einem positiven Ergebnisse.

Die Zeitspanne bis zum Eintritt des positiven Ergebnisses steht in inniger Beziehung zur Individualität der Ratten und der Virulenz der einzelnen Stämme.