牛の卵巢囊腫に關する研究

II. 症狀と卵巢囊腫の内分泌學的組織學的關聯について

山内 亮 乾 純 夫

(家畜衛生試験場中國支場)

(昭和 28 年 1 月 8 日受付)

I. 緒 言

卵巢囊腫が発生すれば多くの牛は思牡狂を呈するが少數のものは之と反對に無發情となる事を HAMMOND⁽¹⁾ が述べ、SCHUMANN⁽²⁾ は前者が約 70 %、後者が 30 % であると述べている。前の第 I 報⁽³⁾ に於いて著者がホルモン治療試験に供した病牛に於いても 12 例中 9 例 (75 %) が思牡狂で 3 例 (25 %) が無發情となつてゐる。何れも直腸検査によつては同じ異常發育濾胞として觸知される囊腫の發生した牛に於いてこの様な 2 つの對蹠的な症狀が現れ且つ第 I 報に述べた治療試験に併行して行つた病牛の尿中に排泄される卵胞ホルモンの檢定の結果に於ても治療前には思牡狂を呈するものでは無發情型のものより本ホルモンの尿中排泄量が多く、兩者の間に明かに差異が認められた事は興味ある事で著者等は之を解明する目的で屠場より得た卵巢囊腫の材料に就いて内分泌學的並に組織學的觀察を行い正常卵巢濾胞に於ける夫等と比較研究を行つたが 2, 3 の新知見を得たので茲に報告する。

II. 研究材料及び方法

本研究は 1949 年 6 月より 1952 年 10 月に至る間家畜衛生試験場中國支場に於いて行つた。

研究材料は何れも生前の症狀の明かな牛の卵巢囊腫 12 例 (Table 1) でその内 6 例を Plate I Fig. 1~6 (何れもホルマリン固定後に撮影したもの) に示した。之等の牛の生前の症狀は 10 例が思牡狂で他の 2 例中 1 例は無發情 1 例は妊娠末期で勿論無發情であつた。對照として 10 例の正常牛の卵巢を用いた。之等は全て屠場より入手後新鮮な内に外部より觸知し得る個々の囊腫の内容液或は濾胞液を夫々注射針を挿入・吸引して無菌的に採取し、其跡に直ちに等量の牛血清を注入して卵巢の形狀を元に復させた後ホルマリンで固定した。

先づ囊腫内容液の個々について卵胞ホルモンの含有量を檢定した。之には KAHNT-DOISY 法⁽⁴⁾ に準じて幼若雌マウスにこの液を注射して檢定した。然し個々の材料 (囊腫内容液或は濾胞液) が少量のため 1 檢定に 5 匹のマウスを使用し得ないものも少くなかつた。對照として正常濾胞液について同様に檢定したが發情期以外のものは小形の濾胞なので 3 頭分及び 4 頭分を夫々混合した。尙この他に個々の囊腫の内容液について細菌の分離を試みた。

卵巣は固定後断面を作り嚢腫又は濾胞の大きさ（内径）を測定した。次いで C1, C2, C3, C4, C11, C5, C6, C7 の 8 例の嚢腫及び対照区の内正常発情牛 F0 の發育濾胞 1 例の切片標本を作りヘマトキシリン・エオジン染色をなしてその壁の組織を詳細に観察した。

III. 研 究 成 績

嚢腫内容液の個々について細菌の分離を試みた結果全例に於いて細菌陰性である事が認められた。

次に内分泌學的・組織學的觀察の結果は Table 1 に示す通りであるが之等の成績を總括して述べることにする。

1. 嚢腫内容液中の卵胞ホルモン

材料（嚢腫内容液或は濾胞液）が少量であるため充分な検定は出来なかつた。例えば No. C3 の 2 個の嚢腫の内 No. 2 は内容が 3.0 cc の小形の嚢腫であるため 0.25 cc の検定で 100 % 陽性を示し卵胞ホルモンは 4,000 IMU/L 以上に含有されるものと推定されるが材料缺乏のためこゝで検定を打切らざるを得なかつた。

之等の成績を總括すると嚢腫の材料中無發情及び妊娠の 2 例に於いては採取液量に應じて 0.5~3.0 cc に就いて検定したが卵胞ホルモンは證明されないに拘らず思牡狂の 10 例では存在する嚢腫の内少くとも 1 個は 0.25~1.2 cc で陽性反應を得、之等の嚢腫内容液 1 L につき 4,000~833 IMU 以上のホルモンが含まれることが推定され、且つ卵胞ホルモンの含有量は嚢腫の容積の大小（内容液の多小）及びその數とは關係がない事が認められた。又對照区の正常濾胞液では 4 頭分を合せて 2.92 cc として之を全部 1 匹のマウスに注射し、1 L につき 342 IMU として検定したものだけが陽性反應を示したのみで他は全部陰性であつたが、之は ALLEN-DOISY⁽⁵⁾ が牛の濾胞液 1 L につき本ホルモン含有量が 321 MU と述べているのと大體一致する。

以上の成績から嚢腫内容液中の卵胞ホルモン濃度と生前の症狀とが一致する事が注目され、更に思牡狂・無發情の 2 つの型の症狀の發現は嚢腫の大小又は數によるものではなく嚢腫内容液中の卵胞ホルモン濃度の大小によるものである事が認められた。

2. 組織學的所見

Plate II の Fig. 7 は對照區に於ける發情牛の正常濾胞壁の組織であるが、嚢腫壁の組織について特徴のある所見はこの内の顆粒膜層と内莢膜層に大體限られている事を認めたので之等の所見を一括して Table 1 に掲げた。主なる所見は Plate II・Fig. 8~11 に示した。之等を總括してみると

i) 卵胞ホルモンの證明されなかつた嚢腫では Fig. 8, Fig. 9 に示す様に顆粒膜層が缺損し且つ内莢膜層が非常に菲薄になつてゐるもの（No. C1 の 1, 2・No. C2 の 1・

No. C3 の 1・No. C5 の 1, 2) と Fig. 11 に見られる様に顆粒膜層が缺損し且つ内莢膜層の深部が黃體化して肥厚しているもの (No. C11 の 2, 3, 4・No. C5 の 5) と 2 通りの型が認められた

ii) 卵胞ホルモン量の多い嚢腫 即ち No. C3 の 2・No. C4 の 1・No. C11 の 1・No. C5 の 3, 4・No. C7 の 1 等では Fig. 10 に示す様に顆粒膜層は前者と反對に正常濾胞よりむしろ發達・肥厚し、顆粒膜細胞の配列は不規則なものが多く且つ層の基底部の血管は擴張し著しい充血が認められ旺盛なホルモン分泌を思わせる所見を呈した 又内莢膜層の所見は顆粒膜層のこの肥厚充血に大體併行し特に充血が著明であるが中には逆に緻密・菲薄になつてゐるもの (No. C4 の 1・No. C6 の 1・No. C7 の 1) も認められた

以上 i), ii) に述べた 2 つの型の中間的な組織所見の嚢腫も認められ、之等の成績から嚢腫内容液中の卵胞ホルモン量と組織學的所見が一致する事が認められた

IV. 考 察

1. VENZKE⁽⁶⁾ は牛の思牡狂は直接には卵巢嚢腫に由來する卵胞ホルモンの過剰に基づくものであらうと推定しているが本研究の結果卵巢嚢腫の中で生前に思牡狂を呈したものの、嚢腫内容液の卵胞ホルモン含有量が無發情を示したものの、夫に比して著しく多い事が認められ且つ著者が前の第 I 報⁽³⁾に於いて述べた様に本病牛の尿中卵胞ホルモン排泄量に於いても同様の關係のある點から上記の正しい事が實證されたものと思考する

2. WESTER⁽⁷⁾ は思牡狂の牛の卵巢嚢腫の組織所見の特徴として顆粒膜層の缺損を挙げ、HAMMOND⁽⁴⁾ は 2 例の思牡狂の卵巢について 1 例の嚢腫には顆粒膜層が残つており他の 1 例では顆粒膜層が缺損している事を報告しているが之等の報告は個々の嚢腫についての詳細な記録及び内分泌學的觀察を缺いている 然しながら本研究に於ける嚢腫壁の組織學的觀察の結果個々の嚢腫については相當の差異が認められたが大體嚢腫内容液中の卵胞ホルモン量の多少と顆粒膜層の肥厚～缺損の所見が一致する事が認められた。

上記の 1, 2 の 2 點から卵巢嚢腫牛の症狀に思牡狂・無發情の對蹠的な 2 様の型が在る理由が略々解明されたものと考えられる。

3. 黃體の發生に就いては BEAR⁽⁸⁾ が濾胞の内莢膜細胞より發生する事を最初に記載し、その後 BISCHOFF は顆粒膜細胞より生ずると上皮説を唱え、又 SOBOTTA (マウス・モルモット), STRICHT (こうもり), MARSHALL (羊) は夫々黃體細胞は専ら顆粒膜細胞より發生し内莢膜細胞は黃體の血管・結締織の形成にあづかる事を述べ⁽⁹⁾, 又 CORNER⁽¹⁰⁾ は豚について顆粒膜細胞・内莢膜細胞は共に黃體を形成すると述べている等種々の動物について多數報告されているが未だ一定した結論を得ていない 星⁽¹¹⁾ は馬の卵巢の組織學的研究に於いて黃體の發生が濾胞の内莢膜細胞によつて行われるもの

Table 1. Results of Endocrinological and Histological Studies on the Ovarian Cyst in the Cow.

Cow No.	Symptom or Stage	Determination of Estrogen in the Cystic Liquid				Histological Findings			
		Material		Dose cc	Positive reactions in mice	Granulosa layer		Theca interna	
		Cyst No.	Volume of the liquid cc			No. of cells	Av. thickness μ	Characteristics	Av. thickness μ
C 1	Anestrus	1	6.0	0.6	0/5	0	0	lacked	8.8 compact, thin
		2	2.0	0.5	0/4	0	0	lacked	9.9 compact, thin
C 2	Anestrus (Pregnancy)	1	17.0	1.2 3.0	0/3 0/4	0	0	almost lacked	7.7 thin
C 3	Nymphomania	1	13.0	1.8	0/4	0	0	lacked	10.0
		2	3.0	0.6 0.25	2/2 5/5	7~15	94.6	hypertrophic, hyperemic	121.0 hypertrophic, hyperemic
C 4	Nymphomania	1	7.2	1.2 0.4	2/2 2/2	4~7	22.6	hypertrophic, hyperemic	0 almost lacked
C 11	Nymphomania	1	5.0	0.6 0.25	2/2 3/5	5~10	50.1	hypertrophic, hyperemic	44.6 hyperemic
		2	2.8	0.6	1/3	0~4	19.3	partially lacked	116.6 luteinized
		3	7.6	1.2	0/4	0	0	lacked	660.0 luteinized
		4				1~3	12.7	compact, thin	278.0 luteinized
C 5	Nymphomania	1	3.7	0.6	0/3	0	0	lacked	27.5 thin
		2	1.5	0.25	0/2	0	0	lacked	26.4 thin
		3				7~10	46.2	hyperemic	123.2 hyperemic
		4	1.9	0.5	3/3	5~10	63.8	hyperemic	77.0 hyperemic
		5				0	0	lacked	168.8 luteinized

Ovarian Follicle Cyst

C 6	Nymphomania	1	5.5	0.6 1.2	1/2 1/1	1~9	29.72	hyperemic	23.1	compact, thin
C 7	Nymphomania	1	1.15	1.0	1/1	8~12	64.9	hypertrophic, hyperemic	44.0	compact, hyperemic
		1	1.3	1.0	0/1	—	—	—	—	—
C 12	Nymphomania	2	3.6	0.6 1.0	0/2 1/1	—	—	—	—	—
		3	2.3	1.0	0/1	—	—	—	—	—
C 13	Nymphomania	1	3.9	1.8	1/1	—	—	—	—	—
		2	0.6	0.6	2/2	—	—	—	—	—
C 14	Nymphomania	1	4.0	1.0	2/2	—	—	—	—	—
		2	2.6	0.5	2/2	—	—	—	—	—
		1	14.7	0.6 1.2	0/2 3/3	—	—	—	—	—
C 15	Nymphomania	2	1.3	0.6	1/1	—	—	—	—	—
		3	—	—	—	—	—	—	—	—
Control										
F 0	Estrus	1 follicle	0.8	0.4	0/2	4~9	40.2	not hyperemic	50.1	not hyperemic
F 1	Proestrus	1 follicle	0.6	0.6	0/1	—	—	—	—	—
F 2	Metestrus	2 follicles	1.0	1.0	0/1	—	—	—	—	—
F 3	Metestrus	5 follicles (3 cows)	0.76	0.76	0/1	—	—	—	—	—
F 4	Various	23 follicles (4 cows)	2.92	2.92	0/1	—	—	—	—	—

であつて顆粒膜細胞に據るものでない事を認めている 又最近飯田⁽¹²⁾は婦人に對し性腺刺激ホルモン（妊婦尿質）を連續注射した結果人工的に濾胞を黃體化せしめた事を報告しているがこの場合顆粒膜細胞は黃體化していないで莢膜細胞が黃體化している事を認めている

本研究の結果2例の病牛の4個の囊腫（No. C11 の 2, 3, 4・No. C5 の 5）に於いて顆粒膜層の缺損と内莢膜の黃體化が認められ、且つこの黃體化は Plate II の Fig. 11 に示す様に層の深部即ち外莢膜に接した部分に認められる事並びに著者等（未發表）が牛に人工的に發生せしめた囊腫に於いても1例に同様の所見が認められた點より小數例乍ら牛に於いても黃體の發生は馬と同様に内莢膜細胞に由來するものではないかと推定される

V. 結 論

牛の卵巢囊腫材料 12 例に就いて囊腫内容液中に含まれる卵胞ホルモンの定量及び組織學的觀察を行い正常卵巢濾胞に於ける夫等と比較し病牛の生前に示した2様の症狀即ち無發情及び思牡狂との關聯に就いて研究を行つた結果

1. 卵胞ホルモンは無發情の例では證明されないに拘らず思牡狂の例では、存在する囊腫の内少くとも1個には相當の量即ち 4,000~833 IMU/L 以上の濃度に含有されることが證明され、この2つの型の症狀の發現は囊腫の容積の大小又は數によるものではなく囊腫内容液中の卵胞ホルモン濃度の大小によるものである事が認められた

2. 組織學的には卵胞ホルモンの證明されない囊腫に於いては顆粒膜層が缺損し、内莢膜は菲薄になるか或は黃體化しているに反し、ホルモン濃度の大きなものでは正常卵胞よりむしろ顆粒膜層が發達し且つ著しい充血が認められた

之等の結果から病牛の症狀と囊腫の卵胞ホルモン含有量と組織學的所見の程度とが大體一致する事が認められ、肉眼的には同様に見える囊腫にも内分泌學的・組織學的に見れば著しい差異があり之によつて思牡狂・無發情という2様の症狀が現れる事が明かになつた

稿を終るに臨み終始懇篤なる御指導を賜つた恩師東大星冬四郎教授並に御鞭撻を賜つた渡邊守松前支場長に對し衷心感謝すると共に貴重なる材料を提供され御協力を賜つた和田山保健所坂上正太郎技師及び組織寫眞撮影に御協力を賜つた畏友浪速大學保田幹男助教授に深謝する

文 献

1. HAMMOND, J.: The physiology of reproduction in the cow., Cambridge Univ. Press (1927).
2. SCHUMANN, P.: Bekämpfung der Sterilität der Rinder., *Arch. d. Deutschen*

Landwirtschaftsrates, Berlin. 40 Jahrg. (1920).

3. 山内(亮)・芦田(淨)：本誌 **15**, 317 (1953).
4. KAHNT, L. C. and E. A. DOISY : *Endocrinol.*, **12**, 760 (1928).
5. ALLEN, E., C. H. DANFORTH and E. A. DOISY : Sex and internal secretions. 2 Ed., Baltimore (1939) より引用.
6. VENZKE, W. G. : *J. Amer. Vet. Med. Ass.*, **115**, 347 (1949).
7. WESTER, J. : Eierstock und Ei—Befruchtung und Unfruchtbarkeit bei den Haustieren. Berlin (1921).
8. VON BEAR : De Ovi Mammalium et Hominis Geneisi. Lipsae (1927).
9. PARKES, A. S. : The internal secretion of the ovary. London (1929) より引用.
10. CORNER, G. W. : *Amer. J. Anat.*, **26**, 117 (1919).
11. 星(修)：本誌, **9**, 59 (1947).
12. 飯田(無)：日本産科婦人科学會雑誌, **3**, 199 (1951).

EXPLANATION OF PLATES

Plate I Cystic ovaries of 6 cows.

Fig. 1 Cow No. C 1 (Anestrus).

FC 1 : 6.0 cc Estrogen —

FC 2 : 2.0 cc Estrogen —

Fig. 2 Cow No. C 2 (Anestrus, pregnancy).

FC 1 : 17.0 cc Estrogen —

Fig. 3 Cow No. C 3 (Nymphomania).

FC 1 : 13.0 cc Estrogen —

FC 2 : 3.0 cc Estrogen +

Fig. 4 Cow No. C 4 (Nymphomania).

FC 1 : 7.2 cc Estrogen +

Fig. 5 Cow No. C 11 (Nymphomania).

FC 1 : 5.0 cc Estrogen +

FC 2 : 2.8 cc Estrogen +

FC 3 & 4 : 7.6 cc Estrogen —

Fig. 6 Cow No. C 13 (Nymphomania).

FC 1 & 2 : 3.9 cc Estrogen +

Plate II Histological findings of the walls of ovarian follicle cysts in the cow.

Fig. 7 Cow No. F 0 (Control) : Normal follicle.

Fig. 8 Cow No. C 1 (Anestrus) : FC 1 (Estrogen —).

Fig. 9 Cow No. C 3 (Nymphomania) : FC 1 (Estrogen —).

Fig. 10 Cow No. C 11 (Nymphomania) : FC 1 (Estrogen +).

Fig. 11 Cow No. C 11 (Nymphomania) : FC 3 (Estrogen —).

ABBREVIATION FOR PLATE I

L. : left ovary, R. : right ovary, FC : follicle cyst,
CL : corpus luteum.

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 10

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 11

STUDIES ON THE OVARIAN CYST IN THE COW

II. ENDOCRINOLOGICAL AND HISTOLOGICAL STUDIES ON THE CORRELATION BETWEEN THE OVARIAN CYST AND THE SYMPTOM.

M. YAMAUCHI and S. INUI.

*(From the Chugoku Branch of Government Experimental Station
for Animal Hygiene. Chief: Dr. H. KAWASHIMA)*

(Received for Publication Jan. 8, 1953)

It has been recognized that many cows with cystic ovaries become nymphomaniac but some of them become anestrus. Among 12 cows with cystic ovaries, reported in the previous paper, 9 cases (75%) were nymphomaniac and 3 cases (25%) were anestrus. It is interesting that there are these two opposite types—nymphomania and anestrus—among the symptoms of cows with cystic ovaries. The correlation between the ovarian cyst and the symptoms, shown in the cow were studied endocrinologically and histologically. Cystic ovaries of 12 cows (Figs. 1~6) were obtained from a slaughter house. The antemortem symptoms presented by these animals were nymphomaniac in 10 cases and anestrus in 2. Besides, ovaries of 10 normal cows were used as the control.

(1) The estrogen content in the liquid of every follicle cyst in the ovaries from 12 cows was determined biologically. In the cases of nymphomania, a large amount of estrogen, more than 833~4,000 IMU per litre of the liquid, was found at least in one of the follicle cysts; although in the cases of anestrus the determinations on all follicle cysts were negative as shown in Table 1. In the control group, 342 IMU per litre was found in normal follicular liquid.

From these results it was remarked that the estrogen content in the liquid of the follicle cyst corresponded to the antemortem symptom presented by the cow. It was also observed that there was no relation between the estrogen content and the size (volume of the content) of the follicle cyst.

(2) In the histological findings, the granulosa layer and the theca

interna of these ovarian follicle cysts were characteristic as shown in Table 1 and Plate II.

In the follicle cysts in which the estrogen test was negative, the granulosa layer disappeared and theca interna became thin in some cases (Figs. 8 & 9), or thickened by luteinization in others (Fig. 11). On the other hand, in the cysts in which the estrogen test was positive, the granulosa layer was thicker than that of the normal follicle (Fig. 7) and the remarkable hyperaemia was observed in the base of this layer and in the theca interna (Fig. 10).

From these results it was remarked that the findings on the estrogen content in the liquid of the ovarian follicle cyst corresponded to the histological findings.