馬ノ赤血球沈降速度ニ關スル實驗的研究. IV.

赤血球沈降速度ニ影響ヲ及ボスベキ

種々ナル條件ニ就テ

菊 池 滋

(山梨縣農務課)

(昭和 16 年 6 月 9 日 受 附)

目 次

I. 緒 論	IV. 結 論
II. 實驗動物及實驗方法	文 献
III. 實驗成績	

I. 緒 論

近時赤血球沈降速度ガ實地臨床上ニ於テ有力ナル一補助診斷法トシテ疾病ノ診斷, 豫後ノ判定, 經過ノ觀察等ニ廣ク應用サレテ居ルコトハ既ニ一般ニ認メラレタ處デアル而シテ赤血球沈降現象ノ非特異性ニシテ變動性ニ富ムガ爲其ノ應用ニ際シテハ生理的, 物理的ノ諸條件ニ左右セラレテ沈降速度成績ニ影響ヲ及スコトハ蓋シ僅少デナイ故ニ是等ノ關係ヲヨク知悉シ臨床上ノ應用ヲシテ可成的ソノ誤差ヲ少カラシメ以テ有力ナ補助診斷法ノ實ヲ舉ルヤウ努メネバナラナイ

由來是ニ關スル研究者ハ人類ニ就テハ極メテ多キモ動物ニ就テノ研究ハ比較的少ク從ツテ未ダ精細ナル業績ノ發表ヲミナイ 著者ハ斯ル目的ヨリ日常赤血球沈降速度ヲ測定スル場合之ガ最モ影響ヲ及スベキ二, 三ノ條件ニ就テ實驗ヲ試ミタ結果次ノ様ナ成績ヲ得タルヲ以テ此處ニ報告スル次第デアル

II. 實驗動物及實驗方法

1. 實驗動物

實驗動物ハ臨床上何レモ强健ニシテ榮養可良ナル農耕馬ノ血液ヲ試驗ニ

供シタ

2. 研究方法

赤血球沈降速度ハ WESTERGREN 法ニ依リ沈降價ハ KATZ ノ提案シタ如ク 1 時間値 = 2 時間値ノ 2 分セル數ヲ加ヘ是ヲ更ニ 2 分シテ表示シタ採血ハ頸靜脈ヨリ直接 Record 注射器ヲ以テ採取試験ニ供シ室溫ハ毎常附記スルコトニシタ 觀察中ニハ室溫ノ變動 2°C 以上ニ及ンダコトハ殆ドナイ

III. 實驗成績

1. 運動ノ赤血球沈降速度ニ及ボス影響

安田⁽¹⁰⁾ハ輓曳形式ニ於ケル緩運動時ニアリテハ赤血球沈降速度ハ僅ニ減少スルニ過ぎナイガ乗馬ニ於ケル急速運動時ニテハ著明ニ減少スルコトヲ報ジ四條⁽¹⁷⁾ハ馬ノ運動後ニ於ケル赤血球沈降速度ハ運動量ノ大ナル程減少スル結果ヲ得タト報告シタ ROSENBLUM⁽⁴⁾ノ報告ニ依レバ 27 kg ノ荷物ヲ以テ 10~20 km 行軍シタ後沈降速度ハ其ノ人ガ訓練サレテ居ナケレバ居ナイダケ増加シタト興味アル事實ヲ述ベタ

著者ハ運動ニ依リ赤血球沈降速度ニ如何ナル影響ヲ及ボスカヲ實驗シ更ニ日常鍛鍊運動ヲ實施セル馬匹ト實施セザル馬匹各 4 頭ヲ選ビ同一量ノ運動ヲ課シソノ沈降速度ヲ比較シタルニ第 1 及第 2 表ニ示ス成績ヲ得タ

第 1 及第 2 表ニ示シタ様ニ鍛鍊運動後ニ於ケル赤血球沈降速度ハ 2 例ヲ除ク他ハ一般ニ遲延ヲ示シ安田、四條等ノ成績ト一致セル結果ヲ得タ

鍛鍊馬ト非鍛鍊馬ノ運動前後ノ赤血球沈降速度ハ鍛鍊馬ニ於テハ沈降價ノ差ハ平均 4.4 mm ニ比シ非鍛鍊馬ノ沈降價ノ差ハ平均 13.3 mm デアル即チ鍛鍊運動ヲ積メル馬匹ハ少量ノ運動ヲ課ストモ沈降度ニ大ナル影響モナク且ツ其ノ恢復モ速デアルガ非鍛鍊馬ニ於テハ沈降速度ハ著シク減少シ正常値ヘノ復歸モ極メテ遅イ

2. 溫度ノ赤血球沈降速度ニ及ボス影響

赤血球沈降速度ハ溫度ノ上昇ニ比例シテ其ノ速度ヲ増加スルコトハ既ニ多數ノ學者ニ依リ報告セラレテイル馬ノ血液ニ就テハ高田⁽¹¹⁾ガ健康馬ノ

第1表 運動ト赤血球沈降速度

番 號	性	年 齡	檢 査 月 日	室 溫	赤血 球數 (萬)	血漿柱ノ高サ (mm)				沈降價	摘 要
						30分後	1時 間後	2時 間後	24時 間後		
1	♂	5	15. 6. 9	21°C	612	95.0	136.5	144.5	149.0	104.375	6 km 常歩 2 km 速歩 1時間普通 鍛鍊
2	♂	6	"	"	630	58.0	102.0	135.0	148.0	84.75	
3	♂	7	"	"	647	82.0	118.0	140.0	149.0	94.0	
4	♂	5	"	"	665	83.0	124.0	138.0	148.0	96.5	
1	♂	5	"	"	570	107.0	140.0	147.0	152.0	106.75	} 上記運動後
2	♂	6	"	"	665	45.0	81.0	120.0	144.0	70.5	
3	♂	7	"	"	700	63.0	101.0	134.5	149.0	84.125	
4	♂	5	"	"	735	78.0	119.0	138.5	146.0	94.125	
1	♀	4	14. 10. 5	16°C	700	75.0	106.0	130.0	145.0	85.5	8 km 常歩 8 km 速歩 30分普通 鍛鍊
2	♀	4	"	"	683	77.0	108.0	130.0	142.5	86.5	
3	♀	9	"	"	648	127.0	141.0	144.0	149.0	106.5	
4	♀	5	"	"	630	109.0	130.0	143.0	150.0	100.75	
1	♀	4	"	"	753	60.0	97.0	121.0	141.0	78.75	} 上記鍛鍊後 運動後
2	♀	4	"	"	717	62.0	103.0	128.0	142.0	83.5	
3	♀	9	"	"	700	130.0	143.0	147.0	152.0	108.25	
4	♀	5	"	"	683	90.0	126.0	141.0	149.0	98.25	

第2表 鍛鍊馬ト非鍛鍊馬トノ赤血球沈降速度

區 分	番 號	性	年 齡	檢 査 月 日	溫 度	赤血 球 數(萬)	血漿柱ノ高サ			沈降價	運 動 量
							30分後	1時 間後	2時 間後		
鍛 鍊 馬	1	♀	12	15. 6. 20	20°C	665	101.0	116.0	138.0	92.5	} 靜 止 時
	2	♀	4	"	"	665	80.0	118.0	138.0	93.5	
	3	♂	8	"	"	750	52.0	62.0	102.0	56.5	
	4	♀	7	"	"	700	54.0	102.0	129.0	83.25	
	1	♀	12	"	"	735	50.0	108.0	137.0	88.25	} 5 km 速歩 運動ヲ課ス
	2	♀	4	"	"	700	52.0	119.0	122.0	90.0	
	3	♂	8	"	"	805	28.0	53.0	98.0	51.0	
	4	♀	7	"	"	752	45.0	97.0	121.0	78.75	
非 鍛 鍊 馬	1	♀	10	15. 6. 20	20°C	595	84.0	123.0	139.0	96.25	} 靜 止 時
	2	♀	8	"	"	525	120.0	141.0	148.0	107.5	
	3	♀	9	"	"	595	121.0	142.0	149.0	108.25	
	4	♀	6	"	"	665	95.0	145.0	148.0	109.5	
	1	♀	10	"	"	665	57.0	106.0	130.0	85.5	} 5 km 速歩 運動ヲ課ス
	2	♀	8	"	"	613	100.0	128.0	137.0	98.25	
	3	♀	9	"	"	635	88.0	115.0	138.0	92.0	
	4	♀	6	"	"	750	61.0	113.0	139.0	91.25	

脱纖維血液ヲ用ヒ測定シタルニ血球ノ沈降ハアル任意溫度ヨリ低溫ノモノハ其ヨリ高溫ノモノノ方ガ沈降度が大デアルト報ジテ居ル小松原⁽⁹⁾ハ牛血漿及血清ニ 0°C, 室溫 (18°C) 37~50°C ノ溫度中ニ於テ同血球ヲ混和シ沈降速度ノ影響ヲ見タル結果溫度高キ氣中ニ放置スル程促進シ室溫又ハ 0°C ニ放置スレバ高溫ニ放置セラレルモノヨリモ速度ノ減少ヲ來スト報ジタ著者ハ溫度ガ赤血球沈降速度ニ如何ナル影響ヲ及ボスカヲ實驗シタルニ次ノ如キ結果ヲ得タ

第 3 表 溫度ト赤血球沈降速度

番 號	性	年 齡	檢 査 月 日	溫 度	血 漿 柱 ノ 高 サ (m.m)				沈降價
					30 分後	1 時間後	2 時間後	24 時間後	
1	♂	5	15.8.8	30°C	114.0	140.0	148.0	151.0	107.0
2	♂	5	"	25°C	110.0	138.0	146.0	153.0	105.5
3	♂	5	"	15°C	117.0	137.0	146.0	153.0	105.0
4	♂	5	"	0°C	101.0	117.0	130.0	149.0	91.0
5	♂	5	"	30°C	100.0	122.0	140.0	145.0	96.0
6	♂	5	"	25°C	100.0	119.0	138.0	146.0	94.0
7	♂	5	"	15°C	90.0	116.0	139.0	147.0	92.74
8	♂	5	"	0°C	62.0	108.0	124.0	146.0	85.0
9	♀	9	"	30°C	102.0	116.0	134.0	144.0	91.5
10	♀	9	"	25°C	99.0	110.0	132.0	146.0	88.0
11	♀	9	"	15°C	103.0	116.5	132.0	145.0	91.25
12	♀	9	"	0°C	65.0	76.0	101.0	141.0	63.25

〔註〕 溫度 0~15°C ハ氷室中ニ於テ實施ス

第 3 表ニ示シタ様ニ 0°, 15°, 25°, 30°C ノ各異ナル溫度ニ於テ同時ニ赤血球沈降速度ヲ測定シタルニ 0°~30°C ニ上ルニ從ツテ次第ニ沈降度ノ増進ヲ來シ特ニ氷室 0°C ニ於テハ著明ニ沈降ノ遲延スルノガ認メラレタ即チ沈降速度測定時冬期ニ於テハ室溫 0°~5°C ニ下降シ夏期ニ於テハ 30°C ヲ越ユルコトガアル爲冬期寒冷ノ測定結果ト夏期氣溫高キ時期トノ沈降速度ニハ大ナル相違ガアル故實施ニ際シテハ室溫ニ注意ヲ拂ハネバナ

ヲ概シテ $15^{\circ} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ノ間ナレバ沈降速度ニサシタル影響ガナイモノノ様デアル

3. 鬱血ノ赤血球沈降速度ニ及ボス影響

鬱血ニ依リ赤血球沈降速度ニ影響ヲ及ボスコトハ既ニ認メラレタ處デア
ル WESTERGREN ハ無鬱血ト 30 秒鬱血竝ニ 3 分鬱血ノモノノ間ニ餘リ變
化ノナイコトヲ報告シ HASELHOLST⁽⁶⁾ ハ 2 分時ト 10 分時トノ鬱血ニ就
テ試験シ後者ノ方ガ著明ニ促進スルコトヲ報告シ KOVACS, 大谷⁽⁸⁾ 等モ 5
分ノ鬱血ニテ既ニ沈降速度ガ早クナルト述べ拓殖ハ腕靜脈ヲ 5 分間鬱血
ヲ起サシメテ採血スルトキハ速度ノ亢進ヲミルト報ジタ BERGLUND⁽¹³⁾ ハ
馬ノ頸靜脈ヲ結紮シ其ノ部ノ血液ヲ採取シタルニ著シク遲延セル事實ヲ認
メタ

著者ハ頸靜脈ニ鬱血ヲ起サシメ之ヲ鬱血セザルモノトノ沈降速度ヲ比較
シタルニ第 4 表ニ示ス様ナ成績ヲ得タ

第 4 表ニ示シタ様ニ頸靜脈ヲ 1~2 分鬱血ヲ起サシメテ其ノ部ノ血液
ヲ採取シタルニ 20 例中ノ 16 例ハ沈降速度ノ亢進ヲ示シタガ他ノ 4 例
ニ於テハ却テ遲延スルノガ認メラレタ概シテ沈降速度ハ鬱血ニ依リ亢進ヲ
來スガ爲測定時ニハ鬱血ヲ去リテ採血セネバナラヌ而シテ何故鬱血ニ依リ
赤血球沈降速度ニ變化ヲ來スカハ從來稱ヘラレタ CO_2 ノ増加ニ依ルモノ
カ或ハ他ノ因子ニ依ルモノカニ就テハ今後ノ研究ニ俟タネバナラナイ

4. 血液振盪ノ赤血球沈降速度ニ及ボス影響

赤血球沈降速度測定ノ血液ハ通院又ハ入院患畜ハ暫ク之ヲ措キ往診セル
患畜ニテハ多クハ醫師ノ靴等ニ入レラレテ汽車, 自働車等ノ乗物ニ載セラ
レテ持歸ラレ而シテ後検査サレルガ故此ノ間乗物ニ依ル振動ガ該血液ニ與
フル影響ニ就テハ一應考慮シナケレバナラヌ

血液ニ振盪ヲ與フレバ赤血球沈降速度ニ如何ナル影響アルヤニ就テハ岡
部⁽¹⁴⁾ ハ 73 例ニ就テ 10 數回強ク振盪スルカ或ハ稍々強ク攪拌スレバ誤
差範圍ヲ越ヘテ赤血球沈降速度ノ増加ヲ來スコトガ多イト述ベタガ
ROURKE, PLASS⁽⁷⁾ 等ハ遠心器ニカケテモ赤血球沈降速度ハ變化シナイト報

第4表 鬱血ト赤血球沈降速度

番 號	性	年 齡	檢 査 月 日	溫 度 (C)	區 分	血 漿 柱 ノ 高 サ (mm)				沈降價
						30 分後	1 時間後	2 時間後	24時間後	
1	合	4	14. 12. 6	19°	正 常 鬱 血	78.0 82.0	118.0 125.0	130.0 133.5	136.0 139.0	91.5 95.88
2	合	4	"	"	正 常 鬱 血	36.0 51.0	59.0 72.0	77.0 86.0	116.0 120.0	48.75 57.5
3	合	11	15. 6. 5	20°	正 常 鬱 血	94.0 102.0	135.0 135.5	143.0 142.5	147.0 146.5	103.25 103.38
4	合	4	"	"	正 常 鬱 血	113.0 120.0	144.0 143.5	149.5 148.0	153.0 152.0	109.38 108.75
5	合	4	14. 12. 24	16°	正 常 鬱 血	39.0 75.0	89.0 100.0	112.0 119.0	136.0 138.0	72.5 94.75
6	合	4	"	"	正 常 鬱 血	99.0 92.0	120.0 119.0	131.5 131.5	145.0 145.0	92.88 92.38
7	合	5	15. 1. 23	14°	正 常 鬱 血	32.0 40.0	59.0 78.0	92.0 113.0	130.0 131.0	54.5 67.25
8	合	5	15. 6. 5	20°	正 常 鬱 血	134.0 138.5	147.0 149.0	150.0 151.5	155.0 156.0	111.0 112.88
9	合	5	15. 6. 6	20°	正 常 鬱 血	69.0 77.0	115.0 125.0	143.0 143.0	151.0 150.0	93.25 98.25
10	合	5	15. 2. 1	18°	正 常 鬱 血	29.0 58.0	74.0 98.0	102.0 121.0	127.0 138.0	62.5 79.25
11	合	3	15. 2. 2	20°	正 常 鬱 血	58.0 63.0	101.5 110.0	133.0 135.0	142.0 145.0	84.0 88.75
12	合	4	14. 12. 6	18.5	正 常 鬱 血	40.0 59.0	93.0 113.0	131.5 142.5	142.5 150.0	79.38 92.13
13	合	6	15. 2. 2	20°	正 常 鬱 血	26.0 35.0	86.0 100.0	117.0 127.0	136.0 146.0	72.25 81.75
14	合	4	15. 6. 6	20°	正 常 鬱 血	53.0 33.0	106.0 90.0	136.0 130.0	146.0 143.0	87.0 77.5
15	♀	3	"	21°	正 常 鬱 血	35.0 35.0	62.0 61.5	104.0 101.0	132.0 135.0	57.0 56.0
16	合	5	"	20°	正 常 鬱 血	58.0 61.0	102.0 100.0	135.0 134.0	147.0 146.5	84.75 83.50
17	♀	5	15. 6. 5	20°	正 常 鬱 血	82.0 66.0	118.0 105.0	140.0 136.0	151.0 148.5	94.0 86.5
18	合	5	15. 6. 6	20°	正 常 鬱 血	83.0 81.0	124.0 122.0	138.0 139.0	145.0 146.0	96.5 95.95
19	♀	5	15. 1. 25	15°	正 常 鬱 血	61.0 62.0	104.0 114.0	129.0 133.0	141.0 142.0	84.25 90.25
20	合	5	"	14°	正 常 鬱 血	98.0 101.0	114.5 116.0	126.0 126.0	140.0 140.0	88.75 89.5

ジタ 末田⁽¹⁶⁾ハ汽車振動ニ依リ血液ヲ振盪シタルニ全數ノ69%ハ遲延シ13.8%ハ促進シ16.9%ハ對照ト同値ナリト報告シタ 著者ハ14例ノ血

第5表 血液振盪ト赤血球沈降速度

番 號	性	年 齡	檢 査 月 日	室 溫 (C)	區 分	血 漿 柱 ノ 高 サ			沈降價
						30 分後	1 時間後	2 時間後	
1	♀	12	15.11.28	16°	正 常	12.0	40.0	60.0	35.0
					60分振盪	15.0	42.0	60.0	36.0
2	♀	5	"	"	正 常	27.0	80.0	121.0	70.25
					60分振盪	33.0	83.5	123.0	72.5
3	♀	4	"	"	正 常	50.0	88.0	140.0	79.0
					60分振盪	47.0	86.0	140.0	78.0
4	♀	10	"	"	正 常	40.0	83.0	138.0	76.0
					60分振盪	50.0	85.0	140.0	77.5
5	♂	3	"	"	正 常	98.0	125.0	140.0	97.5
					60分振盪	98.0	125.0	140.0	97.5
6	♀	7	15.12.9	18°	正 常	25.0	62.0	94.0	54.5
					30分振盪	30.0	62.0	92.0	54.0
7	♂	7	"	"	正 常	95.0	107.0	116.0	82.50
					30分振盪	95.0	105.0	113.0	80.75
8	♀	14	"	"	正 常	138.0	146.0	149.0	110.25
					30分振盪	133.0	141.0	145.0	106.75
9	♀	9	"	"	正 常	99.0	115.0	130.0	90.0
					30分振盪	105.0	120.0	132.0	93.0
10	♀	5	"	"	正 常	111.0	129.0	138.0	99.0
					30分振盪	110.0	128.0	138.0	98.5
11	♂	6	"	"	正 常	84.0	123.0	140.0	96.5
					30分振盪	80.0	118.0	139.0	93.75
12	♀	6	"	"	正 常	65.0	103.0	128.0	83.5
					30分振盪	71.0	112.0	133.0	89.25
13	♀	12	"	"	正 常	73.0	116.0	136.0	92.0
					30分振盪	68.0	109.0	134.0	88.0
14	♂	5	"	"	正 常	95.0	136.5	142.0	103.75
					30分振盪	88.0	130.0	140.0	100.0

液ヲ往診靴ニ入レ自轉車ニテ 30 分及ビ 60 分夫々振動ヲ與ヘ該血液ノ赤血球沈降速度ニ及ボス影響ヲ實驗シタ結果第5表ノ如キ成績ヲ得タ

振盪セラレタ血液ノ赤血球沈降速度ハ 1 時間振動ニ於テハ 5 例中ノ 3 例ガ促進シ 1 例ハ對照血液ト同値, 1 例ハ遲延ヲ示シタ 30 分振動ニ於テハ 9 例中ノ 7 例ガ遲延シ 2 例ハ促進ヲナシタ概シテ血液ノ振動ニ依リ赤血球沈降速度ハ遲延ヲナスモノノ様デアル

5. 採食ノ赤血球沈降速度ニ及ボス影響

BUSCHER⁽¹⁾, MANDELSTAMM 等ニ從ヘバ赤血球沈降速度ハ食後促進スルト述ベタルモ木村, 桐井, 立松⁽¹⁵⁾等ハ却テ遲延ノ傾向アルコトヲ認メタ 又

第 6 表 採食前後ト赤血球沈降速度

番 號	性	年 齡	檢 査 月 日	溫 度 (C)	區 分	血 漿 柱 ノ 高 サ (mm)				沈降價
						30 分後	1 時間後	2 時間後	24 時間後	
1	♂	4	14. 12. 6	19°	採食前	80.0	124.5	133.0	138.0	95.5
					採食後	78.0	118.0	130.0	136.0	91.5
					2時間後	80.0	125.0	134.0	140.0	96.0
2	♂	4	"	19°	採食前	82.0	128.0	137.0	144.0	98.25
					採食後	73.0	116.0	135.0	144.5	91.75
					2時間後	81.0	126.0	137.0	145.0	97.25
3	♀	8	"	18°	採食前	85.0	125.0	143.0	147.0	98.25
					採食後	75.0	118.0	140.5	146.0	94.12
					2時間後	83.0	122.0	142.0	145.0	96.5
4	♀	12	"	18°	採食前	65.0	101.0	125.0	144.0	81.75
					採食後	55.0	99.0	124.5	145.0	80.62
					2時間後	63.0	100.0	123.0	145.0	80.75
5	♀	7	"	18°	採食前	110.0	125.0	133.0	143.0	95.75
					採食後	61.0	120.0	130.5	141.0	92.63
					2時間後	99.0	122.0	131.0	142.0	93.75

岡部ノ經驗ニ依レバ食後 30 分カラ 1 時間ニ於テハ食前ノ速度ニ比シ稍々動搖スルモ食後 1 時間半ヲ經過スレバ又食前ノ速度ニ復歸スルト云ヒ加藤ニ依レバ食餌攝取後ハ一般ニ遲延シ後漸次増加シ食後 2 時間頃ニ至ル迄増加スルト報ジタ

著者ハ採食前後ノ赤血球沈降速度ニ及ボス影響ニツキ實驗シタル結果第 6 表ニ示ス成績ヲ得タ

第7表 枸橼酸曹達ノ濃度ト赤血球沈降速度

番 號	性	年 齡	檢 査 月 日	溫 度 (C)	濃 度 (%)	血 漿 柱 ノ 高 サ (mm)				沈 降 價
						30 分 後	1 時 間 後	2 時 間 後	24 時 間 後	
1	合	6	15.3. 4	16°	3.8	26.0	76.0	119.0	138.0	68.75
					5.0	31.0	79.0	120.0	141.0	69.5
					10.0	19.0	52.0	85.0	138.0	47.25
2	合	5	15.3. 8	18°	3.8	103.0	135.0	146.0	153.0	104.0
					5.0	111.0	138.0	148.0	154.0	106.0
					10.0	79.0	105.0	123.0	148.0	83.25
3	♀	5	15.3.14	〃	3.8	76.0	93.5	113.0	145.0	75.0
					5.0	75.0	93.0	113.0	143.0	74.75
					10.0	62.0	75.0	95.0	131.0	61.25
4	♀	5	〃	〃	3.8	55.0	100.0	124.0	145.0	81.0
					5.0	43.0	92.0	124.0	145.0	77.0
					10.0	38.0	65.0	99.0	128.0	57.25
5	合	13	15.3.20	〃	3.8	27.0	86.0	127.0	145.0	74.75
					5.0	26.0	67.0	101.0	142.0	58.75
					10.0	18.0	42.0	85.0	140.0	42.25
6	合	6	〃	〃	3.8	67.0	120.0	146.0	153.0	96.5
					5.0	50.0	97.0	132.0	154.0	81.5
					10.0	42.0	75.0	115.0	145.0	66.25
7	合	5	15.3.26	〃	3.8	60.0	98.0	130.0	145.0	81.5
					5.0	42.0	82.0	115.0	143.0	69.75
					10.0	35.0	65.0	105.0	140.0	58.75
8	合	14	15.3. 4	〃	3.8	45.0	95.0	125.0	135.0	78.75
					5.0	47.0	96.0	125.0	138.0	79.25
					10.0	33.0	71.0	96.0	135.0	59.50
9	合	5	15.3. 8	16°	5.8	89.0	113.5	134.0	145.0	90.25
					5.0	96.0	120.0	137.0	146.0	94.25
					10.0	45.0	85.0	118.0	142.0	72.0
10	合	3	〃	18°	3.8	93.0	135.0	140.5	147.0	102.63
					5.0	76.0	126.0	143.0	149.0	98.75
					10.0	62.0	100.0	120.0	144.0	80.0
11	合	4	15.6. 2	20°	3.8	59.0	114.0	134.0	140.0	90.50
					5.0	55.0	104.0	135.0	142.0	85.75
					10.0	38.0	82.0	115.0	138.0	69.75
12	合	4	〃	19°	3.8	67.0	130.0	140.0	146.0	100.0
					5.0	64.0	122.0	142.0	149.0	96.5
					10.0	42.0	88.0	110.0	140.0	71.5
13	合	5	15.6. 4	〃	3.8	87.0	131.5	138.0	144.0	100.25
					5.0	66.0	118.0	138.0	145.0	93.5
					10.0	45.0	72.0	106.0	138.0	62.5
14	合	5	〃	〃	3.8	94.0	135.5	142.0	145.0	103.25
					5.0	77.0	125.0	145.0	152.0	98.75
					10.0	61.0	105.0	112.0	140.0	80.5
15	合	9	〃	〃	3.8	123.0	134.0	138.5	144.0	101.6
					5.0	128.0	138.5	143.0	148.0	105.0
					10.0	96.7	110.2	128.0	141.0	87.0
16	合	3	〃	〃	3.0	93.0	136.5	142.0	147.5	103.75
					5.0	87.0	132.0	144.0	150.0	102.0
					10.0	70.0	98.0	120.0	142.0	79.0
17	合	3	〃	〃	3.8	93.0	136.5	142.0	147.0	103.75
					5.0	87.0	132.0	144.0	151.0	102.0
					10.0	75.0	116.0	130.0	144.0	90.5
18	合	6	15.6.18	23°	3.8	75.0	121.0	135.0	143.0	94.25
					5.0	54.0	91.0	128.0	140.0	77.50
					10.0	50.0	82.0	115.0	136.0	69.75
19	♀	4	〃	〃	3.8	114.0	135.0	139.5	145.0	102.38
					5.0	101.0	133.0	144.0	150.0	120.50
					10.0	88.0	112.0	130.0	142.0	88.5

第6表ニ示シタ様ニ採食後ニ於ケル赤血球沈降速度ハ採食前ニ比シテ遲延ヲナシタルモ2時間後ニ至レバ概ネ採食前ノ速度ニ復歸スルノガ認メラレタ故ニ沈降速度測定ハ採食前ニ實施スルカ又ハ採食後少ク共2時間以上ヲ經過シタ後ニ行フノガ良イ

6. 枸橼酸曹達液ノ赤血球沈降速度ニ及ボス影響

枸橼酸曹達液ノ濃度ニ依リ赤血球沈降速度ニ影響ヲ及ボスト云フ從來ノ業績ヲミルニ濃度ノ變化ガ餘リ大デナイ限リ殆ド影響ナシト認メルモノニ HASELHORST⁽⁵⁾, WESTERGREN, PEYER, 木村, 古市, 岡村, 岡部, 拓植, 上田等ノ業績ガアリ濃度ガ増加シタ場合遲延スルト云フモノニ KOVACS⁽³⁾, LUNDWIG, TIETZ 等ガアリ同ジ條件ニテ促進スルト云フモノニ大谷, 田中, 伊藤等ノ報告ガアル 著者ハ枸橼酸曹達液ノ濃度ガ馬ノ赤血球沈降速度ニ如何ニ影響ヲ及ボスカヲ知ラント 3.8%, 5.0%, 10.0% ノ3種類ヲ使用シ實驗シタル結果第7表ニ示ス成績ヲ得タ

第7表ニ示ス如ク 3.8% ノ場合ハ 19 例中ノ13例ガ大ナル沈降速度ヲ示シ 5% ニ於テハ 6 例, 10% デハ全部遲延スルノガ認メラレタ沈降狀況ハ 3.8% ニ於テハ 30分~1時間後ガ比較的速ニ沈降シ 2時間後ヨリ次第ニ緩慢トナルガ 反之 5% デハ 30分~1時間後ガ概シテ緩慢ナル沈降ヲ示スモ 2時間後ヨリ半數ハ次第ニ促進ノ度ヲ増シ 24時間後ニ至ツテハ 19 例中 14 例ガ促進スルノヲ見タ即チ枸橼酸曹達ノ濃度ハ 3.8% ト 5% ニ於テハ沈降速度差僅少ナルモ 10% ニ於テハ著シク遲延ヲ示スモノデアアル

IV. 結 論

赤血球沈降速度ハ臨床上重要ナル補助診斷法トシテ廣ク應用サレテイル而シテ沈降現象ノ非特異性ニシテ變動性ニ富ムガ爲其ノ應用ニ際シテハ沈降速度ニ影響ヲ及ボスベキ種々ナル内因及外因的條件ニ就テヨク知悉セネバナラヌ

著者ハ日常沈降速度ヲ測定スル場合最モ之ガ影響ヲ及ボスベキ條件ニツ

キ實驗ヲ試ミタ結果次ノ様ナ結論ヲ得タ

(1) 鍛鍊運動後ニ於ケル赤血球沈降速度ハ一般ニ遲延ヲ示シ更ニ日常鍛鍊ヲ積メル馬匹ト非鍛鍊馬ノ運動前後ノ赤血球沈降速度ハ前者ノ馬匹ニ於テハ少量ノ運動ヲ課ストモ其ノ速度ニ大ナル影響モナク且ツ正常値ヘノ恢復モ速デアルガ後者ニアリテハ沈降速度ハ著シク減少シ正常値ヘノ復歸モ遅イ

(2) 0° , 15° , 25° , 30°C ノ各異ナル溫度ニ於テ同時ニ赤血球沈降速度ヲ測定シタルニ $0^{\circ}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ニ昇ルニ從ツテ沈降速度ノ亢進ヲ來シ殊ニ氷室 0°C ニ於テハ著明ニ遲延スルノガ認めラレタ概シテ $15^{\circ}\sim 20^{\circ}\text{C}$ ノ間ニ於テハ沈降速度ニ及ボス影響ハ僅微デアル

(3) 頸靜脈ニ $1\sim 2$ 分鬱血ヲ起サシメテ赤血球沈降速度ヲ測定シタルニ 20 例中 16 例ハ亢進ヲ示シ 4 例ハ遲延スルノガ認めラレタ

(4) 1 時間及 30 分間自轉車ニ依リ振盪セラレタ血液ノ沈降速度ハ概シテ遲延ヲ示スモノノ様デアル

(5) 採食ニ依ル赤血球沈降速度ハ食後遲延ヲ來シ 2 時間ヲ經過セバ概ネ採食前ノ速度ニ復歸スル

(6) 枸橼酸曹達ノ濃度ニ依ル赤血球沈降速度ハ 3.8% ニ於テハ 19 例中 13 例ガ大ナル沈降速度ヲ示シ 5% ニ於テハ 6 例, 10% ニ於テハ全部遲延スルノガ認めラレタ

稿ヲ終ルニ臨ミ御多忙中ニモ關ラズ綿密ナ御校閲ノ勞ヲ賜リタル北海道帝國大學教授小華和博士ニ謹ミテ感謝ノ意ヲ捧ゲ本研究中終始御助力下サレタル山形縣衛生技手池田保一氏竝ニ種々御親切ナル御助言ヲ寄セラレタ農學士林英夫氏, 林庸晃氏ノ御好意ヲ厚ク感謝スルモノデアル

文 献

- (1) BÜSCHER: *Berl. Kl. W.*, **58**, 323 (1921).
- (2) WESTERGREN: *Klin. W.*, **27**, 1359 (1922).
- (3) KOVACS: *Deuts. M. W.*, 785 (1923).
- (4) ROSENBLUM: *Z. Exp. Biol.*, **90**, 1152 (1924).

- (5) HASELHORST: *Deuts. M. W.*, 1544 (1924).
 - (6) „ : *Ibid.*, 1138 (1926).
 - (7) ROURKE & J. PLESS: *Amer. J. Physiol.*, **84**, 24 (1924).
 - (8) 大谷誠: 日新醫學雜誌, **5**, 757 (1926).
 - (9) 小松原謙三: 東京醫學會雜誌, **40**, 880 (1926).
 - (10) 安田純夫: 滿鮮之醫界, **92**, 677 (1930).
 - (11) 高田幸二: 獸醫界, **1**, 13 (1930).
 - (12) 太田徳次郎: *グレンツゲピード*, **1**, 105 (1930).
 - (13) BERGLUND: *Hygiea*, **27**, 677 (1930).
 - (14) 岡部英一: 東北醫學雜誌, **17**, 142 (1934).
 - (15) 木村, 桐井, 立松, 福谷: 臨床病理學血液雜誌, **11**, 1008 (1935).
 - (16) 末田稭: 京都醫科大學雜誌, **19**, 207 (1937).
 - (17) 四條隆徳: 中央獸醫學雜誌, **50**, 167 (1937).
 - (18) 菊池滋: 同上, **51**, 797 (1938).
 - (19) „ : 同上, **51**, 817 (1938).
 - (20) „ : 應用獸醫學雜誌, **13**, 477 (1940).
-

EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN ÜBER
DIE SENKUNGSGESCHWINDIGKEIT DER
BLUTKÖRPERCHEN. IV.
ÜBER DIE VERSCHIEDENEN BEDINGUNGEN,
DIE AUF DIE SENKUNGSGESCHWINDIG-
KEIT DER ROTEN BLUTKÖRPERCHEN
IHRE EINFLÜSSE AUSÜBEN.

SIGERU KIKUTI.

(*Landwirtschaftliches Büro, Yamanashi Prefektur*).

Die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen findet als eine wichtige diagnostische Hilfsmethode weite Anwendung auf dem klinischen Gebiete. Da die Senkungserscheinung sehr unspezifisch und veränderlich ist, muß man bei ihrer Anwendung immer über die endogenen sowie exogenen Bedingungen völlig unterrichtet sein, welche auf die Senkungsgeschwindigkeit ihre Einflüsse ausüben können.

Der Verf. hat bei jeder Bestimmung der Senkungsgeschwindigkeit immer die Bedingungen, die sie am stärksten beeinflussen, experimentell untersucht und folgende Schlußfolgerungen erhalten :

(1) Die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen des Pferdes zeigt nach dem Trainieren im allgemeinen zu einer Verlangsamung. Vergleicht man die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen der täglich gut trainierten Pferde und diejenige nicht trainierten vor und nach dem Trainieren, so stellt man fest, daß die Senkungsgeschwindigkeit der ersteren bei geringem Trainieren nicht stark beeinflusst wird und daß sie wieder schnell zu normalen Werten zurückkehrt, während die Senkungsgeschwindigkeit der letzteren in einem solchen Fall außerordentlich gering wird und nur langsam zu normalen Werten zurückkommt.

(2) Bei verschiedenen Temperaturen wie bei 0°, 15°, 25° und 30°C hat der Verf. gleichzeitig die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen bestimmt und festgestellt, daß sie mit der Steigerung von 0° bis 30° beschleunigt wird. Dagegen hat es sich herausgestellt, daß sie im Eisschrank bei 0°C besonders verlangsamt wird. Im allgemeinen wird die Senkungsgeschwindigkeit zwischen 15° und 25° nur sehr gering beeinflusst.

(3) Der Verf. hat durch 1~2 Minuten hindurch eine Abstauung

der Halsvene vorgenommen und dann die Senkungsgeschwindigkeit bestimmt. Dabei ist festgestellt worden, daß sich bei 16 von 20 Fällen eine Beschleunigung zeigte, während bei den restlichen 4 Fällen eine Verlangsamung auftrat.

(4) Das Blut, das jedesmal eine Stunde oder 30 Minuten lang auf dem Fahrrad geschüttelt worden ist, scheint im allgemeinen eine verringerte Senkungsgeschwindigkeit aufzuweisen.

(5) Direkt nach dem Füttern zeigt das Blut eine verlangsamte Senkungsgeschwindigkeit, aber diese nimmt mit der Zeit nach und nach wieder zu und kehrt nach 2 Stunden im allgemeinen wieder zu der Geschwindigkeit vor dem Füttern zurück.

(6) Was die Beziehung zwischen der Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen und der Konzentration der Natriumzitrat-Lösung anbetrifft, so hat der Verf. festgestellt, daß die Senkungsgeschwindigkeit bei 13 von 19 Fällen bei einer 3.8%igen Natriumzitrat-Lösung relativ groß war und daß bei einer 5%igen Lösung 6 Fälle und bei einer 10%igen Lösung alle Fälle eine verlangsamte Senkungsgeschwindigkeit zeigten.