齧歯類仮性結核病の病理学的研究

III. 豚の自然感染例について

森田迪夫・中松正雄・五藤精知

鳥取大学農学部家畜病理学教室

(昭和42年9月12日受付)

MALASSEZ & VIGNAL (1883) によって、初めて、モルモットから分離された *Pasteurella pseudotuberculosis* は、齧歯類を初め、種々の家畜、鳥類、野生動物および人にも感受性があることが知られている。

わが国においては、宮本⁴⁾ が家兎に仮性結核病を観察して以来、若干の報告がある。すなわち、宮本ら⁵⁾ は削瘦、下痢を主要症状とした山羊の本病を観察し、肝、脾および腸間膜リンパ節の壊死巣に肉芽組織をめぐらす、いわゆる仮性結核結節、肝の肉芽腫様形成物、および空腸の潰瘍を認めた。越智ら⁷⁾ は削瘦、下痢、衰弱を呈し、斃死または屠殺されたモルモット群の肝、脾および肺のいずれか、またはそれら全部に、帽針頭大ないし米粒大の限局性病巣を認め、仮性結核菌を分離している。すでに著者ら^{2,3)} は、家兎における本病の病理学的研究を行ない、肝、脾、腸間膜リンパ節、腸粘膜のリンパ装置、腎および肺に菌塊を混ざる仮性結核結節、肝におけるリンパ様細胞結節および多発性小壊死巣を主要病変とする自然感染例および接種例を観察した。また自然感染例に認められたジフテリー様腸炎、腸間膜リンパ節および腸粘膜リンパ装置における仮性結核結節が、接種例に認められなかったことから、本病の自然感染例は、消化器感染によるものと考えた。

以上のように、わが国における本病の報告は、すでに家兎、山羊、モルモットについて行なわれ

ているが、豚のそれにはまだ接していない。諸外国における豚の本病に関する報告は、1905年 POELS⁸⁾ が、紫斑病に罹患した豚の扁桃、気管リンパ節および肺にみられた壊死巣、乾酪化した腸粘膜のリンパ濾胞および腸間膜リンパ節から、仮性結核菌を分離したのが最初である。その後 WRAMBY & FREDRICKSON¹⁰⁾ は、腫大・乾酪化した腸間膜リンパ節、脾、肺および腎の限局性病巣、すなわち仮性結核結節を特徴的変化とする1例を、EIELAND¹⁾ は小腸、大腸の一部の粘膜の壊死性炎、および高度の腸間膜リンパ節の腫脹を認めた流行性の発生を、MOLLARET⁶⁾ は散発例3例を、REUS⁹⁾ は高度の黄疸、カタル性出血性腸炎、間質性腎炎、喉頭、膀胱粘膜および腎における点状出血、さらに組織球性反応を備え、多発性小膿瘍によって特徴づけられた化膿性膿瘍性肝炎および脾炎を特徴的病変とする3例を報告している。

著者らは1962年12月、鳥取市内で3例の豚の本病を経験し、その病理学的検査とともに若干の考察を行なったので報告する。

材料および方法

検査材料は、Table 1 に示されたように、いずれも鳥取市内の農家で育成中の生後4カ月の中ヨークシャー種3例である。

検査材料は、10%ホルマリン液に固定した後、パラフィン切片とし、ヘマトキシリン・エオジン

Table 1. Cases Examined

Case No.	Necropsy No.	Age (months)	Sex	Termination	Date of necropsy
1	Pr. 994	4	Castrated male	Died	Dec. 13, '62
2	Pr. 995	4	Castrated male	Killed	Dec. 14, '62
3	Pr. 996	4	Castrated male	Killed	Dec. 14, '62

染色, 必要に応じてワングーソン染色, アザン染色, 格子繊維染色およびグラム染色を施した。

検 査 成 績

1. 臨床所見

自家生産した同腹の4頭を同一の豚房に飼育していた。そのうち3頭が食欲不振, 顔面の浮腫を示したので, 残り1頭を隔離した。その後3頭は, 下痢または血便を呈し, 栄養状態は悪化し, 眼結膜は浮腫性となり, さらに両眼瞼, 耳根部, 下顎および下腹部から飛節におよぶ著しい浮腫を表わし, 浮腫病が疑われた。その他, 心音渾濁, 胃の蠕動微弱, 腸の蠕動亢進が認められた。

2. 病理解剖学的所見

3例を一括すると, 体格および栄養状態は中等で, 可視粘膜は蒼白となり, 全身性の貧血を呈していた。浮腫は全身の皮下組織におよび, 特に顎凹部から下腹部, 内股部にかけて, その程度は重く, 淡黄色の液が貯留していた。また同時に体腔水腫, 特に腹腔水腫が, かなりの程度にみられた。皮下組織および腹腔の脂肪組織は, 淡黄色調を呈していた。

肝は腫大し, 灰白色ケシの実大の小結節が, 表面・断面とも密在していた。脾ではリンパ汭胞は腫大し, 第3例では肝と同様に, ケシの実大ないし粟粒大の結節が散在していた。腎はやや渾濁している以外に, 著変は認められなかった。心では, 心冠脂肪組織が黄色調強く, 右心室は拡張し, 第1例の心外膜に点状出血がみられた。肺では, 気管支断端より乳白色の泡沫を混ざる粘液が漏出し, 第1例では, 鬱血水腫が著明であり, 第2例では, 点状出血および軽度の水腫が存していた。胃・小腸とも, カタール性的変化を示し, 大腸, 特に盲腸および結腸に, 限局性のジフテリー様変換ないし潰瘍性の粘膜欠損と, かなり広範囲にわたり出血がみられ, 同時にリンパ装置は腫大していた。全身リンパ節, ことに体表リンパ節には, 浮腫および血液の増量がみられた。腸間膜リンパ節は連珠状に腫大し, 第1例および第3例では, 紋理状の灰白色斑, およびケシの実大ないし粟粒大の結節がみられた。また第1例および第3例では, 腸間膜付着部の付近に高度の浮腫が存していた。

3. 病理組織学的所見

第1例一肝: 主として小葉周辺部, 時に小葉間

結合組織にわたり, 核崩壊(一部乾酪化)を中心とし, 周囲に發育の悪い肉芽組織に囲まれた結節, あるいは, 好中球および組織球性細胞からなる細胞結節, 小葉中心性の不全壊死巣, 瀰漫性の好中球・リンパ球・好酸球の浸潤, さらに細網内皮系細胞の活性化が認められた。

脾: 赤脾髄には, 核崩壊が強い小結節から, 中心が一部乾酪化して周囲に薄い肉芽組織反応をみる結節が形成され, その他, 急性充血, 好中球の増数および細網内皮系細胞の活性化がみられた。

腎: 尿細管上皮の渾濁腫脹および間質におけるリンパ球の浸潤が認められた。糸球体は萎縮しているものがみられた。

心: 心冠脂肪組織においてリンパ球・好酸球の瀰漫性浸潤, 組織球性細胞の増殖, 壊死細胞片の散在, 脂肪細胞の変性および壊死がみられた。これらの中には, セロイド色素の沈着も認められた。

肺: 間質において, 組織球性細胞・リンパ球をめぐらす小壊死巣がみられた。そのほか, 鬱血性水腫, リンパ汭胞の増生, および間質における多形核白血球の浸潤が認められた。

胃・小腸: 急性カタール性炎が一様に存していた。

大腸: ジフテリー様カタール性炎が存し, リンパ汭胞には, 一部乾酪化した中心性壊死またはリンパ球の増生がみられた。なおジフテリー様炎部に, かなり多くの *Balantidium* が寄生し, 壊死細胞片とともに, 粘膜下組織のリンパ管に栓塞を起こしていた。さらに漿膜下の脂肪組織には, 細胞増数, 核崩壊, 脂肪細胞の変性および壊死, セロイド色素の沈着がみられた。

腸間膜リンパ節: リンパ洞の走行に従って, 斑紋状または巣状の壊死が広範囲にみられた。これらの壊死の一部は乾酪化し, 周囲には薄い細胞反応層があり, さらに壊死巣内に *Balantidium* の寄生がみられた。リンパ洞にそった壊死は, 周辺の一部のリンパ汭胞を侵していたが, その他のリンパ汭胞は壊死に陥っていなかった。なお洞カタール, リンパ汭胞の増生, 血液吸収および好酸球の浸潤がみられた。

その他の臓器の変化として, 脾の間質の浮腫, 副腎の内皮細胞の増殖, さらに皮下脂肪組織の黄色脂肪症が認められた。

第2例—肝：好中球および組織球性細胞からなる細胞性結節がみられ、その中には、Langhans型の巨細胞を混ざるものも存していた。さらに周囲にかなり発育のよい肉芽組織をめぐらす中心性壊死巣のほかに、細網内皮系細胞の活性化、Glisson 鞘における細胞浸潤を認めた。

脾：発育のよい肉芽組織をもつ中心性壊死結節、細網内皮系細胞の活性化、急性充血および好酸球の増数がみられた。

腎：尿細管上皮細胞の濁濁腫脹が存していた。

心：心冠脂肪組織に細胞増数、壊死細胞片の散在をみた。

肺：急性カタル性気管支炎および肺胞内出血が存していた。

胃・小腸：急性カタル性炎をみた。

大腸：ジフテリー様カタル性炎が存し、その付近の汭胞は壊死に陥り、粘膜下組織に *Balantidium* が寄生していた。また粘膜下および漿膜下組織の脂肪組織は、変性・壊死に陥り、セロイド色素が沈着していた。

腸間膜リンパ節：瀰漫性のリンパ球の増生、好中球・好酸球の浸潤、細網内皮系細胞の活性化、洞カタルおよび血液吸収を認めた。

骨髓：中好性骨髓細胞の増数および脂肪組織の変性・壊死、セロイド色素の沈着をみた。

第3例—肝：薄い肉芽組織に囲まれた中心性壊死結節、細菌塊を含む膿瘍、組織球性細胞および好中球が種々の程度に混在する細胞性結節、Kupffer 星細胞の腫大增数、および好中球の瀰漫性浸潤がみられた。

脾：赤脾髄および白脾髄に、菌塊を含む大小種々の壊死結節がみられたほか、好中球の瀰漫性ないし巣状の増数、急性充血および細網内皮系細胞の活性化が認められた。

腎：尿細管上皮細胞の濁濁腫脹、間質における細胞浸潤、および尿細管における石灰沈着が、軽度ながら存していた。

心：心冠脂肪組織における細胞増数、脂肪細胞の変性・壊死、およびセロイド色素の沈着を認めた。

肺：肺胞間に、菌塊を含む壊死結節が散在していたほか、瀰漫性の好中球の浸潤、無気肺巣および出血がみられた。

胃・小腸：中程度のカタル性変化が認められた。

大腸：リンパ汭胞の増生の著しいジフテリー様カタル性炎と、粘膜下・漿膜下の脂肪組織にセロイド色素の沈着がみられた。

腸間膜リンパ節：リンパ洞にそって、斑紋状または巣状の壊死形成が存し、合わせて洞カタル、リンパ球の増生、血液吸収、梁柱の浮腫および細胞浸潤がみられ、さらに壊死巣部には *Balantidium* の寄生が認められた。

骨髓：脂肪組織の変性・壊死、セロイド色素の沈着、さらに中好性骨髓細胞の増数をみた。

4. 細菌学的検査

各臓器から *Pasteurella pseudotuberculosis* が分離された (Table 2)。また分離・培養された *P. pseudotuberculosis* をマウスの腹腔内に接種したところ、接種後数日で発病・斃死し、各臓器に壊

Table 2. Results of Isolation of *Pasteurella pseudotuberculosis*

Organs	Case No.		
	1	2	3
Liver	++	—	++
Spleen	—	—	+++
Kidney	•	—	—
Lung	+	—	—
Duodenum	•	++	•
Rectum	•	++	•
Mesenteric lymphnode	+++	++	+++

+ ~ +++ Positive.
 — Negative.
 • Not examined.

死巣の形式をみた。

考 察

本病に観察された著明な病変は、肝・脾・腸間膜リンパ節・大腸および肺の化膿性壊死性結節、腸間膜リンパ節における斑紋状の壊死病変、ジフテリー様カタル性腸炎、全身の皮下脂肪組織などにおける浮腫、および全身性のセロイド沈着症である。これらの変化を、前述の著者^{5,7-10)}が認めた病変、および著者ら^{2,3)}が認めた家兎病変と比較し、さらに今回行なった細菌学的研究の成績を考慮すると、本病は明らかに豚の仮性結核病と診断される。

第一の特徴的病変である限局性の仮性結核病巣は、WRAMBY & FREDRICKSON¹⁰⁾の豚例および著者ら^{2,3)}の家兎例にみられた仮性結核結節と同一のものである。しかし、臓器および症例によって、その病型に多少の相違がみられた。まず肝についてみると、第1例では膿瘍性ないし壊死性の病巣を形成し、中心部は一部乾酪化し、周囲に薄い肉芽組織をめぐらした結節がある。第2例では、中心性の壊死は軽度であるが、周囲には比較的厚い肉芽組織を形成した結節がある。第3例では、菌塊を含む化膿性膿瘍性の変化が強く、中心部は壊死に陥り、周囲は組織球性細胞に囲まれた結節、すなわち、いずれも仮性結核結節と診断し得るものである。なお前の第2例で宮本ら⁵⁾の山羊例、および著者ら^{2,3)}の家兎例に認められた肉芽腫性細胞結節がみられ、その中には、Langhans型の巨細胞を含むものも存していた。これら3例に認められた仮性結核結節は、一般には化膿、さらに壊死をもって始まり、漸次、組織球性細胞の参加により、周囲に肉芽組織の形成が促されるものと思われた。また第2例の肉芽腫細胞結節の形成については、菌量または毒力と生体の抵抗力との関係を検討に入れなければならないと思われる。さらに、これらの病巣は、主として小葉辺縁部に形成されている。この事実は、病原体が門脈を介して肝に到着し、小葉内毛細血管を中心にして病巣を形成したものと考えられる。

脾の仮性結核結節は、化膿性病巣の崩壊による乾酪化の傾向が強い大きな結節であるが、そのほか、菌塊を含む小さな化膿性壊死性病巣が、赤脾髄および白脾髄に散見された。この小病巣は初期

変化と目されるが、これに類似の病巣が、第1例および第3例の肺胞壁に存していた。これらの脾および肺の病巣は、腸および腸間膜リンパ節から、血行性またはリンパ道性、さらに血行性に、病原体が運ばれた結果と思われる。

大腸にみられる仮性結核結節は、ジフテリー様炎部のリンパ濾胞に存在する。肝・脾にみられたものと同様に、乾酪化した結節を形成しているが、これは本菌の直接の侵入によるものであろう。

腸間膜リンパ節では、リンパ液の流れにそって、病変がひろがるものと思われた。すなわち病変は、梁柱周囲リンパ洞より、被膜下リンパ洞に認められる洞カタルに始まる。その後、仮性結核菌とともに、次第に周囲に波及し、壊死形成に至ったものであろう。従って腸間膜リンパ節にみられる病変は、肝・脾などにみられた病変と趣を異にし、限局性の結節病変は少ない。また周囲の細胞反応は軽く、わずかに組織球性細胞の増殖をみるだけであった。一般にリンパ濾胞は、みずから壊死性変化をとることはなく、周囲の病変が波及するか、あるいは全身性の病変の一環として起こるものと、考えられる。

第1報および第2報の家兎例では、本病の自然感染が消化器感染によるものと述べた。豚の場合にも、腸間膜リンパ節にみられたリンパ洞性病変、肝における病変分布、さらに大腸におけるジフテリー様変化および仮性結核結節の存在などから、消化器感染が考えられる。

本病の発現については、本菌の固有の宿主である家兎と異なり、豚は人工感染が困難のようである。EIELAND¹⁾は経口投与および静脈内注射で、WRAMBY & FREDRICKSON¹⁰⁾は静脈内注射で、いずれも人工感染に失敗した。そこでこれらの研究者^{1,10)}およびREUS⁹⁾は、本病は仮性結核菌単独では発病せず、著しい飼養管理の失宜、飼料成分の欠乏、さらにその他の病原菌の感作などの誘因が存在し、あらかじめ抵抗力が低下していないと、成立しないと述べている。このような点を考慮すると、全例にみられた全身性セロイド沈着症および相当高度のBalantidiumの寄生が、本病の感染に大きな誘因となったものと考えられる。

要 約

豚の仮性結核病の自然感染例 3 例を病理学的に検索し、次の結果を得た。

1) 肝・脾・肺・腸間膜リンパ節および大腸のリンパ濾胞に、化膿性壊死性結節、すなわち仮性結核結節、および腸間膜リンパ節にリンパ洞の走行にそった斑紋状の壊死を認めた。

2) 肝において、時に Langhans 型の巨細胞を含む肉芽腫性細胞結節を認めた。

3) 仮性結核菌のひろがりについては、ジフテリア様腸炎を原発とし、腸粘膜リンパ濾胞においては直接本菌の侵入により、さらに腸間膜リンパ節においてはリンパ道性に、肝においては門脈性に、本菌が到着し、その後流血中に移行して、脾および肺に病巣を形成したものと考えられる。

4) 今回の豚罹患例においても、本病の自然感染には、消化器感染が考えられる。しかし全身性のセロイド沈着症および *Balantidium* の寄生が、本病の発生に必要な誘因として作用したと思われる。

最後に、材料および臨床所見を提供された本学内科学教室、細菌検索成績を提供された本学微生物学教室の各位に深謝する。

文 献

- 1) EIELAND, E. (1947): *Norsk. vet. T.*, **59**, 85~90 (REUS, U⁹⁾ より引用).
- 2) 藤原, 板倉, 五藤 (1958): 鳥取農学会報, **11**, 308~315.
- 3) 五藤, 猪口 (1954): 鳥取農学会報, **10**, 161~168.
- 4) 宮本 (1931): 家畜伝染病診断学, pp. 363~365, 東京, 文永堂.
- 5) 宮本, 尾形, 佐伯 (1954): 日本獣医学雑誌, **15** (学会号), 110.
- 6) MOLLARET, H. H. (1961): *Écon. Méd. Anim.*, **2**, 353~363. (REUS, U⁹⁾ より引用).
- 7) 越智, 滝沢, 石崎, 小西 (1956): 日本獣医学雑誌, **18**, 151~155.
- 8) POELS (1905): WRAMBY, G. & M. FREDRICSON¹⁰⁾ より引用.
- 9) REUS, U. (1962): *Berl. Münch. tierärztl. Wschr.*, **75**, 203~204.
- 10) WRAMBY, G. & M. FREDRICSON (1941): *Skand. vet. T.*, **31**, 590~598.

PATHOLOGICAL STUDIES ON PSEUDOTUBERCULOSIS RODENTIIUM

III. SPONTANEOUS SWINE CASES

Michio MORITA, Masao NAKAMATSU and Masatomo GOTO

Department of Veterinary Pathology, Faculty of Agriculture, Tottori University, Tottori

(Received for Publication September 12, 1967)

In December, 1962, the authors happened to encounter 3 swine cases of pseudotuberculosis which broke out in Tottori city. *Pasteurella pseudotuberculosis* was isolated from the liver, spleen, lungs, duodenum, rectum, and mesenteric lymphnodes of these cases.

The main clinical findings were dullness, inappetence, blood-stained diarrhea, and remarkable edema in the eyelids and their neighboring areas, the mandibla, and the lower part of the abdomen.

Macroscopically were observed miliary grayish-white spots in the liver, spleen, and mesenteric lymphnodes, enteritis catarrhalis and diphtheroides, swelling and grayish-white-macular formation in the mesenteric lymphnodes, dilatation of the right ventricle of the heart, remarkable general edema, moderate increase of ascites, hydropericardium, and yellowish coloration of the general adipose tissues.

Microscopically, the following findings were characteristic. There were purulent and necrotic foci containing bacillary masses and surrounded by thin granulation tissues, that is, pseudotubercles, in the lungs, liver, spleen, mesenteric lymphnodes, and lymphfollicles of the large intestine. On the other hand, the liver presented cellular foci, some of which contained one or a few giant cells resembling Langhans's giant cells. Both pseudotubercular and cellular foci were present in the periphery of some acini. Consequently, it was considered that these changes had spread via circulation of the portal system. In the mesenteric lymphnodes, such pseudotubercular foci as observed in the liver and spleen were few, and necrotic areas with bacillary masses were spread mostly along the peritrabecular and subcapsular sinuses. Therefore, it was presumed that the change had been spread to the mesenteric lymphnodes via the lymphatic stream. In the colon and caecum where the diphtheroid change was present, the lymphfollicles were hyperplastic and pseudotubercular foci sometimes formed in them.

It was considered that loss of the resistance caused by general steatitis and parasitism of *Balantidium coli* facilitated the infection of *Pasteurella pseudotuberculosis*.

EXPLANATION OF PLATES

PLATE I

All microphotographs are of specimens stained with haematoxylin and eosin.

- Fig. 1. Liver. A large pseudotubercular focus surrounded by thin granulation tissue. Case No. 1. $\times 125$.
- Fig. 2. Liver. Abscess containing bacillary masses. Case No. 3. $\times 570$.
- Fig. 3. Liver. A cellular focus containing giant cells. Case No. 2. $\times 570$.
- Fig. 4. Liver. A cellular focus. Case No. 2. $\times 260$.

PLATE II

- Fig. 5. Spleen. A pseudotubercular focus with well-grown granulation tissue around a necrotic area. Case No. 2. $\times 60$.
- Fig. 6. Mesenteric lymphnodes. A necrotic focus containing bacillary masses lies along the peritrabecular sinus. Necrosis is seen in peripheral lymphfollicles. Trabeculae are edematous and cellular infiltration is observed in them. Case No. 1. $\times 145$.
- Fig. 7. Lung. A small pseudotubercular focus in the interstitium. Case No. 3. $\times 145$.
- Fig. 8. Large intestine. Lymphangial embolism caused by necrotic cellular debris and *Balantidium coli*. Case No. 1. $\times 145$.
- Fig. 9. Subcutaneous adipose tissue. Steatitis. Case No. 2. $\times 145$.