馬の伝染性貧血症における赤血球自己抗体 の性状とその役割

大木与志雄

農林省家畜衛生試験場研究第3部

三浦克洋

東北大学農学部家畜衛生学教室

(昭和45年2月23日受付)

自己免疫病が自然的に家畜において起こるという事は、長らく証明されていなかったが、1957年 MILLER ら¹⁴⁾によって、犬において、人の自己免疫性溶血性貧血症^{1,2)}に類似した貧血症が、自然的に起こることが報告された。次いで、1963年 LEWIS ら¹¹⁾によって、抗グロブリン試験陽性であるところの本症の存在が確認された。また人の疾患と同様、L. E. 細胞の証明される犬の全身性紅斑性狼瘡 SLE (LEWIS, 1965)¹²⁾ やプラズマ細胞増多症と血管病変を伴うミンクのアリユーシャン病^{8,9,22)}においても、赤血球の抗グロブリン試験が陽性となることが報告されている。馬の伝染性貧血症においても、古くから自家ないし同種溶血素の存在が、FINZI (1911) および葛西ら (1931)¹⁰⁾によって報告されているが、否定的な報告²³⁾もあり、その実在性については、確証するに至っていない。しかしながら最近 (1966年以降)、著者ら¹⁵⁻¹⁹⁾によって、諸種の赤血球自己抗体が、本症において同定されるとともに、抗グロブリン試験もまた陽性となることが証明された。

そこで、本症における自己免疫病的性格を明らかにするとともに、その貧血機構に関連して、網内系細胞による自己赤血球の貪食、破壊および担鉄細胞の出現機序等を明らかにする事を目的として、赤血球自己抗体の性状およびそのオプソニ的性状等について、諸種の検討をおこなった。

材料および方法

20頭の人工感染伝貧馬の血液について、自己赤

血球の凝集反応および抗グロブリン試験を行なうとともに、それらの赤血球自己抗体の諸性状について検討を加えた。またそのオプソニ的性状を明らかにするために、自己抗体感作赤血球に対するマクロファージの貪食能を調べた。

寒冷および温式凝集素：検査用血漿の分離に際しては、凝集素が自己の赤血球と反応して、吸着沈殿を起こすのを防ぐために、採血後直ちに凝固防止剤を加えて、46~48°C に加温し、なるべく速やかに遠心分離を行ない、血漿と血球を分離した。而凝集素の測定に際しては、2倍段階希釈した各血漿 0.25ml に、0.25% 自己赤血球 0.25ml をそれぞれ添加した。寒冷凝集素価の測定には、4°C の氷室に3時間静置し、また温式凝集素価の測定には、37°C の恒温槽に2時間静置した後、判定を行なった。

直接抗グロブリン試験：病馬の血液を採取した後、直ちに37°C に加温し、生理食塩水 (37°C) で数回洗浄して、2% 赤血球浮遊液を作った。この0.1ml を2倍段階希釈した抗一馬グロブリン家兔血清 (健康馬赤血球で充分吸収) 0.1ml にそれぞれ添加し、37°C に60分間静置した後、1000 rpm で1分間遠心分離して、凝集の有無を判定した。その力価は、抗グロブリン血清の希釈倍数で示した。

マクロファージによる赤血球貪食試験：in vivo の貪食試験に関しては、病馬血漿中の自己抗体によって凝集感作 (37°C, 60分) された伝貧馬赤血球 (4%) を 0.5ml ずつ、マウス腹腔内に注射し

Chart 1. Changes of Temperature and Red Cell Auto-antibodies in a Horse Infected with Equine Infectious Anemia (EIA) Virus

た。腹腔内マクロファージによる初期貪食率（30分後）を、健康馬血漿で同様に処理した健康馬赤血球のそれと比較した。また *in vitro* の貪食試験に関しては、同様にして自己抗体で凝集感作された伝貧馬赤血球（0.25%）を 0.5ml ずつ、馬白血球培養細胞（単球—マクロファージ系）に添加し、培養白血球による貪食率（37°C、1～2時間後）を未感作健康馬赤血球のそれと比較検討した。

実験成績

1. 臨床症状と赤血球自己抗体

a. 寒冷凝集素と症状：伝貧馬においては、ウイルス感染後発熱すると、まもなく流血中に自己の赤血球を低温で凝集し得る病的寒冷凝集素が出現増加し（凝集素価16～256倍）、症状の軽重とはあまり関係なく、次第に減少する。このような病的寒冷凝集素は、4°C が至適反応温度であるが、通常室温でも反応する。しかしながら体温と同程度の温度では、全く凝集反応を示さず、貧血の程度とも、あまり関連は認められなかった。

b. 温式凝集素と症状：伝貧馬の血液について、最も特徴的な病的所見は、発症とともに、体温（37～42°C）においても、自己の赤血球と反応結合し得る温式型の血球凝集素が出現することで

ある。またこれと相前後して、貧血、担鉄細胞および遊離フェリチンの出現が見られることである。特に温式凝集素は、健康馬の血漿中には全く検出されないが、発熱中の伝貧馬においては、いずれも陽性に検出される。頸静脈血における本凝集素の消長をみると、発熱後間もなく微量出現し、症状と比較的密接な関係のもとに増減が認められる。すなわち軽度ないし中等度の発症例においては、凝集素価は2～64倍を示したが、高温が続くと100倍以上となり、重篤な例においては最高1,024倍に達した（Chart 1）。次いで解熱とともに急速に低下して弱陽性となり、回帰発熱とともに再び著しく増加するのが観察された。

赤血球数と本凝集素価とは必ずしも比例はしないが、大体その出現を契機として、100～200万の赤血球減少が認められた。ただし症状が急激で、凝集素価が一過的に、急速に著しく高値を示す場合には、そのピークに一致して、頸静脈血は一過的に停滞し、鬱血の傾向を示し、明らかな血流の循環障害が観察され、その後において貧血が認められた。各種病型の伝貧馬（20頭）における温式凝集素と赤血球数の関係についてみると、特に高熱が比較的長期間持続した急性型、定型的な回帰熱を伴う亜急性型、および慢性型から急性型に移行したいわゆる再燃型では、発熱極期から解熱直

Table 1. Titers of Warm Auto-antibodies and Number of Red Cells in Blood of Jugular Vein in Horses Artificially Infected with EIA Virus

Form of disease	No. of cases	Warm agglutinin titer*	Antiglobulin test titer	Number of red cell ($\times 10^4$)
Latent period (4~7 days)	2	0	0	670~710
Early stage of fever (1~7 days)	3	0~16	0~64	448~692
Acute form I (at time of death) **	4	8~256	64~1024	520~660
Acute form II (at time of death) ***	2	32~1024	512~2048	400~410
Subacute form (recurrent fever)	3	4~128	32~64	168~560
Chronic-acute complex form (at time of death)	1	256	128	207
Chronic form (at time of normal temperature)	5	0~4	0	460~775
Healthy horses	20	0	0	600~965

* Plasma samples used for the titration of warm-hemagglutinin had been separated from fresh blood of EIA incubated in a water-bath at 46 to 48°C.

** The infected horses died in 7 to 9 days after inoculation of EIA virus.

*** The infected horses died in 35 and 38 days after inoculation of EIA virus.

Table 2. Comparison of Antiglobulin Test between Blood from Jugular Vein and Blood from Portal Vein of Artificially Infected Horses

Course of disease	Antiglobulin test (jugular vein)	Antiglobulin test (portal vein) **	No. of red cells ($\times 10^4$)
Latent period (4 days)	0	0	670
Latent period (7 days)	0	16	710
First febrile stage*	16 and 32	128 and 256	448 and 520
Recurrent febrile stage*	32 and 128	128 and 512	168 and 207
6 days after fever fall	8	258	287
60 days after fever fall	0	128	489

* Two cases were tested.

** Blood from a small portall vein in the liver.

後、あるいはまた死亡時にかけて、比較的高力価の本凝集素が証明された。貧血も著しく、300~500万の赤血球減少と、著しい貪食性の担鉄細胞の出現が認められた (Table 1)。

c. 抗グロブリン試験と症状：定型的な発熱中の伝貧馬では、頸静脈における赤血球は、いずれも直接抗グロブリン試験が陽性(力価8~2048倍)であることが証明された。その力価は、病的寒冷凝集素の消長とは余り関連がなかったが、温式凝集素の消長との間に、密接な関係が認められた (Table 1)。すなわち、伝貧ウィルス接種後、その潜伏期間中はいずれも陰性であったが、定型的な発熱に伴って、温式凝集素が出現すると、抗グロブリン試験もまた陽性となった。凝集素が急激に増加すると、本試験の力価も、ほぼ並行して上昇したが、下熱とともに、いずれも急速に反応は減弱した。また回帰発症とともに、両反応は相前

後して強陽性に転化した。死亡時においては、著名な貧血とともに、抗グロブリン試験も著しく高い値を示した (Chart 1)。

末梢血(頸静脈血)と内臓血(肝臓血または脾臓血)において、赤血球の抗グロブリン試験の力価を比較検討した。その結果、潜伏後期から発熱期および下熱後にわたって、いずれの病的経過時においても、常に頸静脈血よりも内臓血の方が、抗グロブリン試験の力価が遙かに高いことが証明された。従って内臓に停滞している赤血球は、末梢循環血液に含まれているものに比べて、遙かに多量の自己抗体によって吸着感作されていることが明らかとなった (Table 2)。特に比較的経過が長い定型的な回帰熱型(および再燃型)において、発熱期から解熱直後にわたって、比較的高い力価が示され、著しい貧血とともに、肝・脾臓における鬱血、血球凝集、マクロファージないし組

Chart 2. Fractionation of Plasma Proteins and Auto-hemagglutinins of an Infected Horse by Gel Filtration (Sephadex G-200)

織球様細胞による赤血球貪食像, および多数の担鉄細胞が観察された (Fig. 2).

2. 赤血球自己抗体の血清学的性状

a. 寒冷凝集素の性状: 健康馬において少量検出される正常寒冷凝集素 (2~8 倍) も, ウィルス感染後, 伝貧馬において増加する病的寒冷凝集素も, その免疫グロブリンとしての性状は, 全く同様なものであるが, 反応温度領域と血清学的特異性において, 若干の差異が認められた. すなわち両者とも, 免疫グロブリンとしては IgM に属し, 0.1M の 2-メルカプトエタノール (2-ME) を用いる還元処理によって不活性化される. また Sephadex (G-200) ゲル濾過法⁴⁾ による血漿蛋白の分画においては, 最もすみやかに溶出濾過されるマクログロブリン分画のピークと一致して, その活性が証明された (Chart 2). さらに両者とも, 硫酸塩析法では約 40% 飽和で沈殿を起こした. その他両者ともに, 至適反応 pH は約 7.4 であり, 耐熱性をみると, 56°C 30 分で約 1/2 に活性が減弱し, 63°C 30 分加熱で完全に活性が破壊される比較的易熱性のグロブリン蛋白質であった. しかしながら, その反応温度領域においては, いずれも至適反応温度は 4°C であるが, 正常寒冷凝集素の場合は, 15~20°C 以上では全く赤血球と反応しない. これに対して, 病的寒冷凝集

素の場合は, 約 30°C まで反応するのが認められた.

また血清学的特異性に関しては, 正常寒冷凝集素は, 馬血球以外に, モルモット血球とも交叉反応を示した. しかし病的寒冷凝集素は, 馬血球とのみ反応し, モルモット, 家兎, めん羊, 豚, 鶏などの異種血球とは全く反応しないことが, 吸収交叉試験によって証明された.

b. 温式凝集素の性状: 温式凝集素が寒冷凝集素と最も著しく異なる点はいうまでもなく, その反応温度領域である. その至適反応温度は 37~38°C であり, 30°C 以下, または 42°C 以上では, 急激に反応が減弱した.

しかしながら免疫グロブリンとしての性状は, 寒冷凝集素と同様に, IgM に属し, 2-ME によって, 最初に溶出されるマクログロブリン分画に活性が証明された (Chart 2). また硫酸によって, 40% 飽和で沈殿を生じた. その他, 至適反応 pH は約 7.4 であり, 耐熱性をみると, 56°C 30 分で約 1/4 に活性が減弱し, 63°C 30 分加熱で完全に活性が消失する, 比較的易熱性の不安定なグロブリン蛋白質であった.

またその血清学的特異性に関しては, 自己の馬赤血球によっては完全に吸収除去されるが, 鶏, モルモット, めん羊および家兎の異種赤血球とは反応せず, 吸収されなかった. すなわち病的寒冷

Table 3. Pattern of Reaction between Warm Auto-hemagglutinin and Red Cells in an Infected Horse

Agglutinin*	Red cell	Suspension of horse red cells (%)							
		8	4	2	1	0.5	0.25	0.12	0.06
Dilution of infected horse plasma	1 : 1	±	+	+	±	—	—	—	—
	1 : 2	+	+	+	+	±	—	—	—
	1 : 4	+	+	+	+	±	—	—	—
	1 : 8	+	+	++	+	+	+	—	—
	1 : 16	+	+	++	++	++	+	+	±
	1 : 32	+	+	++	++	++	+	+	+
	1 : 64	+	++	++	++	++	+	+	—
	1 : 128	+	++	++	++	+	+	±	—
	1 : 256	+	++	++	+	+	+	—	—
	1 : 512	+	+	++	+	+	—	—	—
	1 : 1024	+	+	+	+	—	—	—	—
	1 : 2048	—	+	+	—	—	—	—	—

* Diluted plasma of a horse affected with EIA was incubated with self-red cells at 37°C for 2 hours.

Table 4. Direct Antiglobulin Neutralization Tests of Red Cells of a Horse Affected with EIA

Immune serum	Horse serum proteins for neutralization*	Dilution of antiglobulin serum					
		16	32	64	128	256	512
Anti-horse globulins	Physiological saline (control)	++	++	+	+	+	—
	Macroglobulins (containing IgM)	—	—	—	—	—	—
	Serum proteins (containing IgG)	++	++	+	—	—	—
	Serum proteins (containing albumin)	++	++	+	+	±	—
Anti-human IgM	Physiological saline	++	++	+	+	—	—
	Macroglobulins (containing IgM)	—	—	—	—	—	—
Anti-human IgG	Physiological saline	++	+	—	—	—	—
	Serum proteins (containing IgG)	—	—	—	—	—	—

* Horse serum proteins fractionated by gel filtration (Sephadex G-200) were used for neutralization of antiglobulin serum.

凝集素と同様、馬の赤血球に対して特異性を示す自己血球凝集素であるが、溶血作用は示さなかった。また本凝集素は、通常の免疫反応と同様、凝集素価の高い抗体過剰域、あるいはまた赤血球濃度の高い抗原過剰域では、反応が抑制され、いわゆる *prozone* 現象が認められた (Table 3)。

c. 抗グロブリン試験と自己抗体の性状：直接抗グロブリン試験に關与する伝貧馬の赤血球に吸着されている自己抗体は、IgG を主体とする免疫グロブリンであるが、一部には IgM (非定型) も關与している可能性が認められた。すなわち抗一馬グロブリン血清を Sephadex (G-200) ゲル濾過法によって分画し、得られた馬血清マクログロブ

リン分画 (IgM を含む) で吸収した上清を用いて、伝貧馬赤血球の直接抗グロブリン試験を行なうと、未吸収対照と同じ強陽性から、吸収後は全く陰性となる事が証明された。しかしながら第二の蛋白分画 (IgG を含む) による吸収中和試験の場合には、その力価は若干減弱するに過ぎず、第三の蛋白分画 (アルブミンを含む) によっては、全く中和されなかった (Table 4)。

一方、馬の IgM は、抗一人 IgM 血清と強い交叉反応を示すことが、免疫電気泳動によって証明された (Fig. 1)。この抗一人 IgM 血清を用いて、定型的な伝貧馬赤血球と直接抗グロブリン試験を行なうと、抗一馬グロブリン血清の力価と同

様、強い陽性反応を示した。馬と人の IgG も、交叉反応を示すが、抗一人 IgG 血清と同一伝貧馬赤血球との直接抗グロブリン試験は、弱陽性反応を示すに過ぎなかった。また両反応とも、それぞれ馬 IgM 分画または馬 IgG 分画によって中和され、それぞれ陰性となることが認められた (Table 4)。

また本試験に関与する物質は、間接抗グロブリン試験によると、56°C, 30 分加熱によって著しく活性が減弱され、温式凝集素と同様、比較的易熱性であることが証明された。しかしながら、本物質は、加熱不活化後、新鮮な健康馬血清の添加によっても、活性の回復は認められず、易熱性の補体成分とは異なることが明らかにされた。

3. 自己抗体のオプソニンの作用

a. マウス腹腔内マクロファージによる赤血球貪食：温式凝集素の力価が高い伝貧馬血漿と反応して凝集した馬赤血球の表面上には、自己抗体グロブリンが吸着されていることが、蛍光抗体法によっても証明される (Fig. 3)。

このような温式凝集素によって吸着感作された伝貧馬赤血球と、全く感作されていない健康馬赤血球とを、それぞれマウスの腹腔内に注射し、腹腔内マクロファージによる貪食能を比較検討した。その結果、30 分後に健康馬血球の例では、いまだいずれのマウスにおいても、ほとんど貪食が開始されていなかった (白血球 1,000 個につき貪食単球数、平均 2 個)。自己抗体感作伝貧馬血球の例では、いずれのマウスにおいても、すでにマクロファージによる貪食がかなり進行していることが観察された (同上貪食単球数、平均 51 個)、ただし 2～6 時間後では、両赤血球とも、いずれも同様に著しく貪食されていた (貪食単球数、100～250 個)。24 時間後には、マクロファージに貪食された赤血球は破壊消失する。72 時間後には、多数のマクロファージが赤血球を消化して、担鉄細胞化していることが観察された。

b. 馬培養白血球による赤血球貪食：マウスにおける *in vivo* の実験と同様の目的で、自己抗体のオプソニンとしての貪食促進効果をしらべるために、馬白血球培養細胞を用い、*in vitro* で、血漿中の温式凝集素で感作した伝貧馬赤血球と、健康馬血漿で同様に処理した健康馬赤血球に対する

貪食能を比較した。その結果、自己抗体感作伝貧馬赤血球を培養細胞に添加した場合には、いずれの例 (6 例) においても、かなり多数のマクロファージが赤血球を貪食していた (白血球 1,000 個につき、貪食マクロファージ数、平均 140 個)。非感作健康馬赤血球を培養細胞に添加した場合には、血球を貪食したマクロファージの数は、いずれもわずかな程度にとどまった (同上貪食マクロファージ数、平均 22 個)。さらに伝貧馬赤血球の場合には、マクロファージ 1 個あたりの貪食血球数も、健康馬赤血球の場合と比較して、遙かに多い (Fig. 4)。また多数の凝集赤血球がマクロファージの周辺を取り囲み、あるいはまた偽足によって捕捉せられ、同時に多数貪食されているのが観察された (Fig. 5)。健康馬赤血球の場合には、このような偽足で捕捉された像は見られなかった。

以上のような結果から、自己抗体のうち、少なくとも温式凝集素は、自己の赤血球の表面に結合して、マクロファージの偽足が赤血球を捕捉するのを容易にし、貪食を促進するものであることが証明された。

総括および考察

馬の伝染性貧血症においては、発病とともに、ほとんどすべての例で、その血漿中に、自己の赤血球を凝集する病的寒冷凝集素と温式凝集素が証明される。これらの凝集素は、いずれもその免疫学および物理化学的性状から、諸種の免疫グロブリンのうち、IgM に属する自己抗体であることが証明された。さらに本症においては、赤血球の抗グロブリン試験もまた陽性となる。このような、生体内ですでに自己の赤血球表面に吸着されている蛋白質もまた、その免疫化学的性状から、IgM を主体とする免疫グロブリンであることが証明された。

このような赤血球自己抗体のうち、病的寒冷凝集素に関しては、人の疾病においても、非定型肺炎 (PPLO)、伝染性単核球症、リンパ細網系増殖性疾患 (リンパ肉腫、細網肉腫およびリンパ性白血病) などの患者の血清中に、著しく増加することが知られている。寒冷にさらされると、末梢血管で赤血球凝集を起し、補体成分の関与のもとに、貧血の誘因となることが知られている^{1,3,7)}。しかしながら、伝貧馬においては、病的寒冷凝集

素^{16,18,25)}の消長と、症状や貧血の軽重との間に、余り関係は認められず、マクロファージによる赤血球貪食との関連も認められなかった。

本症においては、むしろ、病的寒冷凝集素の出現より若干遅れて出現増加する温式型の血球凝集素が、症状や貧血の軽重と比較的密接な関係を有している。その出現を契機として、貧血が認められるので、本凝集素が、伝貧馬における赤血球の変性障害および貪食に、最も重要な役割を果たしているものと考えられる。しかし本凝集素は、モルモットや馬の補体とともに、自己の赤血球に対してほとんど溶血作用を示さないもので、これまでに報告された自家または同種溶血素¹⁰⁾とは、異なるものと考えられる。伝貧馬における本凝集素は、比較的易熱性であって、生理的食塩水(37°C)中で、自己の赤血球や、他の馬の赤血球を特異的に凝集する IgM 型の抗体である。このような温式凝集素は、他の家畜の疾病においては報告されていないので、伝貧馬における一つの特徴的な免疫グロブリンであると考えられる。

さらに定型的な伝貧馬においては、この温式凝集素の消長と密接な関係のもとに、赤血球の直接抗グロブリン試験もまた陽性となる。このような伝貧赤血球の表面に吸着されているグロブリンもまた、抗一馬グロブリン中和試験および抗一人 IgM 血清による交叉反応等によって、主として IgM に属する免疫グロブリンであることが証明された。また間接抗グロブリン試験の結果から、本試験に関与する物質は、温式凝集素と同様、かなり易熱性ではあるが、補体成分とは異なっていることがわかった。この結果から、伝貧馬の流血中において、血漿中に遊離した温式凝集素自体が、過剰な抗原として存在する自己の赤血球に吸着結合され、直接抗グロブリン試験を陽性ならしめる要因となるものと考えられる。

いっぽう、人の後天性の自己免疫性溶血性貧血症^{1,2,5)}において検出される温式型の赤血球自己抗体に関しては、比較的耐熱性の溶血素がまれに検出されることが知られている。しかし、赤血球自己抗体の大部分は、耐熱性の非定型抗体 (IgG) であって、自己の赤血球を生理的食塩水中で直接凝集する能力はなく、抗グロブリン試験によって始めて証明される自己抗体である。それ故、伝貧馬において証明される大部分の赤血球自己抗体

(IgM) とは、性状を異にしている。ただし伝貧血球の抗グロブリン試験には、抗一人 IgG 血清との交叉反応で示されるように、非定型抗体 (IgG) が一部関与する可能性も認められる。

次に温式型の赤血球自己抗体で吸着感作された伝貧馬赤血球は、非感作健康馬赤血球と比べると、マクロファージによって捕捉貪食され易い。少なくとも温式凝集素は、オプソニ的な作用を有することが明らかにされた。実際、伝貧馬における貧血は、温式凝集素の出現の時期と相前後して開始される。ことに本凝集素の活性が比較的高く、かつ持続する場合には、肝臓や脾臓における鬱血とともに、貧血も著しい。またこのような内臓に停滞している赤血球は、頸静脈血に比較して、抗グロブリン試験の力価も遙かに高く、多量の自己抗体が吸着されていることが証明された。同時に、内臓血流中に遊走化した多数のマクロファージないし組織球様細胞が、遊離フェリチン^{20, 21)}とともに、赤血球を貪食し、さらにこれを消化して、担鉄細胞となっているのが観察される。

このような成績から判断すると、伝貧馬においては、温式凝集素を主体とする赤血球自己抗体によって吸着感作された赤血球は、主として肝・脾臓の内臓血流中に凝集停滞して、変性し易い。またその表面的性状の物理化学的な変化に伴い、マクロファージないし組織球様細胞によって捕捉され、最終的には貪食破壊されるものと考えられる。換言すれば、馬の伝染性貧血は、ウィルスによって起こる続発性の自己免疫性溶血性貧血症に属する疾患であると考えられる。伝貧ウィルスの増殖に伴う網内系細胞の変動²⁰⁾とともに、さらに、さらに非貪食性のリンパ胚球^{6,24)}その他の幼若リンパ系細胞 (IgM 産生細胞)¹³⁾に、なんらかの変調が起こり、赤血球自己抗体(主として IgM)が産生される。このように異常な免疫グロブリンの働きによって、マクロファージを始めとする網内系細胞は、いわば赤血球に対する自己と非自己の識別能を乱され、みずからの赤血球を貪食破壊することによって、貧血と担鉄細胞出現に一つの重要な役割を演ずるものと考えられる。

結 論

馬の伝染性貧血においては、ウィルス感染後、発熱に伴って、流血中に病的寒冷凝集素および温

式凝集素等の赤血球自己抗体 (IgM) が出現する。これとともに、赤血球の直接抗グロブリン試験もまた、定型的発症に伴って陽性となる。これらの自己抗体のうち、特に温式凝集素は、オプソニンの作用を有し、生体内で自己の赤血球と反応結合して、肝・脾臓を主とする内臓における血行障害、赤血球の変性および食食を促進する要因となり、本症における貧血の発生および担鉄細胞の出現に、重要な役割を演ずるものと考えられる。

本研究を遂行するに当たって、終始配慮と援助を賜った農林省家畜衛生試験場藤田壽吉場長、石谷類造部長、ならびに伝染性貧血研究部の各位に対し、厚く謝意を表する。

文 献

- 1) DACIE, J. V. (1965): *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, **124**, 415~421.
- 2) DACIE, J. V. and WORLLEDGE, S. M. (1968): In: *Clinical Aspects of Immunology*, edited by GELL, P. G. H. and COOMBS, R. R. A., 2nd Ed., pp. 804~830, Oxford and Edinburgh, Blackwell Scientific Publ..
- 3) EVANS, R. S., BINGHAM, M. and TURNER, E. (1965): *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, **124**, 422~440.
- 4) FLODIN, P. and KILLANDER, J. (1962): *Biochim. biophys. Acta. Sci.*, (Amst.), **63**, 403~410.
- 5) FUDENBERG, H. H. and KUNKEL, H. G. (1957): *J. exp. Med.*, **106**, 689~702.
- 6) 花岡 (1964): *最新医学*, **19**, 3137~3157.
- 7) HARBOE, M. (1965): *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, **124**, 491~498.
- 8) HENSON, J. B., LEADER, R. W. and GORHAM, J. R. (1961): *Proc. Soc. exp. Biol. (N. Y.)*, **107**, 919~920.
- 9) HENSON, J. B., GORHAM, J. R., LEADER, R. W. and WAGNER, B. M. (1962): *J. exp. Med.*, **116**, 357~364.
- 10) 葛西, 小倉, 館沢, 佐藤 (1931): *中央獣医学会誌*, **44**, 385.
- 11) LEWIS, R. M., HENRY, W. B., THORNTON, G. W. and GILMORE, C. E. (1963): *Sci. Proc. Amer. J. vet. med. Assoc.*, **1**, 140~163.
- 12) LEWIS, R. M., SCHWARTZ, R. S. and GILMORE, C. E. (1965): *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, **124**, 178~200.
- 13) 右田, 谷垣 (1967): *蛋白質核酸酵素*, **12**, 1352~1365.
- 14) MILLER, G., FIRTH, F. W., SWISHER, S. N. and YOUNG, L. E. (1957): *Amer. J. Dis. Child.*, **93**, 35.
- 15) 大木, 井上 (1966): *日本獣医学雑誌*, **28**, (学会号), 355~356.
- 16) 大木, 三浦 (1967): *日本獣医学雑誌*, **29**, (学会号), 76~77.
- 17) 大木, 三浦 (1968): *日本獣医学雑誌*, **30**, (学会号), 159.
- 18) 大木, 三浦 (1968): *馬伝染性貧血に関する研究報告*, **3**, 48~57, 家畜衛生試験場.
- 19) 大木 (1969): *獣医畜産新報*, No. 491, 328~330.
- 20) 大木, 藤田 (1959): *日本獣医学雑誌*, **21**, 71~83.
- 21) 大木, 藤田 (1959): *日本獣医学雑誌*, **21**, 241~256.
- 22) SAISON, R., KARSTAD, L. and PRIDHAM, T. J. (1966): *Canad. J. comp. Med.*, **30**, 151~156.
- 23) 添川, 西 (1949): *馬の伝染性貧血*, 上巻, 89~97頁, 東京, 養賢堂.
- 24) 山極 (1952): *日本獣医学雑誌*, **14** (学会号), 523.
- 25) ZEBROWSKI, L. and ZULINSKI, T. (1957): *Vet. Bull. (Weybridge)*, **27**, 120.

CHARACTERISTICS AND ROLES OF RED CELL AUTO-ANTIBODIES IN EQUINE INFECTIOUS ANEMIA

Yoshio OKI

Third Research Division, National Institute of Animal Health, Kodaira, Tokyo

Katsuhiro MIURA

Department of Animal Health, Faculty of Agriculture, Tohoku University, Sendai

(Received for Publication February 23, 1970)

In the recent years, various red cell auto-antibodies have been determined in some animal diseases, including autoimmune hemolytic anemia and systemic lupus erythematosus in dogs,^{4,5)} Aleutian disease in minks,⁸⁾ and equine infectious anemia.^{11~15)}

In this report, the red cell auto-antibodies were examined for symptomatic changes, serological characteristics, and immunopathological roles in 20 horses infected with equine infectious anemia virus (Table 1).

Pathologic cold hemagglutinin and warm hemagglutinin were identified in the plasma of artificially infected horses. The direct antiglobulin tests of red cells gave also positive results, showing an intimate correlation with the appearance of warm hemagglutinin, in infected horses of febrile stage (Chart 1 and Table 1). Red cells in the portal veins of the liver tissue were always higher in titer in the antiglobulin tests than those in the jugular veins. There was an intimate correlation between this titer and the number of red cells in the jugular vein of the infected horses (Table 2).

Both warm and cold hemagglutinins were macroglobulins (IgM) which were inactivated with 2-mercaptoethanol, and found in the first peak of the plasma protein fractions obtained by gel filtration using Sephadex G-200 (Chart 2). These auto-hemagglutinins reacted with horse red cells, but did not with red cells of any other animal species, such as sheep, rabbit, guinea pig, or chicken. In the pattern of reaction between warm hemagglutinin and horse red cells, prozones were formed by excess antigen or antibody (Table 3). The auto-antibodies, combined with the red cells of the infected horses and correlated with the antiglobulin test, were serologically determined to be composed predominantly of IgM, like warm hemagglutinin, and probably partially of IgG (Table 4 and Fig. 1).

Warm hemagglutinin among these red cell auto-antibodies exhibited an opsonic action but no hemolytic action, and accelerated phagocytosis of horse red cells by macrophages (Figs. 3, 4, and 5).

It was considered that the presence of warm auto-antibodies might be a principal cause of the degeneration of red cells, phagocytosis of red cells by macrophages, and the appearance of siderocytes in equine infectious anemia.

EXPLANATION OF PLATE

PLATE I

- Fig. 1. Immunoelectrophoresis indicating cross-reaction between anti-human IgM and horse serum (IgM). Upper trough: anti-horse serum; middle well: horse serum proteins; lower trough: anti-human IgM.
- Fig. 2. Blood picture in portal vein of liver in equine infectious anemia (EIA). A number of agglutinated red cells and siderocytes are observed with erythrophagocytosis.
- Fig. 3. Fluorescent antiglobulin staining of warm hemagglutinin combined on red cells of a horse affected with EIA.
- Fig. 4. Phagocytosis of EIA-red cells combined with auto-hemagglutinin by cultured horse macrophages. The red cells have been caught by means of the pseudopods of macrophages and engulfed by these cells.
- Fig. 5. Phagocytosis of EIA-red cells combined with auto-hemagglutinin by cultured horse macrophages. A number of agglutinated red cells were around the macrophages and have been caught by these cells.