鶏の比較解剖学的並びに局所解剖学的研究

LXX. 上頸神経節の局所解剖学的並びに細胞構築学的研究

磯村 源蔵*・保田 幹男

名古屋大学農学部家畜解剖学教室

(昭和47年3月21日受付)

上頸神経節について実験的に意義づけをおこなったのは, PETIT¹⁷⁾ であった. 以来, BUDGE and WALLER⁶⁾, BERNARD²⁾ および HORNER¹⁰⁾ らの研究により, 上頸神経節は, 交感神経系の一部であり, 自律神経機能をもつことが明らかにされた. この神経節の細胞は, 脊髄交感神経中枢から節前線維を受けて synapse を形成し, ここから節後線維を出す, 節前線維数と神経節細胞数とが一致せず, 細胞数と線維数の間には, 一定の倍数関係がみられる. この点に関して BILLINGSLEY and RANSON⁴⁾ は, 線維に対して数倍の細胞が連絡しているか, または, 介在ニューロンが存在すると仮定した.

上頸神経節の節後線維の走行とその分布に関しては, 哺乳類における多くの研究がある. 節後線維のうち内頸動脈に伴行し, 頭部に分布する神経の一つは, 三叉神経節を通過するか, または, 三叉神経節を通過せず, 直接毛様体神経節に入り, この神経節より出る神経内に混在して虹彩にいたり, 瞳孔散大筋を支配するとされている. しかし, 鳥類の上頸神経節に関して研究した BONSDORFF⁵⁾, MAGNIEN¹⁶⁾, JEGOROW¹³⁾ および LANGLEY¹⁴⁾ によって, 鳥類の上頸神経節は, 哺乳類のものと異なった線維連絡をもつことが指摘された. LANGLEY¹⁴⁾ は, 内頸動脈に沿うものは, 上行して外眼動脈に伴行し, 三叉神経節と直接連絡しないで, 三叉神経節から出る上頸神経の中に混入するとしている.

哺乳類で観察できる瞳孔散大筋に分布する節後線維は, 鳥類では, 肉眼的に認めることができないが, 上頸神経節摘出により, 頸部の羽毛が起立できなくなることから, この神経節より出る節後

線維は, 立毛筋に分布するといえる. これらの事実に基づけば, 鳥類の上頸神経節の節後線維の分布は, 哺乳類のそれに比して, かなり異なるものと推定される. 従って, 鳥類の上頸神経節の位置とその組織学的構造を研究し, 節後線維の分布を明らかにすれば, 哺乳類との間にみられる機能上の差異を解明することができるものと考えた.

材料および方法

材料として白色レグホン種12例, トカラ地鶏10例, 褐色レグホン種2例およびロードアイランド・レッド種2例, 計26例の成鶏を用いた. これらの鶏の片側の上頸神経節を, 周囲の組織とともに, または, 神経節だけを摘出し, ただちに10%中性ホルマリン液に固定した. 5例だけ, 総頸動脈にカニユーレを挿入し, 10%ホルマリン還流固定を行なった. 常法によりパラフィン包埋し, 10 μ の連続切片を2枚おきに3系列に分けて, それぞれに Einarson の Gallocyanin 染色, Klüver and Barrera の Luxol fast blue cresyl violet 染色および Holmes の鍍銀を行なった. また, 立体的に細胞構築を明らかにするため, 横断, 矢状断および水平断の3平面の切片を作成した. Abbe の描画装置で, 切片を1枚ごとに写しとり, 核の中に核小体の認められる細胞だけに限って数えた.

観 察

1. 局所解剖学的観察

下顎角から尾側に向かって切開すると, 気管, 食道および頸静脈の間の深部に, 腹頭直筋に包まれて総頸動脈が認められる. この動脈は, 吻側へ進むと, 内頸動脈と外頸動脈とに二分し, 舌骨角の下で, 前者は, 舌咽神経と迷走神経の腹側には

* 現在の所属: 名古屋大学医学部解剖学教室

Fig. 1. Schematic representation of the relation of the superior cervical ganglion to the glossopharyngeus, the vagus, and the internal carotid artery. The ganglion is evidently not only connected with the glossopharyngeus by two branches but also penetrated by this nerve through the cranial part.

いり込む。舌咽神経と迷走神経は、頭蓋から出てすぐに、それぞれ錐体神経節と迷走神経根神経節を形成する。これら両神経は、神経節の尾側で、比較的大きい交通枝で結ばれている。この交通枝より近位で、迷走神経から副神経の外枝が外側に向かって出るのが認められる。この高さで、舌咽神経、迷走神経および内頸動脈に囲まれて、上頸神経節が存在する (Fig. 1)。

上頸神経節の外形は、長楕円形で、これに多数の神経が出入する。神経の数は、個体により差がある。19例中で17本のもの11例、16本のもの5例、13本、15本および18本のものが、それぞれ1例であった。この変異は、特に迷走神経との連絡枝、および内頸動脈に向かう神経において観察された。迷走神経との連絡枝は、上頸神経節の背頭側に多く、それは小神経枝に分かれている。内頸動脈に向かう神経は、神経節の背・腹両面から出

る。内頸動脈は、上頸神経節の腹側に沿って走るが、この部位では、神経節の腹側から神経を受ける。内頸動脈が、頭側に走り脳頸動脈と外眼動脈に分かれた後の部位では、神経節の腹側から脳頸動脈に、また、背側から外眼動脈に向かって大きい神経が出される。

一方、舌咽神経は、迷走神経や内頸動脈と同じく、上頸神経節と密接な位置の関係をもつ。特に舌咽神経が、上頸神経節を貫通する例においては、その部位は神経節の頭側 $1/5 \sim 1/6$ の高さである。舌咽神経は、上頸神経節を貫通した後、この神経節と2本の細い神経で連絡する。貫通するものは、26例中12例において認められた。さらに、単に両者が接触するもの4例、同一の被膜に被われるもの3例がみられた。この神経節が貫通を受ける部分から出る神経は、内頸動脈に向かって走り、二分して、一つは、外眼動脈に沿って上行し、他の一つは、これに沿って下行する。

2. 細胞構築学的観察

上頸神経節を構成する細胞は、一般に、5~6個の外套細胞に包まれている (Fig. 9)。3種類の染色法による観察所見から、細胞を3種類に区分することができる。

大型細胞は、長径 36μ 、短径 24μ 以上で、典型的な多極細胞である。比較的小きなニッスル小体が細胞質全体に散在し、核の周囲と細胞の周辺にやや大きなものがみられる (Fig. 5)。核は、長楕円形で大きく、細胞の一侧に偏って存在する。核の内部に小さな核小体を持ち、それは数個からなる場合もある。鍍銀標本では、細胞質に太い神経原線維が認められ、多極の形態を示している (Fig. 6)。連続横断切片によれば、大型細胞は頭側 $2/3$ の領域にみられ、特に頭側 $1/3$ に多い。水平断切片では、大型細胞は、腹側 $1/3$ に比較的多い。矢状断切片では、この細胞は、外側部と内側部との中間に多い。トカラ地鶏、白色レグホン種およびロードアイランド・レッド種の3例での計数値は、それぞれ226個、418個および635個である (Table 1)。

中型細胞は、長径・短径ともに大型細胞と小型細胞の中間にあり、細胞質内に大きなニッスル小体がみられ、核は大きく、その内部に核小体が認められる (Figs. 7, 8)。横断切片では、頭側から

Table 1. Number of cells in the superior cervical ganglion of the fowl

Section number	(A)			(B)			(C)		
	S	I	L	S	I	L	S	I	L
1	7			5		3			
2	25			13	2	2			
3	37		7	33	6	3	8	8	
4	48	4	8	41	9	4	10	15	4
5	76	5	13	33	17	7	16	8	9
6	91	17	12	33	13	11	18	28	11
7	103	8	16	42	15	10	43	40	4
8	90	8	18	28	9	8	47	16	8
9	98	3	17	73	15	15	44	38	11
10	171	11	13	64	31	14	51	37	14
11	164	15	17	68	28	14	70	61	12
12	141	7	11	86	41	26	69	31	21
13	78	7	11	120	22	15	76	50	14
14	121	14	17	100	33	11	91	41	9
15	84	7	16	93	26	10	72	46	10
16	118	11	5	86	27	12	76	50	24
17	73	9	5	128	44	10	57	25	33
18	93	10	7	96	28	16	67	20	31
19	62	6	13	100	38	20	85	44	30
20	81	7	8	99	38	13	85	39	26
21	78	4	2	77	53	13	93	39	28
22	62	6	4	74	45	24	106	56	26
23	67	9	2	68	30	18	80	45	29
24	53	10	2	34	26	22	65	31	30
25	48	6	2	46	32	21	51	37	23
26	43	5		61	41	29	54	47	22
27	33	5		32	49	12	44	47	21
28	28	4		19	37	13	40	44	32
29	19	4		41	19	9	52	34	40
30	14	7		6	21	13	45	36	14
31	6	8		11	13	14	35	36	16
32				4	4	6	38	25	8
33							39	17	17
34							32	2	20
35							20	1	26
36							23	1	8
37							26	3	2
38							18	5	2
39							24		
40							15		
41							10		
42							6		
43							2		
Total	2,212	217	226	1,814	812	418	1,903	1,103	635

Remarks.

(A): Tokara native fowl; frontal section; Einarson's galloxyanin staining.

(B): White Leghorn; horizontal section; Klüver-Barrera's luxol fast blue and cresyl violet staining.

(C): Rhode Island Red; sagittal section; Holmes' silver impregnation.

I: intermediate cell

L: large cell

S: small cell

尾側にわたり一様に分布し、水平断切片では背側部と腹側部の中間に比較的多く、矢状断切片では、外側部と内側部の中間に比較的多く認められる (Table 1). 3 個体での中型細胞の数は、それぞれ 217 個, 812 個および 1,103 個である。

小型細胞の長径は 15μ , 短径は 9μ 以下で、ニッスル小体は大きく少数である (Fig. 9). 核は大きく、数個の核小体を持ち、それらが線状または馬蹄形に配列する (Fig. 10). この細胞は、神経節全体に広く密に分布する。横断切片では、頭側部と尾側部の中間に、水平断切片では背側部と腹側部の中間に、矢状断切片では、外側半分に密に存在する領域が認められる。小型細胞の数は、3 例でそれぞれ 2,212 個, 1,814 個および 1,903 個であり、3 種類の細胞のうち、その数は最も多く、過半数を占めている (Table 1).

計数した 3 例における神経節細胞の総数は、それぞれ 2,655 個, 3,044 個および 3,641 個である。この計数は 2 枚おきの切片によるもので、この値を 3 倍することにより、理論上の総神経節細胞の概数を算出できるものとして、その結果を出せば、計数した 3 例では、それぞれ 7,965 個, 9,132 個および 10,923 個である。

考 察

観察の所見より次のようにまとめられる。(1) 上頸神経節に出入する神経の数には、13 本から 18 本までの幅があるが、17 本の例が最も多い。(2) 上頸神経節の一部を舌咽神経が貫通している。(3) 上頸神経節を構成する神経節細胞を、その大きさとニッスル小体の大きさ、分布により、大型、中型および小型の 3 種類に区別することができる。そのうち小型細胞が最も多い。

上頸神経節に出入する神経の数に関して、BONSDORFF⁶⁾ はツルで、三叉神経とは 2 本、顔面神経とは 2 本、迷走神経とは 2 本、舌下神経とは 1 本、交感神経幹とは 1 本の総計 8 本の神経で連絡していることを報告した。CORDS⁸⁾ は、鶯、家鴨および鶏で、顔面神経とは 1 本、舌咽神経とは 2 本、迷走神経とは 1 本、舌下神経とは 1 本および頸神経とは 1 本の合計 6 本の連絡枝を数えた。渡辺^{20,21)} は鶏で、顔面神経とは 1 本、舌咽神経とは 1 本、迷走神経根神経節とは

1~2 本、舌下神経とは 1 本および内頸動脈に沿って上行するもの 1 本と、下行するもの 1 本の合計 6~7 本の連絡枝を報告している。

前記各著者の結果と、今回の観察所見との間には、かなりの差がみられ、その差は、特に内頸動脈に伴行するものと、迷走神経との連絡枝の数においてである。このことは、今回の観察が顕微鏡的手法によったものであり、前記三著者は肉眼的観察によることに原因するものと考えられ、また、BILLINGSLEY and RANSON³⁾ が髄鞘染色を施した猫の上頸神経節標本で観察した結果と、よく一致している。その報告によると、上頸神経節は、舌咽神経咽頭枝とは 4 本、迷走神経とは 1 本、舌下神経とは 2 本、頸神経とは 6 本、交感神経幹とは 1 本の連絡枝で結合し、さらに、上甲状腺動脈へは 2 本、外頸動脈へは 2 本、内頸動脈へは 7 本、総頸動脈へは 2 本の神経枝を出し、総計 27 本の連絡枝をもつ。

上頸神経節の一部を舌咽神経が貫通することに関して、いまだ報告はみられない。ただ渡辺^{20,21)} および PICK¹⁸⁾ が、上頸神経節は、舌咽神経、迷走神経および内頸動脈に囲まれて存在していると報告しているにすぎない。舌咽神経が、上頸神経節の一部を貫通することの意味についてはなお不明である。

今回の所見により、舌咽神経をとり囲む部分が、神経節のうち、ほとんど神経線維からなる部分であり、この神経節のとり囲む部分から出た神経枝は、内頸動脈に沿って上行および下行することからみて、初めに上頸神経節と舌咽神経との両者に位置的に接近した関係ができ、その後、上頸神経節から出て内頸動脈に沿って走る上行および下行枝が生じ、その結果、この貫通の形態ができあがったものと推定できる。

上頸神経節を構成する細胞を、細胞の大きさとニッスル小体の形態により、3 種類に区分した。鳥類における上頸神経節の細胞構築については、HUBER¹¹⁾ の鶏の上頸神経節に関する Methylene blue 染色標本による観察結果があるが、これによると、上頸神経節を構成する細胞は、微細なニッスル小体を一様に含んだ多極細胞であり、神経節の外部からきてこれらの細胞に synapse を形成する方法には 2 種類あることから、上頸神経節の

構成細胞は、2種類よりなることが明らかにされている。

哺乳類の上頸神経節の細胞構築については、DOGIEL⁹⁾ が犬、猫およびイルカで2種類の細胞を区別し、それらに異なった機能を負わせた。KISS¹³⁾ および安楽¹⁾ も、細胞の大きさとニッスル小体の形態によって分類した。BILLINGSLEY and RANSON⁴⁾ は、上頸神経節の節前有髄線維数と神経節細胞数との比が、1対12であることから、介在ニューロンの存在を仮定して、交感神経性の神経節細胞と介在ニューロンの2種類の存在を考えた。LAWRENTJEW¹⁵⁾ も介在ニューロンの存在を仮定して、2型を区別した。CARPENTER and CONEL⁷⁾ は、齧歯類の上頸神経節において、神経節細胞の中に2核細胞があることを認め、1核と2核の2種の細胞のあることを明らかにした。SAMUEL¹⁹⁾ は、兎の上頸神経節において、2核細胞の存在を認め、また、節後線維切除により、98%の神経節細胞に逆行性変性がみられたことから、介在性のニューロンの存在を否定した。上頸神経節を構成する細胞の種類、および介在ニューロンの存在については、決定的な証拠はない。しかし、上頸神経節から出る神経の分布部位、または、効果器のもつ性質を明らかにし、その組織学的および機能的差異を解明し、さらに、他の神経からの神経線維が、上頸神経節のどの細胞にsynapseするかを観察することができれば、間接的ではあるが、上頸神経節を構成する細胞の種類、その機能および配列のもつ意味が、さらに一層明らかになるであろう。

結 論

鶏の上頸神経節の位置、神経節に出入する神経の数、神経節細胞の形態とその分布および細胞数について観察した。その結果を次のように要約した。

(1) 上頸神経節は、舌咽神経、迷走神経および内頸動脈に囲まれて位置する。この位置において、舌咽神経と連絡枝により結ばれるのみでなく、多くの例で、上頸神経節の頭側1/5~1/6の範囲で、舌咽神経がこれを貫通していることが明らかにになった。神経節に出入する神経枝の数は、個体差があり、13本から18本の幅の中にあるが、

17本の例が最も多かった。

(2) 神経節を構成する細胞は、その大きさとニッスル小体の形態により、大型、中型および小型の3種類に区別される。この中で小型細胞が最も多く過半数を占め、また、3種の細胞の総数は、3例でそれぞれ約7,965個、9,132個および10,923個であった。

本研究は、磯村の大学院在学中の研究の一部である。在学中、教示をいただいた助教授藤岡俊健博士、助手渡辺徹博士および東京大学助教授西田隆雄博士に厚くお礼を申し上げる。

文 献

- 1) 安 楽 (1936): 日本医科大学雑誌, 7, 662~682 および 847~872.
- 2) BERNARD, C. (1862): *C. R. Acad. Sci.*, 55, 381~388.
- 3) BILLINGSLEY, P. R. and RANSON, S. W. (1918): *J. Comp. Neur.*, 29, 359~366.
- 4) BILLINGSLEY, P. R. and RANSON, S. W. (1918): *J. Comp. Neur.*, 29, 367~384.
- 5) BONSDORFF, E. J. (1852): *Acta Societatis Scientiarum Fenniae, Helsingfors*, 591~624.
- 6) BUDGE, L. J. and WALLER, A. V. (1851): *C. R. Acad. Sci.*, 3, 370~374.
- 7) CARPENTER, F. W. and CONEL, J. L. (1914): *J. Comp. Neur.*, 24, 269~281.
- 8) CORDS, E. (1904): *Anat. Hefte*, 26, 49~100.
- 9) DOGIEL, A. S. (1896): *Anat. Anz.*, 11, 679~687.
- 10) HORNER, J. F. (1869): *Klin. Monatsbl. Augenheilk.*, 7, 193~198.
- 11) HUBER, G. C. (1899): *J. Morph.*, 16, 27~90.
- 12) JEGOROW, J. (1887): *Pflüger's Arch. Physiol.*, 41, 326~348.
- 13) KISS, F. (1932): *J. Anat.*, 6, 488~498.
- 14) LANGLEY, J. N. (1904): *J. Physiol.*, 30, 221~252.
- 15) LAWRENTJEW, B. J. (1924): *Anat. Anz.*,

- 58, 529~539.
- 16) MAGNIEN, M. L. (1887): *C. R. Acad. Sci.*, **104**, 77~79.
- 17) PETIT, P. D. (1727): *Histoire de l'Académie royale des Sciences*, **1**, 7~10; **2**, 1~19.
- 18) PICK, J. (1970): *The Autonomic Nervous System*, pp. 241~252, J. B. Lippincott Company, Philadelphia and Toronto.
- 19) SAMUEL, E. P. (1953): *J. Comp. Neur.*, **98**, 93~112.
- 20) 渡辺 (1960): *日獣誌*, **22**, 145~154.
- 21) 渡辺 (1964): *日獣誌*, **26**, 249~258.

COMPARATIVE AND TOPOGRAPHICAL ANATOMY OF THE FOWL

LXX. TOPOGRAPHICAL ANATOMY AND CYTOARCHITECTURE OF THE SUPERIOR CERVICAL GANGLION

Genzoh ISOMURA* and Mikio YASUDA

*Department of Veterinary Anatomy, Faculty of Agriculture,
Nagoya University, Nagoya*

(Received for Publication March 21, 1972)

The topographical anatomy and the cytoarchitecture of the superior cervical ganglion were described and illustrated in detail on the basis of studies on 26 fowls. The results obtained are summarized in the following table and plates.

1. The superior cervical ganglion was surrounded by the glossopharyngeal and vagus nerves and the internal carotid artery. It was related to these nerves through 17 nerve branches. The glossopharyngeal nerve then passed through cranial one-fifth to one-sixth of the ganglion (Figs. 1, 3, and 4).

2. The ganglion consisted morphologically of not only one kind of ganglion cells, but two other kinds of ganglion cells. These cells were classified into large, intermediate, and small cells on the basis of size and Nissl bodies (Figs. 2 and 5 to 10).

3. All the ganglion cells were counted in every second section. The numbers of cells in three fowl breeds are shown in Table 1. When they were tripled to include the numbers of cells in the intervening sections, the total numbers of ganglion cells in the three breeds were 7,965, 9,132, and 10,923, respectively.

* Present address: Department of Anatomy, Nagoya University School of Medicine, Tsurumai-cho, Showa-ku, Nagoya 466, Japan.

EXPLANATION OF PLATES

PLATE I

- Fig. 2. Gross sagittal appearance of the superior cervical ganglion. Letters L, I, and S show the cell types of the ganglion. Klüver-Barrera's luxol fast blue and cresyl violet staining. $\times 400$.
- Fig. 3. Gross horizontal appearance of the relation of the superior cervical ganglion to the glossopharyngeus. The nerve penetrates through a part of the ganglion. Holmes' silver impregnation. $\times 160$.
- Fig. 4. Gross frontal section of the glossopharyngeus passing through the ganglion. Holmes' silver impregnation. $\times 160$.

PLATE II

- Fig. 5. Large cell. Einarson's gallocyanin staining. $\times 6,000$.
- Fig. 6. Large cell. Holmes' silver impregnation. $\times 6,000$.
- Fig. 7. Intermediate cells. Einarson's gallocyanin staining. $\times 6,000$.
- Fig. 8. Intermediate cells. Holmes' silver impregnation. $\times 6,000$.
- Fig. 9. Small cells. Einarson's gallocyanin staining. $\times 6,000$.
- Fig. 10. Small cells. Holmes' silver impregnation. $\times 6,000$.

ABBREVIATIONS

- CA: cerebral carotid artery
- EO: external ophthalmic artery
- GCS: superior cervical ganglion
- GpIX: petrosal ganglion of glossopharyngeal nerve
- GrX: vagal radical ganglion
- I: intermediate cell
- IC: internal carotid artery
- L: large cell
- S: small cell
- IX: glossopharyngeal nerve
- X: vagal nerve
- XI: accessory nerve