鶏血漿中 Albumin から単離した Aspartate- および Alanine-aminotransferase 系アミノ基転移酵素 の活性とその物理化学的性状について

山 田 一 彦

大阪府立大学農学部家畜生理飼養学教室

(昭和47年2月8日受付)

低温エタノール (EtOH) 分別法^{9,24)} を基礎とした一連の細分別法^{34~36)} を用いて、著者は、鶏血漿中から、著者の分類による Forward (F)-Aspartate aminotransferase (GOT), Reverse (R)-GOT, F-Alanine aminotransferase (GPT) および R-GPT の、計 4 種のアミノ基転移酵素 (T-ase)^{30~33,35,36)} を分離した。しかしながら、それらの T-ase 中には、それぞれ、さらに補足細分類されるべき数個の isozyme または類属酵素のほか、R-GOT および R-GPT の両基質を触媒する複合活性基を持つと考えられる R 系 T-ase (CRT-ase) らが含まれており³⁶⁾、しかも、これら T-ase のうちの多くは、複数存在する Albumin (Alb.) 成分中³⁴⁾ のいずれかを担体として、血漿中を行動するものと推察されている^{35,36)}。しかし、その詳細に関しては、現在までのところ十分明らかではない。

そこで、本報告では、著者法により、鶏血漿 Alb. 中各系 T-ase を単離精製し、その活性と物理化学的性状について、比較検討を行なったので報告する。

実験材料と方法

A. 実験材料

Arbor Acres 種、240 日令、平均体重 3.65 kg の雄、350 羽の頸静脈血を採取し、型のごとく処理³⁴⁾ して得られた血漿を試料として用いた。この試料の pH は 7.9 ± 0.1 、総蛋白質量 (TP) は 4.61 ± 0.11 g/dl である。

B. 実験方法

1. 血漿中 Alb. の細分別精製法

Chart 1 (A, B, C) に示す著者法に準拠して行なった。

2. GOT および GPT の各 F, R 系 T-ase の基質調製とそれらの活性測定法
いずれも著者法^{30~33,35,36)} によった。
3. 分別用試料の pH 測定とその調整法
試料 pH は、HRL pH Meter Model H によるガラス電極法^{12,37)} を用いて行なった。pH 調整には 0.04~0.5 N の酢酸とアンモニアを使用した³⁾。
4. 分別用試料の TP 定量
micro-Kjeldahl 法¹²⁾ を用いた。
5. 分別用試料中含有 Alb. の定量法
メタノール分画法³⁷⁾ を用いた。
6. 分画分別用 EtOH の添加法
McMEEKIN の膜平衡法¹⁹⁾ を用いた。
7. 分別 Alb. 成分の純度検定法
ORNSTEIN²⁵⁾ and DAVIS¹¹⁾ の著者変法³⁴⁾、ならびに成分命名法³⁴⁾ に準拠した Disc 電気泳動法のほか、Cellulose acetate (CA) 電気泳動法^{23,34)} と超遠心沈降法⁵⁾ を用いた。
8. 分別 Alb. 成分の物理化学的性状の確認
Table 4 (A, B) 記載の方法に従って行なった。

実験結果

A. 鶏血漿中脂質成分の除去

著者法³⁶⁾ に準拠して行なった。血漿からのこの n-ブタノール分画物は、以後 Source sample (SS) 1 と呼ばれる。

B. SS 1 中 Alb. 成分群の塩析

OSBORNE 法³⁾ に従って得られた硫酸 (AS) 塩析液の TP 中で占める全可溶性蛋白質および Alb. 成分の実含量 (g/dl) は、Chart 2 に示すとおりである。それによると、液液 TP 中、最大の可溶性 Alb. 成分を含有する液液の液液域は、

Chart I (A, B, and C)
Scheme for Further Purification of Plasma Albumin
(A) Method for Separating Source Sample 5

- Blood plasma
- Method for separating plasma:
Oxalated blood plasma obtained from jugular vein by puncture
pH 7.9 ± 0.1 , TP 4.61 ± 0.11 g/dl
- A. Removal of lipid from blood plasma
- n-Butanol extracts (source sample 1)
- Method for extracting lipid: The author's method³⁶⁾
pH 8.4 ± 0.1 , TP 1.27 ± 0.21 g/dl
- B. Purification of source sample 1 by $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ fractionation
- Filtrate (source sample 2)
- Method for salting out: Osborne's method^{3,36)}
pH 7.9 ± 0.1 , TP 0.61 ± 0.09 g/dl
- C. Purification of source sample 2 by $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ fractionation at a controlled pH
- Precipitate (source sample 3)
- Method used: The author's modification of Adair and Robinson's method¹⁾
Final pH of suspension: pH 4.4
TP 5.70 g/dl
Prepare a 5.70 g/dl suspension of this precipitate by addition of distilled water at pH 7.0.
- D. Sephadex gel fractionation of source sample 3
- Pooled filtrates (source sample 4)
- Method used for gel filtration: Ascending method
- E. Concentration of source sample 4
- Concentrated filtrate (source sample 5)
- Final pH 7.4
Bring the pH of source sample 5 to 7.4 by addition of 0.04 N ammonia.
TP 5.70 g/dl
Condense the filtrate under reduced pressure to make a final concentration 5.70 g/dl.
- F. Subfractionation of source sample 5 with ethanol (EtOH)

Remarks.

1. A brief outline is given in this chart and detailed information in charts 1-(B) and (C).
2. During the course of these experiments, the temperature of the samples was maintained at 0°C.

Chart 1.
(B) Method for Fractionation of Source Sample 5

Source sample 5	
pH 7.2, TP 5.70 g/dl Conc. of EtOH, 8 vol. %	
Sup. I	F-I (—)
pH 6.9, TP 6.80 g/dl Conc. of EtOH, 25 vol. %	
Sup. II+III	F-II+III (—)
pH 5.2, TP 5.80 g/dl Conc. of EtOH, 18 vol. %	
Sup. IV-I	F-IV-I (+)
pH 5.8, TP 3.20 g/dl Conc. of EtOH, 40 vol. %	
Sup. IV-4	F-IV-4 (+)
pH 4.8, TP 1.32 g/dl Conc. of EtOH, 40 vol. %	
Sup. V	F-V (+)
(A)	(B)
pH 5.4, TP 0.30 g/dl Conc. of EtOH, 1.8 vol. %	pH 4.7, TP 0.27 g/dl Conc. of EtOH, 1.8 vol. %
I-a	I-(b, c)
pH 4.5 TP 1.23 g/dl Conc. of EtOH, 10 vol. %	
Sup. V-I	F-V-I (+)
pH 5.2, TP 0.42 g/dl Conc. of EtOH, 40 vol. %	
Sup. V-2	F-V-2 (+)
pH 4.4, TP 0.01 g/dl Bring the pH of Sup. V-2 to 4.4 by addition of a mixture of 1 part of 0.5 N acetate and 1 part of fully saturated $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$.	
I-c ₁	

Remarks.

- TP: total protein.
Conc. of EtOH: final concentration of ethanol.
F: fraction.
Sup.: supernatant.
- See the remarks of Chart I.

Chart 1.
(C) Method for Subfractionation of Fraction V-2

Remarks.

See the remarks of Charts of I-(A) and (B).

Chart 2.
Protein Content of Various Filtrates Obtained
from n-Butanol Extracts (Source Sample 1) by
Fractionation with $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

Remarks.

1. x-x: total protein.
o-o: albumin content.
●-●: soluble proteins in distilled water at pH 7.0.
2. Method used for salting out: Osborne's method^{3,36}.
Abscissa: grams of $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ per 10 ml of source sample 1.
Ordinate: grams of protein per 100 ml of filtrate.
3. The albumin content of various filtrates was determined by the method of Saito and Yoshikawa³⁷.
4. In the following experiments, the filtrate used for a purpose of separating whole albumin is indicated by arrow. A filtrate was collected and called source sample 2.
5. Quantitative determination of protein components in the filtrate was made by the micro-Kjeldahl method¹².
6. The result obtained is expressed by the mean of 85 experiments and standard deviation.

Chart 4.
Sephadex Gel Fractionation of Source Sample 3
Obtained by the Author's Modification of Adair
and Robinson Method

Remarks.

1. x-x: total protein.
o-o: albumin content.
2. Abscissa: (a) Number of fractions (7 ml / tube).
(b) The range eluted of components I-a, ab, abc, bc, and c is as follows.

Component	Number of fractions
I-a	24-25
I-a and b	26-27
I-a, b and c	28-35
I-b and c	36
I-b	37
I-c	38-47

Ordinate: protein N in mg per 100 ml of filtrate

3. Sephadex gel fractionation was performed under the following conditions.
 - (a) Method used for filtration; Ascending method.
 - (b) Gel type; Sephadex G-100.
 - (c) Eluant; 0.1 M phosphate buffer, pH 7.4.
 - (d) Flow rate: 25 ml/hr.
 - (e) Column: K 25/1000 jacketed.
4. A pooled sample for fractionation with ethanol was collected from the tube indicated by arrow, and called source sample 4.
5. The result obtained is expressed by the mean of 265 experiments and standard deviation.

Chart 3.
Scheme for Fractionation of Albumin

Remarks.

1. The method used for the fractionation of albumin was developed initially by Adair-Robinson¹⁾ and modified by the author.
2. The precipitate was pooled under the name of source sample 3. Table 1 shows the disc-electrophoretically distinguishable components of source samples 3 and 5.
3. See the remarks of Table 1.

2.5 g A S/10 ml SS 1 である。このことから、この汙液を集めて SS 2 と名づけ、以後の分別に供した。

なお、この SS 2 は、分類上 4 種の T-ase 中では、とくに F-GPT と R 系両 T-ase の分別用試料として、最も有用であることがわかっている³⁶⁾。

C. ADAIR and ROBINSON 法¹⁾ の著者変法による SS 2 中 Alb. 成分の分別

本法で分別した沈降物の懸濁液は、SS 3 と呼ばれる。その Disc 泳動成分の種類は、Table 1 の

とおりである。それによると、本 SS TP の約 72 % は、Alb. 成分で占められており、A/G 比は 2.54 である。

D. Sephadex ゲル汙過による SS 3 中 Alb. 成分の分別

Chart 4 記載の溶出条件に従って得られた各区溶出ゲル汙液中、Disc 泳動により確認された含有 Alb. 成分の種類は、Chart 4 備考欄記載のとおりである。この結果、SS 3 中の 1-a, b および c 位の全 Alb. 成分³⁴⁾の回収には、図中矢印部分のゲル汙液の pool が最適と考えられた。この

Table 1. Percent Composition of Protein Components of Source Samples 3 and 5, and Their Origin

Component			Source sample and its origin		
Mark	Subdivision	Relative position	Plasma	Source sample 3	Source sample 5
7—	slow beta-globulins	0	10.29±0.95	—	—
c—	slow alpha ₂ -globulins	4	5.85±0.25	—	—
b—		8	5.18±0.21	—	—
6-a—	beta- and gamma-globulins	20	4.95±0.25	—	—
b—		26	15.80±1.05	—	—
5-a—		27	3.35±0.11	2.20±0.15	—
c—	(SF)	30	—	1.89±0.11	—
c—	beta'-globulins	31	1.65±0.08	6.30±0.34	1.26±0.14
b—		33	6.20±0.33	11.34±0.95	3.34±0.15
4-a—		35	1.15±0.05	—	—
d—	transferrin C	46	1.85±0.02	—	—
c—		50	7.95±0.31	4.09±0.25	4.16±0.24
b—	fast alpha ₂ -globulins	55	3.56±0.22	—	—
3-a—		57	1.05±0.05	2.39±0.12	—
c—	alpha ₂ -globulins	67	1.30±0.02	—	—
b—	alpha ₁ -globulins	71	0.54±0.01	—	—
2-a—	alpha-lipoprotein	76	0.79±0.01	—	—
c—		85			
b—	albumin	92	27.29±0.92*	71.79±3.59*	91.24±4.14*
1-a—		100			
P ₂ —	pre-albumin 2	112	0.65±0.01	—	—
P ₁ —	pre-albumin 1	129	0.60±0.01	—	—
A/G ratio			0.40	2.54	10.38

Remarks.

- These results were obtained by disc electrophoresis conducted by the author's modification³⁴⁾ of the Ornstein-Davis methods^{11,25)}.
- Ratio of migration of each protein component (relative position) is expressed by the result of comparison between the distance of migration of the component and the position of slow beta-globulins (7: relative position, 0) to the position of albumin (1-a: relative position, 100³⁴⁾. The mark of each protein component was given by the author³⁴⁾.
- The value with asterisk is for a mixture of the following components: 1-a, 1-b₁, 1-b₂, 1-b (b, c), 1-c₁, and 1-c₂. For details see the remarks of Table 3.
- SF: subfraction.
- The result obtained is expressed by the mean of 265 (source sample 3), 265 (source sample 5), or 110 (plasma) experiments and standard deviation.

pool した溶液群は、以後 SS 4 と呼ばれる。

E. SS 4 の濃縮とその含有成分

減圧透析法⁶⁾を用いて、SS 3 と同じ TP にまで濃縮された SS 4 は、以後 SS 5 と呼ばれる。この SS 5 中の含有 Disc 成分の種類は、Table 1 に

示すとおりである。それによると、SS 5 TP 中の約 91% は、Alb. 成分群で占められ、その A/G 比は 10.38 である。

F. SS 5 の低温 EtOH 分別

1. 血漿 Alb. の構成成分数とその種類

Table 2. Actual Amount and Ratio of Each Albumin Component to Total Plasma Albumin

Component and its protein content (g/l)						Plasma albumin content (g/l)
I-a	I-b ₁	I-b ₂	I-(b, c)	I-c ₁	I-c ₂	
6.16±1.05 (48.96±8.35)	0.20±0.08 (1.59±0.64)	0.06±0.01 (0.48±0.08)	5.54±1.19 (44.04±9.47)	0.21±0.07 (1.67±0.56)	0.41±0.10 (3.26±0.79)	12.58±2.13 (100)

Remarks.

1. In parentheses is shown the percent composition of each albumin component to total plasma albumin.
2. Quantitative determination of each albumin component was done by the micro-Kjeldahl method.
3. The result obtained is expressed by the mean of 265 experiments and standard deviation.

Table 3. Differences in Transaminase Activity Value among Six Components of Albumin

Substrate used	Component and its transaminase activity					
	I-a	I-b ₁	I-b ₂	I-(b, c)	I-c ₁	I-c ₂
F-GOT	—	—	—	—	—	—
R-GOT	—	9.73±1.04	—	0.99±0.07	—	—
F-GPT	—	—	0.04±0.01	—	—	—
R-GPT	0.09±0.01	10.36±1.34	9.80±1.22	1.40±0.17	1.54±0.22	3.00±0.45

Remarks.

1. The transaminase activity of each component was determined by the author's method^{30-33, 35, 36}. It is expressed in terms of μ Moles of hydrazone extracts of alpha-ketonic acid per mg of protein N.
2. The relative position of each component is as follows.

Component	Relative position	
	Disc ³⁴⁾	Cellulose acetate ³⁴⁾
I-a	100	100 (albumin 1)
I-b ₁	92	—94.4 (albumin 2)
I-b ₂	92	
I-(b, c)	89	—93-82 (pre-alpha ₁ -globulins)
I-c ₁	85	
I-c ₂	85	

The method used for calculation of the relative position of each component is shown in the remarks of Table 1.

3. The result obtained is expressed by the mean of 265 experiments and standard deviation.

一連の低温 EtOH 分別法によって, SS 5 から細分別精製された Alb. 成分群中には, 相対移動度³⁴⁾ (RP) 100, 92 および 85 の I-a, b および c 位の 3 成分のほか, I-b と c 位の両成分の中間に位置する, 便宜上, I-(b, c) と記載される RP 89 位成分など, 4 種の RP 成分群が含まれている。しかし, このうち, 従来 1 個の成分として分類してきた I-b および c 位の両成分³⁴⁾ は, いずれ

も本報告で I-b₁ および b₂, ならびに I-c₁ および c₂ と命名された, 各 2 個の同移動度の重畳成分から成ることが確認された。したがって, 鶏血漿中 Alb. は, 合計 4 群 6 種の成分群から構成されていることが明らかとなった。これら 6 成分が, 原血漿 Alb. 中で占める含量関係は, Table 2 のとおりで, $I-a \geq I-(b, c) > I-c_{1+2} > I-b_{1+2}$ として示される。すなわち, 全 Alb. 中の約 93% は,

Table 4. (A and B). Physicochemical Properties of Albumin Components
(A) Physical Properties

	Component						Apparatus used
	I-a	I-b ₁	I-b ₂	I-(b, c)	I-c ₁	I-c ₂	
Isoelectric point	4.8	6.0	4.9	4.7	4.4	5.4	HRL pH meter, model H
Sedimentation constant	4.4	4.1	4.5	4.6	4.7	4.9	Analytical ultracentrifuge, Spinco model E
Relative viscosity	0.42	0.27	0.24	0.21	0.27	0.24	Viscosimeter, model VV-I A
Refractive index	1.3600	1.3368	1.3578	1.3362	1.3368	1.3371	Refractometer, model PRA-B
Absorbancy							
253	—	—	—	—	+	—	
260	—	—	+	—	+	+	
265	—	—	+	—	+	+	
270	—	—	+	—	+	+	
at wavelength of 278	+	+	+	+	+	+	Spectrophotometer, model SV-50 A
283	+	+	+	+	+	+	
404	+	—	—	+	—	—	
418	—	—	—	—	+	—	
600	+	—	—	+	—	—	
710 (mμ)	+	+	+	+	+	+	

Remarks.

Intense absorption was determined by a model SV-50A Shimadzu spectrophotometer in a range of wavelength from 210 to 950 mμ.

The presence and absence of absorption are indicated by + and — signs, respectively. The + sign accompanied by an asterisk indicates an intense absorption of the component.

1-a 位と 1-(b, c) 位の両成分で占められている。

2. 分別 Alb. 成分の CA 法上の移動位置

Disc 法により RP 確認された分別 6 成分中, 1-a 位成分は, CA 法上, RP 100 の Alb. 1 位に, 1-b₁ 位および b₂ 位の両成分は, 同じく RP 94.4 の Alb. 2 位に, また 1-(b, c) 位, 1-c₁ 位および c₂ 位の 3 成分は, いずれも RP 93 の Pre-α₁-globulins (globs.) 位に一致する移動度成分³⁴⁾であることが確認された。

3. 分別 Alb. 成分の T-ase 活性

各分別成分の 4 種の T-ase 基質に対する活性関係は, Table 3 のとおりである。それによると, Alb. 6 成分中には, F-GOT, R-GOT, Reversible GOT など, 一連の GOT 系 T-ase はもちろん, F-GPT も存在せず, 1 種の Reversible GPT, 2 種の CRT-ase および 3 種の R-GPT など, 主として GPT 系 T-ase 群が含まれており, そのいずれもが R-GPT 活性基を共有していることが示されている。

4. 分別 Alb. 成分の物理化学的性状

分別 6 成分の主要な物理的性状と, それらの化学的な含有成分の定量結果は, Table 4 (A, B) 記載のとおりである。

考 察

A. 分別 Alb. 成分中に分布する T-ase とその isozyme

鶏血漿 Alb. 中には, (1) 1-a 位成分と, 1-c 位重畳の 2 成分など, 3 成分中に含まれる基質特異性の高い合計 3 種の R-GPT と, (2) 1-b₁ 位と 1-(b, c) 位の両成分中に含まれる合計 2 種の CRT-ase のほか, (3) 1-b₂ 位成分中にも含まれる 1 種の Reversible GPT など, 主として GPT 系 T-ase 群の分布が確認された。このように, 2 個の R-GPT のみが, 1-c 位成分群中に重畳して存在するほかは, 各系 T-ase が, 他の各 Alb. 成分中にそれぞれ分布展開していることは, すでに述べたとおりである。(F-3 項)そこで, ここでは,

Table 4.
(B) Chemical Properties

	Component						Method used for determination
	I-a	I-b ₁	I-b ₂	I-(b, c)	I-c ₁	I-c ₂	
Total N	1.59 ±0.34	1.52 ±0.35	1.58 ±0.28	1.60 ±0.31	1.59 ±0.24	1.60 ±0.32	micro-Kjeldahl method ¹²⁾
Total amino acid	50.79 ±8.98	6.68 ±1.08	8.20 ±1.34	15.18 ±2.78	43.55 ±6.56	6.60 ±1.06	KCN method ²²⁾
Total P	0.01 ±0.01 >	0.01 ±0.01 >	0.01 ±0.01 >	0.01 ±0.01 >	0.02 ±0.01	0.02 ±0.01	Fiske-Subbarow method ¹²⁾
Total S	0.05 ±0.01	0.49 ±0.06	0.01 ±0.01 >	0.18 ±0.01	0.14 ±0.02	0.06 ±0.01	Fister method ³⁷⁾
Lipid	0.08 ±0.02	10.61 ±1.79	1.28 ±0.23	0.21 ±0.03	0.51 ±0.11	0.10 ±0.01	Allen ²⁾ -Zak ¹⁵⁾ methods
Hexose	0.05 ±0.01	38.43 ±6.56	6.37 ±1.08	3.98 ±0.75	1.38 ±0.15	0.05 ±0.01	Graff method ¹²⁾
Hexosamine	0.02 ±0.01	3.17 ±0.54	0.91 ±0.15	0.79 ±0.19	0.29 ±0.04	0.19 ±0.03	Shetler method ¹²⁾

Remarks.

1. The amount of amino acid locked up in each component is expressed in terms of grams of leucine.
2. The total amounts of the chemical components described above are presented in terms of grams per 100 g of each albumin component.
3. The result obtained is expressed by the mean of 265 experiments and standard deviation.

さきに明らかとなった、活性対象を同一基質にとる各系複数個の T-ase の isozyme 性、あるいはそれらの類属酵素性について考察してみる。

一般に、活性反応上、共通の活性傾向を示す複数個の酵素群が、isozyme として命名・分類されるためには、1 種の基質のみに触媒性を持つ各酵素が、それぞれ蛋白質構造を異にすることを条件としており⁹⁾、この点からすると、前記 (1)、(2) および (3) にあげた 6 個の T-ase のうちでは、(1) の 3 個の T-ase 群が、R-GPT isozyme 相当の活性態度を持っているといつてよい。

しかし、isozyme の解釈枠を広げて、2 種の共通基質を同時に触媒する酵素をも含めてみると、(2) に示した CRT-ase 群も、一連の CRT-ase isozyme としての範疇に入れることができる。しかしながら、(1)、(2) および (3) にあげた各 T-ase のいずれもが、R-GPT 基質に共通の触媒性を示している点からすると、(3) に分類した Reversible GPT をも含めて、Alb. 成分中 T-ase のすべてが、R-GPT 関連の類属酵素群として分

類される可能性があり、かつて F-GPT < R-GPT として知られた鶏血漿中 GPT の F, R 系 T-ase 間の著明な活性差^{30~33)} は、本報告の結果によれば、ただ 1 個存在する Reversible GPT の F 系反応の低活性に対して、複数存在する R-GPT isozyme 群またはその類属酵素群による相乗的な高活性発現の結果に基づくものであることが理解される。

一方、F-GOT > R-GOT で示された GOT の F, R 系 T-ase の活性差^{30~33)} の由来は、単独存在すると考えられる F-GOT の高活性に対して、複数存在が推察される R-GOT 関連 T-ase 群の総活性の低さによるものと考えられるが^{35,36)}、この結論は、F-GOT および R-GOT 群の実験的な取り出しの結果によって明らかとなるであろう。しかし、本報告の結果は、GOT 系 T-ase、とくに F-GOT の主担体成分が、Alb. 以外の Glob. 成分群中に存在することを推察した点を^{35,36)}、明らかに支持するものである。

B. 分別 Alb. 成分の物理化学的性状

血漿蛋白質中では最も大きい移動度を持ち、pH 4.0~4.5 の条件下における電気泳動では、3~4 個の成分に分離するといわれる¹⁷⁾ 人血清中 Alb. は、分子量 69,000, 等電点 pH (pI) 区を 4.9 に持つ、沈降定数 (S) 4.6, $150 \times 38 \text{ \AA}$ の長径の楕円粒子であると考えられており、これら溶液の粘度、摩擦比や偏比容などに関しても、多くの報告が行なわれている^{5,8,16,20,28)}。しかしながら、鶏血漿中 Alb. に関しては、それらの点の詳細は不明で、COMMON ら¹⁰⁾、GLEASON¹³⁾、BLOCK ら⁷⁾、GLICK¹⁴⁾ および著者³⁴⁾ によって、鶏血漿または血清蛋白質の電気泳動^{10,13,14,34)}、ならびにそれらのクロマト成分⁷⁾、あるいは EtOH 分別成分³⁴⁾ などの物理化学的性状の確認によって、わずかにその性状の一端が知られているにすぎない。しかも、これらの報告中では、著者³⁴⁾ の場合以外、鶏血漿中 Alb. を、いずれも単一の成分として扱っており、とくに Alb. の移動度を哺乳動物のそれと比較している GLEASON ら¹³⁾ も、鶏血漿 Alb. 成分の複数性については、全く触れていない。

しかし、著者法 (B-1 項) によれば、鶏血漿 Alb. からは、Disc 法上、RP 85~100 間に、いずれも、相対移動度幅 2.4 以内の 1 本の Amidoblack 10 B 染色帯を示す 4 群 6 種の成分群の分離が可能であり (F-1, 2 項)、これらは超遠心沈降法でも、それぞれ独立した S 比を持つ 1 個の Peak 成分として示され、その他の物理化学的性状においても、相違が認められている (F-4 項)。そこで、ここでは、これら血漿 Alb. 中各成分の物理化学的性状について、考察を加えてみる。

鶏での著者の結果 (F-4 項) によると、細分別 Alb. 6 成分の平均 pI 区は 5.0 で、このうち 1-a 位および 1-(b, c) 位の Alb. 中の両主成分の pI 区は、それぞれ 4.7 と 4.8 にある。これを人血清 Alb. のそれ⁵⁾ と比較すると、それらはいずれもわずかに酸性側に位置する pI 区成分であることがわかる。この点は、WEIMER²⁹⁾ ならびに SCHMID²⁷⁾ が、人血清中の Mucoprotein および α_1 -Acid glucoprotein の各 pI 区が、それぞれ 1.8 と 2.7 にあることを認めている結果と比較しても、その相違は明らかである。

また、平均 4.5 S を示す Alb. 6 成分のうち、前述の pI 区でも比較した 1-a 位および 1-(b, c) 位の両成分は、それぞれ 4.4 と 4.6 の S 比を持っ

ているが、これらは人血清 Alb. の場合^{5,17)} とほぼ同じか、それよりわずかに小さな S 比であり、これらはまた、WEIMER²⁹⁾ ならびに SCHMID²⁷⁾ が、それぞれ 3.1 S と 3.5 S を、前述の両性状蛋白質の S 比としてあげているのと比較しても、相違していることは明らかである。

さらにまた、これら各 Alb. 成分を含む溶液の粘性^{5,8,28)} や屈折率^{5,8,29)} については、各成分構成粒子の対称性の相違²⁸⁾ などを間接的に推察させる数値が得られているが、それらの吸収像⁵⁾ には、分別各成分の性状差がさらに明らかに示されており、分別 6 成分は、280 m μ 位前後に蛋白質成分由来の極大吸収を持ち、一連の紫外部吸収に関しては、ほぼ共通の吸収像を示すこれらの成分も、可視部領域では、Heme protein^{5,26,34)} または β_1 -metal combining protein^{4,34)} 類似成分の結合、または含有を指示する 404~600 m μ 間での吸収を表わすほか、血漿の n-ブタノール分画由来の Lipid と、その関連成分の含有を指示する 710 m μ 位での吸収^{34,36)} などのいずれかを特徴的に示し、可視部の吸収像上では、全く一致する性状成分をみつけることはできない。

このような各 Alb. 成分の物理的性状に対して、複合蛋白質の化学的性状の比較検討の一つにしばしば引用される蛋白質中含 Hexose 量を、人血漿 Alb. 標品でのそれを対照に、本報告 Alb. の場合と比較してみると、その結果は、次のとおりである。すなわち、鶏血漿 Alb. 各成分の 100 g 当たりの含 Hexose 量は、0.05~38.43 g で、1-b₁ 位成分を除く他の成分中には、このうち 0.05~6.37 g の範囲内の Hexose が含まれており、この成績は、1-(b, c) 位成分のみが、Mc-MEEKIN²⁰⁾ が人血漿から分別精製している 2.0~5.5% の含 Hexose Alb. の範疇にはいることを示している。

一方、COHN⁹⁾ は、人血漿 Fraction (F)-V から分別結晶化した n-デカノール Alb. は、そのほとんどがアミノ酸残基から成り、微量の脂肪酸を含有する糖反応陰性の蛋白質成分であると述べている。この点と比較しても、前記各 Alb. 成分との差は明らかである。しかしながら、この場合の Alb. 標品が原分画を F-V に持っていることから、本報 Alb. 成分群の origin 性状とは、類似または共通するものと考えられ、著者の Alb. 各

標品は、n-デカノール Alb. と共通 origin 中の、とくに EtOH Alb. 部分、が単離精製されたものであるといつてよい。

また、MEYER²¹⁾ や MACLAGAN¹⁸⁾ が述べている Hexosamine 含量による特殊蛋白質の分類法を、この EtOH Alb. 成分の場合にあてはめてみると、これらは、いずれも Mucoprotein²¹⁾ や Mucoid proper¹⁸⁾ ではなく、また SCHMID²⁷⁾ が述べている α_1 -Acid glucoprotein と明らかに異なり、含 Hexosamine 量 4% 以下の蛋白質を主成分とする Glucoprotein であると考えられる。

この点は、WEIMER ら²⁹⁾ が、人血清 Mucoprotein 中の含有化学的成分としてあげている N (10.1%), Hexose (16.4%), Hexosamine (11.9%), Lipid (3.6%), P (0.03%) および S (1.02%) の各成分含量比と比較してみても、明らかに差があり、一致しないことから支持されるもので、本報 Alb. 成分群に関するこの Mucoprotein の性状否定は、前述した本成分群の pI 区および S 比の物理的性状差に関する考察点とも符合している。

しかしながら、1-b 位の重量 2 成分は、他の分別 4 成分と比較して、化学的成分、とくに Hexose および Hexosamine を著明に含有しており、この事実は、分別 Alb. 各成分間の化学的性状の比較の上でも、留意する必要がある、これは、また本報告で細分別精製した鶏血漿中各 Alb. 成分が、明らかに Glucoprotein 性状を示すものではあるが、その構成成分の一つとして、分類上、Mucoprotein 類似の含 Hexosamine 成分を含むことを示すものであり、これらとの複合蛋白質成分群によって、鶏血漿中 Alb. が構成されていることを示唆するものと考えられる。

要 約

1. 著者法により、鶏血漿中から単離された Albumin (Alb.) 成分群は、いずれも蛋白質を主とする Glucoprotein で、等電点 pH (pI) 区 4.4~6.0、沈降定数 (S) 4.1~4.9 の成分から構成されている。またこれらは、Disc 電気泳動法上からは、相対移動度 (RP) 100~85 間に 1-a (RP:100), 1-b₁ と b₂ (RP:92), 1-(b,c) (RP:89) および 1-c₁ と c₂ (RP:85) の 4 群 6 種の移動度成分に分類され、このうち、1-a 位成分は、Cellulose ace-

tate (CA) 電気泳動法上、血漿 Alb. 1 位 (RP:100) に、1-b 位両成分は Alb. 2 位 (RP:94.4) に、そして 1-(b,c) と c₁ および c₂ の 3 成分は Pre- α_1 -globulins (globs.) 位 (RP:93~82) に、それぞれ一致する移動度成分であることが確認された。

2. Forward (F)-Aspartate aminotransferase (GOT), Reverse (R)-GOT, F-Alanine aminotransferase (GPT) および R-GPT の 4 種に分類されるアミノ基転移酵素 (T-ase) の基質に対する分別 Alb. 各成分の活性態度によると、鶏血漿 Alb. 中には、1 種の Reversible GPT, 3 種の R-GPT isozyme および、R-GOT と R-GPT の両基質に触媒性を示す 2 個の isozyme 様 T-ase (CRT-ase) を含んでおり、これらは、いずれも R-GPT 活性基を共有する類属酵素群である。しかし F-GOT, R-GOT, Reversible GOT および F-GPT の各独立性基は含まれていない。

文 献

- 1) ADAIR, G. S. and ROBINSON, M. E. (1930): *Biochem. J.*, **24**, 993~1011.
- 2) ALLEN, R. J. L. (1940): *Biochem. J.*, **34**, 858~865.
- 3) 赤堀 (編) (1955): 酵素研究法, **1**, 129~136 頁, 東京, 朝倉書店.
- 4) 赤堀, 水島 (編) (1957): 蛋白質化学, **3**, 363~367 頁, 東京, 共立出版.
- 5) 赤堀, 水島 (編) (1958): 蛋白質化学, **2**, 285~395 頁, 東京, 共立出版.
- 6) 安藤, 寺山, 西沢, 山川 (編) (1967): 生化学研究法 II, 488~489 頁, 東京, 朝倉書店.
- 7) BLOCK, R. J., KELLER, S. and MILLER, D. W. (1959): *Arch. Biochem. Biophys.*, **83**, 426~435.
- 8) BRAND, E., Kassel, B. and SAIDEL, L. J. (1944): *J. clin. Invest.*, **23**, 437~444.
- 9) COHN, E. J., STRONG, L. E., HUGHES, W. L., Jr., MULFORD, D. J., ASHWORTH, J. N., MELIN, M. and TAYLOR, H. L. (1946): *J. Amer. chem. Soc.*, **68**, 459~475.
- 10) COMMON, R. H., MCKINLEY, W. P. and MAW, W. A. (1953): *Science*, **118**, 86~89.
- 11) DAVIS, B. J. (1964): *Ann. New York Acad. Sci.*, **121**, 404~427.
- 12) 藤井 (1964): 生化学実験法 (定量篇), 改訂 13 版, 37~510 頁, 東京, 南山堂.
- 13) GLEASON, T. L. and FRIEDBERG, F. (1953):

- Physiol Zool.*, **26**, 95~100.
- 14) GLICK, B. (1968): *Poult. Sci.*, **47**, 807~814.
 - 15) 金井 (1964): 臨床検査法提要, 改訂増補 21~23 版, VII-50~54 頁, 東京, 金原出版.
 - 16) KENDALL, F.E. (1941): *J. biol. Chem.*, **138**, 97~109.
 - 17) 黒田, 吉川, 中尾, 脇坂 (編) (1963): 血液化学, 514~520 頁, 東京, 朝倉書店.
 - 18) MACLAGAN, N. F. (1957): *Clin. Chem.*, **3**, 548~556.
 - 19) McMECKIN, T. L. (1939): *J. Amer. chem. Soc.*, **61**, 2884~2888.
 - 20) McMECKIN, T. L. (1940): *J. Amer. chem. Soc.*, **62**, 3393~3396.
 - 21) MEYER, K. (1945): *Adv. in Protein Chem.*, **II**, 249~275.
 - 22) 成田, 村上 (1964): クロマトグラフィーの実際, I, 63~65 頁, 東京, 広川書店.
 - 23) 小川 (1963): 日本臨床, **21**, 2419~2426.
 - 24) ONCLEY, J. L., MELIN, M. RICHERT, D. A., CAMERON, J. W. and GROSS, P. M., Jr. (1949): *J. Amer. chem. Soc.*, **71**, 541~553.
 - 25) ORNSTEIN, L. (1964): *Ann. New York Acad. Sci.*, **121**, 321~349.
 - 26) SCHADE, A. L. and CAROLINE, L. (1944): *Science*, **100**, 14~15.
 - 27) SCHMID, K. (1953): *J. Amer. chem. Soc.*, **75**, 2532.
 - 28) 曾良, 川出, 山本 (訳) (1961): 実験免疫化学, 320~375 頁, 東京, 岩波書店.
 - 29) WEIMER, H. E., MEHL, J. W. and WINZLER, R. J. (1950): *J. biol. Chem.*, **185**, 561~568.
 - 30) 山田 (1967): 日獣誌 (学会号), **29**, 136.
 - 31) 山田 (1968): 日獣誌 (学会号) **30**, 38~39.
 - 32) 山田 (1969): *Bull. Univ. Osaka Pref.*, Ser. B, **21**, 343~345.
 - 33) 山田 (1971): 日獣誌, **33**, 237~249.
 - 34) 山田 (1971): 日獣誌, **33**, 301~314.
 - 35) 山田 (1972): 日獣誌, **34**, 39~48.
 - 36) 山田 (1972): 日獣誌, **34**, 207~221.
 - 37) 吉川 (1962): 臨床医化学, I (実験篇), 236~310 頁, 東京, 協同医書出版社.

ASPARTATE- AND ALANINE-AMINOTRANSFERASE ACTIVITIES AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF ALBUMIN COMPONENTS SUBFRACTIONATED FROM FOWL BLOOD PLASMA

Kazuhiko YAMADA

*Department of Animal Physiology and Feeding, College of Agriculture,
University of Osaka Prefecture, Sakai, Osaka*

(Received for Publication February 8, 1972)

In view of the results of experiments³⁴⁻³⁶⁾ conducted to fractionate the transaminases in fowl blood plasma, some of these enzymes called forward (F)-aspartate aminotransferase (GOT), reverse (R)-GOT, F-alanine aminotransferase (GPT), and R-GPT were presumed to be contained in a limited number of albumin components^{35,36)}. No effective verification of this conjecture, however, could be made for lack of detailed information on any systematic method for the subfractionation of fowl blood plasma albumin. Naturally, the physicochemical properties of those enzymes have been left unknown due to insufficient data.

In the present investigation, a practical solution was reached for these problems by means of the author's method introduced. This report gives an outline of the method used for subfractionation of plasma albumin. The results obtained are summarized as follows.

1. Disc electrophoretic analysis revealed that plasma albumin consisted of six different components classified into four large divisions. The components were called I-a, I-b₁, I-b₂, I-(b, c), I-c₁, and I-c₂. Their relative positions are shown in detail in the remarks of Table 3.

The major part of the albumin was occupied by two components, I-a and I-(b, c). The ratio of both components to the total albumin was approximately 93%. The yield per total albumin was maximum.

2. The albumins subfractionated were characterized by the following physicochemical properties.

(a) Their isoelectric points were in a range of pH from 4.4 to 6.0. The isoelectric points of components I-a and I-(b, c) were found to be 4.7 and 4.8, respectively.

(b) Their sedimentation constants ranged from a minimum value of 4.1 to a maximum value of 4.9. The sedimentation constants of the two components mentioned above were found to be 4.4 and 4.6, respectively.

(c) The different absorbancy of each component has been interpreted as indicating the presence of six different types of conjugated protein. The greater part of each component, however, consisted of protein.

(d) The albumins were classified roughly into a group of glucoprotein. The conclusion was indicated by the hexosamine content included in each of the components.

3. When the criteria described in Tables 3, 4-A, and 4-B were applied, a more detailed classification was made for the transaminases which were usually classified into four large divisions. The classification finally reached is illustrated as follows.

Transaminase	Component	Remarks
F-GOT	—	—
R-GOT	—	—
reversible GOT	—	—
F-GPT	—	—
R-GPT	I-a, I-c ₁ , and I-c ₂	Isozymes
reversible GPT	I-b ₂	—
CRT-ase*	I-b ₁ , and I-(b, c)	Isozyme-like

* The transaminases are related to the transamination reaction of the substrates of both R-GOT and R-GPT.

On the basis of this classification, the following conclusions could be drawn.

(a) The albumin components were positive for the transamination reaction, as was expected. None of them reacted as a self-supporting transaminase, as pointed out from the observation on F-GOT, R-GOT, reversible GOT, and F-GPT mentioned above.

(b) The albumin components subfractionated supported all the active fragments of R-GPT.

(c) The albumins contained the following transaminases: three isozymes of the group of R-GPT, two isozyme-like CRT-ases, and a reversible GPT.

As mentioned above, the difficulties of obtaining several kinds of transaminases from fowl blood plasma albumin were overcome by the efficient method developed by the author. The properties described above not to mention any other property, will have to be taken into consideration when such fractionation is to be carried out on this albumin.

EXPLANATION OF PLATE

Fig. 1. Source sample 5.

Remarks.

Albumin*: This component ranged from 100 to 85 in relative position and contained the following components: I-a, I-b₁, I-b₂, I-(b, c), I-c₁, and I-c₂.

Fig. 2. Component I-a

Remarks.

The relative position of this component is 100.

Figs. 3 and 4. Component I-b₁ and I-b₂, respectively.

Remarks.

Both components conjugated at a relative position of 92.

Fig. 5. Component I-(b, c)

Remarks.

For convenience' sake, the component migrating in between I-b and I-c is indicated by I-(b, c). The relative position of this component is 89.

Figs. 6 and 7. Component I-c₁ and I-c₂, respectively.

Remarks.

Both components conjugated at a relative position of 85.

In addition, each of the bands is nine times as long as the actual width. Its area is twelve times as wide as the actual area in acrylamide gel. Detailed information is given in the remarks of Tables 1 and 3.