Yersinia (Pasteurella) pseudotuberculosis による 仮性結核病の病理学的研究

IV. 山羊にみられた自然感染の1例

森田 迪夫*・中松 正雄・五藤 精知
鳥取大学農学部家畜病理学教室

(昭和47年10月9日受付)

緬山羊の *Yersinia (Pasteurella) pseudotuberculosis* による仮性結核病は、従来、*Corynebacterium pseudotuberculosis* による仮性結核病、および *Pasteurella* 属の菌による疾病と混同されていた。*Yersinia pseudotuberculosis* による仮性結核病が報告されたのは、今世紀にはいつてからである。しかもそれに関しては、病理学的報告に乏しい。

山羊では、CZAPLEWSKI³⁾ が腸間膜リンパ節から本菌を分離したのが始めのようである。その後 BAUMANN¹⁾ が、著しい消瘦および下痢で死亡した1例を、RAJAGOPALAN and SANKARANARAYANAN²¹⁾ が悪液質および肺炎症状を呈して死亡した1例を、宮本ら¹⁴⁾ が下痢および消瘦を主要症状とした1例を、さらに MOLLARET and PLACIDI¹⁵⁾ が流産胎児の1例を、それぞれ報告している。

また緬羊では、前世紀後半に本病と思われる報告がいくつかある。多くの研究者は、TRUCHE²²⁾ によって原因菌の同定がなされた GILRUTH⁷⁾ の報告例を、最初の報告例としてあげている。その後多くの研究者の自然発生例の報告がある^{11~13, 16, 18, 19, 20, 24)}。さらに DUNGAL⁴⁾ は肺炎病巣から、BEVERIDGE²⁾ は肺炎病巣および壊死巣から、*Yersinia pseudotuberculosis* 類似の菌を分離している。

著者らはこれまでに、家兔^{6, 9)} および豚¹⁷⁾ の仮性結核病について報告した。今回肝、脾および腸間膜リンパ節から *Yersinia pseudotuberculosis* が分離された山羊の自然感染例1例を剖検する機会を得た。そこで、その病理学的所見を報告する。

材料と方法

本動物は、鳥取市の農家で飼育されていた2才の雌山羊である。1963年秋、2頭の子山羊を分娩(初産)したが、子山羊は生後間もなく死亡した。その後の経過は不良で、本学農場に移され、繋養されていたが、一週後起立不能に陥り、その一週後に死亡した。剖検後、各臓器を10倍ホルマリン液に固定、パラフィン切片とし、ヘマトキシリン・エオジン染色、必要に応じて、ワンギーソン染色、アザン染色、GOMORI の格子線維染色およびグラム染色を施した。

成 績

1. 病理学的所見

a. 肉眼所見：肝および腸間膜リンパ節にケシの実大ないし粟粒大の灰白色の小結節の密在が特に注目された。脾では、結節の数は少なかったが、肝、腸間膜リンパ節に比して大きかった。

その他、腸間膜リンパ節の高度の腫脹、脾腫、急性気管支肺炎、および両葉にわたる肺水腫、特に盲腸および結腸における急性カタル性およびジフテリー様腸炎、大腸漿膜面における壊死結節形成、肝における融解壊死巣、腎の混濁および斑点形成、胸腔および腹腔水腫、さらに心外膜の浮腫などの変化が認められた。

b. 顕微鏡所見：肝、脾および腸間膜リンパ節に認められた灰白色の小結節は、組織学的に次のように分けられた。

(1) 周囲に肉芽組織をめぐらす中心壊死結節：この種のいわゆる仮性結節は、肝、脾、腸間膜リンパ節および脾、十二指腸リンパ節にみられ

* 現所属：千葉県血清研究所

たが、臓器により、多少様相を異にしていた。肝では核濃縮、核崩壊の強い壊死巣が、多くは孤在していた(Fig. 1)。脾および腸間膜リンパ節では、結節病巣が融合して、大きな壊死巣を形成し、凝固壊死に陥っているのもみられた(Fig. 6, 7)。かかる小壊死巣は、脾、十二指腸リンパ節では、周縁洞および梁材周囲のリンパ洞に存在していた。さらに腸間膜および肝(Fig. 3)では、周囲の肉芽組織層は概して厚かった。壊死の周囲および内部には、粗大な線維を混じえた格子線維がよく発育していた(Fig. 9, 10)。一般に小病巣では、中心部に菌塊を含み、その周囲には組織球性細胞および好中球が集簇し、壊死は菌塊周囲に多くみられた(Fig. 2)。その比較的大きな病巣では、菌塊は壊死周囲に偏在する傾向がみられた。

(2) 硝子様、敗血症性血栓を伴う壊死性結節：この種の結節は、肝、腸間膜リンパ節および肺にみられた。肝では小葉間静脈および中心静脈中心性に、(1)項の病巣とともに、比較的多く形成されていた。腸間膜リンパ節では比較的大きな血管周囲性に、さらに肺では肺胞壁毛細血管周囲性に、形成されていた。血栓の周囲には、組織球性細胞および好中球が集簇し、壊死は血栓周囲に多くみられた(Fig. 4, 8)。

(3) 以上の結節病巣のほかに、肝には、おもに組織球性細胞から成る比較的大きな肉芽腫性細胞結節(Fig. 5)、好中球が主体をなす化膿性細胞結節が、(1)(2)両項の病巣とともに散在していた。肉芽腫性細胞結節では、一部壊死が認められるものもあったが、菌塊は認められなかった。

以上の特徴的病巣のほかに、各臓器のおもな変化は、下記のとおりである。

肝：実質の凝固壊死巣、出血巣、血栓形成、肝蛭の寄生を伴った空洞形成、胆管の増生を伴った小葉間結合組織の増生、瀰漫性白血球浸潤、および細網内皮系細胞の活性化がみられた。

脾：濾胞の腫大および粗性化、細網内皮系細胞の活性化、好中球の増数(特に濾胞周囲)がみられた。なお前記の仮性結核結節は、赤脾髄のみに認められた。

腎：巣状の間質性腎炎、尿細管上皮の変性、および尿細管における石灰様物質の沈着が認められた。

心：心外膜下織における浮腫および巣状出血がみられた。

肺：剝離性の変化が強い急性気管支肺炎、肺胞および間質の水腫がみられた。

胃：軽度のカタル性変化がみられるのみであった。

腸：大腸の一部にジフテリー様炎がみられたほかは、カタル性炎が認められるのみであった。一方、肉眼的に認められた漿膜面の壊死性結節は、異物巨細胞を混ざる肉芽組織に囲まれた凝固壊死巣で、これらの中に腸結節虫の子虫を認めたものもあった。

腸間膜リンパ節：リンパ洞内皮細胞の増殖および剝離、リンパ濾胞の増大および増生、リンパ洞の拡張および静脈性充血がみられた。なお前記の仮性結核結節および血栓を伴う病巣は、リンパ濾胞には認められなかった。

気管支リンパ節および脾、十二指腸リンパ節には、腸間膜リンパ節と同様の変化がみられた。

中枢神経系およびその他の臓器には、特記すべき変化は認められなかった。

2. 細菌学的検索

肝、脾および腸間膜リンパ節から、*Yersinia pseudotuberculosis* type I が分離された。その性状は、板垣および坪倉¹⁰⁾、坪倉ら²³⁾によってすでに報告されている。

本例から分離された菌をマウス腹腔内に接種した。その結果、18例中6例、細別すれば、 10^{-3}mg で4例中3例が、 10^{-4}mg で5例中2例が、 10^{-5}mg で5例中1例が、接種後11日目までに死亡した。

肉眼的には、特に接種菌量が多い例に、肝、脾の腫大およびケシの実大ないし粟粒大の限局した壊死巣の形成がみられた。

組織学的には、本菌による病巣は、肝で18例中15例に、脾で18例中11例に、肺で18例中5例に、および腸間膜リンパ節で18例中2例に認められた。

考 察

緬山羊における本菌による限局病巣を、BAUMANN¹⁾は肝および腸間膜リンパ節に、RAJAGOPARAN and SANKARANARAYANAN²¹⁾は肝および肺

に、宮本ら¹⁴⁾は肝、脾および腸間膜リンパ節に、JAMIESON and SOLTYS¹¹⁾は精巣および精巣上体に、PULLAR²⁰⁾は肝、脾およびそれらの付属リンパ節に、PLACIDI ら¹⁹⁾は肺に、KAMIŃSKI¹²⁾は肝に、WATSON and HUNTER²⁴⁾は肝に、NAGY¹⁸⁾は肝、脾および腸間膜リンパ節に、MORIN and GSTACH¹⁶⁾は肝に、それぞれ認めている。またその限局巣の大きさは、本例に認められたケシの実大から、NAGY¹⁸⁾が認めたくるみ大まで、まちまちである。JAMIESON and SOLTYS¹¹⁾は、内部臓器に限局病巣が存在しないこと、また限局病巣をみない化膿性精巣および精巣上体炎を報告している。それ以外の報告例では、限局病巣は内部臓器に存し、またその性状も、壊死性肉芽腫性結節、すなわち仮性結核結節が主体をなしているようである。

肉眼的に特徴ある変化として肝に認められる限局病巣を、WATSON and HUNTER²⁴⁾は次の2つの型に分けている。(1) 正常な肝組織とは明瞭に区別され、中心部には、わずかの好中球とリンパ球の浸潤、および変性した肝細胞をみ、周囲は線維性被膜からなる病巣。(2) 中心性壊死を伴った炎症巣で、周囲には線維性被膜が存在せず、中心部は大食細胞とわずかの好中球、単核細胞で占められた病巣。

これらの2つの型の病巣は、像を異にするが、いわゆる仮性結核結節である。本例の場合、線維化した仮性結核結節は認められなかったが、肝には、壊死性変化が弱く、肉芽組織の増生が盛んな結節が存在した。また宮本ら¹⁴⁾は、仮性結核結節のほかに、肉芽腫性の形成を認めている。本例の場合にも、肝に同様の肉芽腫性細胞結節が存在し、さらに化膿性細胞結節および敗血症性、硝子様血栓を伴う結節病巣がみられた。なおいずれの臓器および結節病巣にも、家兎^{6,9)}および豚例¹⁷⁾にみられたような多核巨細胞の出現は、認められなかった。

既報の著者らの家兎^{6,9)}および豚例¹⁷⁾のように、今回の山羊例も、腸、腸間膜リンパ節および肝の病変から、感染は経口感染によるものと考えられる。しかしながら若干の研究者^{5,8,15)}による各種動物を用いた消化管感染の実験では、感染の成立はむずかしいようである。MOLLARET and PLACI-

DI¹⁵⁾の山羊実験例では、内部臓器に肉眼病変は認められなかったが、投与数週後も本菌が糞中に排出されていることが確認された。それ故、自然界での経口感染の成立は、単純な本菌の摂取だけでは困難なようである。

KAMIŃSKI¹²⁾およびNAGY¹⁸⁾のいう飼育中の諸要素、PLACIDI ら¹⁹⁾、KAMIŃSKI¹²⁾およびNAGY¹⁸⁾があげている寄生虫病、さらにPULLAR²⁰⁾が述べている寒冷感作などの諸条件が、複合的に作用して、経口感染は成立するものと思われる。本例も、寒冷期における粗悪な飼育管理、腸結節虫および肝蛭の感染、さらに妊娠による体力消耗などの前提条件があつて、消化管感染が成立したのではなからうか。

さらに本例では、子山羊が生後間もなく死亡した。MOLLARET and PLACIDI¹⁵⁾の山羊、およびWATSON and HUNTER²⁴⁾、MORIN and GSTACH¹⁶⁾の緬羊の流産胎児例からの本菌の分離、さらに本例の産後の経過不良などを考慮すると、子山羊の死亡は、本病と何らかの関係があつただろうと容易に想像される。

総 括

1963年12月、鳥取市において発生した山羊のYersinia (Pasteurella) pseudotuberculosis による仮性結核病1例を、病理学的に検索した。この山羊は約2才で、2頭の子山羊を分娩したが、子山羊は生後間もなく死亡した。その後、山羊は経過不良で消瘦し、分娩1週後に起立不能に陥り、その翌週死亡した。

肉眼的には、肝、脾および腸間膜リンパ節に、ケシの実ないし粟粒大の灰白色限局病巣が形成され、脾腫、腸間膜リンパ節の腫大、急性気管支肺炎、カタル性・ジフテリー様腸炎が認められた。

肉眼的に認められた限局病巣は、組織学的に次のように分けられた。

(1) 肝、脾、腸間膜リンパ節および脾、十二指腸リンパ節にあり、肉芽組織に囲まれ、しばしば菌塊を伴う中心壊死結節：これらの限局病巣は、脾および腸間膜リンパ節では融合し、凝固壊死に陥っていた。肉芽組織は、腸間膜リンパ節および肝では比較的良好に発達していたが、その他で

は一般に貧弱であった。

(2) 肝, 肺および腸間膜リンパ節にあり, 敗血症性, 硝子様血栓を伴う限局病巣: 壊死を伴って, 大食細胞および好中球が血栓の周囲に堆積していた。

(3) 肝にあり, おもに組織球性細胞からなる肉芽腫性細胞結節および化膿性細胞結節。

仮性結核菌 *Yersinia pseudotuberculosis* type I が, 肝, 脾および腸間膜リンパ節から分離された。分離菌をマウスに腹腔内接種すると, 特徴的な病巣が肝, 脾, 腸間膜リンパ節, 肺および腎に形成された。

肝蛭および腸結節虫の感染, 妊娠, および寒冷期における粗悪な飼育管理による体力消耗が, 本病の病理発生に大きな影響を与えたものと考えられた。

稿を終わるに当たり, 仮性結核菌の分離に協力された鳥取大学農学部家畜微生物学教室に深謝する。

文 献

- 1) BAUMANN, R. (1927): *Z. Infekt.-Kr. Haustiere*, **31**, 141~146.
- 2) BEVERIDGE, W. B. (1937): *Aust. vet. J.*, **13**, 155~157.
- 3) CZAPLESKI: 文献 (1) より引用.
- 4) DUNGAL, J. A. (1931): *J. comp. Path.*, **44**, 126~143.
- 5) EIELAND, E. (1947): *Norsk. Vet. T.*, **59**, 85~90 [*Vet. Bull.*, **19**, 594 (1949)].
- 6) 藤原, 板倉, 五藤 (1958): 鳥取農学会報, **11**, 308~315.
- 7) GILRUTH, J. A. (1911): *Vet. J.*, **18**, 541~545.
- 8) GORET, P., COLLET, P., JOUBERT, L. and PILET, C. (1955): *Bull. Soc. Sci. vét. Lyon*, **57**, 205~227 [*Vet. Bull.*, **27**, 60 (1957)].
- 9) 五藤, 猪口 (1954): 鳥取農学会報, **10**, 161~168.
- 10) 板垣, 坪倉 (1964): 日本獣医学雑誌, **26** (学会号), 375.
- 11) JAMIESON, S. and SOLTYS, M. A. (1947): *Vet. Rec.*, **59**, 351~355.
- 12) KAMIŃSKI J. (1959): *Med. Wet.*, **15**, 586 [*Vet. Bull.*, **30**, 166 (1960)].
- 13) LARRAT, R. (1948): *Rev. Elev. Méd. vét. Pays trop.*, **2**, 237~238 [文献 (15) より].
- 14) 宮本, 尾形, 佐伯 (1954): 日本獣医学雑誌, **15** (学会号), 110.
- 15) MOLLARET, H. H. and PLACIDI, L. (1964): *Rec. Méd. vét.*, **140**, 515~524.
- 16) MORIN, J. C. and GSTACH, C. (1967): *Rec. Méd. vét.*, **143**, 1247~1252.
- 17) 森田, 中松, 五藤 (1968): 日本獣医学雑誌, **30**, 233~239.
- 18) NAGY, A. (1963): *Mag. állatov. Lapja.*, **18**, 294~296 [*Vet. Bull.*, **34**, 317 (1964)].
- 19) PLACIDI, L. SANTUCCI, J. and BELOP, P. (1951): *Maroc méd.*, **314**, 654~656 [文献 (15) より引用].
- 20) PULLAR, E. M. (1932): *Aust. vet. J.*, **8**, 181~183.
- 21) RAJAGOPALAN, V. R. and SANKARANARAYANAN, N. S. (1944): *Indian J. vet. Sci.*, **14**, 34~36 [*Vet. Bull.*, **15**, 384 (1945)].
- 22) TRUCHE, M. (1938): *Rev. Path. comp.*, **38**, 874~884.
- 23) TSUBOKURA, M., ITAGAKI, K. and KAWAMURA, K. (1970): *Jap. J. vet. Sci.*, **32**, 227~233.
- 24) WATSON, W. A. and HUNTER, D. (1960): *Vet. Rec.*, **72**, 770~772.

PATHOLOGICAL STUDIES ON PSEUDOTUBERCULOSIS CAUSED BY *YERSINIA (PASTEURELLA) PSEUDOTUBERCULOSIS*

IV. A SPONTANEOUS CASE IN THE GOAT

Michio MORITA, Masao NAKAMATSU and Masatomo GOTO

Department of Veterinary Pathology, Faculty of Agriculture, Tottori University, Tottori

(Received for Publication October 9, 1972)

A spontaneous case of pseudotuberculosis caused by *Yersinia (Pasteurella) pseudotuberculosis* was found in a goat in Tottori city and examined pathologically.

The goat examined was about 2 years old and in December, 1963, gave birth to 2 kids which died shortly after birth. Afterward, it became emaciated and astatic gradually and died two weeks later. At necropsy, grayish-white foci of poppy-seed to milliary size were present in the liver, enlarged spleen, and swollen mesenteric lymph nodes. In addition, catarrhal broncho-pneumonia and diphtheroid and catarrhal enteritis were observed.

Microscopically, these foci were classified into the following groups.

1) Central necrotic foci surrounded by granulation tissue and often accompanied by bacillary masses. They were observed in the liver, spleen, mesenteric lymph nodes, and pancreatico-duodenal lymph nodes. They were fused with one another and fell into coagulation necrosis in the spleen and mesenteric lymph nodes. Granulation tissue was poor in all the organs, except the liver and mesenteric lymph nodes where it was comparatively well developed.

2) Foci with septic and hyaline thrombi. They were observed in the liver, lung, and mesenteric lymph nodes. Macrophages and leukocytes were accumulated around the thrombi causing necrosis.

3) A granulomatous cell-nodule consisting principally of macrophages and a purulent cell-nodule. They were observed in the liver.

Yersinia pseudotuberculosis type I was isolated from the liver, spleen, and mesenteric lymph nodes. Intraperitoneal inoculation of the isolate killed mice, which showed characteristic lesions in different organs.

The authors speculated that infection with *Fasciola hepatica* and *Oesophagostomum* sp. and deficiency of physical strength due to pregnancy and poor feeding and management in the cold season might play an important role in the pathogenesis of this disease.

EXPLANATION OF PLATES

Figs. 1~8 are of specimens stained with hematoxylin and eosin.

PLATE I

Fig. 1. Liver. A central necrotic focus surrounded by granulation tissue. Bacillary masses are present in the periphery of the necrotic focus. $\times 200$.

Fig. 2. Liver. A small necrotic focus with bacillary masses in the central part. $\times 400$.

- Fig. 3. Liver. A central necrotic focus surrounded by comparatively well developed granulation tissue. No bacillary masses are present. $\times 200$.
Fig. 4. Liver. Foci with septic and hyaline thrombi. $\times 310$.
Fig. 5. Liver. A granalomatous cell-nodule. $\times 310$.

PLATE II

- Fig. 6. Spleen. Large necrotic foci showing coagulation necrosis. $\times 180$.
Fig. 7. Mesenteric lymph node. Multiple necrotic foci, including a large focus of coagulation necrosis. $\times 37$.
Fig. 8. Lung. Foci with septic and hyaline thrombi. $\times 180$.
Fig. 9. Liver. Reticulum fibers well grown around and into central necrotic foci. Gomori's argyrophil fiber staining. $\times 170$.
Fig. 10. Mesenteric lymph node. Reticulum fibers well grown around and into necrotic foci. Gomori's argyrophil fiber staining. $\times 120$.