エゾヒグマ頭蓋の形態学的研究

III. 歯牙の咬耗様式と頭蓋成長について

末 永 義 圓

北海道大学医学部解剖学教室

(昭和47年10月2日受付)

歯牙の咬耗様式は、食生活と密接に関連しており、動物個体の生活史を知るうえで、極めて有効な指標の一つと思われる。

著者は、ヒグマ頭蓋の形態学的研究の一環として、既報においては、頭蓋の大きさの変動²²⁾、および縫合消滅の順位性²³⁾について報告した。今回は、ヒグマ頭蓋の成長に伴ってみられる歯牙の咬耗様式について観察した。

歯牙の咬耗様式については、古くから、歯牙の萌出期および乳歯より永久歯への歯牙交換期とともに、年令との対応関係において、注目されてきた。ヒトの場合は、年令がはっきりしているもので、各年代における咬耗様式の詳細な形態学的研究がみられる^{4,11,24,25)}。

一方、家畜においては、年令鑑定の一指標として、歯牙の萌出期やその交換期が既に明らかにされている^{3,6,8,9,14,15,18,20)}。しかし、永久歯の咬耗様式については、家畜の中でも、馬および犬において記載をみるに過ぎない^{9,15)}。

他方、野生動物の歯牙咬耗に関する報告は極めて少ない。とくにヒグマについては、MIDDEN-DORFF¹²⁾、SCHÄFF¹⁶⁾、および STICKLEY²¹⁾ の記載をみるだけのものである。しかも、これらのヒグマに関する報告には、咬耗度基準が明記されていない。

著者は、ヒグマの歯牙咬耗様式について、ヒトに関する MARTIN and SALLER¹¹⁾ の方法を参照し、ヒグマの咬耗度基準を設定して観察した。ヒグマの歯牙形態は、ヒトのものと異なり、切歯、犬歯、前臼歯および後臼歯で、部位的にそれぞれ著しく相違している。また、犬歯と前臼歯においては、咬耗様式の変化に乏しく、これらの歯牙咬耗は、大部分がエナメル質のみに限定している。後臼歯では、歯冠の多咬頭性により、咬耗度基準の設定

が困難であった。したがって、ヒグマ頭蓋の全歯牙の中で、とくに比較的類似した歯冠の形態を有する上顎切歯と下顎切歯に着目し、それらの咬耗様式について検討した。

さらに、ヒグマ頭蓋の成長に伴う各形質間の相互関係を明らかにするために、これらの歯牙咬耗度および先に報告した縫合消滅度²³⁾、基底頭蓋長(B-P)²²⁾などとの相対成長について、比較検討した。

材料および方法

材料は、既報²²⁾において計測に使用したヒグマ頭蓋標本65個の中から、切歯に脱落のないもの52個(雄34, 雌18)を用いた (Table 1)。

野生ヒグマと飼育ヒグマとでは、生活様式が異なるために、歯牙の咬耗様式にも差異のあることが予想されるので、両者を区別して検討した。

ヒグマの切歯、犬歯、前臼歯および後臼歯では、歯冠咬合面の形態がそれぞれ著しく異っている。したがって、一つの咬耗度基準を用いて、全歯牙の咬耗様式を段階的に区分することは困難であった。著者は、全歯牙のうちで、比較的類似した歯冠の形態を有する上顎切歯と下顎切歯について、咬耗度基準を設けて観察した。その基準は、MARRIN and SALLER¹¹⁾ のヒトの歯牙咬耗度に関するつぎの5段階を、ヒグマに応用したものである。

- 0 度: 咬耗が全く認められないもの。
- 1 度: エナメル質は咬耗しているが、咬頭はなお明瞭なもの。
- 2 度: 黒褐色様の小点が、咬耗した象牙質にみられるもの。
- 3 度: 咬合面のすべてのエナメル質が咬耗しているもの。

Table 1. Materials Used for Observation

Bear skull	Sex		Total
	Male	Female	
Wild brown bear	23	16	39
Captive brown bear	11	2	13
Total	34	18	52

Table 2. Pattern and Degree of Abrasion of Dentes Incisivi

Pattern	Degree
A No abrasion	0
B Abrasion of enamelum	1
C Dotting abrasion of dentinum	2
D Plane abrasion of dentinum	3
E Abrasion of dentinum continuing from basal tubercle to mamelon	4
F Formation of a dark ring on dentinum	5
G Abrasion of whole dentinum on the occluding surface	6
H Formation of secondary dentine	7
I Abrasion of dentinum up to the neck of the tooth	8

4 度: 咬耗により歯冠が, 歯頸部近くまで消滅しているもの。

ヒグマの切歯の場合は, その咬耗度を, Table 2 に示すように, 0 度から 8 度までの 9 段階に区分した。

無咬耗のものと, エナメル質のみ咬耗しているものを, MARTIN and SALLER と同様に, それぞれ 0 度と 1 度に区分した。象牙質では, その形態により, 点状咬耗を 2 度, 面状咬耗を 3 度, また咬耗により露出した象牙質が, 基底結節 (basal tubercle) から切縁結節 (mamelon) へ連続するものを 4 度, 象牙質に黒褐色のリングが形成されたものを 5 度 (MARTIN and SALLER の 2 度), 咬合面の全象牙質が露出したものを 6 度 (MARTIN and SALLER の 3 度) とした。黒褐色のリング内に, 第 2 象牙質 (secondary dentine) の形成が認められるようになったものは 7 度とした。高令のものでは, 歯冠の部分が咬耗により消滅し, 咬合面が歯頸部に達した。これを 8 度 (MARTIN and SALLER の 4 度) とした。各歯牙間の部位的变化については, 平均咬耗度 = 咬耗度総計 / 観察歯数の公式によって検討した。

観 察 所 見

1. ヒグマ歯牙の一般形態

クマ科の歯式は, 犬科のものと同様に, 一般的には $\frac{3}{3} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{4}{4} \cdot \frac{2}{3} = 42$ で示される。この歯式は, ツキノワグマ (*Selenarctos thibetanus* HEU. DE) においては妥当と思われる。しかし, ヒグマの前臼歯には歯数異常例が多数に認められるので, 再検討されなければならないと思われる。すなわち, 下顎の第 2 前臼歯に約 80%, 下顎第 3 前臼歯に約 70%, および上顎第 2 前臼歯に約 50% と, 著しい歯数不足例が認められたからである (Figs. 8, 9, 16, 17)。その他, 下顎第 1 切歯に約 7% の歯数不足例も認められた (Fig. 12)。なお, ヒグマにおいては, 歯式を完全に満たしているものは, わずかに全体の約 4% に過ぎなかった。

ヒグマの切歯の切縁結節は, 上顎と下顎とで多少異なった形態を示している。すなわち, 上顎切歯においては, 近心結節 (medial tubercle) と遠心結節 (distal tubercle) が未発達であり単一の中心結節 (central tubercle) のみからなる。一方, 下顎切歯においては, 上顎のものと同様に, 近心結節は未発達であるが, 遠心結節は認められ, 中心結節は最もよく発達する。なお, 下顎第 3 切歯の遠心結節は, 比較的良好に発達している。

下顎第 2 切歯には, 他の切歯群のものと異なり, やや後退して植立する傾向が認められた。そのため, 下顎切歯においては, 歯列弓 (dental arch)

Table 3. Mean Values of Abrasion on Each Incisor of Male Skulls

Kind and No. of bears	Maxillary incisors						Mandibular incisors					
	I ₃	I ₂	I ₁	I ₁	I ₂	I ₃	I ₃	I ₂	I ₁	I ₁	I ₂	I ₃
Wild (23)	2.87	3.96	4.78	4.91	3.83	2.74	2.17	2.43	2.43	2.43	2.43	2.13
Captive (11)	2.91	3.36	4.00	3.73	3.45	2.90	2.90	3.27	3.00	3.00	3.27	3.18
Total (34)	2.88	3.76	4.58	4.53	3.71	2.79	2.41	2.71	2.62	2.62	2.71	2.47

Table 4. Mean Values of Abrasion on Each Incisor of Female Skulls

Kind and No. of bears	Maxillary incisors						Mandibular incisors					
	I ₃	I ₂	I ₁	I ₁	I ₂	I ₃	I ₃	I ₂	I ₁	I ₁	I ₂	I ₃
Wild (16)	2.13	3.69	4.75	4.75	3.75	2.25	1.63	1.69	1.81	1.81	1.69	1.56
Captive (2)	2.50	3.00	4.00	4.00	3.00	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Total (18)	2.17	3.61	4.67	4.67	3.67	2.28	1.78	1.83	1.94	1.94	1.83	1.72

と歯槽弓 (alveolar arch) とが一致していない (Fig. 9).

切歯における咬合形式をみると、幼令時には切端咬合 (kophbiss) を示すが、年令が進むに伴い、鋏状咬合 (Scherenbiss) へと移行するようである。上顎切歯においては、咬合形式の変化に伴い、その咬耗部位も、切縁結節から基底結節にかけて認められた。一方、下顎切歯においては、その咬耗部位が、おもに切縁結節に限られていた。

犬歯は、著しく大きく、円錐形を呈している。上顎犬歯は、下顎の、犬歯と第3切歯の間に咬合している。したがって、下顎犬歯の咬合面は近心舌側面と遠心頬側面の両側にみられるが、一方、上顎犬歯の咬合面は、近心舌側面のみである。

前臼歯は、上顎第4前臼歯 (P₄) を除くと、互に直接咬合しないで、この部の上顎と下顎は離開している (Fig. 7)。P₄ は、下顎の第1後臼歯と咬合している。ヒグマの前臼歯は、一般に P₄ を除いて、著しい矮小歯 (zwergzahn) であり、退化的傾向にある歯牙であると思われる^{1,2)}。犬歯と P₄ 以外の前臼歯では、その咬耗様式に変化が乏しく、咬耗度はエナメル質の部分に限られていた。下顎の第4前臼歯 (P₄) は単咬頭であるが、近心部と遠心部に、それぞれ未発達な副咬頭がみられた。一方、上顎の第4前臼歯 (P₄) は、よく発達した3咬頭 [近心舌側咬頭 (Protocone), 近心頬側咬頭 (paracone), 遠心頬側咬頭 (metacone)]

を有している。

後臼歯は、典型的な被蓋咬合形式を呈している。各咬頭は、中心溝をはさんで両側の、それぞれ頬側咬頭群と舌側咬頭群に分れている¹³⁾。上顎では、頬側咬頭群は外側に位置し、舌側咬頭群は下顎後臼歯の各中心溝と咬合している。また下顎では、後臼歯の頬側咬頭群は上顎後臼歯の各中心溝と咬合し、舌側咬頭群は内側に位置している。したがって後臼歯のおもな咬耗部位は、上顎の舌側咬頭群と下顎の頬側咬頭群および各中心溝である。

2. 切歯の咬耗様式

最初の咬耗は、中心結節のエナメル質に認められた (咬耗度 1, Fig. 10)。次いで、中心結節では、咬耗により象牙質が露出する。その咬耗形態は、点状 (咬耗度 2) から面状 (咬耗度 3, Fig. 11) となる。さらに咬耗様式が進行すると、上顎では中心結節と基底結節の象牙質が連続する (咬耗度 4, Fig. 12)。中心結節の象牙質には、濃褐色のリングが形成される (咬耗度 5, Fig. 5, Fig. 13)。その後、全咬合面でエナメル質は消失し、象牙質が露出する (咬耗度 6)。濃褐色のリング内には、第二次象牙質 (secondary dentine) の形成が認められる (咬耗度 7, Fig. 14)。咬耗が最も進行したものでは、極度に象牙質が消失し、咬合面が歯頸部にまで達するようになる (咬耗度 8, Fig. 15)。

切歯の各歯牙別の平均咬耗度は、性別とともに

Fig. 1. Abrasion Patterns of Maxillary Incisors in Male Skulls

Fig. 2. Abrasion Patterns of Mandibular Incisors in Male Skulls

Fig. 3. Abrasion Patterns of Maxillary Incisors in Female Skulls

Fig. 4. Abrasion Patterns of Mandibular Incisors in Female Skulls

に, Tables 3, 4 に示してある. またこれらの値を, 折れ線グラフを用いて, Figs. 1~4 に図示した.

雄ヒグマの上顎切歯には, 各歯牙間で, 咬耗度に明らかな部位的差異が認められた (Fig. 1). すなわち, 咬耗度は第1切歯で最も高く, 次いで第2切歯, 第3切歯へとその値が順次低くなっている. このことは, 最初に咬耗する歯牙が第1切歯であり, 次いで第2切歯, 第3切歯へと, その咬耗様式が進行するものと思われる. この咬耗度の部位的差異を, 野生ヒグマのものと, 飼育ヒグマのものとで比較すると, 前者のほうにその段階性が著しく強いという傾向が認められた.

一方, 雄ヒグマの下顎切歯においては, 各歯牙間に, 咬耗度の部位的差異が認められなかった (Fig. 2). すなわち, 下顎切歯では, 咬耗は均一

な進行をたどるものと思われる. 雄ヒグマの切歯咬耗度を, 上顎と下顎の別に, 野生ヒグマと飼育ヒグマの間で比較すると, 上顎では, 野生ヒグマの方が一般に高く, 下顎では, 飼育ヒグマのほうの方が一般に高いという傾向が認められた.

雌ヒグマの切歯の咬耗様式は, 上・下顎とも, 雄ヒグマのものに著しく類似しており, 性差はほとんど認められなかった (Figs. 3, 4). しかし, 上顎切歯における咬耗度の部位的差異は, 飼育雌ヒグマのほうに, 飼育雄ヒグマより若干大きかった (Figs. 1, 3).

3. 歯牙咬耗度と基底頭蓋長 (B-P) との相対成長

頭蓋においては, 大きさの変動, 縫合の消滅様式, および歯牙の咬耗様式は, 成長系の各要素と

Fig. 5. Allometric Plot of the Abrasion on the Incisors (Y) against the Basilar Length of the Skull (X)

考えられる。これらの各形質間の関係を、相対成長の立場から検討した。検索材料は、野生ヒグマに限定した。

歯牙の咬耗度と B-P との相対成長においては、横軸に B-P の値をとり、縦軸には上顎切歯 6 本の咬耗度総計をとり、両者の関係について、これら各点をグラフ上にプロットした。直線の式 $y = ax + b$ は、最小二乗法により求めた (Fig. 5)。

歯牙の咬耗度と B-P との相対成長は、雌雄ともに、その途中で一つの変移点を有する複相アロメトリー (Diphasic allometry) として示された。その変移点の位置は、雌雄間で著しく異なっていた。

雄ヒグマの成長式は、 $B-P \div 285 \text{ mm}$ の近くで一つの変移点が認められ、その前方では $y = 0.12x - 20.07$ 、後方では $y = 0.63x - 164.79$ の式で示された。

一方、雌ヒグマの成長式では、 $B-P \div 250 \text{ mm}$ の近くで一つの変移点が認められ、その前方では $y = -0.01x + 13$ 、後方では $y = 0.87x - 206.40$ の式が成立した。図中の A と B は、直線の位置より著しく離れており、個体変異のとくに大なるものと思われた (Fig. 5)。

4. 縫合消滅度と基底頭蓋長 (B-P) との相対成長

横軸に B-P の値をとり、縦軸に 15 項目の縫合消滅度総計をとり、縫合消滅度と B-P の関係について、これらの各点をグラフ上にプロットした。直線の式 $y = ax + b$ は、歯牙咬耗度の場合と同様に、最小二乗法により算出した (Fig. 6)。

検討した縫合部位は、前報²³⁾で報告した縫合消滅順位の最上位から 15 項目である。すなわち、(1) 鱗外側後頭内軟骨結合、(2) 底外側後頭内軟骨結合、(3) 人字縫合、(4) 矢状縫合、(5) 上顎切歯縫合 (顔面部)、(6) 蝶後頭軟骨結合、(7) 後頭乳突縫合、(8) 上顎切歯縫合 (口蓋部)、(9) 前頭間縫合、(10) 冠状縫合、(11) 上顎間縫合、(12) 鱗状縫合、(13) 横口蓋縫合、(14) 正中口蓋縫合、および (15) 鼻骨間縫合である。

縫合消滅度の B-P に対する相対成長も、歯牙咬耗度の場合と同様に、複相アロメトリーで示された。

雄ヒグマの成長は、 $B-P \div 290 \text{ mm}$ の近くで一つの変移点が認められ、その前方では $y = 0.06x - 4.87$ 、後方では $y = 1.24x - 359.14$ の式で示された。

一方、雌ヒグマの成長は、 $B-P \div 260 \text{ mm}$ の近

Fig. 6. Allometric Plot of the Obliteration of the Suturæ and Synchondroses (Y) against the Basilar Length of the Skull (X)

くで変移点が認められ、その前方では $y = -0.05x + 23$ 、後方では $y = 1.48x - 375.70$ の式で示された。図中の点 A は、個体変異がとくに大きいものと思われた (Fig. 6)。

考 察

ヒグマ頭蓋の歯牙の咬耗様式について、最初に報告したのは MIDDENDORFF¹²⁾ と思われる。彼は頭蓋の計測学的検討や縫合消滅の観察と同時に、歯牙の咬耗様式についても、詳細な観察を行なった。SCHÄFF¹⁶⁾ のヒグマの歯牙咬耗に関する所見は、MIDDENDORFF¹²⁾ のものと一致している。

STICKLEY²¹⁾ は、アメリカクロクマ (*Euarctos americanus* GRAY) の頭蓋を用い、歯牙の咬耗様式と年令との対応関係について検討し、次のように記載している。「明け 2 才までは、咬耗現象は全くみられない。明け 3.5 才で、第 1 切歯と第 2 切歯に軽度の咬耗がみられる。明け 4.5 才では、全切歯が咬耗を示し、上顎第 1 後臼歯の舌側咬頭 (lingual cusps) にも咬耗がみられる。5 才～13 才では、全切歯の咬耗がさらに進行し、上顎全臼歯

の舌側咬頭の咬耗がみられる。13 才を過ぎると。」下顎第 2 後臼歯の遠心頬側咬頭 (hypoconid) を除いて、全臼歯が強度の咬耗を示すようになる。

近年、SCHEFFER¹⁷⁾ は、オットセイ犬歯の象牙質に、年輪様の成長線が形成されることを報告している。その後、野生動物の年令鑑定については、歯牙の組織学的方法が広範囲に用いられるようになった。彼によると、4 才までのオットセイでは、象牙質に形成される成長線の数により、年令が確実に示され、7～8 才までのものでも、ほぼ、その年令を鑑定することができる。

また、アメリカクロクマの犬歯セメント質に形成される成長線により、年令鑑定を行なった MARKS and ERICKSON¹⁰⁾ は、その数により、当才、1～2 才、2～4 才、4～6 才、6～8 才、8 才以上、の 6 段階で年令鑑定が可能であると述べている。

KLEVEZAL and KLEINENBERG⁷⁾ の著書には、野生動物の年令鑑定に関する歯牙の詳細な組織学的記載がある。

MARTIN and SALLER¹¹⁾ は、ヒトの歯牙の咬耗

様式を、歯冠表面のエナメル質、およびその深部の象牙質が、加齢に伴って示す形態的变化により、5段階に区分して検討した。

著者は、エゾヒグマ頭蓋の上・下顎における切歯の咬耗様式について、野生ヒグマ39例（雄23，雌16）と、飼育ヒグマ13例（雄11，雌2）の計52例を用い、咬耗度基準を設定して、肉眼的観察を行なった。

上顎切歯の各歯牙間には、雌雄ともに、咬耗度の部位的差異が認められた。すなわち、第1切歯が最も高く、次いで第2切歯、第3切歯の順で、咬耗度は減少している。これらの各値間には、野生ヒグマの場合、有意の差が認められた（Tables 3, 4, Figs. 1, 3）。このことから、上顎切歯においては、第1切歯が最初に咬耗し、次いで第2切歯、第3切歯の順位で、咬耗が進行するものと思われる。これらの所見は、MIDDENDORFF¹²⁾ および SCHÄFF¹⁶⁾ の記載と全く一致している。咬耗度の部位的差異は、野生ヒグマが飼育ヒグマより、かなり大きいようである。

一方、下顎切歯の場合は、雌雄ともに、各歯牙間の平均咬耗度の部位的差異が、ほとんど認められなかった（Figs. 2, 4）。下顎切歯では、MIDDENDORFF¹²⁾ や SCHÄFF¹⁶⁾ の記載と異なり、各歯牙の咬耗が同時に進行するようである。これらの上顎切歯と下顎切歯における咬耗様式の差異は、いかなる要因により生じたものであろうか。

永久切歯の萌出期は、上・下顎ともに、第1切歯が生後約 3.5 カ月、第2切歯が約 4.5 カ月、第3切歯が約 5 カ月と報告されている⁵⁾。したがって、上顎切歯と下顎切歯の咬耗様式の差は、歯牙萌出期の相違によるだけではないようである。

とくに、下顎切歯の咬耗様式の均一性は、その咬合形式によるものと思われる。すなわち、上顎切歯においては、第3切歯が他の切歯群のものと異なり、かなり大きく、またその中心結節は下方へ大きく伸びている。この切歯は、下顎の第3切歯と犬歯の間にはいり、おもに下顎犬歯の近心頬側面と下顎第3切歯の遠心結節と咬合している。したがって、下顎切歯6本は、左右の上顎第3切歯の間で咬合し、また、それらの咬合面の高さが、ほぼ同じ位置にみられる。咀嚼時における力の加わり方は、上顎切歯の場合には各歯牙間で若干異

なっているが、一方、下顎切歯の場合には各歯牙間に差がないため、下顎切歯では均一な咬耗様式を示しているものと思われる。

野生ヒグマと飼育ヒグマの切歯における咬耗様式を、上・下顎別に比較検討した。上顎において、第2切歯と第3切歯の咬耗度は、野生ヒグマのほうが高い（Figs. 1, 3）。下顎の場合には、逆に、飼育ヒグマのほうが全切歯の咬耗度が高い（Figs. 2, 4）。この現象は、飼育ヒグマのみに認められた下顎犬歯の遠心頬側面における著明な咬耗と、関係あるように思われる。すなわち、飼育ヒグマの場合、下顎犬歯後面の著しい咬耗により、上顎犬歯および上顎切歯が、咀嚼時に、相対する下顎の各歯牙に大きな力を加えるために、下顎切歯の咬耗度が増大したものではなかろうか。

清水¹⁹⁾は、成長に関する形態学的分野を二つに大別している。その一つは、成長を時間の函数としてとらえる方法であり、これを絶対成長と称している。他方は、時間を単に潜在的因子として把握し、成長系を全体と部分、あるいは各形質間の相互関係について検討する方法であり、これを相対成長と称している。生物は環境との相互関係において存在しており、生物の個体変異、種の分化、および系統発生などを究明するうえに、後者の相対成長に関する研究も極めて重要であると力説している。彼は、相対成長の式を $y=ax^b$ という指数関数で表わし、これを対数値のグラフ上にプロットすることにより、直線の式 $\log y = \log a + b \log x$ として、検討している。

著者は、エゾヒグマ頭蓋の成長系を、大きさの変動、縫合の消滅様式、および歯牙の咬耗様式の3点に大別し、これらの3形質間の相対成長について検討した。大きさの変動を基底頭蓋長（B-P）に求め、これに対する歯牙の咬耗様式を、上顎切歯6本の咬耗度総計で表わし、また縫合の消滅様式を、既報²³⁾で観察した頭蓋縫合の15項目の消滅度総計で表わした。それぞれ両者の関係について、これを正数値のグラフ上にプロットし、最小二乗法により直線の式 $y=ax+b$ を算出して検討した。なお、飼育ヒグマ頭蓋は、相対成長の検討から除外した。

1. 上顎切歯の咬耗度と基底頭蓋長（B-P）との相対成長

基底頭蓋長に対する上顎切歯咬耗度の相対成長は、複相アロメトリーで示された。変移点の位置は、雄では $B-P \div 285 \text{ mm}$ の近くに、雌では $B-P \div 250 \text{ mm}$ の近くに認められた。両者の位置的差異は、 $B-P$ からみて約 35 mm であった。変移点までの両者の関係は、極めてゆるやかな成長勾配を示しているが、変移点を過ぎると、成長勾配の急速な上昇が認められた。雄の成長式は、変移点より前では $y=0.12x-20.07$ 、その後では $y=0.63x-164.79$ で示された。一方、雌の成長式は、変移点より前では $y=-0.01x+13$ で、成長勾配が負の値を示している。このことは、変異点より前に位置する雌ヒグマには、個体変異が非常に多いことを示しているものと思われる。変移点より後の雌の成長式は、 $y=0.87x-206.40$ で示され、成長勾配が著しく増大していることが注目された。

以上の所見により、歯牙の咬耗様式は、 $B-P$ の大きさが増大する後期において、急速に進行するものと思われる。

2. 縫合消滅度と基底頭蓋長 ($B-P$) との相対成長

基底頭蓋長に対する縫合消滅度の相対成長も、歯牙咬耗度の場合と同様に、複相アロメトリーで示された。

変移点の位置は、雄では $B-P \div 290 \text{ mm}$ 、雌では $B-P \div 260 \text{ mm}$ であった。雌雄の変移点の位置的差異は、 $B-P$ からみて約 30 mm である。雄の成長式は、変移点の前では $y=0.06x-4.87$ 、その後では $y=1.24x-359.14$ で示された。一方、雌の成長式は、変移点の前では $y=-0.05x+23$ で、成長勾配が負となっている。これは個体変異が多いことを示しているものと思われる。変移点の後では、雌の成長式は $y=1.48x-378.50$ で示され、成長勾配の著しい増加が注目された。

上記の所見により、縫合消滅という頭蓋の形態形成の機構は、歯牙の咬耗様式と同様に、 $B-P$ の大きさが増大する末期において急速に進行するようである。また変移点の位置は、頭蓋が成熟期に達する時期のようであるこの時期の年齢を明らかにすることは、生物学的にみて意義深いものと思われる。なお、雌のエゾヒグマでは、既報²²⁾で犬歯の形態においても指摘したように、とくに、変

移点より前のものに、多くの個体変異が存在するようである。

以上のように、野生動物における種内の個体変異や、種間の変異を明らかにするうえで、歯牙の咬耗度および縫合の消滅度と、基底頭蓋長との相対成長について検討することは、極めて有効な方法と思われる。

要 約

エゾヒグマ頭蓋の、成長に伴う形態的变化の一つとして、歯牙の咬耗を取り上げ、その様式について観察した。さらに、基底頭蓋長に対する、歯牙の咬耗度および縫合の消滅度の、相対成長について検討した。

1) 上顎切歯の各歯牙間には、咬耗様式に明らかな部位的差異が認められた。最初に咬耗を呈する部位は第1切歯である。次いで第2切歯、第3切歯の順で咬耗が進行する。一方、下顎切歯の場合は部位的差異が認められず、全歯牙が均一な咬耗様式を示している。なお、性差はほとんど認められなかった。

2) 歯牙咬耗度と基底頭蓋長 ($B-P$) との相対成長は、雌雄ともに、複相アロメトリーで示された。雄の変移点の位置は $B-P \div 285 \text{ mm}$ で、その前方の成長式は $y=0.12x-20.07$ 、後方では $y=0.63x-164.79$ であった。一方、雌の変移点の位置は $B-P \div 250 \text{ mm}$ で、その前方の成長式は $y=-0.01x+13$ 、後方では $y=0.87x-206.40$ であった。

3) 縫合消滅度と基底頭蓋長との相対成長も、複相アロメトリーで示された。雄の変移点は $B-P \div 290 \text{ mm}$ で、その前方の成長式は $y=0.06x-4.87$ 、後方では $y=1.24x-359.14$ であった。雌の変移点は $B-P \div 260 \text{ mm}$ で、その前方の成長式は $y=-0.05x+23$ 、後方では $y=1.48x-378.50$ であった。

4) 歯牙の咬耗様式は、基底頭蓋長の増大する後期において、急速に進行するものと思われる。

謝 辞

稿を終えるにあたり、終始御指導と御鞭撻を賜った北海道大学医学部松野正彦教授、同獣医学部工藤規雄教授に対し、深甚なる謝意を表する。

とくに、御校閲の労を賜った工藤規雄教授に感謝する。

本論文の要旨は、日本解剖学会第15回東北・北海道連合地方会（1969年5月）において発表した。

文 献

- 1) 藤田 (1958): 科学, **28**, 611~619.
- 2) 藤田 (1971): 歯の解剖学, 第17版, 東京, 金原出版.
- 3) HABERMEHL, K. H. (1961): Die Altersbestimmung bei Haustieren, pelztieren und beim jagdbaren wilden Tier. Berlin, Verlag Paul Parey.
- 4) Hojō, M. (1954): *Folia anat. Jap.*, **26**, 11~30.
- 5) INUKAI, T. and MUKASA, K. (1934): *Folia anat. Jap.*, **12**, 291~300.
- 6) 加藤 (1961): 家畜の解剖と生理, 10~21頁, 東京, 養賢堂.
- 7) KLEVEZAL, G. A. and KLEINENBERG, S. E. (1969): Age Determination of Mammals from Annual Layers in Teeth and Bones. Jerusalem, IPST Press.
- 8) KOCH, T. (1970): Lehrbuch der Veterinär-Anatomie, Bd. II, S. 50~78. Jena, Gustav Fischer Verlag.
- 9) 黒沢 (1970): 臨床家畜外科学講義, 112~115頁, 東京, 明文堂.
- 10) MARKS, S. A. and ERICKSON, A. W. (1966): *J. Wild. Manage.*, **30**, 389~410.
- 11) MARTIN, R. and SALLER, K. (1957): Lehrbuch der Anthropologie, Bd. I, Stuttgart, Gustav Fischer. Verlag.
- 12) MIDDENDORFF, A. Th. (1853): Reise in den äussersten norden und osten Sibirien, 2. Bd., 2, Theil, S. 4~67, St. Petersburg, Kaiserl. Akad. Wiss.
- 13) 中根 (1971): 歯基礎誌, **13**, 499~503.
- 14) NICKEL, R., SCHUMMER, A. and SEIFERLE, E. (1960): Lehrbuch der Haustiere, Bd. II, S. 75~97. Berlin, Verlag Paul Parey.
- 15) 佐藤 (1967): 家畜の発生・解剖要説, 236~243頁, 東京, 学窓社.
- 16) SCHÄFF, E. (1899): *Arch. Naturgesch.*, **55**, 244~269.
- 17) SCHEFFER, B. (1950): *Science*, **122**, 309~311.
- 18) 芝田 (1949): 新畜産学原論, 162~168頁, 東京, 明文堂.
- 19) 清水 (1959): 相対成長, 1~47頁, 東京, 協同医書.
- 20) SISSON, S. and GROSSMAN, J. D. (1956): The Anatomy of the Domestic Animals, 4th Ed., pp. 396~503. Philadelphia and London, W. B. Saunders Co.
- 21) STICKLEY, A. R. (1957): The Status and Characteristics of the Black Bear in Virginia. Blacksburg, Virginia Polytechnic Institute Press.
- 22) 末永 (1972): 日獣誌, **34**, 17~28.
- 23) 末永 (1972): 日獣誌, **34**, 71~78.
- 24) 梶原 (1957): 熊本医学誌, **31**, 607~656.
- 25) 津田 (1955): 交通医学, **8**, 41~46.

MORPHOLOGICAL STUDIES OF THE SKULL OF YEZO BROWN BEAR (*URSUS ARCTOS YEZOENSIS* LYD.)

III. ABRASION PATTERNS OF TEETH AND THEIR ALLOMETRIC VALUES IN RELATION TO THE SKULL SIZE (BASILAR SKULL LENGTH)

Yoshimaru SUENAGA

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Hokkaido, Sapporo

(Received for Publication October 2, 1972)

In the morphological changes of the skull of the Yezo brown bear (*Ursus arctos yezoensis* Lyd.) showing growth with postnatal development were observed the abrasion patterns of teeth. And the relative growth between the abrasion patterns of teeth and

the obliteration patterns of suturae to the basilar skull length (B-P) was analyzed statistically.

The materials used in this study were 52 skulls (34 male and 18 female) which had been described in the previous part of the present series (Table I).

The abrasion degrees of teeth were determined by the method employed by MARTIN and SALLER (Table 2).

The local gradation of abrasion was recognized in both male and female upper incisors, but not in the lower incisors.

Of the upper incisors, the first incisor was the first to show abrasion and followed by the second and the third incisor in this order with this regard.

The relative advance in abrasion pattern of the upper incisor to the basilar skull length (B-P) was shown by diphasic allometry with one critical point on the growth curve (Fig. 5). The position of the critical point on the growth curve was found at about 285 mm in the male skull and at about 250 mm in the female skull by B-P. In the front of the point, the formula of growth curve was $y=0.12x-20.07$ for the male and $y=-0.01x+13$ for the female. In the backward of the point, it was $y=0.63x-164.79$ for the male and $y=0.87x-206.40$ for the female.

The relative advance in obliteration pattern of fifteen suturae and synchondroses to the basilar skull length was also shown by diphasic allometry with one critical point on the growth curve (Fig. 6).

The position of the critical point was found at about 290 mm in the male and at about 260 mm in the female.

In the front of the point, the formula of the growth curve was $y=0.06x-4.87$ for the male and $y=-0.05x+23$ for the female. In the backward of the point, the formula was $y=1.24x-359.14$ for the male and $y=1.48x-375.70$ for the female.

An individual variation was noticed in the front of the critical point among the female skulls.

The abrasion of teeth and the obliteration of suturae and synchondroses seemed to be enhanced rapidly in the late stage when there was an increase in the basilar skull length.

It is reasonable to consider it an effective method for studying the individual variation and classification of wild mammals into species to analyze the relative advance in abrasion pattern of teeth and obliteration pattern of suturae to the basilar skull length (B-P).

The brown bears which live in Hokkaido were presumed to belong to only one species, *Ursus arctos yezoensis* Lyd., from the results of studies on the relative advanced mentioned above.

EXPLANATION OF PLATES

PLATE I

- Fig. 7. Lateral view of the female skull. Specimen No. 1. Premolars of the upper and lower jaw, excepted $\overline{P}_4$ and $\overline{P}_4$, do not occlude.
- Fig. 8. Ventral view of the female skull. Specimen No. 1. In the molar, the central groove and lingual and buccal cusps are recognized. The fourth premolar ($\overline{P}_4$) is a tritubercular tooth. Protocone, paracone, and metacone are clear.
- Fig. 9. Mandibula of the female skull. Specimen No. 1. In the first and second molar, the central groove and lingual and buccal cusps are recognized. The central groove of the third molar is near the lingual part. The cusps of the fourth premolar ($\overline{P}_4$) seemed to be only protocone.

PLATE II

- Fig. 10. $\overline{I}_1$ and $\overline{I}_1$ show abrasion of enamel. First degree. No other teeth show abrasion.
- Fig. 11. $\overline{I}_2$ and $\overline{I}_2$ show dotting abrasion of dentinum. Second degree. $\overline{I}_1$ and $\overline{I}_1$ show plane abrasion of dentinum on the incisal and basal ridge. Third degree. No other teeth show abrasion.
- Fig. 12. The first incisor of the lower jaw ($\overline{I}_1$) is absent. $\overline{I}_1$ and $\overline{I}_1$ show continual abrasion of dentinum from the incisal to the basal ridge. Fourth degree. $\overline{I}_2$, $\overline{I}_2$, $\overline{I}_1$, $\overline{I}_2$, and $\overline{I}_2$ show abrasion of third degree. $\overline{I}_3$, $\overline{I}_3$, $\overline{I}_3$, and $\overline{I}_3$ show abrasion of second degree. $\overline{I}_2$ has formed a dark ring on the dentinum, showing abrasion of fifth degree.
- Fig. 13. $\overline{I}_1$ and $\overline{I}_1$ have formed a dark ring on the dentinum, showing abrasion of sixth degree on the dentinum of the occluding surface. $\overline{I}_2$ and $\overline{I}_2$ have formed a dark ring on the dentinum showing abrasion of fifth degree.
- Fig. 14. $\overline{I}_1$ and $\overline{I}_1$ have formed secondary dentinum showing abrasion of seventh degree.
- Fig. 15. $\overline{I}_2$, $\overline{I}_1$, $\overline{I}_1$ and $\overline{I}_2$ show abrasion of eighth degree. On the dentinum up to the margo cervicalis. Specimens No. 2.
- Fig. 16. Ventral view of the female skull. Specimen No. 2. Abrasion is intense at the lingual cusps of the upper molars. Dental caries is noticeable in these teeth.
- Fig. 17. Mandibula of the female skull. Specimen No. 2. Abrasion is intense at the lower molars. Dental caries is noticeable in these teeth.