Ultrastructural Alterations in Skeletal Muscle Fibers of Rats after Exercise

Masao AKUZAWA* and Masaaki HATAYA**

Department of Veterinary Surgery, Faculty of Agriculture,
University of Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo 113

(Received for publication December 15, 1977)

Abstract. Ultrastructural alterations in skeletal muscle fibers were electron microscopically studied in rats forced to run on the tread mill until "all-out". When they were mild and limited to relatively small areas, the reconstruction of filaments ensued within 10 days without infiltration of cells. When they were severe and extensive, phagocytes infiltrated in the lesions and removed degenerative sarcoplasmic debris from muscle fibers. A little later, myoblasts appeared and regeneration was accomplished in 30 days in much the same manner as in myogenesis.

運動によるラット骨格筋の微細構造の変化

阿久沢正夫・幡谷正明

東京大学農学部家畜外科教室

運動後の骨格筋に生ずる、生化学的、あるいは生理学的な諸変化に関する記載 [8] は多いが、形態学的な側面からの検討は、ほとんどなされていない。本研究はラットを強制的に走らせて、いわゆる all out の状態にしたのち、骨格筋に生ずる微細構造の変化と、その修復の過程を、経時的に追ったものである。

材料と方法

1. 動物と運動の方法

実験動物には、ラット (Wistar 系雄) を用いた。体重 80-100 g で購入し、研究室において 180 g に達するまで飼育したのち、実験に供した。

運動には、100 V の電気刺激装置を備えた自家製トレッドミルを使用し、毎分 20 m の速さで回転する厚布製ベルトの上で、ラットを強制的に走らせた。実験

の開始に先立って、運転中のトレッドミルの上に試みに乗せ、その回転に合わせて直ちに走り出したラット 45例を選び、これらを対照群10例と、運動群35例に分けて用いた。運動群は運動直後および 1, 3, 5, 7, 10, 30 日目に、各 5 例ずつと殺して試料を採取した。

2. 試料

ラットは断頭し、放血致死後に右後肢より M. rectus femoris を摘出した。すなわち予試験において、前肢の M. biceps brachii (屈筋) と、後肢の M. rectus femoris (伸筋), M. biceps femoris (屈筋) などの諸筋のグリコーゲン含量を測定したところ、各筋の値に差はなく、また運動群は対照群と比較して一様に減少し、筋によって差がみられなかったため、実験には M. rectus femoris を用いた。

筋は摘出後直ちに、緩衝液で希釈した OsO_4 1% 固

Present address: *Laboratory Animal Science and Toxicology Laboratories, Sankyo Co., Ltd., Fukuroishi, Shizuoka 437 and **Department of Veterinary Surgery, Faculty of Agriculture, University of Miyazaki, Miyazaki-shi, Miyazaki 880

定液中で細切し、10°C で2時間固定後、水洗、脱水して Epon 樹脂に包埋し、一部は 1 μm の厚切り切片として、toluidine blue 染色下で光学顕微鏡により、また一部は超薄切片として、酢酸ウラン-クエン酸鉛二重染色下で、電子顕微鏡 (JEM-7A, 日本電子株式会社) により観察した。

成 績

1. 運動直後の変化

運動直後の骨格筋線維には、狭い範囲に局在し軽度に変化している部分と、広い範囲にわたって激しく変化している部分とが認められた。狭い範囲の変化は、一本の筋線維内に膨化した横紋が斑状に局在している (Fig. 1)。この部分を電子顕微鏡で観察すると、筋節は完全には破壊されていなかったが、Z-line の蛇行、幅の拡張、断裂、消失が、また myofilament の走行の乱れ、断裂などが認められた (Fig. 2)。

一方、広い範囲が変化している部分は、横紋が消失し (Fig. 3)、電子顕微鏡で観察すると、筋節は全く破壊されて myofilament が小断片となっていた。Mitochondria (以下 Mt と略す) は外膜の断裂、基質の淡明化、cristae の消失が認められ、数が減り、その配列も乱れていた。また sarcoplasmic reticulum (以下 Sr と略す) は管状構造をとらず、球状あるいは短管状の vesicle となって散在していた。このように変化している部分に含まれている核は、電子密度が低く、外形はまるみを増すとともに、核膜は平滑となって、膨化していた (Fig. 4)。

2. 運動後の経時的变化

筋線維内の変化が局在し軽度な部分は、1日目にはほとんど変わりがみられなかったが、3日目になると、散乱していた myofilament の小断片は消失した。Myofilament が断裂し欠損していたところは、Z-line と同程度の電子密度を持った無構造な物質によって埋められ、連続性が回復した (Fig. 5)。この無構造な物質が減少するとともに、myofilament が正常に配列している筋節が多くなり、10日目になると、筋線維の一部に局在していた軽度な変化はほぼ消失した。

変化が広範囲で激しかった部分では、運動後1日目に、筋線維の内部に単核細胞の出現が認められた (Fig. 8)。これらの単核細胞を電子顕微鏡で観察すると、電子密度の高い物質を含む封入体が見られた (Fig. 6)。このような筋線維内の変化は、運動直後よりも1日目にはさらに激しくなり、myofilament の小

断片あるいは変性した Mt だけが、わずかに残っているだけとなった (Fig. 7)。

3日目には、筋線維の内部およびその周囲に出現した単核細胞は、1日目より著明に増加した (Fig. 9)。これらの細胞の中に、幅 70 Å の Filament を含んでいる細長い単核細胞があった。Filament は多数の ribosome と密接に関連して存在し、細胞の長軸方向にほぼ平行して並んでいた。また円形あるいは長円形で cristae の少ない Mt と、球状あるいは短管状の vesicle を含んでいたが、粗面小胞体は認められなかった。細胞の周囲には線維の形成はなかった (Fig. 10)。この細胞は鎖状にならんで、互いに接しているだけの部分や、融合して合胞体を形成し多核となった部分もあった (Fig. 11)。

5日目には、これらの filament の上に、Z-line と同程度に電子密度の高い無構造な物質が現われ、等間隔で filament 上に配置されるようになった (Fig. 12)。7日目になると、核が中央部に連続して並んでいる、筋管細胞 (myotube) 様の筋線維が認められるようになった (Fig. 13)。これらの筋線維を電子顕微鏡で観察すると、核が中央部に存在し、筋節は形態がほぼ完成しているが、部分的に蛇行した Z-line がみられた (Fig. 14)。このような筋線維は、10日目になると少なくなり、30日目には全く認められなくなった。

考 察

Hoyle ら [7] が、筋を断裂寸前まで牽引して観察したところ、Z-line は断裂あるいは消失したが、myofilament に変化はみられなかった。このことから、運動後のラット骨格筋に認められたような激しい変化は、運動時に筋に負荷された物理学的な力だけが原因とは考え難い。一方、細菌毒素 [20]、抗マラリア薬 [3, 16]、糖質コルチコイド [21] などの投与、あるいは凍傷 [14]、局所性貧血 [6, 19] の後には、運動後のラット筋線維にみられた変化とほぼ同様に、myofilament や Mt, Sr の激しい変化が認められた。in vitro の実験で、筋の収縮タンパクの溶解性は、溶媒の pH とイオン濃度 [2, 3, 4]、温度 [9]、あるいは ATP 濃度 [22, 23] によって左右されるといわれ、また筋線維は内因性のタンパク分解酵素によって溶解されると報告されている [18]。これらのことから、局所における生化学的あるいは物理化学的な環境条件の変化が、筋線維の微細構造に変化をもたらす重要な因子と考えられよう。

運動後の経時的な観察では、変化が軽度な部分で **myofilament** が断裂し欠損しているところが、**Z-line** とほぼ同程度の電子密度を持つ無構造な物質によって埋められ、連続性が保たれていた。この物質が **Z-line** の構成物質と同一であるかどうか不明であったが、**myofilament** が断裂していない部分でも、**Z-line** の変形、消失などが認められることから、**Z-line** は筋節の構造維持および修復に、重要な役割を果たしているものと考えられよう。

Myofilament の形成は **ribosome** の存在と密接な関連があるとされている [15] が、変化が局在し軽度な部分では、運動後に **ribosome** も、またこれに関連した **filament** も認められなかった。そのため、このような部分では、**filament** を構成するタンパク質の分子間結合 [5, 12] が断裂したが、運動後、環境条件の回復に伴って可逆的に再結合し、修復されたものと考えられた。この修復には約10日を要するであろう。

筋線維の変化が広範囲な部分では、運動直後よりも1日目に、変化がより激しくなっていた。この現象は、駆血帯を用いた実験 [11] で、装着中の乏血時よりも、開放後の血流が再開した場合に、筋の変化がより激しくなったという報告と似ている。運動後に変化が進行することも、血流の急激な変化が一因であろう。

1日目以後に筋線維内部に出現した単核細胞は、電子密度の高い物質を封入体に含んでおり、食機能を持つことが示唆された。

3日目以後 **ribosome** と密接に関連した、**filament** を含む単核細胞が認められた。この細胞は、マクロファージや線維芽細胞に良く発達する粗面小胞体を持たず、また細胞周囲には、線維芽細胞と違って、線維の形成がないことから、これらの細胞と区別された。この **filament** を含む細胞は、Price ら [15] が凍傷の後にみた筋芽細胞と類似していた。また多数が鎖状に並んで、互いに接し、あるいは融合して、多核の細長い合胞体を形成し筋管細胞様になった。この合胞体は Przybylsky ら [17] が、ニワトリの発生中の筋組織で観察したものと似ていた。これらの所見から、**filament** を含む細胞は、恐らく筋芽細胞であろうと思われる。

筋芽細胞は、筋線維の損傷部の核に由来するという説 [1] と、骨格筋線維表面に密接して存在する外套細胞 (**satellite cell**) に由来するという説 [10] がある。しかし筋線維の変性した部分に含まれる核は、**myofilament**, **Mt**, **Sr** などとともに変化してしまうため、筋

芽細胞が変わるとは考え難い。一方、外套細胞は、筋線維と共通の基底膜に含まれているが、互いに別々の細胞膜を持つため、隣接する筋線維内部が激しく変化しても、外套細胞には波及しないと考えられる。このことから、筋芽細胞は外套細胞に由来する可能性が強いといえよう。

食機能を持つ細胞と筋芽細胞とは同一の細胞であって、分化の過程で筋芽細胞が食機能を持つという説 [1] と、両者は別種の細胞であるという説 [15] とがある。本実験では、食機能を持つ細胞は運動後1日目から、また筋芽細胞と似た細胞は3日目から認められた。両者は、形態および始めて現われる時期が異なることから、互いに別種の細胞と考えられた。

以上で述べたように、運動によって広範囲に激しく変化した部分には、単核の細胞が現われ、そのうちの筋芽細胞に似た細胞によって筋線維が再生された。このような修復には、約30日を要するであろう。

結 論

ラットを、いわゆる **all out** の状態となるまで、強制的に走らせた場合に、骨格筋線維の微細構造に変化が認められた。この変化が少数の筋節の **Z-line**, **myofilament** などに局在し軽度な場合には、約10日目に修復が完了した。

一方、広範囲に激しく変化した部分には、運動後1日目に食機能を持った細胞が出現して、変性した **myofilament**, **mitochondria**, **sarcoplasmic reticulum** などが除去された。また3日目に **filament** を含む、筋芽細胞に似た細胞が現われた。この細胞が鎖状に並び、互いに融合して細長い合胞体となり、筋管細胞様の筋線維が形成された。このような過程を経て筋線維が再生され、約30日目には修復が完了した。

謝 辞

稿を終えるにあたり、本研究のために懇切なご助力をいただいた東京大学農学部臼井和哉教授、竹内啓助教授、伊東信夫助手、ならびに実験の遂行に際して種々ご援助下さった日本中央競馬会および同会競走馬保健研究所（現在、競走馬総合研究所）の各位に心から感謝の意を表する。

文 献

- [1] Allbrook, D. (1962). An electron microscopic study of regenerating skeletal muscle. *J. Anat.*, **96**, 137-152.
- [2] Corsi, A., and Perry, S. V. (1958). Some observations on the localization of myosin, actin and tropomyosin in the rabbit myofibril. *Biochem. J.*, **68**, 12-17.
- [3] D'Agostino, A. N. (1964). An electron microscopic study of skeletal muscle and cardiac muscle of the rat poisoned by plasmocid. *Lab. Invest.*, **12**, 1060-1071.
- [4] 芳賀達也・浜 浩子・野田春彦 (1965). 筋肉の構造とその機能. 生体機能の分子論 (生物物理学講座 6), 日本生物物理学会編, 吉岡書店, 京都, 86.
- [5] Haggis, G.H. (1966). タンパク質の巨大構造およびタンパク質構造と機能の関係. 分子生物学入門, みすず書房, 東京, 第4章, 79.
- [6] Henderson, P. B., Sommers, H. M., and Jennings, R. S. (1965). A comparative study of the fine structure of normal and ischemic dog myocardium with special reference to early changes following temporary occlusion of coronary artery. *Amer. J. Path.*, **46**, 367-386.
- [7] Hoyle, G., McAlear, J. H., and Selverston, A. (1965). Mechanism of supercontraction in a striated muscle. *J. Cell Biol.*, **26**, 621-640.
- [8] 猪飼道夫・矢部重之助 (1967). 筋力と疲労の研究. 体育の科学, No. 171, 108.
- [9] McColester, D. L., and Semente, G. (1964). Membrane isolation and cytoskeletal breakdown. I. The effect of endogeneous enzymes, ions, pH, temperature and dissolved gasses. *Biochim. Biophys. Acta.*, **90**, 146-158.
- [10] Maruo, A. (1961). Satellite cell of skeletal muscle fibers. *J. Biophys. Biochem. Cytol.*, **9**, 493-495.
- [11] Moore, D. H., Ruska, H., and Copenhaver, W. H. (1956). Electron microscopic and histochemical observations of muscle degeneration after tourniquet. *J. Biophys. Biochem. Cytol.*, **2**, 755-764.
- [12] 大槻磐男・津久井菱子 (1969). 筋収縮の分子生物学. II. 筋肉の構造蛋白質 (I). 科学, **39**, 157-161.
- [13] Perry, S. V., and Corsi, A. (1958). Extraction of proteins other than myosin from the isolated rabbit myofibril. *Biochem. J.*, **68**, 5-17.
- [14] Price, H. M., Howes, E. D., and Blumberg, J. M. (1964). Ultrastructural alterations in skeletal muscle fibers injured by cold. I. The acute degenerative changes. *Lab. Invest.*, **13**, 1264-1278.
- [15] Price, H. M., Howes, E. D., and Blumberg, J. M. (1964). Ultrastructural alterations in skeletal muscle fibers injured by cold. II. Cells of the sarcolemmal tube: Observations on "discontinuous" regeneration and myofibril formation. *Lab. Invest.*, **13**, 1297-1302.
- [16] Price, H. M., Pease, D. C., and Pearson, C. M. (1962). Selective actin filament and Z-band degeneration induced by plasmocid. An electron microscopic study. *Lab. Invest.*, **11**, 549-562.
- [17] Przybylsky, R. J., and Blumberg, J. M. (1966). Ultrastructural aspects of myogenesis in the chick. *Lab. Invest.*, **15**, 836-863.
- [18] Scopes, R. K. (1964). The influence of post mortem conditions on the solubility of muscle proteins. *Biochem. J.*, **91**, 201-207.
- [19] Stenger, R. J., Spiro, D., Scully, R. E., and Shannon, J. M. (1962). Ultrastructural and physiological alterations in ischemic skeletal muscle. *Amer. J. Path.*, **40**, 1-20.
- [20] Strunk, S. W., Smith, C. W., and Blumberg, J. M. (1967). Ultrastructural studies on the lesion produced in skeletal muscle fibers by crude type A *Clostridium perfringens* toxin and its purified alpha fraction. *Amer. J. Path.*, **50**, 89-107.
- [21] Tice, L. W., and Engel, A. G. (1967). The effects of glucocorticoids on red and white muscles in the rat. *Amer. J. Path.*, **50**, 311-333.
- [22] 湯田坂八重子 (1955). Myosin 並に actomyosin の酵素化学的研究. III. Actomyosin-ATP-ase 及び superprecipitation に対する温度の影響. 生体の科学, **7**, 161-163.
- [23] 湯田坂八重子 (1955). Myosin 並に actomyosin の酵素化学的研究. IV. Myosin-ATP-ase の熱変性に対する actin の影響. 生体の科学, **7**, 261.

Explanation of Figures

- Fig. 1. Immediately after exercise. Damaged swollen striations are apparent in small areas of a muscle fiber. Light micrograph. $\times 1,000$.
- Fig. 2. Immediately after exercise. Parallel ultrathin section of Fig. 1. Sarcomeres are widened. Disappearance of Z-line and fragmentation of filaments are apparent. Electron micrograph. $\times 4,000$.
- Fig. 3. Immediately after exercise. Severely damaged wide area. No striation is apparent. Light micrograph. $\times 1,000$.
- Fig. 4. Immediately after exercise. Parallel ultrathin section of Fig. 3. Myofibrils are completely torn in pieces. Mitochondria and sarcoplasmic reticulum are damaged. Swollen nucleus is seen in the lower part of the fiber. Electron micrograph. $\times 4,000$.
- Fig. 5. Three days after exercise. Mildly damaged myofibrils have recovered continuity with dense amorphous substance having the same density as the Z-line. Electron micrograph. $\times 4,000$.
- Fig. 6. One day after exercise. A mononuclear cell is present within a severely damaged muscle fiber along with the necrotic sarcoplasmic debris. Electron micrograph. $\times 10,000$.
- Fig. 7. One day after exercise. Only a small number of damaged mitochondria are evident in a widely damaged muscle fiber. Electron micrograph. $\times 4,200$.
- Fig. 8. One day after exercise. Mononuclear cells are present within a severely damaged muscle fiber. Light micrograph. $\times 1,500$.
- Fig. 9. Three days after exercise. Many cells are observed near damaged muscle fibers. Light micrograph. $\times 840$.
- Fig. 10. Three days after exercise. Aligned and fused mononuclear cells with fine filaments and no rough-surfaced endoplasmic reticulum are supposed to be myoblasts. Electron micrograph. $\times 4,600$.
- Fig. 11. Three days after exercise. A portion of a multinuclear myoblast containing many fine filaments (arrow) that assume a longitudinal parallel orientation. A- and I-band and Z-line are not yet evident. Electron micrograph. $\times 9,400$.
- Fig. 12. Five days after exercise. Filaments are aligned into rudimentary myofibrils. Dense substance on the filaments appears to be Z-line. Electron micrograph. $\times 20,000$.
- Fig. 13. Seven days after exercise. Newly regenerating multinucleated muscle fibers (arrow). Light micrograph. $\times 840$.
- Fig. 14. Seven days after exercise. Newly regenerating muscle fiber. Nucleus is still at the center of the cell. Z-lines are still zig-zag. Electron micrograph. $\times 2,200$.