原 著

腺疫患馬ヨリ分離シタル弱溶血性腺疫菌ニ就テ

久池井忠男 佐藤秋雄 江守信 瀬古源一

(陸軍獸醫學校)

(昭和 15 年 12 月 1 日受附)

目 次

I. 緒 言	VI. 好氣性及嫌氣性累代培養
ニヨル溶血環ノ變化
II. 菌株ノ由來	VII. 總括及結論
III. 形態, 培養所見並ニ生物學的性狀	文 獻
IV. 血清學的性狀	
V. 小試験動物ニ對スル毒力	

I. 緒 言

腺疫連鎖狀球菌 (以下連鎖狀球菌ヲ連球菌ト略稱ス) ハ 1888 年 SCHÜTZ⁽¹⁾, SAND U. JENSEN⁽²⁾ 及 POELS⁽³⁾ ニヨリ夫々獨立ニ腺疫患馬ヨリ發見セラレ腺疫ノ病原ト見做サル、ニ至リテヨリソノ性狀及起病性ハ梅野(信)⁽⁴⁾, HOLTH⁽⁵⁾, KOCH U. POKSCHISCHEWSKY⁽⁶⁾, MAASS⁽⁷⁾, ADSERSEN⁽⁸⁾, JONES⁽⁹⁾, 小國及澤田⁽¹⁰⁾, 梅野(早)^(11, 16), KLIMMER U. HAUPT⁽¹²⁾, 小倉⁽¹³⁾, EDWARDS⁽¹⁴⁾, EVANS⁽¹⁵⁾, 西⁽¹⁷⁾, 並河, 栗原及江守⁽¹⁸⁾, 辻及佐藤^(19, 20), 並河及佐藤⁽²¹⁾, 越智及平尾^(22, 23) 等ニヨリ細密ニ追及セラレソノ特異性著シク闡明トナリ特ニ本菌ガ顯著ナル溶血性ヲ有スル定型的 β 型連球菌ニ屬スルモノナルコトハ周知ノ事實トナレリ

然ルニ最近久池井, 佐藤及葛西⁽²⁴⁾ ハ軍馬補充部某支部ニ於ケル非溶血性連球菌ニヨル腺疫ノ流行例ヲ報告セリ 該病原菌株ハ非溶血性ナル點ヲ除ケバソノ他ノ諸性狀完全ニ腺疫菌ニ一致スルモノニシテ氏等ハ本菌ヲ腺疫菌ノ溶血性ヲ喪失セル變異株ナル可シト思惟セリ余等ハ昭和 15 年腦炎研究供試

當歳馬群中偶々腺疫ニ罹患セル 2 例ヨリ溶血環ノ極メテ狭キ (安東氏分類⁽²⁵⁾ β m 型ニ屬ス) 連球菌ヲ分離セリ 本菌株ハ形態, 培養, 生物學的性状, 沈降反應並ニまうす, 海狸及家兎ニ對スル毒力等完全ニ腺疫菌ニ一致スルモ唯溶血性弱キ點ニ於テノミ定型的腺疫菌ト異ル特徴ヲ有スルモノナリ

斯ル腺疫菌ノ存在スルコトハ著者等ノ嘗テ經驗セザルトコロナルノミナラズ寡聞ニシテ未ダ斯ノ如キ弱溶血性腺疫菌ニ關スル報告ノ發表セラレアルヲ知ラズ腺疫ノ診斷及豫防上將來注意ヲ要スル問題ナリト信ジ茲ニ報告スルモノナリ

第 1 表 分離菌株ノ由來

菌 株 番 號	菌 分 離 馬 名	分離部位 (分離部位ノ變狀) 及分離菌數	隨 伴 菌
No. 1	初 花	顎凹淋 (膿瘍)∞, 咽背淋 (膿瘍)∞, 盲腸淋 (膿瘍)∞, 左肺後葉 (肺炎)∞, 肺尖部 (膿瘍)∞, 食道部 (膿瘍)∞	
No. 2	姬 高	咽背淋 (腫脹) +	<i>Str. equi</i> C 型 卅 <i>Str. pyogenes</i> B 型 卅

II. 菌株ノ由來

實驗ニ供セル菌株ハ當校ニ於テ城井博士ガふるまりん處置腦炎病毒ヲ 3 回接種セル當歳馬 5 頭中偶々腺疫ニ罹患セル 2 頭ヨリ昭和 15 年 2 月分離セルモノニシテ分離部位ノ明細ハ第 1 表々示ノ如シ

今參考ノ爲本菌株分離馬ノ病歷ヲ述ブルコト、ス

No. 1 菌株ヲ分離セル初花號ハ昭和 14 年 12 月 7 日腦炎わくちん 15 cc, 13 日 30 cc, 19 日 100 cc ノ皮下注射ヲ受ケタルモノニシテ翌昭和 15 年 1 月 14 日顎凹淋巴腺腫脹, 16 日發熱シ腺疫ト診斷セラレ 2 月 2 日朝膿毒症ニヨリ斃死セルモノナリソノ體溫表ハ第 1 圖ノ如シ

No. 2 菌株分離姬高號ハ初花號ト同時ニ同様 3 回ニ亘リ腦炎わくちんノ皮下注射ヲ受ク 昭和 15 年 1 月 27 日鼻漏アリ次デ咽背淋巴腺腫脹セルモ

著明ナル發熱ナク 2 月 5 日朝斃死セリ 死因詳カナラザルモ (傳染性貧血?)
腺疫ニヨルモノニ非ザルコト明カナリ

III. 形態, 培養所見並ニ生物學的性狀

實驗方法ハ辻及佐藤⁽¹⁹⁾, 久池井, 佐藤及葛西⁽²⁴⁾ノ行ヒタル方法ト同様ナルヲ以テ省略ス

(1) 形態

材料ヨリ塗抹標本ヲ造リギーむざ染色ヲ施シ鏡檢セルニ本菌ハ何レモ彎曲セル數十個ノ長連鎖ヨリ成リ長キハ全視野ヲ横斷ス 又明ニ莢膜ヲ認メタリ

第 1 圖 初花號(菌株分離馬)熱型

尙本菌ハ馬血液 (又ハ血清) 加寒天培養ニ於テモ著明ナル莢膜ノ形成ヲ示シタリ

(2) 培養

5% 馬血清加寒天平板ニ本菌株ヲ培養スルニ發育良好ニシテソノ集落ハ正圓, 青白色, 透明, 滑澤, 粘稠, 牽縷性ニ富ミ之ヲ鏡檢スルニ顆粒狀構造ヲ呈シ梅野⁽¹⁶⁾ノ腺疫菌 G 型ト全ク區別シ得ズ

並河, 栗原及江守⁽¹⁸⁾ニ倣ヒ本菌ノ FORTNER 氏嫌氣性培養ヲ試ミタルニ腺疫菌ト同様縮毛型集落ヲ形成セリ

ぶいよん並ニ 5% 馬血清加ぶいよんニ於ケル本菌株ノ發育狀態モ亦定型的腺疫菌ト全ク同様ニシテ兩培地ヲ強ク濁濁ス

(3) 生化學的性狀

本菌株ハできすところ一ゼ、まると一ゼ、さっかろ一ゼ及ざりちんヲ分解スルモらくと一ゼ、そるびと、とれはろ一ゼ、らふの一ゼ、まんにと、いぬりん及ぐりせりんヲ分解セズ、又えすくりん及澱粉ヲ中等度ニ分解ス 馬尿酸曹達ノ加水分解ハ陰性ナリ 終末水素いおん濃度ハ No. 1 菌株 pH 4.9, No. 2 菌株 pH 5.0 ヲ示セリ

(4) 溶血作用

5% 馬血液加寒天培養ニヨル溶血環ノ直径ハ兩菌株共 1.4~1.6 mm ニシテ安東氏分類⁽²⁵⁾ β_m 型ニ屬ス 之ニ對シ定型的腺疫菌ノ溶血環ハ直径 2.0~3.0 mm ニシテ安東氏分類 β_t 型ニ屬ス

次ニ小林氏分類法⁽²⁶⁾ニヨレバ兩菌株共葡萄糖添加ノ有無ニ拘ラズ馬及山羊ノ血液ヲ溶解スルヲ以テ氏ノ II 型ニ屬スルモノナリ

(5) めちれん青ノ還元性

5,000 倍めちれん青加牛乳ヲ用ヒテ實驗セルニ兩菌株共めちれん青ヲ還元セズ

(6) 豚疫菌集落ノ螢光性消失現象

渡部⁽²⁷⁾ノ發見セル本現象ヲ試ミタルニ兩菌株共豚疫菌集落ノ螢光ニ影響ヲ及ボサズ

(7) 膽汁及熱ニ對スル抵抗性

10 及 40% 牛胆汁加寒天ニ本菌株ヲ培養セルニ 10% 加培地ニ於テ既ニ發育阻止セラル、ヲ見タリ 又兩菌株共 56°C, 5 分間ノ加熱ニヨリ死滅セリ

IV. 血清學的性狀

實驗方法ハ辻及佐藤⁽²⁰⁾ノ行ヒタル方法ト同様ナリ 本實驗ハ曩ニ久池井、佐藤及葛西⁽²⁴⁾が報告セル論文中ニ記載セル沈降反應ト同時ニ實施セルモノニシテソノ成績ヲ第 2 表ニ表示ス

抗分離菌血清ハソノ沈降價低キモ定型的腺疫菌抗原及非溶血性腺疫菌抗原ニ最モ強ク反應シ本菌株抗原ニハ強度ニ、化膿性連鎖菌 A 型抗原ニハ中等度乃至強度ニ、化膿性連鎖菌 B 型抗原ニハ弱度ニ反應セリ

2 種ノ抗定型的腺疫菌 (G 型) 血清及抗非溶血性腺疫菌血清モ亦ソノ沈降價低シ 但シ本分離菌抗元, 腺疫菌 G 型抗元及非溶血性腺疫菌抗元ニ最モ強ク反應シ, 化膿性連鎖菌 A 型抗元ニハ弱度乃至強度ニ, B 型抗元ニハ弱度ニ反應セリ

抗化膿性連鎖菌 A 型並ニ B 型血清ハ各型抗元ニ對シ殆ト同程度ニ強ク

Table 2.

Result of Precipitation Reaction with Immune Rabbit Sera.

ANTIGEN \ SERA		ISOLATED STREPT.	Str. equi			Str. pyogenes		
			G		N	A	B	
			No. 2	No. 191	No. 201	No. 1	No. 95	No. 2
Isolated Strept.	No. 1	10	20	40 (±)	40 (±)	80	80	
	No. 2	20	20	10 (±)	40 (±)	40	160	
Str. equi	G	No. 85	40 (±)	20 (±)	20 (±)	40 (±)	80	160
		No. 201	40	20	40 (±)	40 (±)	80	160
	N	No. 1	40	20 (±)	20	40	80 (±)	80
Str. pyogenes	A	No. 95	5	10 (±)	5	10 (±)	80	160
		No. 137	10	20	20	1	160	80
	B	No. 2	1	5 (±)	5 (±)	1	80 (±)	160 (±)
		No. 100	1	1	5 (±)	5	80	160

N. B. G: G type.
A: A type.

N: Nonhemolytic-type.
B: B type.

反應シ特異性ヲ認メ難シ

即チ本分離菌株ハ免疫家兎血清ヲ以テセル沈降反應上腺疫菌ト概ネ同一ノ態度ヲ示セリ

V. 小試験動物ニ對スル毒力

實驗方法ハ並河及佐藤⁽²¹⁾ノ行ヒタル方法ト同様ナリ

(1) まうすニ對スル毒力

本分離菌株ノまうすニ對スル毒力ハ定型的腺疫菌ト同様甚ダ強ク腹腔内接種ニヨル最少致死量ハ No. 1 菌株ハ 10^{-5} mg, No. 2 菌株ハ 10^{-6} mg ナリ

(2) 海狸ニ對スル毒力

本菌株ハ海狸ニ對シ殆ド毒力ヲ有セザルモノ、如ク 30 mg ノ大量ヲ腹腔内ニ接種スルモ毫モ影響ナシ コレ亦定型的腺疫菌ニ一致スル成績ナリ

(3) 家兎ニ對スル毒力

Table 3.

Virulence of Isolated Strains for Rabbits by Intravenous Inoculation.

No. OF STRAINS	No. OF RABBITS	DOSIS (mg)	RESULT OF DAILY BLOOD CULTIVATION AFTER INOCULATION										ARTHRITIS	EXITUS	RESULT OF CULTIVATION									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			Heart Blood	Lung	Spleen	Liver	Kidney	Abdom. Fluid	Left Elbow	Right Elbow	Left Knee	Right Knee
No. 1	1	0.5	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-
	2	1.0	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	6	+	+	∞	∞	∞	∞	∞	∞	?	?
	3	5.0	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	5	-	?	?	?	?	?	?	?	?	?
No. 2	4	1.0	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	+	-	+	+	
	5	5.0	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	?	?

N. B. "Exitus" ⌘₁₉ denotes that the rabbit was killed 19 days after inoculation; ⌘₆ shows that the animal died 6 days after inoculation.

本菌株ノ靜脉内接種ニヨル家兎ニ對スル毒力試験ヲ試ミタルニ第3表々示ノ如ク毒力稍強ク No. 1 菌株ハ 1 mg, No. 2 菌株ハ 5 mg ノ最少致死量ヲ示セリ

本菌株ヲ接種セル家兎中斃死セルモノニアリテハ菌接種翌日又ハ第2日目ニ於テ流血中ニ接種菌出現シ爾後漸次増數ノ傾向ヲ示セルモノ耐過生存セルモノニアリテハ一過性ニ 1~2 回出現スルニ過ギズ 尙接種家兎中關節炎ヲ惹起セルモノ1例モナシ 但シ實驗頭數少キニヨリ之ヲ以テ本菌株ノ關節炎惹起能力ヲ否定スルモノニアラス

斃死家兎ハ漿液性腹膜炎、實質臓器ノ濁腫、淋巴腺ノ充血腫脹、肺炎及化膿性心囊炎等ノ病理解剖學的所見ヲ呈ス 而シテ斃殺家兎ノ臓器ヨリ接種菌ノ培養ヲ試ミタルニ斃死例ニアリテハ勿論全臓器ニ多數ノ菌ヲ證明セルモ耐過生存セルモノニアリテハ1例ハ腎及關節ニ、他ノ1例ハ關節ニノミ接種菌ヲ證明セリ

以上ノ成績モ亦定型的腺疫菌ヲ家兎ニ接種シタル場合ト略同様ナリ

Table 4.

Increase of Hemolysis in Isolated Low-Hemolytic Streptococci by Subcultivation.

GENERATIONS OF SUBCUL- TIVATION	DIAMETER OF HEMOLYTIC ZONE (MM)			
	No. 1 Strain		No. 2 Strain	
	Aerobic Cultivation	Anaerobic Cultivation	Aerobic Cultivation	Anaerobic Cultivation
1	1.4~1.6	1.4~1.4	1.4~1.6	0.6~0.8
2	2.0~2.2	1.8~2.0	0.6~1.6	0.6~0.6
3	2.6~3.0	2.0~2.4	2.0~2.8	1.8~2.0
4	2.8~3.0	2.0~2.4	2.4~2.8	1.4~1.8
5	2.6~3.6	2.0~2.6	2.4~3.0	1.2~1.6
6	2.8~3.0	1.8~2.6	2.6~2.6	1.4~1.6
7	2.8~3.0	1.8~2.2	2.4~2.8	1.4~2.0
8	2.8~3.0	2.0~2.4	2.2~2.8	1.6~2.2

N. B. "Anaerobic cultivation" was executed by using NOBATA'S⁽²⁸⁾ CO₂-supplying media.

VI. 好氣性及嫌氣性累代培養ニヨル溶血環ノ變化

以上ノ實驗結果ヨリ本分離菌株ハ溶血環ノ極メテ狭キ點ヲ除ケバ其他ノ性狀安全ニ定型的腺疫菌ニ一致スルモノナルコトヲ知レリ 從テ本菌株ハ定型的腺疫菌ガ恐ラク感染馬體內ニ於テ何等カノ原因ニヨリ溶血性ヲ減弱スルニ至リタル變異株ナル可シト想像セラル 而シテ分離菌ハ累代人工培養ニヨリ容易ニ溶血性ヲ回復シ來ル可シトノ豫想ノ下ニ馬血清加寒天斜面ヲ用ヒ毎月1回好氣性並ニ嫌氣性(野畑氏法⁽²⁸⁾ニヨリ炭酸瓦斯供給)累代培養ヲ試ミ毎代溶血環ヲ測定セルニ第4表々示ノ如キ成績ヲ得タリ

本分離菌ニツキ好氣性累代培養ヲ行ヘバ兩菌株共 3~4 代ニシテ増強セラレタル溶血性ヲ固定シ定型的腺疫菌ニ還元スルヲ見タリ 但シ炭酸瓦斯供給培地ニ累代培養ヲ行ヒタル場合ハ溶血性ノ増進著シク阻止セラレ 3 代以降殆ド溶血環ノ増大ナク之ヲ好氣性培養菌ノ溶血ニ比シ著シキ遜色アリ 依テ本菌ノ弱溶血性ヲ多少共保持セシムル爲ニハ炭酸瓦斯供給培地ニ累代培養ヲ行フヲ可トス

VII. 總括及結論

余等ハ腦炎豫防液接種當歳馬 5 頭中腺疫罹患斃死例 2 頭ニ就キ昭和 15 年 2 月分離培養ヲ試ミタルニ中 1 例(熱型参照)ニ於ケル顎凹・咽背・直腸淋巴腺等ノ膿瘍, 肺炎竈, 肺膿瘍及食道部膿瘍等ヨリ何レモ無數ニ, 又他ノ 1 例ノ咽背淋巴腺ヨリ少數ニ溶血環ノ極メテ狭キ連鎖狀球菌ヲ分離シ得タリ(第 1 表参照)

本分離菌ノ特徴ヲ述ブレバ次ノ如シ

- (1) 患馬材料中ニ於ケル本菌ハ長連鎖ヲ形成シ且厚キ莢膜ヲ有セリ
- (2) 本菌ヲ馬血清加寒天平板ニ培養セバ定型的腺疫菌タル梅野⁽¹⁶⁾ノ G 型集落ト全ク區別シ得ザル集落ヲ生ズ 又 FORTNER 氏嫌氣性培養ニヨリ腺疫菌ト同様著明ナル縮毛型集落ヲ形成ス⁽¹⁸⁾
- (3) 本菌ハざりちんヲ分離スルモらくと一ゼ, そるびっと及とれはろ一ゼヲ分解セス
- (4) 本菌ハ腺疫菌ト同様豚疫菌集落ノ螢光性ヲ消失スル作用ナシ⁽²⁷⁾
- (5) LANCEFIELD ノ方法ニ準ジ免疫家兔血清ヲ用ヒテ本菌ト定型的腺疫菌トニ就キ交叉沈降反應ヲ行ヒタルニソノ成績殆ド一致セリ (Table 2 参照)
- (6) 本菌ハマウスニ對シ毒力强キモ (MLD 10^{-5} ~ 10^{-6} mg) 家兔ニ對シテハ弱シ (MLD 1~5 mg) 海猿ハ本菌ニ對シ高度ノ抵抗性ヲ示シ 30 mg ノ大量ヲ接種スルモヨク之ニ耐ヘ健存ス コノ點亦腺疫菌ニ一致ス (Table 3 参照)
- (7) 本菌ノ分離直後ニ於ケル溶血環ハ直徑 1.4~1.6 mm ニシテ安東氏分類⁽²⁵⁾βm 型ニ屬ス コノ點本分離菌ノ定型的腺疫菌ト異ル唯一ノ特徴ナリ

(8) 馬血清加寒天斜面ヲ用ヒ本菌ヲ毎月1回好氣性累代培養ヲ行ヒタルニ急激ニ溶血性ヲ増進シ數代ニシテ固定シ定型的腺疫菌ニ還元セリ (Table 4 參照) 但シ炭酸瓦斯供給培地ニ培養ヲ繼代スル場合ハ好氣性累代培養ニ比シ溶血性ノ増進著シク阻止セラル

(9) 以上ノ如ク本分離菌ハ溶血環ノ狹キ點ヲ除ケバ其他ノ性狀完全ニ定型的腺疫菌ニ一致スルモノニシテ而カモ該弱溶血性モ人工培養ノ繼代ニヨリ容易ニ強溶血性トナリ定型的腺疫菌ノ夫ト區別シ能ハザルニ至ル斯ノ如キ事實ヨリ考察シ本菌ハ恐ラク感染馬體內ニ於テ何等カノ原因ニヨリ定型的腺疫菌ノ溶血性ヲ減弱スルニ至レル變異型ナル可シト解シ得ルガ如シ

(10) 斯ル非定型的弱溶血性腺疫菌ニヨル腺疫ノ發生ハソノ診斷ヲ誤マラシメ爲ニ之ガ豫防措置ヲ遲延セシムル危險アリ 從テ非溶血性腺疫菌ト同様弱溶血性腺疫菌ノ存在モ亦腺疫豫防上ノ觀點ヨリミテ決シテ等閑視シ得ザル實際問題ナリト思惟セラル

撰筆スルニ臨ミ吉村學校長ニ謹ミテ敬意ヲ表シ終始懇篤ナル御指導ト嚴密ナル御校閲トヲ賜リタル囑託葛西博士竝ニ貴重ナル材料ヲ提供セラレタル囑託城井博士ニ謹謝ス

文 献

- (1) SCHÜTZ : *Arch. Tierheilk.*, 14, 172 (1888).
- (2) SAND, G., u. C. O. JENSEN : *Deuts. Z. Tiermed.*, 13, 37 (1888) [LÜPKE, F. : *Cbl. Bakt.*, 5, 44 (1889)].
- (3) POELS, J. : *Fortschr. Med.*, 6, 4 (1888).
- (4) 梅野信吉 : 細菌學雜誌, 第 78 號, 303 (明治 35 年-1901) ; 中央獸醫會雜誌, 15, 1 (明治 35 年-1901).
- (5) HOLTH : KLIMMER u. WOLFF-EISNER — *Handbuch der Serumtherapie und Serumdiagnostik in der Veterinär-Medizin*, Leipzig, 226 (1911).
- (6) KOCH, J., u. N. POKSCHISCHESKY : *Z. Hyg. u. Infektkr.*, 74, 1 (1913).
- (7) MAASS, C. : *Cbl. Bakt.*, I, Ref., 57, Beiheft, 258 (1913).
- (8) ADSESEN, V. : *Ibid.*, I, Orig., 76, 111 (1915).
- (9) JONES, F. S. : *J. Exp. Med.*, 30, 159 (1919).
- (10) 小國及澤田 : 獸疫調査所報告, 第 9 號, 85 (大正 15 年-1926).
- (11) 梅野早苗 : 細菌學雜誌, 第 360 號, 67 (大正 15 年-1926).
- (12) KLIMMER, M., u. H. HAUPT : *Cbl. Bakt.*, I, Orig., 101, 126 (1927).

- (13) OGURA, K.: *J. Jap. Soc. Vet. Sci.*, 8, 174 (1929).
- (14) EDWARDS, P. R.: *J. Bact.*, 25, 527 (1933).
- (15) EVANS, A. C.: *Ibid.*, 32, 541 (1936).
- (16) 梅野早苗 (UMENO, S.): 日本獸醫學會雜誌 (*J. Jap. Soc. Vet. Sci.*), 15, 296 (昭和 11 年-1936); 16, 259 (昭和 12 年-1937);
UMENO, S.: *Kitasato Arch. Exp. Med.*, 15, 262 & 294 (1938).
- (17) 西 (NISI, T.): 日本獸醫學雜誌 (*Jap. J. Vet. Sci.*), 1, 184 (昭和 14 年-1939).
- (18) 並河 (NAMIKAWA, S.), 栗原 (KURIHARA, Y.) 及江守 (EMORI, M.): *Ibid.*, 2, 518 (昭和 15 年-1940).
- (19) 辻 (TUJI, Y.) 及佐藤 (SATO, A.): *Ibid.*, 2, 593 (昭和 15 年-1940).
- (20) 辻及佐藤: *Ibid.*, 3, 71 (昭和 16 年-1941).
- (21) 並河 (NAMIKAWA, S.) 及佐藤 (SATO, A.): *Ibid.*, 3, 337 (昭和 16 年-1941).
- (22) 越智 (OCHI, Y.) 及平尾 (HIRAO, R.): *Ibid.*, 3, 49 (昭和 16 年-1941).
- (23) 越智及平尾: *Ibid.*, 4, 697 (昭和 17 年-1942); 5, 73 (昭和 18 年-1943); 5, 243 (昭和 18 年-1943).
- (24) 久池井 (KUTII, T.), 佐藤 (SATO, A.) 及葛西 (KASAI, K.): *Ibid.*, 4, 745 (昭和 17 年-1942).
- (25) 安東及伊藤: 細菌學雜誌, 第 310 號, 377 (大正 10 年-1921); 安東: 同上, 第 319 號, 167 (大正 11 年-1922).
- (26) 小林六造: 東京醫事新誌, 55, 717 (昭和 6 年-1931).
- (27) 渡部成三 (WATANABE, S.): 日本獸醫學會雜誌 (*J. Jap. Soc. Vet. Sci.*), 13, 337 (昭和 9 年-1934); 16, 297 (昭和 12 年-1937).
- (28) 野畑良作 (NOBATA, R.): 日本獸醫學雜誌 (*Jap. J. Vet. Sci.*), 1, 610 (昭和 14 年-1939).

ON THE WEAK-HEMOLYTIC FORM OF *STREPTOCOCCUS EQUI* ISOLATED FROM STRANGLES FOALS.

T. KUTII, A. SATO, M. EMORI and G. SEKO.

(From the Epizootiological Division, Army Veterinary School, Tokyo).

In February of 1940, we tried to find the causative bacteria in the mortal cases of a strangles-like disease in 5 yearlings, which had been treated with virus vaccine of Japanese equine encephalomyelitis, and could isolate streptococci manifesting a narrow hemolytic zone innumerable from the submaxillar, retropharyngeal and rectal glands, abscesses of lungs and oesophagus; in one case (*vid.* Fever Curve), and in a small number from the retropharyngeal glands of the other case.

The isolated streptococcus was found to have the following characteristics:

- (1) The present organism was detected as a long chain provided with well-developed capsule in the materials from the foals.
- (2) It shows a growth quite similar to the G-colony⁽¹⁶⁾ of the typical *Streptococcus equi* on horse serum agar. And it forms the tangled-thread colony, the same as *Str. equi* does, under FORTNER'S anaerobic cultivation.
- (3) It ferments salicin, but not lactose, sorbitol and trehalose.
- (4) Its growth does not at all erode the fluorescent film of *Pasteurella suisseptica* on agar plate, as *Str. equi* does not.
- (5) The results of cross precipitation tests carried out after LANCEFIELD'S method, show that the isolated organism is almost identical to *Str. equi* antigenically. (Table 2).
- (6) This streptococcus is highly virulent in mice (MLD $10^{-5} \sim 10^{-6}$ mg), and of low virulence in rabbits (MLD 1~5 mg), while it is almost non-pathogenic for guinea-pigs in that even a large dose, such as 30 mg, does not affect them. (Table 3). This respect accords also completely with that of *Str. equi*.
- (7) The diameter of the hemolytic zone around its colony, directly after isolation, was 1.4~1.6 mm, while that of the typical *Str. equi* is some 3.0 mm. The weak hemolysis mentioned above is the only respect, in which the present organism differentiates from *Str. equi*.
- (8) By repeating aerobic subcultivation on serum (horse) agar slant monthly, it increases the hemolytic activity rapidly, and becomes un-

distinguishable from the typical *Str. equi* after several generations. (Table 4). However, such a progress of hemolytic activity is markedly retarded by subcultivation under supply of CO₂, compared with that under ordinary aerobic condition.

(9) Thus the isolated streptococcus seems to be identical with the typical *Str. equi*, except in only one respect, which is weak hemolysis. And even this difference disappears readily by subcultivation as stated above.

Considering from these facts, the streptococcus under discussion seems to be in all probability a variant of *Str. equi* which happened to diminish the hemolytic activity in the body of the infected foal.

(10) Ultimately we have learned that the occurrence of strangles due to such an atypical form of *Str. equi* must in the future be taken into consideration in the prevention or eradication of strangles.

The writers wish to express their cordial thanks to Prof. K. KASAI for his valuable advice and ardent help.