生態写真による大形カモメ 4 種幼鳥の識別

山 本 弘*

筆者は1943年以来20年、岩手県中部沿岸において鳥類観察を続けてきたが、数年前まで多くの問題を残していたのは大型カモメ類の幼鳥であった。これらはたとえ採集しても恐らく同定は容易でないと思われるほど個体差、年令差があり、且つ他種との類似性が大きい。

そこで筆者は撮影に努力し、宮古市において 1,000 枚以上の写真を得て比較した結果、識別上の特徴を見出すことができたので、以下その要点を記述する。

ここに考察する種類は：セグロカモメ *Larus argentatus (vegae)* (普通)、オオセグロカモメ *Larus schistisagus* (普通)、ワシカモメ *Larus glaucescens* (稀種、山本「鳥」76号参照)、シロカモメ *Larus hyperboreus (pallidissimus)* (少数) の 4 種である。

嘴 型

性差・年令差も大きく、且つ観察距離、鳥の動作並びに頭部の向き方など、種々事実上の制約はあるが、しかもなお嘴の型は最も有用な種別判定の基準になるようである。

これを第 1, 2 図及び第 1 表で示した。

第 1 図は 2 才程度の ♂ と思われるものの平均的な形態を示した。♂(?) 成鳥が最もいかつく、♀(?) 当才(?) 鳥が最も特徴が乏しいが、正しく横から見る限り、ほとんど総ての場合、宮古に渡来する大形カモメは上記 4 種のうちの何れかに峻別し得る。第 2 図では下嘴の形状の分析である。

第 1 図 大形カモメ類 4 種の嘴型 (The bill-shape of the four species of gulls)

第 2 図 下嘴の型 (The lower mandible)

* 岩手県宮古市八幡前 40

(Pl. 1~4 1962年12月~1963年1月 筆者撮影)

Plate 1. セグロカモメ *Larus argentatus*

- 1) 2才♀, 細斑型で淡色型 (2nd year ♀, pale fine-marking type)
- 2) 当才冬♀, 細斑型で濃色型 (1st year ♀ winter, deep fine-marking type)
- 3) 当才冬♂, ゴマ斑型 (1st year ♂ winter, large-marking type)
- 4) 2才冬♂, 細斑型で濃色型 (2nd year ♂ winter, deep fine-marking type)
- 5) 亜幼鳥♂ (Subad. ♂)
- 6) 亜幼鳥♀, 特に小形, 向うはオオセグロ (背面等の濃色は近い小枝の陰)
(Subad. small ♀, with *L. schistisagus*)

Plate 2. オオセグロカモメ *Larus schistisagus*

- 1) 幼羽型を残す当才♀ (1st year ♀)
- 2) 当才冬♂ (1st year ♂ winter)
- 3) 当才冬♀, 濃色斑の大きいもの (1st year ♀ winter, with large dorsal markings)
- 4) 当才冬♂, 珍しい斑紋のもの (1st year ♂ winter, a rare type of markings)
- 5) 成鳥♀ (Adult ♀)
- 6) 2才♀, ごく普通の型 (2nd year ♀, the general type)

Plate 3. ワシカモメ *Larus glaucescens* (Except 6)

- 1) 幼羽型を残す当才鳥 (1st year bird)
- 2) 当才冬♀ (1st year ♀ winter)
- 3) 成鳥♂ (右はオオセグロ幼) (Adult ♂, with juvenile *L. schistisagus*)
- 4) 成鳥♀ (三列風切羽のふくらみは乱れていて標準型を示していない) (Adult ♀)
- 5) 成鳥♀ (手前はオオセグロ3年) (Adult ♀, with *L. schistisagus*, 3rd year)
- 6) [オオセグロカモメ3年♂] (手前はウミネコ成鳥) (*L. schistisagus* 3rd year ♂ with *L. crassirostris*)

Plate 4. シロカモメ *Larus hyperboreus*

- 1) 当才冬♀ (1st year ♀ winter)
- 2) 当才冬♀ (1st year ♀ winter)
- 3) 当才冬♂ (1st year ♂ winter)
- 4) 当才冬♂ (1st year ♂ winter)
- 5) 3年めの春先♀ (向うはオオセグロ2年め) (3rd year ♀ early spring, with *L. schistisagus*, 2nd year)
- 6) 3年めの春先♀, 濃斑型 (3rd year ♀ early spring, heavy-marking type)

第 1 表 大形カモメ類 4 種の嘴型の特徴
(Bill-type analysis of the four species of gulls)

		セグロカモメ <i>L. argentatus</i>	オオセグロカモメ <i>L. schistisagus</i>	ワシカモメ <i>L. glaucescens</i>	シロカモメ <i>L. hyperboreus</i>
嘴 概 観		頑丈で鋭い	大形カモメらしさが 少ない	長く見えて短い	下嘴ごと曲る
曲 り 方		大きく強く	大きく弱く	先端部だけ小さく弱く	下嘴とも大きく弱く
第 2 図 参 照	A : B	約 1 : 0.8	約 1 : 1	約 1 : 1.2	約 1 : 1.5
	α	殆 無	小	大	大
	β	ごく小	小	大	大

羽 色

羽色は当然最も印象的でありながら、各種とも極めて個体差が大きく、そのうえ種の特徴として挙げ得べき明確な共通点が無く、しかも変異の様態が各種相互に類似する場合が多いので、一般鳥類と異なって羽色による種の判別は極めて困難である。

しかし嘴型を確実に観察し得ない場合が非常に多いので、実用上は羽色による判別が重要になるため、極力これを求めた結果を要約して第 2 表とした。

不備な点が多いが筆者として最善を尽した結果である。

形 態

相互によく似たカモメ類どおしであるが、なお却って羽色によるよりは判別が容易な場合が多い。しかしそれは人の容貌を覚えるに似た感覚的な面が多いので、確実に記述することは困難だが、客観的に取り上げ得る面を主としてこれをまとめ、第 3 表とした。

ま と め

20年に互る野外観察と、1,000枚以上の写真とによって、大形カモメ類 4 種(セグロ・オオセグロ・ワシ・シロ) 幼鳥の識別基準を(1)嘴型、(2)羽色、(3)形態について考察し、嘴型図、表及び写真(生態大写真)によってこれを示した。

科学的実験を欠くので不備な点は多く、また誤りも無いとは言いきれないが、従来 of 学界成果は出来るだけ活用したので大誤は無いと考える。

この問題の解決には広汎な実験も行う必要があるが、従来少なくとも日本ではほとんど未解決であった大形カモメ類幼鳥の識別問題を、ここに不完全ながら野外判別可能の域まで引き上げ得たと信ずるものである。

第 2 表 大形カモメ類 4 種幼鳥の羽色の特徴
(Analysis of juvenile plumage patterns of the four species of gulls)

		セグロカモメ <i>L. argentatus</i>	オオセグロカモメ <i>L. schistisagus</i>	ワシカモメ <i>L. glaucescens</i>	シロカモメ <i>L. hyperboreus</i>
1・2才鳥の場合	主 調 色	灰 褐 色	褐 色	褐 色	白 褐 色
	体部(含雨覆)主調色の偏差	薄墨色 ↗ 疑 白 色 ↘ 褐 色 (稀に青黒色)	褐 色 ↗ 疑 白 色 ↘ 濃 褐 色	黄土褐色 ↗ 銀 褐 色 ↘ 褐 色	淡 褐 色 ↗ 白 褐 色 ↘ 淡 褐 色
	(その年令)	(当才夏→当冬・2才)	(当才夏→当冬・2才)	(当才夏→当冬・2才)	(当才夏→当冬・2才)
	体部(含雨覆)羽色と年令との関係	無 関 係	疑白色は 2 才が主	関係稀薄らし	年令の進みと共に白くなるが個体差大
	初列風切羽の色	年令と無関係に淡褐一褐一稀に青黒色	当才濃褐色 2才黒褐色	年令と無関係(?)に淡褐一褐色	当才淡褐色 2才白褐色) 偏差大
	当才冬及び 2 才の体部(含雨覆)の斑紋の型	1) 平均的なゴマ斑 2) 微細な斑紋が不規則に密布(少なければ淡色無斑に近く, 多ければ濃色無斑に至る)	各羽に比較的大形の明瞭な斑紋あり, 全体疑白色の場合も軸斑は明瞭	各羽とも境界明瞭な斑紋は有せず	羽軸と横斑との濃さが等価に見え, 結局セグロの 1) 2) の中間型をなす
亜 幼 鳥	各令冬羽に共通する種の特徴	体部に比して頭・頸が明らかに白い	初列風切羽の色が著しく濃い	初列風切羽の色が体部の色と大差が無い	1) 全身殆んど同色に見える 2) 飛行中, 初列風切羽の基部が特に白く見える
	鳥	成鳥に類似, 初列風切羽は幼鳥型(羽色ではワシカモメ亜幼鳥との区別不可能)	成鳥に類似初列風切羽は幼鳥型(種の識別を誤る憂いなし)	成鳥に類似, 初列風切羽は幼鳥型(羽色ではセグロカモメ亜幼鳥との区別不可能)	3才鳥に類似, 風切羽はやや着色
	鳥	成鳥に類似, 頭部に着色多, 風切羽の白斑やや小	成鳥に類似, 頭部に着色多	成鳥に類似, 頭部に着色多	白色に近いが必ず細かい横斑あり, 特に♀に横斑明瞭のもの多
(参考) 年令の判定	当 才 夏 型 (各種とも稀)	肩羽濃色地に幅の狭い淡色へりとり	同 左	同 左	肩羽へりとり広く軸斑の幅狭し
	当 才 夏 冬 と も	嘴黒褐色	同左, 風切羽褐色	同左, 同左	同左, 各風切羽淡褐色
	2	才 嘴基部明色	嘴基部明色傾向	同 左	同 左
	3	才 嘴に黒斑を残す場合多し	同 左	同 左	同 左

(註 1): 当才冬羽と 2 才羽とを羽色で区別するには三列風切羽の斑紋が有用らしいが, 種々問題があり, 結論は保留する。

(註 2): 羽色・嘴色等よりすれば, 成育程度は各種とも個体差が大で, 野外観察の結果では必ずしも総て 4 年目に成鳥になるとは言いきれないように見える。シロカモメのみが亜成鳥型を持たないわけになるのも不可解である。よほど大がかりな実験を経なければ解決がつかない問題なので, 第 2 表は文献からあまり逸脱しない程度に一応整理したものである。

第3表 大形カモメ類4種の形態の特徴
(External features of the four species of gulls)

	セグロカモメ <i>L. argentatus</i>	オオセグロカモメ <i>L. schistisagus</i>	ワシカモメ <i>L. glaucescens</i>	シロカモメ <i>L. hyperboreus</i>
大きさ {最大のもの 最小のもの}	最大のカモメ オオセグロ程度	やや小形 やや小形} 偏差少	最大のカモメ ウミネコの平均程度	最大のカモメ(♂) ウミネコの平均程度 (♀)
概 形	各部の発達よく極めて立派である	ひきしまつてスマートに見える	短大で、ごろりとした感じをうける	カモメらしくない感じあり(♂)可愛い感じのカモメ(♀)
初列風切羽の長さ 飛行中の翼型	尖って長い	尖って長い	やや短い 他種に比してやや翼端が円い感じあり	尖って長い
其の他の特徴	♂の腮・喉の皮膚のたるみは顕著で種の識別に役立つ褐色味の多い幼鳥を土地の人はワシカモメと言ひ、実感がある	他の3種に比し成・幼ともカモメに似た感じがある(事実は大いに違うが)	水上等で三列風切羽をふくらませている場合、その外縁を結ぶ線が弧に近いきれいな曲線を描く	♂♀それぞれ他種に無い独得の顔貌を有する
混同し易い他種	淡色型幼鳥はシロカモメ幼鳥に似る 亜幼鳥はワシカモメ亜幼鳥に酷似する		1・2年鳥はオオセグロに似る 亜幼鳥はセグロカモメ亜幼鳥に酷似する	幼鳥♂はセグロカモメに似る 小形の♀は種々なカモメ類と間違い易い

附記 カモメ類の幼羽及び換羽については下記の Dwight の総説があり、山本氏の本文に関連して参考のため大要を抜萃する。

Dwight, J. 1925. The gulls (Laridae) of the world; their plumages, moults, variations, relationships and distribution. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 52 (Art. 3) : 63~401.

カモメ類(主に大型種)の幼羽及びその換羽は次のようにまとめられる。

幼羽 巣立後第1回冬羽になるまでの暗色羽衣で、初列風切は先が尖り、尾羽は先が円い。換羽の時期には個体差が多い。

第1回冬羽 体羽の換羽で翼や尾は換羽しない。主に背、頭頸、咽が変り腹部は殆んど変らない。大型種では一般に羽色は幼羽に極めて似ており(特にすれた羽毛は)ただやや淡色、灰色になる。

第1回夏羽 蕃殖期の1~2ヶ月前に起る部分換羽で、やはり翼尾は変らない。この換羽でもう一回暗色羽を生ずるが、一般に淡色で頭部が白っぽくなり、背はより灰色となる。この羽色で蕃殖した例は知られていない。小型種では多少成鳥に似てくる。

第2回冬羽 蕃殖後の完全換羽で生じ(雌は雄よりやや遅れる)、風切羽と尾羽ははじめて換羽し、新生の風切羽は先が円く尾羽は角ばってくるので1才と2才以上の最もよい区別の一つとなる。小型種ではこの換羽で成羽となり、中型種には個体により成羽を部分的に生じ、大型種では一般にもう一回幼羽と区別し難い羽色に戻る。しかし多少斑が変り或は変色しとくに背に成羽に近い羽毛を生ずる場合がある(例えば、セグロカモメは斑が微細状になり、背に銀灰色の羽も不規則に混る。オオセグロカモメは殆んど全褐色から暗青色の羽を多く混えるものまであり、ワシカモメでは多少成羽の灰色を帯び、シロカモメでは斑は淡くまたは純白になる)。

第2回夏羽 二回目の蕃殖前に起る部分的換羽で、小型種は顔の黒色とか嘴の色は成鳥と変らなくなる

が、大型種では冬羽とは頭頸、胸部の斑が少なく白くなること、背の成羽型羽毛が多くなること、露出部が濃くなること、とくに嘴の黒色が次第に消えてくること、などで違ってくる。

第3回冬羽 二回目の蓄殖後の完全換羽で生じ、小型種では第2回夏羽をくり返し、中型種では成羽となり、大型種は翼（とくに初列両覆）や尾その他に暗色斑を多少残すほか一応成羽となる。

第3回夏羽 蓄殖前の部分的換羽で生じ、すべて成羽となるが、大型種では第3回冬羽の翼や尾や何枚かの暗色の体羽を残すものがある。

第4回冬羽 蓄殖後の完全換羽で生じ、大型種も完全成羽となるが、翼尾嘴に多少未完成の特徴を残すものがある。

第4回夏羽 部分的換羽で生じ、翼や尾はしばしば非常にすれている。

結局 生後まる1年の間には、初生綿羽——幼羽——第1回冬羽——第1回夏羽の換羽を行い、第2年目以後は、冬羽と夏羽の2種をくり返す、成羽は小型種は第1回夏羽で、中型種は第2回夏羽、大型種は第3回夏羽で生ずる。ただし時にまる1年遅れていると思われる個体がある。なお山本氏の嘴図型も Dwight の図と大体一致している〔編者(黒田長久)記〕。

Photographic identification of four large gulls in young plumage

Hiroshi Yamamoto

Based on 20 years observation made at Miyako, northern Honshiu, and over 1,000 photographs, the confusing young plumages of *L. argentatus*, *L. schistisagus*, *L. glaucescens* and *L. hyperboreus* were analysed comparatively. Chief points discussed are bill-shape, plumage pattern and general features which are shown in tables, figures and photographs. Although there are large individual and age variations in the markings and body size, the author could specify the species-specific patterns and the bill-shape was a good specific character.

A summary of molting of gulls is given by editor from Dwight (1925).

40 Hachimanmae, Miyako City, Iwate, Honshiu