保 護

Conservation

フクロウの生態に関する知見と人工飼育
による孵化について

風 間 辰 男*

1. はじめに

日本産のフクロウ *Strix uralensis* については、その生態が殆んど知られておらず、断片的な観察報告だけであった。また人工飼育(傷害を受けた個体)による孵化例は皆無であると思われ、本年は傷害を受けた2羽(♀, ♂)の個体から受精卵を産卵させ、更に人工孵化に成功した。

新潟県では1971年12月、西蒲原郡巻町にきじ養殖場を建設し、年間2000～3000羽のキジ *Phasianus colchicus* の生産を行なうとともに将来建設される鳥獣保護センターの準備として、傷病鳥(原則として野鳥のみ)の治療と飼育もかねることになった。それ以来本年4月までに保護飼育した鳥類はヒシクイ *Anser fabalis* をはじめ52種、250羽余にもなっている。そのうち本種は18羽であり治療飼育過程において、これまで発表されていない生態の知見と傷病個体からの産卵、孵化の成功を見たので発表する。

本文を作成するにあたり、種々ご指導ご校閲を頂いた山階鳥類研究所の黒田長久博士に深く感謝する。

2. 飼育場所の位置及び環境

Fig. 1 に示したように、飼育場の位置は新潟県の中心部からやや北部よりの西蒲原郡巻町角田浜であり(Fig. 1)、海岸線から直線にして約500メートルの地点で角田山(482メートル)の西側麓である(Fig. 2)。

Fig. 1. 飼育場所の位置図

* (950—21) 新潟市坂井 1398—3 新潟県きじ養殖場, 傷病鳥救護舎

Fig. 2. 新潟県きじ養殖場, 傷病鳥救護舎

面積1ヘクタールの黒松林を開拓して建設したもので冬期の降雪量は県内で最も少なく例年20～30センチであり, 最高の年でも50センチを越えることは殆んどない。付近は山林と畑地であり, 人家もまばらで自然環境は比較的良好佐渡弥彦国定公園の中に含まれている。

しかし人為的に1970年から始まった採石工場が2ヶ所あり, 最も近いK採石場は200メートル位, H採石場は500メートル位と, 屋中は毎日震度2～3の地震と同じくらいになやまされており鳥獣にとって良い環境とはいえない状態となっている。

1971年12月～72年5月頃までは発破音と震動が極めて激しく最高1000 kg, 最低でも100 kgの火薬を使用し, 2～5 kg のがん石がきじ養殖場まで飛散し, 人命に危険を及ぼす状態で, せっきくのきじ養殖はもちろんのこと死傷者まで発生しそうなことが明らかになったため, 再三業者と県, 町, 部落で協議をし, 1972年6月から最高100 kg までとするように変更してもらい, なんとかがん石の飛散をまねかないようにした。それでも平均40 kgの火薬が2年間(1972年6月～1974年5月)にK採石場が566回, H採石場が485回であり, 本種の産卵期(1973年3月～4月, 1974年3月～4月)K採石場が156回, H採石場が133回(火薬は平均40 kg でこの間月平均73回)があった。

キジの場合はわずか1 kgの火薬でも感ずるが(震動測定器で測定できない震動でも感ずる), フクロウの場合は音だけに反応を示した。

3. 救護された各個体の状況

フクロウの収容個体を見ると (Table 1), 人為的な傷害が多く, 18体のうち6体は自動車や銃傷であり, 残りの12体はすべて幼鳥で巣から落下したものである。これらはすべて県自然保

Table 1. 保護飼育状況 (1971. 11~1974. 5)

附番	収容年月日	年齢	傷 の 程 度	放鳥	飼 育 中	落鳥	鳴	産卵
A	1971. 11. 8	若♀	電線衝突左眼, 神経傷		自然復帰不可能		○	○
B	1972. 6. 5	幼	巣から落下栄養失調	○				
C	" 6. 6	"	自動車接触右足骨折	○				
D	" 7. 5	" ♀	Bに同じ		Aに同じ*		○	○
E	" 9. 8	若	Cに同じ右翼切断			○		
F	1973. 3. 25	成♂	Cに同じ左翼切断		Aに同じ		○	
G	" 5. 13	"	両足まひ(P C B, P C T)			○		
H	" 6. 5	幼	Bに同じ		自然復帰可能○		○	
I	" "	"	"		" ○		○	
J	" "	"	"	○				
K	1974. 2. 10	成	銃傷			○		
L	" 5. 9	幼	Bに同じ右足骨折		Hに同じ			
M	" "	"	"		"			
N	" 5. 19	"	Bに同じ "		"			
O	" "	"	"		"			
P	" 5. 20	"	"		"			
Q	" 5. 27	"	"		"			
R	" "	"	"		"			

護課から鳥獣行政を委任してある保健所を通じて本場に収容されたものである。これらに対する捕獲許可は筆者が年間を通じて(6ヶ月ごとに更新)環境庁長官から得ている。

4. 治療及び飼育方法

(1) 治療 外傷の場合はよく水洗いし、患部にマーキュロクロム液を塗布する。出血が多い場合はビニールテープで固定してしまう。

内部疾患の場合は餌にテラエック(テラマイシン総合ビタミン剤)を与える。栄養失調が殆んどであり、回復は容易である。

なお注射は絶対に禁物である。

(2) 飼育 Fig. 3, Fig. 4, に示したように1973年7月まではきじ養殖の幼雉舎を利用して行なったものであり(⑥の地点で飼育), その後は救護舎が完成したのでそこに移動した(⑨の地点)。

また Table 1 に示したA Fの個体は1974年2月末⑨から⑥へ再度移した(受精卵を得るため)。飼育面積は傷が治るまでは3.3平方メートルの四方とざされた場所で手当をし、治ゆ後は6.6平方メートルの三方金網、屋根は60センチ四方のベニヤ板をのせてあるだけの場所で飼

Fig. 3 新潟県きじ養殖場図面

凡 例			
①	管 理 事 務 所	⑪	試 験 キ ジ 舎
②	孵 卵 室	⑫	放 飼 場
③	倉 庫	⑬	"
④	幼 キ ジ 舎	⑭	"
⑤	"	⑮	受 水 そ う
⑥	"	⑯	ポ ン プ 室
⑦	種 キ ジ 舎	⑰	正 門
⑧	"	⑱	場 内 道 路
⑨	"	⑲	傷 病 鳥 救 護 舎
⑩	"	⑳	外 柵

育した。場所内は特別の施設はせず止まり木1本だけしかない、下の部分はキジ飼育に必要な川砂を高さ15センチにしている。

(3) 餌の状況 成鳥は餌を一日平均120g食べるが、5月～8月までは求餌量が少ない、これは育すう期で幼鳥に餌を与えているので、あまり餌を食べないものと思う。9月～翌年4月頃までは場合によって一日200g位食べる。

成鳥は夜だけしか与えない。水は与えておくが夏期を除いては殆んどのまない。夏季はしばしば水浴をする。

幼鳥の場合(本場に收容された個体は孵化後30日位で350g前後)は收容後2ヶ月位は昼と夜の2回給餌した(自然の場合巢中にいるヒナ及び巣立ち後相当の期間親鳥が昼も餌を与えているのを観察している)。

餌の平均は4ヶ月位は1日平均200g位であるが、その後は成鳥と同じ量になる。

Fig. 4. 幼きじ舎 (Fig. 3. の⑥の場所)

与えた餌は鶏のヒナ40%, キジのヒノ20%, 鶏頭10%, ノウサギ5%, タヌキ5%, カモ類5%, スズメ5%, ネズミ5%, イタチ4%, ヘビ類1%の割合であった。

5. 人工孵化及び飼育 (Table 2)

1) A個体 (1973年度)

1973年3月から4月にかけて Fig. 3 ⑥の場所で Fig. 5, 6, 7, 8 のように産卵したので

Table 2. 人工飼育 (人工孵化したもの) によるキジとフクロウの比較

日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	卵の重さ
体重と飼量(g)											
フクロウ 雛 X	38.5	36	落鳥								47.5
” Y	36.5	33	33	35	37	落鳥					45
餌の量(1日)	○	3	5	7	10						
キジ 雛	16	14	15	17	18	20	23	26	28	30	27
餌の量(1日)	○	○	1	2.7	4	4.5	4.5	6	8.5	8.6	

1) 重さはすべてg

2) キジは100羽育すう時の平均である。卵の量も1000卵の平均

3) キジは卵と同じ量になるまで8日間かかる。

4) 餌の量はフクロウの場合は一応キジと比較して与えた。

5) フクロウは孵化後7日間位まで眼があかないと思われるので、この間の給餌方法は全く不明のため落鳥させた。

Fig. 5. A 個体
2 卵目 (1973年 3 月 28 日)

Fig. 6. A 個体
3 卵目 (1973年 4 月 1 日)

Fig. 7. A 個体
3 卵目 (1973年 4 月 3 日)

Fig. 8. A個体
5 卵目（1973年 4 月 7 日）

Fig. 9. D個体
1972年 6 月 6 日保護放容

Fig. 10.
D 個体の産卵状況

Fig. 11.
D個体1974年3月31日産卵

Fig. 12. F個体 (上)
A個体 (下)

早であることが判明した。

本個体は1972年5～6月筆者が本場で45日間泊っていた時にさかんにゴロスケホツホツと鳴いた。野外の個体と鳴き合いをしており、野外の個体が本個体のそばへ来ると互いにホーホホ……と愛情を示すような声に聞こえた。

産卵した5卵は無精卵であったが、抱卵させておいたところ（抱卵は2卵目から行った）21日目全卵を破そんしてしまった。

2) D個体 (1973年度)

1972年6月6日巣から落下し餌がとれず栄養失調状態で保護された（孵化後30日前後と推定、体重375g）。

本個体は1973年1月中旬頃からゴロスケホッホッと鳴き始め、その後人間になれたせいか一年中鳴いている。

本個体は3月27日と4月2日に産卵し早であることが判明した (Fig. 9. 10)。

また1974年は3月31日に1卵産んだだけであった (Fig. 11)。

3) F個体

Fig. 12 の枝に止まっているのが本個体であるが、1973年3月25日自動車にはねとばされ左

Fig. 13 4卵……A個体の卵
3卵……鶏卵
2卵……サンケイの卵

Fig. 14. A, F個体から孵化したヒナ

翼切断で保護された。6月にゴロスケホッホと鳴き12月頃からはさかんに鳴いた。本個体は嘴峰及び体重、羽色から判断して雄の成鳥と認め、1973年10月からA個体と一緒にしたところ、A個体は本年3月14, 17, 20, 23日に計4卵を産み(Fig. 13), これを孵卵器に入れたところ有精卵であり、2体のヒナが孵化した(Fig. 14)。

よって本個体は雄であることが判明した。

4) B, C, H個体

3体はいづれも幼鳥で保護され、独力で餌をとれるようになってからすべて放鳥した。

5) E, G, K個体

3体はいづれも成鳥であったが、治ゆの効果なくすべて落鳥した。

E, Kについては人為的なものであったが、Gは両足がまひしており解剖後の検査で PCB, PCT の検出を見注目された。

6) H, I, J個体

1973年6月5日にH, I, Jの3兄弟の幼鳥が保護されて来たが、放鳥後残った2個体は本年2月頃からゴロスケホッホとさかんに鳴いた(Fig. 15)。

7) 番にしたA, F個体の状況

1973年10月～74年2月下旬までは Fig. 3 ⑩の場所で飼育していたが(6.6平方メートル)産卵時期になったので Fig. 3 ⑥の3.3平方メートルの場所に移した。

非常に仲が良く、夜間小さなあまえるようなホッホホホ……ホホという声を出し交尾しているようだった(この件について、新潟県野生鳥獣生態研究会の波辺央氏の私信によれば、同氏の夜間における観察で、遠方で互いにゴロスケホッホと鳴き合い、そばへくると互いに

Fig. 15. 1973年6月5日に保護されたH, I, Jの幼鳥

Fig. 16, A個体が抱卵して孵化したニワトリのヒナ

ホッホッ・…ホホと小声で鳴きあまえるように、多分交尾しているようだったとのことである)。

産卵は1973年より11日早く3月14日に生み始め、17, 20, 23日と4卵生んだ。

うち2卵は破損してしまった。

1973年は5卵生んだが1個体雌のみであったので無精卵であったが、2卵目から抱卵し21日目に全卵破損してしまった。本年は鶏卵ととりかえ、孵卵器に入卵した。鶏卵4卵を抱卵させたところ、Fig. 16のようにヒナが19, 20日と3羽孵化したがこれは全部夜間に食べてしまった。

昨年抱卵中卵を破損したのは湿度が足りなかったためと判断されたので本年はボールに1リットルの水を入れておいた。水は毎朝からっぽになっており、夜間水で体をぬらして湿度を保っていたものと思う。

雌が抱卵している間は雄が木枝に止まりじ

っとしている。餌は夜間雄が雌に与えていた (Fig. 12)。

8) 卵の状況

A個体：1973年3月25日43.7 g, 23日45.5 g, 4月1日46 g, 4月3日44 g, 4月7日45 gの5卵産卵。

1974年3月14日45 g, 17日47.5 g, 20日45 g, 23日44 gの4卵産卵。

D個体：1973年3月27日40 g, 4月2日43 g, 1974年3月31日45 gの3卵産卵。

以上のA個体の9卵, D個体の3卵の計12卵の重量は平均44.5 gであった。

9) 気温の状況

1973年3月1日～31日 Fig. 3 ⑥の場所と外の温度は平均, 内5.7°C, 外3.7°C。

4月1日～30日は平均, 内13.3°C, 外16.2°C。

1974年3月1日～31日 Fig. 3 ⑥日の場所と外の温度は, 平均内4.2°C, 外3.3°C。

4月1日～30日は平均, 内11.5°C, 外13.2°Cであり, 昨年の方が気温が高いが, 産卵は本年が早くなっている。この点から気温よりも日照時間が大きく影響することが証明された。

10) 孵卵器入卵状況

本年A個体が産卵した4卵のうち完全な2卵を入卵した。孵卵器は立体自動転卵式である。Fig. 17 のようにして本種の抱卵中の体温を測定したところ, 約3分で39.4°Cになることが判明したが, これは直接の温度であり, 全般的には38.4～38.8°C位と判断し, 最低38.4°C～最高38.8°Cにして作業を開始した。推定25日前後が孵化時期と思われるので, 7日目の3月30日に検卵したところ有精卵であり, その後7日目の4月6日にも検卵をしたが中止していなかった。25日目の2日前の4月16日に回転中止をし, 孵卵座へおろした。

Fig. 17. A個体の体温測定

湿度は $30^{\circ} \sim 31.5^{\circ}$ にしておいた。

4月18日に1卵孵化, 19日に2卵目がそれぞれ孵化した (Fig. 14, 18)。

11) 人工飼育の状況 (Table 2)

2羽のヒナをXYとする。

X……3日目に落鳥した。餌の与え方をあやまったためと思う。

Y……6日目に落鳥, Xと同様と思う。

孵化直後のヒナはX38.5g, Y36.5g, 5日目でもまだ眼はあかないし, 外耳孔も殆んど開かない。

XYの個体の比較は Fig. 14, 13 及び Table 2を参照。

Fig. 18. 1974年4月18日に孵化したヒナ

6. 結果及び考察

1) 傷病と治ゆの状況

幼鳥の場合は巣からの落下が原因であり, 衰弱のひどい個体を除けば栄養剤も与える必要がなく, 100% 元気になり, 飼育後回復放鳥した個体を含め, 現在飼育中の個体も近く放鳥できる。

成鳥は人為的の場合が多い, 自動車に衝突, 翼が切断されてしまった個体2, 銃による個体1, PCB, PCT 汚染によると思われる個体1, 若鳥も含め5体収容されたが3個体は落鳥している (Table 1)。

成鳥の場合は治ゆしても放鳥できる個体が1体もなかった。

2) 採餌状況

非常にデリケートで同種の餌を10日間位与えると食べなくなるから色々な餌を与えないと飼育できない。筆者が1958年から1968年まで違法に捕獲した本種の幼鳥87羽を見つけ、成人には厳重注意、「少年は補導した（当時筆者は警察官）。このうち7羽は筆者が引きとり標識放鳥したが、80羽は6ヶ月以内で落鳥している。飼育の困難な時期は孵化後60日位のちょうど7月中旬頃から9月上旬の期間で、気温が 25°C になってくると餌の食いが悪くなって、 30°C 以上になった場合は全く食べなくなる。鶏頭その他かたい骨の場合はくだいて与えることが大切である。幼鳥の時期にやわらかい肉片や臓物ばかり与えると本種に大切なペリットの不可能な体になってしまい、これにネズミや小鳥をまるのまま与えるとペリットがでなくなって食道ないし腸道閉鎖となって落鳥する。本種を健康体に飼育するには餌をそのままの状態（ネズミは毛のついたまま、小鳥などは羽毛のついたまま）で与えることが大切である。

3) 鳴き声

Table 3に示したようにA個体は1973年3月に産卵したことから雌であることが判明したが、筆者が1972年5～6月に本場に宿泊していた時夜間さかんにゴロスケホッホッホ……と鳴いた。

D個体は収容された時幼鳥であったが、孵化後8ヶ月目にゴロスケホッホッホと鳴いたが、1973年3月に産卵し雌であることが判明した。本個体は人間になれすぎているため放鳥しても再三帰ってくるので現在飼育継続中である。不思議に年中ゴロスケホッホッホと昼夜鳴いてい

Table. 3. 鳴いた状況

季節 月	冬			春			夏			秋		
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A ♀	■	■	■				■	■	■			
D ♀	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
F ♂	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
H ♂?		■	■	■	■							
I ♂?		■	■	■	■							

● 一 ■ 一 ■ 一 ■ 鳴いた量
少 多 多

- 1) A(♀)は収容時若鳥。
- 2) D(♀) " 幼鳥(孵化後8ヶ月目に鳴いた)。
- 3) F(♂) " 成鳥。
- 4) H, I(♂?)は収容時幼鳥でありと判断したが、孵化後8ヶ月で鳴いた。
- 5) Dは人間になれているため鳴きはじめてから昼夜でもさかんに鳴く。筆者が手を振ればいつでも鳴き出す。また人が鳴きまねをするとこれに答える。

る。

F 個体は収容された時成鳥であり、体格から見て雄と判断し A 個体と番にしたところ有精卵を得たので、雄であることがわかった。この F 個体も 1973 年 12 月～現在まで夜間ゴロスケホッと鳴いている。Fig. 16 の木に止っている個体がそれである。

H, I は体格から見て雄と思われたが、2 個体とも孵化後 8 ヶ月目に A, D, F 個体と同じように鳴いた。なお空腹になるとギャー、ギャーと鳴いた。

3) 繁殖年令

A 個体は 1971 年 11 月若鳥であったのが、1973 年に 5 卵、1974 年に 4 卵。

D 個体は 1972 年 6 月幼鳥であったが、1973 年に 2 卵、1974 年に 1 卵、それぞれ産卵したので、繁殖年令は孵化後 10 ヶ月と判断された。

4) 卵数

清棲 (1965) によれば 2～4 卵、小林 (1971) は 2～3 卵と発表してあるが、本種の産卵数は 2～5 卵であると考えられる。

6) テリトリー

筆者 (1970) は柏崎、刈羽地方の本種を調査した結果と飼育結果から総合して、繁殖のテリトリーはあるが、採餌のテリトリーはないと判断した。柏崎市市中田の営巣地点から同市畔屋の営巣地点の距離は 500 メートル位であり、採餌地は共同となる。飼育した結果、採餌は極めて

Table 4. 1973 年 2 月～4 月の気温と天候

3 月												(10, 00 a.m. 測定)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
吹雪 外-2	曇 2.0	曇 2.0	雨 0	吹雪 -3	吹雪 -2	曇 2.0	雨 2.0	曇 3.6	曇 5.0	晴 7.0	曇 3.0	曇 3.0	曇 5.0	曇 4.0	晴 3.0
内3.0	4.0	4.0	3.0	0	3.0	5.0	4.0	5.0	6.5	6.5	6.0	6.0	7.0	6.0	5.5
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
晴 外 4	晴 4.0	曇 2.0	晴 5.0	曇 0	曇 4.0	曇 4.0	曇 3.0	曇 5.5	曇 7.0	晴 7.0	雨 5.3	雨 5.0	曇 13.0	晴 12.5	
内6.5	6.5	5.0	7.0	3.0	5.5	6.0	6.0	7.8	8.0	8.0	7.3	8.0	10.0	8.8	
												平均 外 3.7° 内 5.7°			
4 月															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
晴 外12.9	曇 13.5	晴 12.5	雨 8.5	曇 12.5	晴 12.5	晴 18.0	晴 22.0	晴 16.0	曇 16.5	曇 20.0	雨 9.0	晴 13.0	晴 17.5	曇 15.0	曇 21.0
内 9	9.5	8.5	9.0	8.0	8.0	17.0	17.0	13.5	13.5	16.0	9.0	10.0	13.5	10.0	15.0
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
雨 外10.0	晴 15.0	晴 17.0	晴 17.0	曇 20.0	雨 13.0	晴 20.0	曇 20.0	曇 21.0	雨 18.0	晴 15.0	晴 20.0	晴 21.0	晴 20.0		
内10.0	13.0	15.0	15.0	17.0	15.0	18.0	18.0	17.0	15.0	15.0	18.0	18.0	17.0		
外は Fig. 3 ⑥の室外の温度												平均 外 16.2°			
内は Fig. 3 ⑥の室内の温度												内 13.3°			

Table 5. 1974年3月～4月の気温と天候

3 月															
(10, 00a. m. 測定)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
曇	曇	晴	雨	晴	雨	雨	晴	曇	曇	雪	吹雪	吹雪	曇	曇	曇
外-1	2.0	3.0	1.5	1.0	-2	2.0	4.0	1.0	2.0	-2	-5	-3	1.0	5.5	5.0
内3.0	6.0	6.0	4.0	3.0	0	6.0	6.0	3.0	0	0	-1	0	2.0	6.0	5.0
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
曇	晴	雨	曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇	雪	曇	晴	雨	雨	
外5.0	6.0	3.5	8.0	4.5	3.5	4.5	4.5	5.5	5.0	2.0	5.5	8.0	6.0	11.0	
内5.0	5.0	4.5	7.5	5.5	5.0	6.0	5.5	6.0	4.5	2.5	4.0	7.0	5.0	10.0	
平均														外 3.3°	
														内 4.2°	
4 月															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
雨	吹雪	雨	晴	曇	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	晴	雨	晴	雨
外6.5	4.0	6.5	13.0	8.0	8.0	20.0	14.5	11.0	9.5	9.0	11.0	13.5	9.5	14.0	13.0
内6.5	5.5	5.0	10.0	6.5	6.5	20.0	14.0	9.0	9.0	8.0	9.0	12.0	9.0	12.0	13.0
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴	曇	雨	曇	晴	曇	晴		
外10.0	20.0	16.0	15.0	17.0	17.0	15.0	21.0	23.0	15.0	11.0	16.0	13.0	15.0		
内 8.0	15.0	13.0	13.0	14.0	14.0	14.0	17.0	18.0	13.0	11.0	13.0	13.0	14.0		
・外は Fig. 3 ⑥の室外の温度														平均	外 13.2°
・内は Fig. 3 ⑥の室内の温度															内 11.5°

紳士的であり、A F, H I の個体はそれぞれ等分に採餌することである。現在鶏のヒナ 6 羽を 2 個体 (A F, H I はそれぞれ同じ場所に入れてある) に与えると、翌朝残す時はかならずと云ってよいほど偶数であり (たまに例外はあるが)、餌を分けあって食べている。また採餌しない時は両個体とも全くしない。

7) 傷ついた個体の繁殖能力

まさかと思った A 個体と F 個体が仲良く番になり Fig. 14 のように受精し人工孵化の成功を見た。A 個体は電線に衝突し左眼と体の神経が侵され飛しよう能力はない, F 個体は自動車に衝突し左翼を尺骨根元から切断してある。両個体とも全くの身体障害であるのに立派に繁殖能力を示してくれた。

8) 産卵に対する温度と日照時間

産卵期の温度と天候は Table 4, 5 のとおりであり、産卵に温度が影響することになると 1974 年の産卵は前年よりおそくならなければならないが、本年は前年より 11 日も早く A 個体が産卵している。

また D 個体は前年と同じ時期に産卵しており、本種の産卵は野外における幼鳥捕獲例 (5 月中に本県の上越地方 1, 中越 2 地方, 下越地方 4 個体とそれぞれ温度の異なる地方から収容されて来たが、生育状況はほぼ同じ位であった (Fig. 19)) から判断し、日照時間による影響が大きく、温度の高低はあまり関係しないと判断した。

Fig. 19. 1974年5月中に保護収容された L, M, N, O, P, Q, R の個体

Fig. 20. P 2 型孵卵器

9) 孵卵器の活用状況

孵卵器はキジ養殖用の P 2 型 (Fig. 20) を用いた。入卵能力はキジ卵 3000 個であり自動回転式である。

5. (10)にのべたとおりであるが、鳥類の習性から判断し樹上に営巣する種は湿度が低い方が発

生し安く、地上に営巣する場合はこの逆と思われる。従って本種の場合も孵卵器における湿度は孵化3日前ではキジより2~3°も低下した。

一般に云われている野鳥の卵の孵卵器による孵化が非常に困難だとされているのは、温度と湿度の関係がわからないためであろう。筆者の経験から、

樹上営巣鳥の場合、

立体孵卵器：温度38.2~38.8°C，湿度30~31%

平面孵卵器：温度39.4~40.6°C，湿度33%前後

地上営巣鳥の場合

立体孵卵器：温度38.2~38.8°C，湿度32%位

平面孵卵器：温度39.4~40.6°C，湿度34%位

であれば大体発生後の個体も足開き、首まがり、腰立たず、横転（上をむいたままの状態）などは発生しないと思う。しかし孵卵器の使用で孵化率70%以上にするには相当高度の技術と経験が必要である。

7. 知見

1) 繁殖年令

A, Dの個体から判断し、孵化後10ヶ月位と推定された。

2) 鳴き声

A, D, F, H, Iの個体から判断し雌雄とも孵化後8ヶ月位で鳴く。

3) テリトリー

繁殖のテリトリーはあるが、採餌のテリトリーはない。

4) ペリットの時間

大体採餌後18時間以上と推定された。ペリットをはき出す時はさかんに口をあけ“あくび”のような動作をくり返してやる。時によっては50回以上もつづけて“あくび”の動作をくり返すこともある。

5) 採餌時間

幼鳥の場合は昼夜とも行なわれるが中心は夜間である。

成鳥の場合は春秋期は午後8時~12時頃の間、秋冬は午後6時~11時頃の間に行なわれる。飼育した場合は冬期気温がマイナス3°C以下になると採餌しない（餌が凍って食べられなくなるため）。

野生の場合気温が下がってネズミ等が採捕できなくなると、養鶏場の鶏や軒下に乾燥してある魚などを食べる。

6) 抱卵日数

孵化日数は27~29日（清棲1965）といわれているが孵卵器の結果からして、26日前後（25, 26日目に孵化した）と思われる。抱卵中の本種の体温は3分で39.4°Cになった。

7) 産卵及びヒナの孵化時間

人工飼育ではあったが、一応産卵も孵化もすべて夜間であるところから、夜行性の鳥類の特徴がうかがわれた。

8) 野生における繁殖羽数と餌の状況

筆者が1958~1968年の間柏崎刈羽地方で調査した一巢の卵数と羽数は3~5羽（卵数も同

じ)が見られ、少ないので2羽であった。しかし低山帯、平野部が極度に開発され始めた1970年頃から一巢2羽が普通となり、1羽の場合もかなり見られ、3~5羽は殆んど見られない状況となって来た。Table 1に示したLM両個体は5月9日に下越地方で一巢、NO個体は5月19日に中越地方の一巢、9個体は5月20日上越地方の一巢、QR個体は5月27日新潟市内の一巢から発見されたものであり、一巢が1~2羽に移行した明らかな例である(Fig. 19)。

Fig. 19の7個体は共同飼育をしているが非常に仲が良く、採餌にあたって争うことはない。これは本種が共同の餌場を利用している習性を示すものである。なお本種の繁殖羽数が減少して来たのは、餌が不足して来たためと思われる。これはシロフクロウなどに見られる傾向であるが、日本産フクロウの場合もあてはまるものと思う。

引用文献

- 風間辰夫 1969. 野鳥新潟 No. 3: 2-3
 黒田長久 1967. 鳥類の研究. 新思潮社
 清棲幸保 1965. 日本鳥類大図鑑II. (470~472頁)
 小林桂助 1971. 原色日本鳥類図鑑. (188頁)
 風間辰夫 1972. 新潟県農林部報告. (7~9頁)
 滝沢行雄, 皆川興栄, 酒井洋, 風間辰夫 1974. PCTの汚染源探究に関する研究(第1報) 野鳥のPCT, PCT汚染. 日本衛生学会総会発表(秋田大医公衛, 新潟県衛研, 新潟県生活環境部)

Cage observation of wounded Ural Owls and their egg-laying in captivity

Tatsuo Kazama

1. In 1971, Niigata Prefecture constructed a wildlife protection center, which includes pheasant raising and bird hospital. By April, 1974, 250 wounded or unhealthy birds of 52 species were treated and 18 of them were Ural Owls *Strix uralensis*, of which 6 were wounded (by car or shot) and 12 were nestlings fallen down from the nest.

2. This paper reports on Ural Owls about the treatment of wounds, cages (3.3 m² for wounded and 6.6 m² for recovered birds), food, artificial raising of chicks and hatching of eggs laid by protected birds. Also, their vocalization is described.

3. In March to April 1973, one of the protected owls (No. A) laid 5 eggs on the ground which were broken and confirmed to be unfertile after 21 days of incubation.

4. A fallen chick (No. D) picked up on 6 June 1972, laid 2 eggs, at 10 month old, on 27 March, 2 April, 1973 and one egg on 31 March 1974.

5. A wounded bird (No. F) protected on 25 March 1973, was kept with No. A from October and No. A laid 4 eggs on 14, 17, 21, 23 March 1974, of which 2 chicks hatched by artificial incubator. But they died on the 3rd and 6th days after hatching. After taking their own eggs (for artificial incubation), 4 chicken eggs were given which No. A incubated until 3 chicks hatched, but these were eaten by owls during that night.

6. All of D, H. and I chicks first uttered characteristic song at 8 month old after hatching.

Niigata Bird Center

(950-21) Sakai 1398-3, Niigata City, Japan.