越冬中に頭羽の伸びたオオハクチョウ

柿澤 亮三*

新潟県北蒲原郡水原町にある瓢湖は、オオハクチョウ (*Cygnus c. cygnus*) の渡来地として知られている。筆者は数年来、瓢湖に渡来、越冬するオオハクチョウの生態を研究している。1976～77年の冬のシーズンに、1羽のオオハクチョウの雌・成鳥の頭羽がだんだん伸びてくるという興味深い事例を観察したので報告する。

この異常個体を最初に観察したのは、1976年12月29日～1977年1月2日の調査時であった。12月18日に観察したときには気づかなかったもので、このときには頭羽にほとんど異常が見られなかったためか、あるいはたぶん、12月下旬以後に渡来したものと考えられる。初めて観察したときは、頭羽がボサボサと乱れた個体が1羽いるなど感じるぐらいで、さして気にとめなかった。

15日後の調査で再びその個体を観察した。前回見たとき頭羽の乱れだと思っていたものが、一層盛り上って見えたので写真にとり、少し詳しく観察した結果、羽毛が伸びだしていたことを発見した (Plate 14a, 1977年1月17日)。それ以後の頭羽の伸びていく経過を、Plate 14b, 1月30日: Plate 15a, 2月17日: Plate 13, 15b, 3月12日: Plate 16a, 3月21日、に示した。これらの写真により、このオオハクチョウの頭羽が異常に伸びていっていることがわかる。この成鳥はつれあいの成鳥と、2羽の幼鳥との4羽の家族として生活していた (Plate 16b) [成鳥の pair の雌雄の決定についてはここでは述べないが、柿澤 (1976) に述べられているように、家族行動の観察により雌雄の決定を行なった]。

オオハクチョウの頭部は、ふつう2cmから3cmの短い羽毛で密にうめられている。しかし、この個体の異常に伸びた羽毛は、正羽と呼ばれているオオハクチョウの体をおおっている長さ10cmほどの体羽と同じもののようには観察された。

今回みられたようなオオハクチョウの頭部に異質の羽毛が生えた例は、他にまだみつからない。他の野鳥における例も筆者は知らない。このような羽毛の生成の原因は不明である。先天的な突然変異かもしれないし、頭部の怪我などが原因で、後天的にその部分の組織が変化したという可能性も考えられる。

家禽のなかには人為淘汰の結果による変異個体が多い。Grzimek (1972) の「動物百科」第8巻には、カワラバト、ニワトリに“かんむり”のある数品種が図示されている。ガンカモ科の家禽にも“かんむり”のある数品種が知られている。黒田 (1939) の「雁と鴨」にはカンムリアヒル、カンムリコアヒル、バリーダックというやはり“かんむり”をもったアヒルの品種が記載されている。Delacour (1973) の「世界のガンカモ」第4巻には、カンムリガチョウが記載されている。家禽でたびたびみられるこの変異は、鳥類のもつ潜在的な変異形質の一つであろう。今回の例に見られるように、野外の鳥類においてもその変異の出現の可能性が充分考

* 山階鳥類研究所 東京都渋谷区南平台町 8-20 (〒150)

えられる。

文 献

- Delacour, J. 1973. Domestic Waterfowl. In *The Waterfowl of the World*. Vol. 4: 154-166. Country Life, London.
- Grzimek, B. (ed.) 1972. *Grzimek's Animal Life Encyclopedia*. vol. 8, *Birds II*. New York.
- 柿澤亮三・柿澤佳子 1976. 再渡来した瓢湖のオオハクチョウ. 山階鳥研報 8(3): Plate 17-18, 270-275.
- 黒田長禮 1939. 雁と鴨. 修教社書院, 東京.

A female "Crested" Whooper Swan *Cygnus c. cygnus* wintering at Hyoko in Niigata, 1976-77 winter

Ryozo Kakizawa

A particular female Whooper Swan *Cygnus c. cygnus*, wintering at the well known swan and other waterfowls resort, lake Hyoko, was kept under observation in 1976-77 winter. Here the swans and waterfowls are well tamed by artificial feeding. This particular female arrived at Hyoko in late December with her mate and 2 cygnets. In my first observation in December, her crown seemed to be somewhat unkempt, but it was not so curious.

As the time went by her crown feathers became longer. This changing process is shown by Plates 13-16.

Yamashina Institute for Ornithology, 8-20 Nanpeidai-machi, Shibuya-ku, Tokyo 150, Japan.

Plate 13. 頭羽が伸びて“かんむり”となったオオハクチョウ・雌・成鳥 (1977年3月12日撮影)
A female “Crested” Whooper Swan *Gygis c. cygnus*. (March 12, 1977)

Plate 14. a. 1977年1月17日撮影 (January 17, 1977)
b. シイナを採食する. 1977年1月30日撮影, Feeding on Siina, unripe rice (January 30, 1977)

Plate 15. a. 1977年2月17日撮影 (February 17, 1977)
b. 1977年3月12日撮影 (March 12, 1977)

Plate 16. a. シイナを採食する. 1977年3月21日撮影
Surface feeding on siina, unripe rice (March 21, 1977)
b. “かんむり” オオハクチョウの家族 [成鳥の pair と2羽の幼鳥 (J)], 幼鳥は正常な頭羽をしている. 1977年3月21日撮影.
She formed a family with her mate and 2 cygnets (J: Juvenile), Two cygnets seemed to be normal crown. (March 21, 1977)

a

b

a

b

a

b