システム バイオロジー の進展

北野宏明，松岡由希子

特定非営利活動法人システム・バイオロジー研究機構

システムバイオロジーが新たな潮流として生み出されてから、10年がたとうとしている。システムバイオロジーの概念自体は、いろいろな論文ですでに紹介されているので、それらの論文などを参照していただきたい^(1~3)。一言で言うならば、「システムとしての生命を理解する」分野であり、「ものの科学」から「ことの科学」への展開が中核的な概念となる。それを達成するために、多様なアプローチが投入される。コンピュータによるモデル構築もその一つであるが、システムバイオロジーは、その手法で定義されるのではなく、探求する対象で定義される分野である。

ここでは、いろいろなアプローチがあるなかで、特に、最近の大規模相互作用データに基づくネットワーク生物

学ともいえる理論的展開とソフトウェア基盤に関して概観しよう。ゲノムワイドでいろいろな生物種の塩基配列、転写活性の変化、タンパク質相互作用などの測定が可能となった今、生物のもつ複雑な遺伝子やタンパク質相互作用としてのネットワークの本質を探ることが、大きなテーマとして浮上している。本稿では、まず、グローバルなネットワーク構造に関する議論を紹介するとともに、ロバスト・システムとしての生命という視点から、進化可能 (evolvable) でありロバスト (robust, 頑健) であるシステムを構成するネットワークの基本的なアーキテクチャに関して議論したいと思う。さらに後半で、これらの研究を進めるにあたって重要となる、情報基盤・ツールに関して述べる。

連載開始にあたって：システムとして生命現象を探る

いくつかのモデル生物において、ゲノム DNA の全塩基配列が決定されてすでに久しいが、その後も網羅的に生物システム各構成要素の同定やタンパク質間相互作用を明らかにするプロテオーム、メタボローム、インタラクトームなどのオーム解析（オミクス、-omics）が盛んに行なわれている。各要素の時空間動的変化を含め、インフォーマティクス的手法を取り入れて、複雑な生命現象を統合されたネットワークシステムとして理解することを目的とする学問は、システム生物学やシステムバイオロジー (systems biology) と呼ばれている。このような先端的な学際領域で活躍されている研究者に、研究の実際をわかりやすく解説して下さるよう執筆をお願いしたところ、お忙しい中、4 人の方が快諾してくださった。

本セミナーでは、連載のはじめとして、北野宏明先生と松岡由希子先生（システム・バイオロジー研究機構）に「システムバイオロジーの進展」を解説していただき、第 2 回は守屋央朗先生（JST さきがけ）に「生命システムの

ロバストネスを探る」をお願いした。第 3 回は、南陽一先生（理研・発生）に「哺乳類体内時計のシステムバイオロジー」、そして、最終回は岩崎秀雄先生（早大）に「バクテリアを用いた生物の時空間パターン形成ダイナミクスの解析」と題して解説をお願いしている。なお、視点は異なるが関連する事柄として、日本農芸化学会 2008 年度大会において、加藤久典先生（東大院農生）と小田裕昭先生（名大院生農）が世話人として「食品・栄養学研究におけるオミックス・システム生物学の展開—統合システムとしての生命体と食品・栄養学研究」と題したシンポジウムを企画されていたので、興味のある方は講演要旨を参考にいただければ幸いである。

システムとして生命現象を理解する研究は、新しい解析技術の進展に伴って、これからますます注目されると思われる。本セミナーの連載がこのような先端的で学際的な領域の現状を知る手がかりとなることを期待する。

（牧 正敏，名古屋大学大学院生命農学研究科）

生物学的ネットワークのグローバル構造

ゲノムワイドな解析から明らかになってくる生物学的情報から、生物を成り立たせる基本的な構造が浮かび上がってくるのではないかと期待される。従来の局所的な研究のみでは浮かび上がってこなかったことは、転写制御やタンパク質相互作用、代謝パスウェイなどの大局的な構造である。生物のダイナミクスをつくり出すネットワークの基本構造にどのような法則性や原理が見いだされるかが、非常に大きな関心事となっている。

ネットワークのグローバルな構造に関して最近話題になっているのが、スケールフリー・ネットワークに関する議論であろう。これは、Barabasi らによって主張されているもので、インターネットや WWW のハイパーリンク構造から、タンパク質相互作用や代謝ネットワークまでが、「スケールフリー・ネットワーク」であるという議論である^(4~7)。

スケールフリー・ネットワークとは、どのようなネットワークであろうか？ ネットワークは、ノード（結節点）とそれらをつなぐコネクション（結合）として抽象化される。ここで、あるノードがいくつかの他のノードとのコネクションをもっているかを、次数 (degree) という。スケールフリー・ネットワークは、その次数ごとのノードの出現頻度がべき乗則に従う。つまり、あるノード k の次数 $P(k)$ は、 $P(k) \propto k^{-\gamma}$ に従う。 γ は、多くの場

合、2 から 3 程度である。ランダムネットワーク (Erdos-Renyi モデルとも呼ばれる) では、次数の分布は正規分布になる。

また、スケールフリー・ネットワークの特徴として、ランダムなノードの削除に対してはその影響を受けにくい、ネットワークのハブとなる次数の大きいノードの削除に対しては脆弱であるという特徴がある⁽⁵⁾。Barabasi らは、ネットワークのパフォーマンスの指標値として、平均パス長 (AL : Average path length) を使っている。 AL は、すべてのノード対の最小パス長の平均である。ノードの削除によって、 AL が著しく大きくなれば、ネットワークはその擾乱に対して脆弱であるとしている。しかし、 AL をネットワークの性能指標にすることが適切かは、議論が必要であろう。

スケールフリー・ネットワークは、どのようにつくられるのであろうか？ スケールフリー・ネットワークは、新たなノードがネットワークに加えられるときに、相対的に大きな次数をもっているノードに高い確率でコネクションをつくるという、preferential attachment という原理によって成長するとされている^(7,8)。新たなホームページをつくる場合に、Google や有名なサイトへのリンクをつくる確率のほうが、隣の人のホームページにリンクを張る確率より高いということである。タンパク質のネットワークなどでは、遺伝子重複とそれに引き続く変異によって新たな遺伝子が生み出されるので、

すでに多くのタンパク質と相互作用をしているタンパク質は、新たにつくられるタンパク質とも相互作用をする可能性が高いと主張している。

これらは非常に面白い議論であるが、はたして本当であろうか？ まず、Barabasi らは、べき乗則分布に従うネットワークをスケールフリー・ネットワークであると定義し、そのようなネットワークは、preferential attachment によって形成される特徴的なトポロジを有するという議論を展開している。しかし、べき乗則に従った分布をもったネットワークが、必ずしも preferential attachment によって形成されるわけでもないし、同じような構造的特徴を有するわけでもない。また、スケールフリーといった場合、その一部を取り出しても、似たような構造を有しているという自己相似性をもつことも重要な特徴であるが、べき乗則分布を有するネットワークが、すべてこの特徴を有するわけではない。

実際、インターネットの物理レイヤーでのトポロジ、代謝ネットワークなどは、スケールフリーではないという反論がなされている。たとえば、インターネットのルーターレベルでの構造の研究がある⁽⁹⁾。インターネットの物理レイヤーの場合、その構造は、実際に使用する機材などによって制約を受ける。1つのネットワーク・ルーターが、同時に張ることのできるコネクションには制限がある。ネットワークのバックボーンを形成する部分は、超高バンド幅であるが、比較的コネクションは少なく、その周辺に接続されるノードが、非常に多くの低バンド幅のコネクションをもつという構造になっている。このネットワークは、自己非相似であり、Barabasi の主張する構造にはなっていない。また、インターネットは、ノードの除去にはきわめてロバストであり、逆に、ノードは保持されるが不適切な挙動を続けるような故障やウイルス、スパムなどが問題である。

生物に関わるネットワークにおいても、同様な指摘がなされている。実際に代謝パスウェイの特徴をその相互作用の方向性も考慮して調べた研究では、gigant strong component (GSC) と呼ばれる大きく密結合しているネットワークと、それに結合するこれに対して入力と出力の役割を担う2つのネットワーク、さらに、それ以外のネットワークに分類されることがわかった⁽¹⁰⁾。GSC には、TCA サイクル、ペントースリン酸回路、解糖系などの基本的な代謝経路が含まれ、*Streptococcus pneumoniae* と *Pyrococcus furiosus* の比較においては、非常によく保存されていることが示された。ネットワークの統計はべき乗則になるが、構造は自己相似的ではな

く階層的であり、Bow-tie (蝶ネクタイ) 構造 (図1参照) に近い。さらに有田は、大腸菌の代謝回路の詳細な分析から、スケールフリー・ネットワークが有する、スモールワールド・ネットワークという特徴を有していないことを示している⁽¹¹⁾。

Barkai らは、いくつかの種に関していろいろな遺伝子の機能欠失変異株を作製し、各々の遺伝子の相互作用の数と致死性になるかを調べた⁽¹²⁾。より多くの相互作用をもつ遺伝子が致死性になる確率が高くなるという傾向が見られたが、最も多くの相互作用をもつ遺伝子群は、中程度の相互作用をもつ遺伝子群に比べ致死性である確率が低いという結果も観察されている。これは、Barabasi らの予測と一致しない。そもそも、ネットワークのハブ(hub)、すなわち非常に多くの他のノードと相互作用しているノードへの攻撃に対して脆弱であるなら、進化的な競争環境では、このハブを攻撃することに特化した病原体などが進化する可能性があり、このような構造を有するネットワークは決定的に不利である。ハブとなるノードを代替えるようなバックアップ構造が進化的に獲得されたとしても、不思議ではない。

このように、スケールフリー・ネットワークという概念は、ネットワークのグローバル構造の統計的性質を示すものとして非常に興味深いものであるが、その議論をそのまま受け入れられるわけではない。スケールフリー・ネットワークは、現実のネットワークのディテールを省略して、かなり抽象的なレベルで再定義することによって出現する特徴のように思われる。しかし、実際には、インターネットのルーター・トポロジや代謝ネットワークにおいても、物理的な制約など、その領域に特有の制約がネットワークの構造と挙動に重要な役割を果たしており、人為的にデザインされた場合でも、進化的に選択された場合にでも、この制約に対して最適化されたネットワークの構造であると考えたほうがより現実的である。また、その成長メカニズムである preferential attachment も、単独のネットワークの成長機構であり、生物のように選択圧力のある動的な進化過程で、どのようなネットワークに進化するかのモデルとしては不十分に思われる。逆に、このことは、社会ネットワークやハイパーリンクのような物理的な制約のない状況で出現するネットワークには、スケールフリー・ネットワークの議論が当てはまる可能性を示唆している。

進化可能でロバストなシステムのアーキテクチャ

生命のネットワークがスケールフリー・ネットワーク

ではないとすると、実際にはどのような大域構造になっているのでしょうか？ これを理解するためには、生物が進化というドライビング・フォースによって、多様化し複雑化してきたということを基盤におく必要がある。生物の基本的なアーキテクチャとしての要請は、進化が可能であることである。

Gerhard と Krishner は、進化可能であることの特徴として、①少ない数の変異によって新たな表現型（フェノタイプ）を生み出すことができること、②変異が致死性にならないこと、などを挙げている^(13,14)。このような特徴を可能とする構造として、①保存されたコアプロセスと新たな形質を獲得できるフレキシブルな部分が存在すること、②モジュール構造や区画化などで、変異の影響がシステム全体へのダメージにつながらないこと、③ weak linkage と呼ばれる共有化された基本機構が存在すること、などを挙げている。

これらの要請は、ネットワークの構造に一定の制約を与える。それは、以下の3点である：①ある程度のモジュール構造が形成されており⁽¹⁵⁾、そのモジュールはロバストであること、②汎用性のある機能モジュールが存在すること、③保存されたコアプロセスと柔軟に付加されるプロセスというグローバル構造であること。面白いことに、このような要請は、システムがロバストネス（robustness, 頑健性）を有するということとほぼ同じ要請であるということである。

モジュールのロバストネス

生物がロバストであるためには、システム制御、代替要素の存在、モジュール構造、確率的な低レベルプロセスとの分離などが関わっている。ここでは、特にシステム制御が重要であり、それを議論する。システム制御は、複雑なフィードバックによって実現されるが、ネガティブ・フィードバックとポジティブ・フィードバックに分けられる。ネガティブ・フィードバックは、多くの場合、系を安定化させ初期状態または何らかの目標状態に戻るように働く。ポジティブ・フィードバックは、系を一時的に不安定化し、新たな定常状態へと遷移させる機能を有する場合がある。ただし、これらの特徴は具体的な回路やパラメータで大きく変わってくるので、性急に単純化はできない。

ショウジョウバエの体節形成プロセスを見てみよう。体節形成では縞模様（ストライプ）が形成されるが、各々の縞は複数の細胞の列で構成されており、最初の列には *wingless* (*wg*) 遺伝子が発現し、2 番目では *en-*

grailed (*en*) が発現し、3 番目ではどちらも発現しない。このストライプ形成に関わるネットワークは、初期値と各反応定数の変動に関してロバストであることがシミュレーションによって示唆された。Von Dassow らは、この研究において、最初は既知の相互作用のみを使ってネットワークのモデルを構築したが、どのようなパラメータを使っても安定したストライプを形成する解が発見できなかった⁽¹⁶⁾。そこで、合理的に推定できる修正として、*en* と *wg* の自己活性化のポジティブ・フィードバックを加えた。このネットワークでは、安定したストライプを形成する解が、広範囲のパラメータの組み合わせで存在することがわかった。つまり、ポジティブ・フィードバックによって安定した発現が維持され、このネットワークがロバストになったわけである⁽¹⁷⁾。このネットワークは、発生過程で機能し、モジュール構造を有するネットワークになったと思われる。このモジュールがロバストであるということは、このモジュールに至るプロセスでの擾乱に対してセグメント・ポラリティーの確立（上記の例では“体節形成”）に影響を与えにくくなるということを意味している。

シグナル伝達系も、ある程度のモジュール構造が存在すると考えられるネットワークである。発生段階では、*hedgehog* (*Hh*), *Wnt*, *TGF- β* , *receptor tyrosin kinase* (*RTK*), *Notch*, *JAK/STAT*, *nuclear hormone pathway* などのシグナル伝達系が、いろいろな局面で繰り返し使われる⁽¹⁸⁾。たとえば、*Hh* シグナル伝達系は、ショウジョウバエの翅のパターン形成とともに、蝶の翅の目玉模様 (*eyespot*) パターン形成にも利用されている。このように、モジュラーなシグナル伝達系が、いろいろな局面に流用され機能するためには、ある程度のロバストネスがある必要がある。実際、これらのシグナル伝達系ではフィードバック制御が多用されており、ロバストな構造になっている⁽¹⁹⁾。

このようなモジュールレベルでのロバストネスは、他にも観察することができる。また、遺伝子の発現制御のネットワークのレベルにおいても、特徴的なモジュール（モチーフと呼ばれることが多い）が同定されている^(20~24)。ここで、重要なのは、どのようなモチーフがあり、それらがファミリーやスーパーファミリーを構成しているのかということである。

アーキテクチャ

進化が可能かつロバストであるシステムには、特徴的なグローバル構造が存在すると仮定できる。つまり、進

図1 ■ グローバルな Bow-tie 構造

化的に保存され効率的なコア・ネットワークと、その周辺に接続されより多様な進化を遂げているプロセスが多く存在するという構造である。これは、グローバル構造であるとともに、転写機構やシグナル伝達系、イオン・チャンネルなど、いろいろな局面で繰り返し登場する構造であり、Bow-tie 構造（または、hour-glass 構造）と呼ばれる⁽²⁵⁾（図1）。

細胞レベルでは、Bow-tie のコアの部分は基本代謝回路や細胞周期などが保存されている部分で、多くのシグナル伝達系などがこのコアに接続し、新たな細胞の応答を獲得する。シグナル伝達系では、cAMP や Ca^{2+} などが、この保存された部分であり、いろいろなシグナルがこれらの分子の動態を制御することで、その細胞の挙動を変化させている⁽²⁶⁾。つまり、新たなシグナル伝達系は、これらのコア因子を制御することでシステムに組み込まれることが可能になる。最近の研究で、このコアの分子の挙動がクラスター化され、各々の刺激に対応したクラスターが存在し、そこから細胞の応答に直結することがわかり、クラシファイアー（入力分類装置）として進化した結果の構造である可能性が高くなった⁽²⁷⁾。これは、非常に効率的な構造であるとともに、新規のプロセスの問題点が、コア部分にダメージを与える可能性を大幅に軽減している。また、すでに議論した代謝回路の解析でも、GSC というコア・ネットワークに対して、入力と出力にあたるネットワークが接続されているのは、Bow-tie 構造といえる。

ゲノムサイズといろいろな機能を担う遺伝子（Gene Ontology の分類に従う）の数との関係を調べると、細胞周期や代謝などの基本的な細胞機能に関わる遺伝子の数は、ゲノムサイズの増大に対して、増加の割合以下での増大となっているが、シグナル伝達系などに関わる遺伝子は、ゲノムサイズの増加の割合の2倍の比率で増加

している⁽²⁸⁾。また、防御機能などに関する遺伝子群は4倍程度の比率で増大している。つまり、基本機能は、当然ながら進化的によく保存されており、シグナル伝達系などの新たな形質や応答を獲得しえる部分に関わる遺伝子が、生物種の複雑さの増大を上回る比率で増加しているということである。これは、保存されたコアと柔軟に付加され新たな形質を獲得する周辺プロセスという構造の進化的側面を示すものかもしれない。

進化の過程で、いろいろな新たな機能が獲得されているということは、それらを適切に制御する系も加わっているということの意味する。進化の過程で複雑化への道を選択した種は、制御機構の複雑化を抱え込むことになる。これは、シグナル伝達系の多様性として現われ、また non-coding RNA (ncRNA) の劇的な増大という形に反映されている^(29~31)。ゲノムワイドでのネットワークの構造を理解するということの重要な側面は、単にそのトポロジーを同定するということではなく、制御構造の進化を理解するということである。

また、ヘテロクロマチンのリモデリングによるゲノムワイドな発現制御も重要な問題である。10年以上前に、筆者らは、ヘテロクロマチンのシステマティックな再編が老化などに関わる遺伝子発現制御、ひいては様々な形質の出現に中核的な役割を担っているという“Heterochromatin Island Hypothesis”を提唱した⁽³²⁾。最近、ハーバード大学のグループが、この仮説を支持する報告を発表するなどしている⁽³³⁾。

ロバストネスと脆弱性のトレードオフ

複雑化によって環境への適応を達成する戦略を選択した種は、制御機構の高度化によってロバストネスを獲得することになる。しかし、ロバストネスにはトレードオフが存在する。つまり、日常的な擾乱に対してロバストになるように進化・最適化したシステムは、想定していない擾乱に対してきわめて脆弱になるということである。Carlson と Doyle は、この現象について、森林火災などの単純化した物理モデルでその概念を示し、Highly Optimized Tolerance (HOT) と呼んでいる^(34,35)。また、ロバストネスの向上は他の部分での脆弱性の増大につながり、全体でのロバストネスは一定であるというコンセプトは、制御工学のボーデの定理として数学的に確立している⁽³⁶⁾。

このトレードオフを理解することは、システムの不調がどのように発生し、それにどのように対処すればよいかを理解する上で非常に重要である。これは、疾病とそ

の対処方法のシステムの理解につながる。筆者は、この考えに基づき、癌をロバストなシステムと捉えた場合のシステム解析と対処方法の理論的検討を行ない、Cancer Robustness の概念を提唱している^(37,38)。また、2型糖尿病を、進化的に飢餓状態に対して最適化した制御構造をもつ人類が、高カロリー食品を日常的に食べ続けるという想定されていない擾乱に対して脆弱性を示した現象と捉え、システムの制御方法を検討している。

生物に内在するネットワークの研究は、単に網羅型の研究だけではなく、これらの基本的な生命の原理、または戦略とでもいえるような切り口から検討することが重要であると考ええる。

システムバイオロジー研究での情報基盤

最近のシステムバイオロジー研究で際立った特徴は、国際標準の構築である。大規模なネットワークや数理モデルを共有し研究を推進するために、一連の標準化作業が急速に進んでいる。ここでは、これらの国際標準のいくつかを概観する。

Systems Biology Markup Language : SBML

Systems Biology Markup Language (SBML) は、XML ベースの生物学的ネットワーク記述言語である^(39,40)。従来、細胞モデルのシミュレーションや解析を行なうソフトウェアでは共通のモデル表現言語が存在せず、他のツールとの連動や移行がきわめて困難であった。そこで、筆者らは1999年に、この問題を解決する標準モデル表現言語の開発を提案し、いくつかの研究グループとの共同研究を開始した。その後、このプロジェクトに多くの研究グループが参入し、2008年8月現在、100以上のソフトウェアがこの標準に準拠して開発されており、事実上のデファクト標準となっている。

SBML では、異なるソフトウェア間のモデル共有を行なうことが目的であるため、最も合意しやすい部分から

順次規格を決定し、それらをまとめて Level として漸増的にリリースする方式をとっている。SBML Level-1 では、Stoichmetry を中心とした簡単なモデル情報の受け渡しであったのが、Level-2 では、反応定数なども含めたより広範な記述が可能になっている。現在開発中の Level-3 では、空間的配置などさらに高度な部分まで定義可能にする検討が行なわれている。SBML の最新の情報は、<http://www.sbml.org/> から入手することができる。

Systems Biology Graphical Notation : SBGN

複雑な細胞内の相互作用をグラフィカルに（人間に可読な方法で）表現することも重要である⁽⁴¹⁾。現在、ほとんどの論文などでは、タンパク質相互作用や遺伝子制御関係を示すのに、ノードと矢印を使ったインフォーマルな表記が使われている（図2）。この表記方法は簡便であるが、多くの情報が欠落すると同時に、いろいろな誤解釈の原因となる問題を含んでいる。たとえば、図2は、このような表現の典型的な例である。Ras から Raf への矢印(*1)は、Ras が Raf を活性化しているように読める。しかし、実際には、Ras は Raf の細胞膜近傍への局在を推進しているのであり、Ras 自体では Raf を活性化していない。

次に、ERK から2つの矢印が、RSK と c-Myc に向かって引かれている(*2)。これは、ERK が RSK と c-Myc の2つを活性化するという意味であるが、ERK が RSK と c-Myc に分離するとも読める。しかし、一般には、ERK による RSK と c-Myc の活性化と読むであろう。これは、図自体に記述されている情報からではなく、すでにこのタンパク質について十分な知識があるのでこの解釈を採用しているのであって、表記自体には曖昧性が残る。最後に、RSK から RSK に向かう矢印(*3)であるが、これは、RSK のトランスロケーションを示している。つまり、矢印が複数の意味で使われており、それらを正確に読むのは我々の知識に依存するのである。これ

図2 ■ 一般的に使われているネットワーク・ダイアグラム

図 3 ■ プロセスダイアグラムによる表記

図 4 ■ SBN Process Diagram Level-1 のシンボルセット

では、グラフィック表記としては不十分である。

図3は、図2と同じ相互作用ネットワークをプロセスダイアグラム表記方法で記述したものであり、その記号の意味は図4に示している。この表記法で重要な点は、従来は矢印が「活性化」を意味していたのだが、活性化を意味する矢印がなくなり、矢印は状態遷移を意味するものになった点である。あるタンパク質が活性をもったということをそのタンパク質の一状態と考え、活性化のプロセスを、活性化される前のタンパク質と、活性化されたタンパク質を、状態遷移を表わす矢印でつないで記述している。さらに、活性化に寄与する酵素などを、矢印上のボックスに向けて指示することで状態遷移プロセスの詳しい内容を示すこともできる。また、図3では、RasはRafをリクルートしていることが、横棒付き矢印（アローヘッドの手前に横棒が入った矢印）で表わされている(*3)。このように、この表記では、記号の意味の曖昧性が低く抑えられている。

筆者らは、このプロセスダイアグラム記法をベースに、分子間相互作用や遺伝子制御ネットワークの標準的記法の国際標準を制定することを提唱し、Systems Biology Graphical Notation (SBGN) の制定に着手した。数年間の議論の結果、2008年8月に、SBGN Process Diagram Level-1の仕様を決定し、正式にリリースした⁽⁴³⁾。SBGNの最新情報は(<http://www.sbgn.org/>)にて提供されている。すでに、主要なパスウェーデータベースがSBGNの採用を表明しており、急速にSBGN

が標準として受け入れられるであろうと考えられる。

CellDesigner

筆者らは、SBMLならびにSBGNに準拠し、他のシミュレーション・パッケージや解析ツールと連動して使うことができるパスウェー編集ソフトウェアCellDesignerを開発した⁽⁴²⁾(図5)。CellDesignerは、<http://www.systems-biology.org/> からダウンロード可能である。いままでに、マクロファージなど、タンパク質の種類で600以上が含まれるネットワークを記述しており、大規模なネットワークの記述に耐えられることを確認している。現在、CellDesignerは第4版がリリースされており、3万以上のダウンロード数に達している。実際、2007年に*Nature Biotechnology*誌に発表された調査では、CellDesignerは、この分野で最もよく使われている専用ツールであるという結果が出ている。

また、CellDesignerは、高性能シミュレーションパッケージであるCOPASIとの密な連動を達成し、パスウェーの編集からシミュレーションまで、シームレスに利用できるようになった。大規模パスウェーデータベースであるPanther Pathway DBは、CellDesignerをpathwayキュレーションの標準ツールとして利用している。

CellDesignerに連動するソフトウェアとして今後注目すべきものにPayaoがある。これは、沖縄科学技術大学院大学(OIST)の開発したシステムであり、Cell

図5 ■ CellDesigner のスクリーン・ショット

Designer で記述したパスウェイに対して多くのユーザがコメントやアノテーションを加える, Web 2.0 的なツールである. Payao では, 東京大学とマンチェスター大学のプロジェクトである PathTEXT とテキストマイニングとパスウェイとの連動も研究中である. 現在, 大規模な展開に備えて payaologue.org で実験が行なわれている.

システムバイオロジーの研究を行なうには, ネットワークを表現し, 様々な情報をネットワークに関連付けてアクセスできる, ネットワーク・ポータルともいえるインフォメーション・オーガナイザーが必要である. このソフトウェアが, 他のソフトウェアを連動して, シミュレーションや各種解析を行なうコントロールセンターへと進化していくことを期待したい. この他, SBML や SBGN 以外にも, 動的モデルのアノテーション, オントロジーなど多くの標準化に関する努力がなされている.

おわりに

システム・バイオロジーとは, システムとしての生命を理解しようという研究であり^(2,3), そのなかで, ネットワークの進化, 構成原理, ロバストネスなどに関して基本原理を探究することは, 最重要課題の一つである. ゲノムワイドな解析が可能になり, それを網羅的に処理し基盤データ・リソースを開発し応用へとつなげる試みが, 組織的に推進されると同時に, そのようなリソースを使いながら独創的な発想でより根元的な問いを発する研究も重要である. 対象となる現象は複雑で多様である. しかし, その背後に何らかのシステムレベルでの原理が隠されているのではないかと思う. それは, 多様性を生じさせると同時に, 一貫した生命としての基本原理を規定するものではないかと考えている. 提唱されて 10 年程度しかたっていないが, 今後発展していくシステムバイオロジーの研究は, このような基礎的な研究から応用までを, 一貫した視点でつなげていくことになるであろう.

文献

- 1) H. Kitano: "Foundations of Systems Biology" ed. by H. Kitano, The MIT Press, Cambridge, MA, 2001.
- 2) H. Kitano: *Science*, **295**, 1662 (2002).
- 3) H. Kitano: *Nature*, **420**, 206 (2002).
- 4) R. Albert & A. L. Barabasi: *Phys. Rev. Lett.*, **85**, 5234 (2000).
- 5) R. Albert, H. Jeong & A. L. Barabasi: *Nature*, **406**, 378 (2000).
- 6) A. L. Barabasi & R. Albert: *Science*, **286**, 509 (1999).
- 7) A. L. Barabasi & Z. N. Oltvai: *Nature Rev. Genet.*, **5**, 101 (2004).
- 8) E. Eisenberg & E. Y. Levanon: *Phys. Rev. Lett.*, **91**, 138701 (2003).
- 9) L. Li *et al.*: "Proceedings of ACM Special Interest Group on Communications", ACM, 2004. www.sigcomm.org/sigcomm2004/papers/p599-li.pdf.
- 10) H. W. Ma & A. P. Zeng: *Bioinformatics*, **19**, 1423 (2003).
- 11) M. Arita: *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **101**, 1543 (2004).
- 12) S. Bergmann, J. Ihmels & N. Barkai: *PLoS Biol.*, **2**, E9 (2004).
- 13) M. Kirschner & J. Gerhart: *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **95**, 8420 (1998).
- 14) J. Gerhart & M. Kirschner: "Cells, Embryos, and Evolution: Toward a Cellular and Developmental Understanding of Phenotypic Variation and Evolutionary Adaptability", Malden, Massachusetts, Blackwell Science, 1997.
- 15) L. H. Hartwell *et al.*: *Nature*, **402**, C47 (1999).
- 16) G. von Dassow *et al.*: *Nature*, **406**, 188 (2000).
- 17) N. T. Ingolia: *PLoS Biol.*, **2**, E123 (2004).
- 18) A. Pires-daSilva & R. J. Sommer: *Nature Rev. Genet.*, **4**, 39 (2003).
- 19) M. Freeman: *Nature*, **408**, 313 (2000).
- 20) S. Mangan & U. Alon: *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **100**, 11980 (2003).
- 21) S. S. Shen-Orr *et al.*: *Nature Genet.*, **31**, 64 (2002).
- 22) R. Milo *et al.*: *Science*, **298**, 824 (2002).
- 23) R. Milo *et al.*: *Science*, **303**, 1538 (2004).
- 24) E. Yeger-Lotem *et al.*: *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **101**, 5934 (2004).
- 25) M. E. Csete & J. Doyle: *Trends Biotechnol.*, **22**(9), 446 (2004).
- 26) J. D. Jordan, E. M. Landau & R. Iyengar: *Cell*, **103**, 193 (2000).
- 27) N. Polouliakh *et al.*: *PLoS One*, **4**(1): e4189 (2009).
- 28) E. van Nimwegen: *Trends Genet.*, **19**, 479 (2003).
- 29) J. S. Mattick: *EMBO Rep.*, **2**, 986 (2001).
- 30) J. S. Mattick: *Nature Rev. Genet.*, **5**, 316 (2004).
- 31) J. S. Mattick: *Bioessays*, **25**, 930 (2003).
- 32) S. Imai & H. Kitano: *Exp. Gerontol.*, **33**, 555 (1998).
- 33) P. Oberdoerffer *et al.*: *Cell*, **135**, 907 (2008).
- 34) J. M. Carlson & J. Doyle: *Phys. Rev.*, **60**, 1412 (1999).
- 35) J. M. Carlson, & J. Doyle: *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **99**, (Suppl 1), 2538 (2002).
- 36) M. E. Csete & J. C. Doyle: *Science*, **295**, 1664 (2002).
- 37) H. Kitano: *Nature Rev. Cancer*, **4**, 227 (2004).
- 38) H. Kitano: *Nature*, **426**, 125 (2003).
- 39) M. Hucka *et al.*: *Bioinformatics*, **19**, 524 (2003).
- 40) H. Kitano: *Nature Biotechnol.*, **20**, 337 (2002).
- 41) H. Kitano: *Biosilico*, **1**, 169 (2003).
- 42) A. Funahashi & H. Kitano: *Biosilico*, **1**, 159 (2003).
- 43) N. Le Novère, S. Moodie, A. Sorokin, M. Hucka, F. Schreiber, E. Demir, H. Mi, Y. Matsuoka, K. Wegner & H. Kitano: Systems Biology Graphical Notation: Process Diagram Level 1 Release 1.0. http://sbgn.svn.sourceforge.net/viewvc/sbgn/ProcessDiagram/tags/Level1.0.0/sbgn_PD-level1.pdf, Aug. 2008.