5. 大腸菌外膜リポタンパク質の生合成・分泌

市原茂幸, 山田寿美

各古屋大学農学部

大腸菌をはじめとするグラム陰性細菌の細胞表層は、外側より外膜、ペプチドグリカン層、細胞質膜という3層より形成されている。大腸菌外膜には、細胞当りの分子数が細胞内の他のタンパク質にくらべてはるかに多いOmpA, OmpC, OmpF, リポタンパク質と呼ばれる主要タンパク質が存在する。これらのタンパク質は、非常に活発に合成され、細胞質膜を通して分泌され、外膜にアッセムリーしているの、タンパク質の膜透過機構や膜タンパク質のアッセムリーの機構を研究するための格好な材料となっている。本稿では、外膜主要リポタンパク質の細胞質膜透過、ならびに外膜への局在化の機構について、筆者らの研究を中心に述べてみたい。なお、細菌におけるタンパク質透過全般については、総説⁽¹⁾を参考にしていただきたい。

大腸菌リポタンパク質の構造と機能

外膜主要リポタンパク質は、Braun らによって発見されたので、Braun のリポタンパク質 (BLP) とも呼ばれている (図1)^(2,3)。このタンパク質は58個のアミノ酸から成り、そのN末端のシステインには脂肪酸とグリセリドが結合している。その一部はC末端でペプチドグリカンに共有結合しているの、結合型リポタンパク質とも呼ばれている。このため、BLPは外膜とペプチドグリカン層を結びつける働きを担っていると考えられている。井上らは、BLPの一部が外膜に遊離型として存在すること、ペプチドグリカン結合型は遊離型から生成すること、BLPはシグナルペプチドを付した前駆体から生成することを明らかにした。一方、筆者らは、BLPの

図1 外膜主要リポタンパク質 (BLP) とその前駆体の化学構造 (文献3) より引用

リポタンパク質はペプチドグリカンと結合した形で描かれている。MNAc: N-アセチルムラミン酸, GNAc: N-アセチルグルコサミン, DAP: ジアミノピメリン酸, 内はシグナルペプチド。

役割を再構成系を用いて明らかにした。すなわち、外膜主要タンパク質 OmpC あるいは OmpF とリポ多糖によって、外膜の基本骨格と考えられる膜状の格子構造が形成されること、結合型 BLP はこの膜構造をペプチドグリカン上に保持する役割を担っていることを示した。さらに最近、湯らは BLP は C 末端側でペプチドグリカンと相互作用すると同時に、外膜とは脂肪酸部分で相互作用していることを見いだしている。

大腸菌細胞表面には、BLP 以外のリポタンパク質も存在する。管見ら⁽⁴⁾、水野⁽⁵⁾によって見いだされたペプチドグリカンと相互作用しているタンパク質である PAL (peptidoglycan-associated lipoprotein) と、市原ら⁽⁶⁾によって明らかにされた NLPs (new lipoproteins) である。興味深いことに、PAL も BLP もその N 末端がともに O-acetyl-glycerol-Cys-Ser-Ser-Asp と、同一の構造をしている。NLPs は NLP 1 から NLP 7 までの 7 種類が存在する。いずれもグリセリンと脂肪酸残基を含むことから、BLP や PAL と同様の N 末端構造を持つものと推定される。BLP 以外のリポタンパク質の詳細な構造や機能はまったくわかっていない。いずれも前駆体として合成されたあとで成熟体となる。NLP 3, NLP 4 は細胞質膜のタンパク質であるが、ほかのものは外膜に局在している。NLP の局在性を決定している要因は興味のあるところである。BLP や PAL と同様、NLPs もペプチドグリカンと相互作用しうるとすれば、NLP3, NLP 4 は細胞質膜とペプチドグリカンとの相互作用において、ある役割を果たしているのかもしれない。

外膜主要リポタンパク質 (BLP) の生合成と細胞質膜透過機構

外膜やペリプラズムのタンパク質は、シグナルペプチドを付した前駆体として細胞質で合成され、細胞質膜を通して外に出てくる、いわゆる分泌型のタンパク質である。シグナルペプチドは 20 数個のアミノ酸残基より成り、共通の特徴として、N 末端近くに塩基性アミノ酸残

図 2 外膜主要リポタンパク質の細胞質膜透過と外膜への局在化 (文献 12) より引用)

proLP: リポタンパク質前駆体, LP: リポタンパク質, FA: 脂肪酸残基

基が存在し、中央部に疎水性アミノ酸残基より成る広い疎水性領域を持っている。前駆体タンパク質は、N 末端近くの塩基性アミノ酸残基で細胞質膜と相互作用し、疎水性部分に先導されて膜内へ入っていくと考えられている。膜透過の過程でシグナルペプチドは切断され、タンパク質は膜の外側で成熟体となる。

分泌型タンパク質の 1 つである BLP は、外膜の主要成分であると同時に、一部はペプチドグリカンと共有結合している。前駆体型として合成された BLP は、シグナルペプチドの切断、N 末端のグリセリドおよび脂肪酸による修飾という化学変化を受けながら、位置の変化、すなわち細胞質膜透過、外膜への移行、ペプチドグリカン層との結合を行なう。このような複雑な過程を経て、BLP は生合成される。

1978 年に、BLP の合成を阻害する抗生物質としてグロボマイシンが発見された⁽⁷⁾。グロボマイシン処理をした大腸菌細胞には、BLP の前駆体が蓄積する。このことを利用して筆者らの研究室の市原、Hussain らは BLP の生合成過程における化学変化と位置の変化の関係を、主としてタンパク質の膜透過という観点から研究した⁽⁸⁻¹⁰⁾。得られた成果を模式的にまとめると、図 2 のようになる。以下に、このモデルに含まれるいくつかの重要な点について考察してみたい。なお、水島による総

説^(3,11,12)も参考にしていきたい。

第一は、前駆体型は細胞質膜に局在しており、かつC末端でペプチドグリカン層と共有結合しうる状態で存在しているということである。すなわち、タンパク質分子の大部分は、この段階ですでに細胞質膜を通過していると考えられている。このことから、①シグナルペプチドの切断は、タンパク質の成熟型部分の膜透過には必要ではないこと、②しかし、その切断はタンパク質の細胞質膜から外膜への移行には必要なこと、③それはおそらく前駆体シグナルペプチド部分が細胞質膜と強く相互作用しているためであること、などが結論された。

第二の点は、シグナルペプチドの切断は、グリセリドによる修飾に依存して起こることである。グリセリドで修飾されていない前駆体のシグナルの切断は起こらない(図1)。これまで、シグナルペプチド切断の特異性が、どのように決定されているかは明らかでなかったが、少なくとも BLP に関する限り、その特異性は切断部位にあるシステイン残基のグリセリドによる修飾によって決定されていることが明らかになった。すでに述べた他の8種のリボタンパク質も BLP と同様、成熟の過程で、グリセリドによる修飾、シグナルペプチドの切断を受けていた⁽⁶⁾。

第三の点は、シグナルペプチドの代謝は2段階の反応によって起こることである。第一の酵素、シグナルペプチダーゼによるシグナルペプチドの切断と、第二の酵素、シグナルペプチドペプチダーゼによる分解である。筆者らの研究室では、両ペプチダーゼについて、遺伝子とタンパク質の両面から詳細な研究を行なったので以下に詳しく述べる。

第四としては、BLP の外膜への移行、ペプチドグリカンとの相互作用の問題である。この点についても項を改めて、後述する。

リボタンパク質シグナルペプチダーゼ

この酵素は、大腸菌の一群のリボタンパク質のシグナルを特異的に切断するので、このように呼ばれている。筆者らは、この酵素をタンパク化学的に研究する目的で細胞質膜から精製することを試みたが、細胞内含量がきわめて少ないためか、高度に精製することは困難であった。そこでまず、リボタンパク質シグナルペプチダーゼ遺伝子(*lspA*)をクローン化し、遺伝子レベルでの解析

を進める一方、遺伝子コピー数を増やすことで、酵素の精製を容易にすることを試みた。

lspA 遺伝子のクローン化は、*lspA* 酵素の合成量がきわめて少ない変異株⁽¹³⁾を用いて行なった。そして遺伝子座を決定し⁽¹⁴⁾、構造の詳細⁽¹⁵⁾、および全 DNA 塩基配列⁽¹⁶⁾を決定した。この研究から得られた成果を以下に要約する。

① *lspA* 遺伝子は、大腸菌染色体上約 0.5 分のところに位置していた。② *lspA* 遺伝子は、*ileS* (イソロイシル tRNA 合成酵素) 遺伝子とプロモーター-*ileS-lspA* の順序でオペロンを形成していた。③全塩基配列から予想されるタンパク質の一次構造を推定した結果、164 個のアミノ酸残基から成る、きわめて疎水性の強い、細胞質膜タンパク質であった。②で予想されたように、*ileS-lspA* 間にプロモーターは存在していなかった。*ileS* 遺伝子には、連続した終止コドン TGA-TGA が存在し、それと重複して *lspA* 遺伝子の開始コドン (ATG) が存在していた。H. Wu らのグループも、①、③に関して筆者らと同様の結論に到達している^(17,18)。

大腸菌をはじめとするバクテリアにおいては、機能的に関連のあるいくつかの酵素がオペロンを作っていることはよく知られている。しかし、タンパク質の合成に重要な *IleS* と、分泌に重要な *LspA* 両酵素が、互いに機能的に関係があるとは思えない。1つの可能性として、巨大な分子量の *IleS* 酵素が、本来の合成酵素としての役割のほかにタンパク質の分泌に関与していることが考えられる。また、この酵素は RNA と相互作用するので、その機能が何らかの形でタンパク質の分泌と関係している可能性も考えられる。あるいはまったく偶然に2つの遺伝子がオペロンを形成しただけのことかもしれない。非常に興味のある問題である。

もともと、*lspA* 遺伝子をクローン化した始まりは、同酵素の精製が困難だったためである。多コピープラスミド上にクローン化された *lspA* 遺伝子を用いても、酵素の発現量は精製には不十分であった。そこで細胞内の酵素量をさらに増やすために、*lspA* 遺伝子の前に高発現プロモーターである *trpPO* をつけ、さらに遺伝子のコピー数を飛躍的に増加させるベクターであるランナウェー・プラスミドにクローン化した。この2つの操作により、細胞内の酵素量を1,000倍以上に高めることに成功し、細胞質膜よりほぼ純粋なものにまで精製することが

図3 リボタンパク質シグナルペプチダーゼの大量発現と精製

A: 宿主大腸菌のみ, B: ベクタープラスミドのみ, C: トリプトファンプロモーターをつけ、さらにランナウエー・ベクターに組み込んだ後, D, E: 精製シグナルペプチダーゼ. A~Cは大腸菌エンベロープのポリアクリルアミドゲル電気泳動像. 矢印はリボタンパク質シグナルペプチダーゼ

できた(図3). LspA 酵素は, BLPをはじめとする一群のリボタンパク質に作用した. また切断部位のC末端にあるシステイン残基のグリセリドによる修飾が切断反応に必須であった⁽¹⁹⁾.

ところで, これまでに知られているプロテアーゼは, 非常に大きな分子量を持つものが多い. 400 種あるペプチド結合のうちの特定の結合のみを切断するための情報として, 分子が巨大であることが必要なかも知れない. これに対して, LspA 酵素は分子量が小さい. 切断部位の構造が特殊であるために, 小さな分子ですむのかも知れない.

シグナルペプチドペプチダーゼ

細菌のみならず, 動植物を含めた多くの系で, 分泌タンパク質の前駆体から成熟体への変換が報告されてい

る. しかし, シグナルペプチダーゼによる前駆体の分解産物として, 成熟体とシグナルペプチドの両者が同定できているのは, 筆者らのリボタンパク質の系^(20,21)と, Wickner のグループによる M13 ファージ外被タンパク質の系⁽²²⁾のみである. この事実は, すべての膜系において, 切断されたシグナルペプチドをきわめて急速に分解するプロテアーゼが広く分布していることを物語っているものであろう. もし切断されたシグナルペプチドが分解されないとすれば, 膜はちょうど前駆体を蓄積しているのと同じ状態となり, 細胞は死に至ると考えられる. その意味において, シグナルペプチドの分解はタンパク質分泌の一過程であり, 重要であると思われる.

Hussain ら⁽²⁰⁾は, 前駆体を蓄積した膜を高温で処理すると, 前駆体の切断は起こるが, 切断されたシグナルペプチドの分解は起こらないことを見いだした. これにより, 彼らは, まず前駆体の切断が起こり, ひき続いてシグナルペプチドの分解が起こることを, 初めて証明した(図2). そしてこの分解に関与する酵素をシグナルペプチドペプチダーゼと命名した. また, 前駆体を蓄積した膜をアンチパインなどのプロテアーゼ阻害剤で処理することにより, あらかじめシグナルペプチドペプチダーゼを不活性化させると, シグナルペプチドが定量的に得られることが見いだされた⁽²²⁾. このシグナルペプチドは, N末端メチオニンからC末端グリシンまでの完全なものであった(鈴木, 市原, 水島, 未発表). シグナルペプチドを蓄積した膜を基質として, シグナルペプチドペプチダーゼを検索する系は, このようにして確立された.

その頃, 大腸菌の表層には2種類のプロテアーゼ(ⅣとⅤ)の存在することが報告されていた⁽²³⁾. この2種のプロテアーゼは, 主に合成基質を用いて研究されてきたので, 生体内でどのような役割を果たしているのかはまったく不明であった. 市原らは, 両酵素を精製し, 上記の基質(切断されたシグナルペプチドを含む膜標品)に作用させると, プロテアーゼⅣに顕著なシグナルペプチド分解活性を見いだした(図4). プロテアーゼⅣは, 他の膜タンパク質をまったく分解せず, 切断されたシグナルペプチドを特異的に分解した. また注目すべきは, まったく同じ一次構造をしている前駆体のシグナルペプチド部分は分解しないことであった. 膜中にあるシグナルペプチドが切断される前後で, そのコンホメーションをどのように変えるのかは不明であるが, プロテア

図4 プロテアーゼIVによるシグナルペプチドの分解 (文献22)より引用)

リボタンパク質の前駆体 (proLP) を含む膜標品(1)に熱処理(2), 未処理(3)のプロテアーゼIVを作用させた。シグナルペプチドを含む膜標品(4)に熱処理(5), 未処理(6)のプロテアーゼIVを作用させた。

ーゼIVがそれを明らかに識別していることは事実である。

以上の結果から、プロテアーゼIVはシグナルペプチドペプチダーゼであると結論された。しかし、プロテアーゼIVが切断されたシグナルペプチドのみを分解すると結論することは難しい。図4において、シグナルペプチド以外の他の膜タンパク質は、すべて完成したタンパク質であると考えられ、プロテアーゼIVはそれらには作用できず、膜中で不用になったタンパク質分解物一般に作用するスニーパーである可能性もある。これを証明するには、適当なタンパク質のナンセンスフラグメントを膜中に組み込ませ、プロテアーゼIVを作用させてみる必要があるであろう。

プロテアーゼIVは分子量 34,000 で、弱い界面活性剤中では大きなオリゴマーを形成しているらしい⁽²³⁾。しかし、量的には非常に少なく、タンパク化学的に扱うことは困難であった。当研究室ではこれを打破すべく、プロテアーゼIV遺伝子のクローン化を試み、最近それに成功した。研究は緒についたばかりであるが、その一端を以下に紹介する。

プロテアーゼIVのクローンは、その変異株が得られて

いないため、Clarke and Carbon コレクションから、この酵素を過剰生産する株として得られた。大腸菌には、細胞質、細胞質膜、ペリプラズム、そして外膜に至るまで、数多くのプロテアーゼが存在し、特異的に1種類のプロテアーゼ活性のみを測定することはきわめて困難である。プロテアーゼIVの活性を特異的に測定できたのは以下の理由による。

1) 膜プロテアーゼが界面活性剤依存性を示すのに対し、細胞質などの水溶性プロテアーゼはその界面活性剤で失活する。このため、全細胞を酵素標品として用いても、膜プロテアーゼ活性のみが測定できる。

2) プロテアーゼIVの基質特異性を考慮に入れ、かつ活性測定が容易な合成基質、カルボキシベンゾイルバリン-ナフチルエステルを合成し、スクリーニングに用いた。

pBR 322 にサブクローンされた遺伝子を持つ菌におけるプロテアーゼIVの活性は、親株に対して十数倍となっていた。また、その活性はアンチパインにより親株と同様に阻害されていた。一方、プロテアーゼVの活性には、両者による変化はなかった。サブクローンされた遺伝子の全塩基配列はすでに決定されたが、現在のところ遺伝子と遺伝子産物の間の正確な対応はつけられていない。

この項の初めに述べたように、切断されたシグナルペプチドの分解は、細胞にとって必須のことと思われる。逆に言えば、この酵素を阻害することにより、細胞を死に至らしめることも可能であろう。すなわち、この酵素の阻害剤の検索により、新しいタイプの有用物質が見いだされるかもしれない。一方、切断されたシグナルペプチドを速やかに分解する活性は、微生物、動物、植物を問わず広く分布している。大腸菌において、筆者らが開発したこの酵素の測定方法およびスクリーニング法は、微生物のみならず、動植物の系にも応用できるものであろう。

リボタンパク質の外膜への移送

細胞質膜を透過したタンパク質のあるものはペリプラズムにとどまり、あるものは外膜へ移送される。これまで述べてきたリボタンパク質についての研究は、少なくともシグナルペプチドの切断が、細胞膜からの遊離に必要なことを示している。筆者らの研究室の武藤らは、以

前にタンパク質の局在化を決定する要因として、シグナルペプチド切断部位（成熟タンパク質のN末端）のアミノ酸の性質の重要性を示唆した。ここでは、リボタンパク質について同部位のグリセリドによる修飾が必須の役割を果たしていることを示す結果を述べる。以下の結果は、先に湯ら⁽²⁴⁾によってなされた研究に改良を加えたものである。

筆者らの研究室の崔らは、いずれも外膜タンパク質の遺伝子である *ompF* と *lpp* 遺伝子から、ハイブリッド遺伝子を作製した（崔，山田，水野，水島，未発表）。この遺伝子は、*ompF* プロモーターの支配下にあり、シグナルペプチド（*ompF*），N末端2個のアミノ酸残基（*ompF*），C末端側57個のアミノ酸残基（*lpp*）より成るハイブリッドタンパク質を合成する。このタンパク質は、BLPのN末端のアミノ酸2個がAla-Gluに変わっているため、グリセリドによる修飾を受けない。そのほかはBLPと同じアミノ酸配列を持っている。合成されたタンパク質は、細胞質膜を通過して分泌され、シグナルペプチドは正常に切断されていた。しかし、このタンパク質は外膜まで移送されず、ペリプラズムにとどまっていた。このことは、BLPの外膜への移送には、グリセリド、脂肪酸によるN末端の修飾のみが必要なことを強く示唆するものである。

湯，崔らのハイブリッド遺伝子を用いた研究から，①BLPは3量体として存在していること，②そのタンパク質部分はペリプラズムにあること，③BLPはペプチドグリカンと，これまでに知られている共有結合のほか，非共有結合的にも相互作用していること，など興味ある知見を得ることができた。

*

以上，筆者らの研究室で得られた結果を中心に述べてきた。リボタンパク質の生合成の各段階を押さえてゆく間に，前駆体から成熟体への変換，および細胞質膜から外膜への移送過程を把握することができた。単純タンパク質を材料としたのでは得ることができない中間段階を，いくつか押さえることができたのは，リボタンパク質の生合成過程が複雑であったからであろう。そしてこのリボタンパク質の生合成と分泌過程から得られた知見が，広くタンパク質分泌における一般的な様式のかかりの部分の説明できようことは，おそらく誤りのないこと

であろう。

文 献

- 1) T. J. Silhavy, S. A. Benson & [S. D. Emr : *Microbiol. Rev.*, 47, 313 (1983).
- 2) V. Braun : *Biochim. Biophys. Acta.*, 415, 335 (1975).
- 3) S. Mizushima : *Mol. Cell. Biochem.*, 60, 5 (1984).
- 4) N. Hazumi, H. Yamada & S. Mizushima : *FEMS Microbiol. Lett.*, 4, 275 (1978).
- 5) T. Mizuno : *J. Biochem.*, 86, 991 (1979).
- 6) S. Ichihara, M. Hussain & S. Mizushima : *J. Biol. Chem.*, 256, 3125 (1981).
- 7) M. Inukai, M. Takeuchi, K. Shimizu & M. Arai : *J. Antibiot.*, 31, 1230 (1978).
- 8) M. Hussain, S. Ichihara & S. Mizushima : *J. Biol. Chem.*, 255, 3707 (1980).
- 9) S. Ichihara, M. Hussain & S. Mizushima : *J. Biol. Chem.*, 257, 495 (1982).
- 10) M. Hussain, S. Ichihara & S. Mizushima : *J. Biol. Chem.*, 257, 5517 (1982).
- 11) 水島昭二：“細胞の認識応答と膜”，化学増刊10，浅野 朗，大西俊一共編，化学同人，1983，p.83.
- 12) 水島昭二：“バイオテクノロジー——生化学から物質生産へ”，丸尾文治編，学会出版センター，1985，p.404.
- 13) H. Yamagata : *J. Biochem.*, 93, 1509 (1983).
- 14) H. Yamagata, N. Taguchi, K. Daishima & S. Mizushima : *Mol. Gen. Genet.*, 192 (1983).
- 15) H. Yamada, M. Kitagawa, M. Kawakami & S. Mizushima : *FEBS Lett.*, 171, 245 (1984).
- 16) F. Yu, H. Yamada, K. Daishima & S. Mizushima : *FEBS Lett.*, 173, 264 (1984).
- 17) M. Regue, J. Remenick, M. Tokunaga, G. A. Mackie & H. C. Wu : *J. Bacteriol.*, 158, 632 (1984).
- 18) M. A. Innis, M. Tokunaga, M. E. Williams, J. M. Loranger, S.-Y. Chang, S. Chang & H. C. Wu : *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 81, 3708 (1984).
- 19) H. Yamada, H. Yamagata & S. Mizushima : *FEBS Lett.*, 166, 179 (1984).
- 20) M. Hussain, Y. Ozawa, S. Ichihara & S. Mizushima : *Eur. J. Biochem.*, 129, 233 (1982).
- 21) C. Zwizinski & W. Wickner : *J. Biol. Chem.*, 255, 7973 (1980).
- 22) S. Ichihara, N. Beppu & S. Mizushima : *J. Biol. Chem.*, 259, 9853 (1984).
- 23) M. Pacaud : *J. Biol. Chem.*, 257, 4333 (1982).
- 24) F. Yu, H. Furukawa, K. Nakamura & S. Mizushima : *J. Biol. Chem.*, 259, 6013 (1984).

お 知 ら せ

大阪大学蛋白質研究所セミナー

「ラン藻の生化学」

日 程：昭和60年5月31日(金)～6月1日(土)

プログラムなど，詳しくは下記にお問合せ下さい。

問合せ先：赤沢 堯（名古屋大学農学部，052-781-5111）

加藤哲也（京都大学理学部，075-751-2111）

堀尾武一（大阪大学蛋白質研究所，06-877-5111）