棘皮動物胚におけるクロマチン成熟

池上 晋*

英国の発生学者 Wolpert の著作に、「一生のうちで最も大切な時は誕生ではない、結婚でもない、死でもない、原腸胚形成である」という一文がある。しかし、原腸胚形成に先行する胞胚形成は個体にとって最初の形態形成であり、その重要性は原腸胚形成にまさるとも劣らない。本稿は各種の阻害剤をメスとして、この発生過程において主要な役割を演ずる分子を見だし、その機能に迫る試みを紹介する。

多細胞動物のクロマチンは細胞核の DNA とタンパク質の複合体を特定する形態学上の用語として理解されてきた。近年、この形態学的実体は分子レベルの知見が集積し、構成分子群の配置をトポロジカルに示す構造モデルが提示されるようになった。クロマチンは遺伝子の転写が行なわれる場に他ならない。また、細胞機能の多くは遺伝子の転写制御によって調節されているので、クロマチン構成分子間の相互作用の小さな変化が遺伝子の発現状況を変化させ、細胞機能に大きな変化をもたらすことになる。こうしたことから、クロマチンの構造と機能が細胞によってどのように異なるのか、また、その差異は細胞にとってどのような意味をもつのかといった問題が分子細胞生物学の今日的なテーマとして追求されるようになった。

では、受精卵内のクロマチンの構造と機能はどうか。すべての細胞は受精卵に由来しているので、卵にはどの細胞のクロマチンにも共通する典型を求めることができるのだろうか。答えは否である。受精卵のクロマチンは構造的にも機能的にも一般体細胞のそれと著しく異なったものである。クロマチンは初期発生の過程で大きな変貌を遂げる。筆者はこの十年間、棘皮動物イトマキヒトデ受精卵の胚発生過程を選択的に阻害する化学物質を探索してきた。その結果得られた発生阻害物質の多くは、胚がクロマチンとしての機能を獲得する過程を阻害したり、クロマチン構成分子を

崩壊させるものであった。したがって、受精卵中に存在する未熟なクロマチンが機能的な構築物に組み上げられることが初期発生において一義的な重要性をもつと認識するに至った。筆者はこの変化を「クロマチン成熟」と名付けたいと思う。ここではクロマチン成熟に関するこれまでの研究経緯を紹介したい。

卵成熟・受精・胚発生の概要

近年、ヒトデの放卵と卵成熟を誘起するホルモンが同定され⁽¹⁾、随時ヒトデの卵を採り人工受精することが可能になった。とりわけ、イトマキヒトデは日本各地の海岸で容易に採集され、飼育が容易で細胞分裂や分化のメカニズムを調べるための有用な研究材料として活用されるようになった⁽²⁾。

イトマキヒトデの十分に発達した卵巢中の卵母細胞には卵核胞と呼ばれる大きな核が存在する(図 1-A)。この核は第一減数分裂前期の移動期に相当し、 $4n$ の染色体 DNA が含まれる。この卵母細胞に精子を与えると何匹でも細胞内に侵入するが発生を開始しない。すなわち、卵母細胞は受精に対して「未成熟」である。卵母細胞に卵成熟誘起物質 1-メチルアデニン⁽¹⁾を与えると、 20°C で約 30 分で卵核胞が崩壊し、第一減数分裂中期に達する(図 1-B)。60 分後に極端に不均等な分裂が行なわれ、小さい第一極体が放出される。大きいほうの卵母細胞は 60 分後に再び不等分裂し、第二極体を生ずる。この 2 回の減数分裂の間に染色体 DNA 複製は起こらない。分裂の際、

Chromatin Maturation in Echinoderm Embryos

* Susumu Ikegami, 広島大学生物生産学部

図 1 ■ イトマキヒトデの初期発生

A : 未成熟卵母細胞 (GV は卵核胞), B : 成熟中の卵, C : 受精卵 (FM は受精膜), D : 極体を放出した受精卵 (PB は極体), E : 2細胞期の胚, F : 8細胞期の胚, G : 胞胚, H : 原腸胚

卵母細胞の染色体 DNA は将来発生にあずかることのない2個の極体に等分されるので、最終的に卵内に $1n$ 分の染色体 DNA が残ることになる。第二極体を放出して30分経つと、染色体のまわりに核膜が形成されて雌性前核が生ずる。

卵表層は1匹の精子を受け容れた後、他の精子の貫入を妨げる電位変化を生ずる。この多精拒否機構がよく機能するのは、卵核胞の崩壊から第一極体形成に至る約30分間である。この時期の卵に精子を与えると、数分のうちに受精膜が形成される(図1-C)。第二極体の放出(図1-D)が行なわれた後、卵内にとどまっていた精子核は雌性

前核形成に呼応して膨大し、雄性前核となる。やがて雄性前核は雌性前核を引き寄せ、合体して融合核となる。この核融合に先立って、染色体 DNA の複製が行なわれる。したがって、融合核には $4n$ の染色体 DNA が存在することになる。

この後、受精卵、すなわち胚は等しい2個の割球に分離する(図1-E)。胚はその後30分ごとにDNA複製を伴う有糸分裂を繰り返して細胞数を増加させてゆく(図1-F)。これらの細胞分裂では個々の細胞体積が減少してゆくの、この分裂は卵割、それぞれの細胞は割球と呼ばれる。8ないし9回の卵割を繰り返して細胞数が256ないし512となった時点で、個々の割球は上皮化し、胚は1層の細胞層に囲まれた中空の胞胚となる(図1-G)。隣接する割球間にはセプテート・ジャンクションがみられる⁽³⁾。胞胚の形成は1-メチルアデニン処理開始から約7時間後に観察される⁽⁴⁾。さらに6時間後に、個々の細胞の表層に1本ずつ、外側に向かって繊毛が

生じ、やがて胚細胞が孵化酵素を分泌するようになる。この酵素によって受精膜が溶解し、胚は遊泳を始める。1-メチルアデニン処理開始後17時間で原腸胚形成が行なわれる(図1-H)。

これらの多彩な発生過程で、特定の時期に発生を停止させる一群の阻害剤が存在する⁽²⁾。以下に、いくつかの阻害剤の作用について述べる。

卵割期におけるクロマチンの意義

Cephalosporium aphidicola や類縁のカビが生産するDNAポリメラーゼ α の選択的阻害剤アフィディコリン⁽⁵⁾を $10 \mu\text{g/ml}$ の濃度でイトマキヒ

図 2 ■ イトマキヒトデ胚発生に及ぼすアフィディコリンの影響

A : アフィディコリン (10 $\mu\text{g/ml}$) 処理胚, B : 同時刻の対照胚

トデ卵母細胞に与え、1-メチルアデニン処理を行なうと、対照卵母細胞と同時刻に卵核膜が崩壊して極体放出が行なわれる。媒精によって正常に受精膜が形成される。卵成熟や受精の間に染色体のDNA複製は行なわれないので、アフィディコリン処理はこれらのプロセスに影響を与えない。しかし、アフィディコリン存在下で最初の卵割は、対照胚に比べて約30分遅れて行なわれた。この後、対照胚に比べて約2倍の時間を費やしながらい卵割が繰り返された。受精卵は8回ないし9回の卵割で対照胚は胞胚となるが、アフィディコリン処理胚はこの時点で胞胚に達することなく死に至った⁽⁶⁾。染色体DNAの複製はDNAポリメラーゼ α によって触媒されるので、アフィディコリン処理中の染色体は複製されない。その結果、卵割によって生ずる割球にはクロマチンが配分されない⁽⁷⁾。しかし、割球には染色体を含まない紡錘体が現われ、“無染色体分裂”が行なわれる(図2)。

DNA合成基質となるデオキシリボスクレオシド三リン酸の生合成阻害剤を受精卵に与えても同様に、細胞形成直前で死に至る。葉酸の合成同族体の1つ、メトトレキセートは白血病治療薬として広く用いられているが、これはジヒドロ葉酸レダクターゼ活性の阻害を基盤とする薬効に基づく。この酵素阻害によってチミジル酸生合成が阻害され、細胞内TTP*プールが枯渇し、結果的に

DNA合成が阻害される⁽⁸⁾。メトトレキセートはイトマキヒトデ受精卵膜を透過し難いので、卵内濃度が0.9 $\mu\text{g/ml}$ となるように直接受精卵内にマイクロインジェクションしてその効果を見たところ、16細胞期までは遅滞なく正常な卵割が繰り返されるが、32細胞期から“無染色体分裂”が始まり、胞胚形成直前で死に至った⁽⁹⁾。

イトマキヒトデ卵母細胞のデオキシリボスクレオシド三リン酸含量はきわめて低い。しかし、1-メチルアデニンによって卵が成熟すると、その含量は著しく増大する。TTPは卵1個あたり35 fmolに達するが、この量は2倍体DNAの25倍量に相当する⁽¹⁰⁾。メトトレキセート存在下で飼育した受精卵が卵割を繰り返す過程で、最初の4～5回のDNA複製では卵中の過剰のTTPプールが利用され得るが、それ以後は新たにTTPを合成する必要がある。この過程がメトトレキセートによって阻害され、無染色体分裂が始まることになる。受精卵をチミジン含有海水中で飼育すると、メトトレキセート処理によってTTPの飢餓が起こらず、胚は胞胚期を経て原腸胚期に到達する。メトトレキセートは予想された作用以外には胚細胞に影響を与えていないと結論される。

DNA合成基質生合成やDNAポリメラーゼ α 反応を阻害することによってもたらされる‘無染色体分裂’は卵割期の胚に限って可能な分裂であり、これ以後の胚や一般体細胞では見ることがで

* TTP : チミジン-5'-三リン酸

きない。要するに、卵割期の割球の分裂能はクロマチンに依存しない特性を有している。

胞胚形成における転写の必要性

‘無染色体分裂’が卵割期の割球に許され、胞胚形成期に許されないのはなぜか。卵割期の細胞機能に不可欠なタンパク質はあらかじめ卵の細胞質にストックされた mRNA を動員することによって合成される。卵割期が過ぎると胚は母性 mRNA への依存から脱却し、胚みずからのゲノムに基づいて必要な情報を転写し始める。したがって、クロマチンを失った割球が細胞形成直前に死に至るのは、胞胚形成のために必要なタンパク質の鋳型となる mRNA の生成が行なわれないことに帰結できそうである。はたしてそうであろうか。

ウニ受精卵に転写阻害剤アクチノマイシン D を与えることによって RNA 合成を阻止しても、胚は孵化胞胚期に達することが示されている⁽¹¹⁾。これは、母性 mRNA が孵化胞胚期までに必要なタンパク質の鋳型として機能することを示している。アクチノマイシン D は DNA の塩基間にインターカレートすることにより転写の鋳型活性を阻害するといわれる。しかし、インターカレーションによって相補的デオキシリボスクレオチドの鎖間の分離や複製のプロセスも影響を免れず、本薬剤の作用特異性は必ずしも高くない。したがって、アクチノマイシン D による発生停止が RNA 合成の阻害だけに起因すると結論することは困難である。そこで筆者らは、可逆的に阻害を解除し得る RNA 合成阻害剤を用いて、胞胚形成に胚クロマチンの新しい転写が必要かどうかを調べた。

*Nocardia interforma*が生産

する抗生物質ホルマイシンはアデノシンの 8 位の炭素が窒素に、9 位の窒素が炭素に置換した構造をもつ⁽¹²⁾。これは哺乳類細胞のリボスクレオチド合成を阻害する活性を有する。イトマキヒトデ受精卵に 25 $\mu\text{g/ml}$ のホルマイシンを与えて飼育すると正常に胞胚が形成され、その直後の 1,024 細胞期で発生を停止した (図 3)⁽¹³⁾。ホルマイシンは胚細胞中で効率よくホルマイシン-5'-三リン酸に変換され、胞胚形成期に認められる UTP プールの増加と RNA 合成を阻害した。CTP プールの増加は部分的に阻害されたが、ATP と GTP プール量は対照胚と同等であった。ホルマイシン処理で発生が停止した胚にウリジンとシチジンを与えると胚は発生を再開し、原腸胚期に至った。したがって、ホルマイシンによる発生停止はピリミジンヌクレオチド合成の阻害によってもたらされる RNA 合成阻害に起因すると結論される。アフィディコリン存在下で飼育した場合と異なる

図 3 ■イトマキヒトデ胚発生に及ぼすホルマイシン (25 $\mu\text{g/ml}$) の影響
A : ホルマイシン処理 5.5 時間胚, B : 対照 5.5 時間胚, C : ホルマイシン処理 10 時間胚, D : 対照 10 時間胚。バーの長さは 40 μm

り、ホルマイシン処理胚のそれぞれの割球には核が存在する（図 3）。したがって、ホルマイシンは DNA 合成とその基質生成には影響を与えないものと考えられる。

RNA 合成の阻害が胞胚形成を完了した後に発生停止をもたらすのであれば、そのような活性物質をスクリーニングすることによって新しい RNA 合成阻害剤が見いだされるものと考えられる。筆者らは、受精卵に与えると有核のまま正常に卵割を続けるが、胞胚形成直後で発生停止させる活性を多数の放線菌培養液中に検索した。その結果、*Streptomyces albus* の培養液から新規ヌクレオシド、ピロロシンを単離した⁽¹⁴⁾。本物質もホルマイシン同様 C-ヌクレオシド構造を有し、ピリミジンヌクレオチド生合成の阻害によって胞胚形成期の RNA 合成を選択的に阻害することが明らかとなった。

胞胚形成期で合成される RNA は mRNA とその前駆体に限られている。胚全体の RNA 合成量の増加は主に胚の細胞数の増加に基づくもので、この時点で転写速度が高まるわけではない。しかし、特定の mRNA 分子種が胞胚期初期の発生進行に不可欠なタンパク質の鋳型として働くものと考えられる。

以上の実験結果から、アフィディコリンとメトトレキセート存在下で飼育した胚の割球が核を失い上皮化できないのは、核と細胞質に mRNA の受給以外の相互作用が生じ、これに割球の生存そのものが依存するようになるためであると考えられる。

胞胚形成時における核-細胞質-細胞膜相互作用

胞胚形成直前に細胞間の接着性が増大する。胞胚形成の重要

な推進力は細胞膜を介した細胞間相互作用である。レクチンの 1 種コンカナバリン A を 50 $\mu\text{g/ml}$ の濃度で受精卵に与えると、卵割期に卵割は正常に進行するが、256 細胞期で胞胚形成することなく死に至る⁽¹⁵⁾。細胞膜が胞胚形成期に上皮細胞の膜へと変化し、後に纖毛を生ずる。

筆者らは、*Bacillus subtilis* の生産する抗カビ性物質イツリン A-2⁽¹⁶⁾ を 50 $\mu\text{g/ml}$ の濃度で受精卵に与えると、卵割が阻害されることを見いだした⁽¹⁷⁾。この物質は胚細胞膜に強固に結合して卵割を阻害するが、核分裂は正常に進行するので多核単細胞となる。対照胚が胞胚形成する直前、すなわち単細胞中の核数が 128 ないし 256 になると、突然核が崩壊し、クロマチンどうしが融合した（図 4）。イツリン A-2 を受精卵内に注入してもこのような多核胚は生じない。したがって、細胞膜以外にイツリン A-2 の作用点はない。

図 4 ■ イツリン A-2 (50 $\mu\text{g/ml}$) 処理によって生じたイトマキヒトデ卵割阻止胚 (A, C, E) および対照胚 (B, D, F) の核
受精後 4 時間 (A, B), 6 時間 (C, D), 8 時間 (E, F) 胚を DNA 蛍光染色試薬へキスト 33342 存在下で固定して得た蛍光顕微鏡写真像

図 5 ■ オカダ酸 (20 $\mu\text{g/ml}$) 処理によって生じたイトマキヒト胚クロマチン崩壊
受精後 5.5 時間後に処理胚 (A) と対照胚 (B) をヘキスト 33342 存在下で固定して得た蛍光顕微鏡写真像。バーの長さは 20 μm

最近筆者らは、クロイソカイメンの一成分、オカダ酸⁽¹⁸⁾を 20 $\mu\text{g/ml}$ の濃度で受精卵に与えると、最初の 6 回の卵割は正常に起こるが、128 細胞期で胞胚を形成することなく死に至ることを見いだした⁽¹⁹⁾。オカダ酸存在下で飼育した胚のクロマチンは 32 細胞期まで正常であったが、64 細胞期で突如崩壊した (図 5)。このクロマチン崩壊によって、胞胚形成に要求される核の機能が果たせず、細胞死がもたらされるものと考えられる。胚の DNA 合成速度はオカダ酸によって発生遅延がもたらされる時点で大きく低下しない。したがって、DNA 複製阻害がクロマチン崩壊の原因になるとは考えられない。クロマチンの崩壊はオカダ酸を受精卵の外側から与えることによってもたらされるもので、受精卵内にオカダ酸をマイクロインジェクションしてもこのようなクロマチン異常はもたらされない。また、受精卵の外側からオカダ酸-抗オカダ酸モノクローナル抗体複合体を与えても、遊離オカダ酸と同様にクロマチンの崩壊がもたらされる。したがって、オカダ酸の一次作用点は細胞膜であると考えられる。

上に述べたことを総合すると、細胞形成期に近づくと、核、細胞質、細胞膜がそれぞれ勝手にふるまうことが許されなくなり、それらは相互に依存し合い、1 個の細胞としての全体性、統一性が形成されてくると考えられる。また、これと歩調を合わせて、胚細胞が他から分離されても独立に分裂する能力を次第に失い、個体としての統一性が形成され、これによって個体としての最初の形

態形成が始まることになる。

胞胚形成期に生ずる核-細胞質-細胞膜相互作用の実態は不明である。一般体細胞では細胞骨格系が核や細胞膜の機能を制御することが数多く知られている。たとえば、ある種の哺乳類細胞で、微小管の脱重合をひき起こす薬剤によって細胞が DNA 合成を開始する事例が知られている⁽²⁰⁾。また、細胞骨格のアクチン繊維が細胞膜の構造的支持体として存在するフォドリンその他の調節タンパク質と接着し、細胞の移動、物質輸送、分泌、細胞質分裂を支配する⁽²¹⁾。胞胚形成期に細胞骨格系とその調節タンパク質因子がどのように関連し、機能しているのであろうか、今後の重要な課題の一つと考えられる。

胞胚形成を境に、細胞質機能と核機能が強く関連した発生進行統御機構が出現する。この機構の特性について以下に述べる。

初期胞胚のアデノシン感受性とクロマチン変化

筆者らは、*Bacillus subtilis* の培養液中に胚発生を 256 細胞期で停止させる活性が存在することを見いだした。その本体を精製・単離したところ、活性本体はアデノシンに他ならなかった⁽²²⁾。受精卵を 50 $\mu\text{g/ml}$ のアデノシン存在下で連続的に飼育すると、128 細胞期で卵割の遅れが生じ、256 細胞期で胞胚形成が行なわれたあと、発生が停止した (図 6)。卵割の遅れが始まる 128 細胞期での DNA 合成と RNA 合成の速度は対照胚とまったく同じであった。したがって、核酸合成系が

図 6 ■ イトマキヒトデ胚発生に及ぼすアデノシンの影響
A : アデノシン (50 $\mu\text{g/ml}$) 処理胚, B : 同時刻の対照胚

アデノシンの発生阻害の作用点ではあり得ない。

胚発生さまざまな時期からアデノシン処理を開始して発生停止効果を調べたところ、発生停止が起こるのは胞胚形成直後の 256 細胞期から胞胚期前期に限られており、胞胚期中期以降にアデノシン処理を開始しても胚発生に何の影響ももたらさなかった。逆に、受精直後にアデノシンを加え、一定時刻後に胚をアデノシンを含まない海水に移し換えて飼育したところ、受精直後から 64 細胞期にアデノシン処理を施しても発生に影響は認められなかった。注目すべきことに、256 細胞期で発生を停止した胚から 10 時間後にアデノシンを除去しても発生は再開し、原腸胚期を経てビピンナリア幼生期に至った。すなわち、イトマキヒトデ胚は胞胚期前期にアデノシンによって発生が可逆的に停止する特徴を有する。

受精直後からアデノシンを与え、各時刻でタンパク質合成速度を調べたところ、発生の遅延が始まる 128 細胞期から合成速度が低下し、256 細胞期では対照胚の 5% まで減少した。この時点で DNA 合成と RNA 合成は完全に停止した。アデノシンを除去するとタンパク質合成速度は徐々に回復し、10 時間後には対照胚と同じレベルに達した。DNA 合成と RNA 合成も徐々に回復し、この回復の速度に合わせて発生が進行した。筆者らは、アデノシンによる胞胚初期の可逆的発生停止を休眠と名付けている⁽²³⁾。

休眠中に胚細胞内で起こる変化は何か。また、休眠が破られた胚で最初に起こる変化は何か。

胚細胞中のヌクレオチド含量を調べたところ、ATP, ADP, AMP, 3',5'-サイクリック AMP の含量はアデノシン処理で変化しないが、遊離アデノシン量は数倍増加した⁽²⁴⁾。外液中のアデノシンを除去すると細胞内アデノシン量も減少する。細胞内アデノシン濃度の増減が直接、発生の進行を統御する可能性が考えられる。また、アデノシンを除去して休眠が破られた胚で最初に合成が高まるタンパク質の分子種を調べた結果、Mr* が 29 キロダルトンのメチオニン含有クロマチン・タンパク質の特徴的な合成が認められた⁽²³⁾。このクロマチン・タンパク質が直接発生の進行に係わるかどうか、今後検討を加えるべき課題である。

胞胚形成期前後で主要クロマチン・タンパク質であるヒストンの合成パターンを調べると、卵割期の 32 細胞期では図 7-A に示すとうり、ヒストン H2A, H2B, H3, H4 のいわゆるコアヒストンの合成量に比べて、ヒストン H1 の合成量はきわめて少ない。胞胚形成期に Mr が 29 キロダルトンのヒストン H1 の相対合成速度が急速に増加した (図 7-B)⁽²⁵⁾。

イトマキヒトデ胚では 256 細胞期まで胚細胞の細胞周期進行に G₁ 期を欠いており、M期の終期がS期の始まりと重なっている。しかし、胞胚期前期を過ぎる頃から G₁ 期が出現してくる。やがて細胞分裂の同調性が失われ、胚細胞数はだらだらと増加するようになる。このように、胞胚期中期になると胚細胞が一般細胞の特性を獲得する

* Mr : 見掛けの分子量

図 7 ■ [^3H] リジンで 30 分間パルス標識して得られたイトマキヒトデ 32 細胞期胚 (A), 512 細胞期胚 (B), 中期胞胚 (10 時間胚) (C) の SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動パターン

ゲルのフロログラムをデンストメトリーでスキャンした。H1 は Mr 29 のヒストン H1, H3, H2B·A, H4 はそれぞれヒストン H3, H2B と H2A の混合物, H4 を示す。N33 は Mr 33 のヒストン H1。

ようになり、胚ゲノムの発現が増大する。この過程でクロマチンの新しい構築が行なわれるものと考えられる。次に、胞胚期中期から後期の胚細胞に存在するクロマチン・タンパク質について述べる。

胞胚期中期以降のクロマチン・タンパク質

受精後約 10 時間で胞胚中期に達する。この時期に新生されるヒストンを分割し、それぞれの相対合成量比を胞胚形成直後のものと比較すると、コアヒストン分子群に対して Mr 29 キロダルトンのヒストン H1 の比率が高まる (図 7-B, C)。さらに、この時期で Mr 33, 36, 47 キロダルトンのヒストン H1 亜種分子群が生成する。筆者らは、この分子群が酸によるヒストン分別画法でヒストン H1 画分に回収されてくること、それぞれのアミノ酸組成を調べたところ、アルギニン

含量に比べてリジン含量が高いことなどから H1 グループに属するものと推定した。次に、Mr 29 キロダルトンの主要ヒストン H1 分子種を抗原として Balb/c マウスに免疫して抗 Mr 29 キロダルトンヒストン H1 モノクローナル抗体を得た。本抗体は仔ウシ胸腺ヒストン H1 やイトマキヒトデ精子のヒストン H1 に反応しないが、胞胚中期の Mr 33, 36, 47 キロダルトンのペプチドに反応した。したがって、これらのペプチドは免疫学的にもヒストン H1 亜種分子種群であることが認められた⁽²⁵⁾。

胞胚期中期は胚細胞の細胞周期進行の同調性が失われ、やがて細胞が内胚葉、中胚葉、外胚葉へとそれぞれ運命を異にする決定がなされる時期がある。この細胞分化によって遺伝子発現に差異が生ずるものと考えられる。細胞系列の異なる細胞群には異なるヒストン H1 が生成し、異なるクロマチン構成を有している可能性も考えられる。いずれにせよ、主要ヒストン H1 分子種の他に Mr が大きなヒストン H1 亜種分子がいくつか新生する点に、中期胞胚クロマチンの特徴が存在する。

胞胚期後期に至り、それぞれの割球の外側に 1 本ずつ纖毛が生じ、胚が回転するようになる。続いて胚は孵化し、遊泳する。孵化して 1~2 時間すると植物極側の細胞層が肥厚し、胞胚腔内へと陥入する。すなわち原腸胚期に達する。この頃になると、胞胚腔内には細胞外マトリックスが分泌され、やがて原腸の先端からこれを足がかりとして中胚葉性の間充細胞が腔の中へと移動する⁽²⁶⁾。

筆者らは、*Streptomyces siوياensis* が生産する抗カビ性物質トリコスタチン A を 10 ng/ml の濃度で受精卵に与えて飼育すると、卵割、胞胚形成、原腸陥入過程は影響を受けないが、間充細胞の生成 (中胚葉分化) が阻害され、この時点で発生の停止がもたらされることを見いだした⁽²⁷⁾。トリコスタチン A はフレンド白血病細胞をきわめて低濃度で赤血球へ分化させる物質として再発見された⁽²⁸⁾ のものであるが、イトマキヒトデ胚では選択的な中胚葉分化の阻害剤であるということが

できる。ヒストン H1 に対するモノクローナル抗体を用いた解析から、トリコスタチン A 処理胚では孵化後の胞胚期で Mr 29 キロダルトンのヒストン H1 が選択的に分解を受け、崩壊していることが認められた。ヒストン H1 が崩壊しつつある胚では、Mr 92 キロダルトンのペプチド生成が大幅に増加していた。これは、ヒストン H1 の欠落によるクロマチン異常が遺伝子発現の制御システムに大きな変化をもたらした可能性を示唆する。

*

受精卵がひたすら細胞数を増加してゆく卵分割を経て、胞胚形成の時期にヒストン H1 をはじめとする各種クロマチン・タンパク質の合成が開始する。やがてヒストン H1 に多形性が認められるようになり、同質の細胞群が異なった方向に特殊化してゆく。それぞれの細胞のクロマチンがそれぞれの空間構造を形づくり、独自の遺伝子発現を行なうようになる。こうした細胞分化の前提となるクロマチン成熟の詳細を理解することは、まぎれもなく発生過程における遺伝子発現の基盤を理解することである。この分野に対する研究者の関心はまだ低いと言わざるを得ないが、多方面の研究者との交流のなかでこの問題の重要性の認識が深まり、大きな飛躍が生れることを期待したい。

本論稿の基礎となった研究の一部は日産科学財団研究助成金ならびに水産庁水産バイオテク導入基盤整備事業委託費によって行なわれた。

文献

- 1) H. Kanatani : *Int. Rev. Cytol.*, **35**, 253 (1973).
- 2) 池上 晋, 高橋信雄, 土森 登 : “バイオテクノロジー——生化学から物質生産へ”, 学会出版センター, 1985, p. 286.
- 3) M. Dan-Sohkawa & H. Fujisawa : *Develop. Biol.*, **77**, 328 (1980).
- 4) T. Kominami & N. Satoh : *Zool. Mag.*, **89**, 244 (1980).
- 5) S. Ikegami, T. Taguchi, M. Ohashi, M. Oguro, H. Nagano & Y. Mano : *Nature*, **275**, 458 (1978).
- 6) H. Nagano, S. Hirai, K. Okano & S. Ikegami : *Develop. Biol.*, **85**, 409 (1981).
- 7) H. Yamada, S. Hirai, S. Ikegami, Y. Kawarada, E. Okuhara & H. Nagano : *J. Cell. Physiol.*, **124**, 9 (1985).
- 8) S. Ikegami, K. Mori & J. Imayoshi : *Agric. Biol. Chem.*, **51**, 1277 (1987).
- 9) S. Ikegami, J. Imayoshi, N. Takahashi & H. Nagano : *Develop. Growth Differ.*, **27**, 393 (1985).

- 10) H. Nagano, K. Okano & S. Ikegami : *Exp. Cell Res.*, **145**, 219 (1983).
- 11) G. Giudice : “The Sea Urchin Embryo. A Developmental Biological System”, Springer-Verlag, Berlin, 1986.
- 12) G. Koyama, K. Maeda & H. Umezawa : *Tetrahedron Lett.*, **6**, 597 (1966).
- 13) H. Isomura, N. Itoh & S. Ikegami : *Biochim. Biophys. Acta*, **1007**, 343 (1989).
- 14) S. Ikegami, H. Isomura & N. Tsuchimori : Abstracts of the 14th International Congress of Biochemistry, Praha, 1988, p. 207 (TH).
- 15) S. Kyoizumi & T. Kominami : *Exp. Cell Res.*, **128**, 323 (1980).
- 16) A. Isogai, S. Takayama, S. Murakoshi & A. Suzuki : *Tetrahedron Lett.*, **23**, 3065 (1982).
- 17) N. Tsuchimori, S. Miyashiro, T. Tsuji, T. Kida, H. Shibai & S. Ikegami : *Develop. Growth Differ.*, **28**, 619 (1986).
- 18) K. Tachibana, P. J. Scheuer, Y. Tsukitani, H. Kikuchi, D. Van Engen, J. Clardy, Y. Gopichand & F. J. Schmitz : *J. Amer. Chem. Soc.*, **103**, 2469 (1981).
- 19) 伊藤典之, 梶山 昇, 宇佐川 泰, 宇田泰三, 池上 晋 : 生化学, **60**, 865 (1988).
- 20) K. L. Crossin & D. H. Carney : *Cell*, **27**, 341 (1981).
- 21) 西田栄介 : 生化学, **56**, 1251 (1984).
- 22) N. Tsuchimori, S. Miyashiro, H. Shibai & S. Ikegami : *FEBS Lett.*, **218**, 205 (1987).
- 23) N. Tsuchimori, S. Miyashiro, H. Shibai & S. Ikegami : *Development*, **103**, 345 (1988).
- 24) N. Tsuchimori, S. Miyashiro, H. Shibai & S. Ikegami : *Develop. Growth Differ.*, **30**, 553 (1988).
- 25) 光野朋子, 片岡正憲, 土森 登, 池上 晋 : 生化学, **60**, 865 (1988).
- 26) 岡まりな : “動物の系統と個体発生”, 東京大学出版会, 1987.
- 27) 池上 晋, 光野朋子, 大江泰徳, 尾崎吉弘 : 第 22 回日本発生生物学会大会講演要旨集, 1989, p. 129.
- 28) 吉田 稔, 別府輝彦 : “物質生産の素材としての動物細胞”, 秀潤社, 1988, p. 91.

教官公募

名古屋大学農学部農芸化学科醸酵化学講座助教授

本講座(教授 水野 猛)は、微生物学の基礎分野における分子レベルでの研究の新しい展開を目指しています。今回募集する助教授はこうした分野の研究を意欲的に推進し、微生物学ないし応用微生物学の発展に大きく貢献することが期待される創造性豊かな研究者であることが望まれます。

提出書類 : ①履歴書, ②研究業績目録, ③業績報文の別刷, ④現在までの研究の概要 (1,200 字程度), 今後の研究に対する抱負 (800 字程度), および教育に対する考え (800 字程度), ⑤応募者の研究・人物などについて照会できる人の氏名 (2 名以内)

書類送付先, 問合せ先 : 〒464-01 名古屋市中種区不老町
名古屋大学農学部醸酵化学助教授選考委員会
委員長 水野 猛 ☎ 052-781-5111 内線 6290

書類提出期限 : 平成元年 10 月 31 日 (火) 必着