大豆胚軸のプロテインボディ

大豆種子は主に子葉、胚軸、種皮から成っている。このうち、子葉は大豆の 90% 以上の部分を占め、これまで大豆の成分、微細構造、貯蔵物質の生合成や蓄積についての研究の多くは、子葉について行なわれてきた。一方、胚軸は種子の 1~3% 程度に過ぎないものの、強い収斂味を持つサポニン類を特異的に集積しており⁽¹⁾、大豆臭の原因となるリポキシングナーゼの性質、貯蔵タンパク質の組成、フィチン酸の存在形態などにも特徴がある⁽²⁻⁴⁾。これらの胚軸成分の特性は、タンパク質の凝固性や大豆製品の食味に関係しており、最近では脱胚軸して豆腐を作る製法も開発されている⁽⁵⁾。

胚軸には約 40% のタンパク質が含まれているが、胚軸タンパク質は、2 種の主要な大豆貯蔵タンパク質のうち β -コングリシニンに富んでおり、グリシニンはほとんど含まれていない。また、サブユニット組成にも特徴がみられ、胚軸の β -コングリシニンは子葉に比べると α -サブユニットが多く、 β -サブユニットはほとんど検出されない⁽³⁾。

胚軸の貯蔵タンパク質も、子葉と同様にプロテインボディと呼ばれる液胞由来の細胞内小器官に蓄積されているが、胚軸のプロテインボディの形態は子葉のプロテインボディや、種皮アリューロン層⁽⁶⁾の液胞とはかなり異なっている(写真 1~4)。すなわち、子葉のプロテインボディは直径が 10 μm に達するものもあり、内部は均質でグロバイドはほとんど見られない(写真 5)のに対し、胚軸のプロテインボディは子葉に比べると小さく、羽毛状のマトリクスをもち、内包膜、電子密度の高いフィチングロバイド、および電子透過性のソフトグロバイドからなる内部構造が観察される(写真 1)。一般に、フィチングロバイドの主成分はフィチン酸のマグネシウム、カリウム、カルシウム塩である。大豆胚軸のフィチングロバイドをエネルギー分散型の X 線マイクロアナライザーで元素分析すると、カリウムは比較的少なくカルシウムが多いのが特徴的である⁽⁴⁾。また、カラスミギやイネなどの穀類のアリューロン顆粒で見いだされている鉄、亜鉛もかなり検出される。

子葉と胚軸ではタンパク質含量、フィチン酸含量ともにはほとんど変わらないが、このように胚軸でフィチングロバイドが顕著に観察されるのは、胚軸の貯蔵タンパク質のフィチン酸との結合性が低いことと関係していると

考えられる。胚軸のリピッドボディは子葉に比べると少なく、プロテインボディの外膜上や細胞壁の周囲に連なって観察される(写真 1, 3)。維管束の内側の中心柱細胞(写真 2, 3)では、外側の皮相細胞(写真 1, 4)に比べてプロテインボディの直径が大きく、数も多い。マメ科種子の子葉のプロテインボディの形態については Lott ら⁽⁷⁾が詳細に検討しているが、大豆胚軸のプロテインボディは彼らが報告している *Cassia* (カワラケツメイ) 属種子子葉のプロテインボディと非常によく似ている。

胚軸と子葉のプロテインボディは形態だけでなく、その形成過程も異なっているようである⁽⁸⁾。どちらも粗面小胞体で生合成されたタンパク質が、細胞内を vesicle 輸送されて液胞に蓄積されるという点では共通であるが、胚軸の場合はタンパク質の蓄積期に粗面小胞体が直接液胞に結合しており、おそらく胚軸ではゴルジ体でのタンパク質のプロセッシングはバイパスされているのではないかと考えられる。また、前述のフィチングロバイドを含む内部構造は、登熟中期に貯蔵タンパク質が蓄積された後、まず内包膜とソフトグロバイドが現われ、種子登熟の最終段階にフィチングロバイドが形成される。

胚軸細胞でも子葉⁽⁹⁾と同様、登熟中期にアミロプラスト(澱粉形成体)が発達し、登熟が進むと内部の澱粉粒が急速に分解される。完熟種子の胚軸では、プロプラストが細胞の周辺部分にみられ、二重膜がらせん状につながり、2~3 個連なっていることが多い(写真 6)。内部にはしばしばファイトフェリチンの結晶がみられる。

また、胚軸細胞には子葉に比べるとミトコンドリアが頻繁に観察される。このことは、胚軸が種子発芽後、茎や根となる生理的な活性の高い組織であることと関連しているであろう。

- 1) 大久保一良：日食工誌, 35, 866 (1988).
- 2) 大村芳正, 秋山美展, 斎尾恭子：日食工誌, 33, 653 (1986).
- 3) T. Sugimoto, M. Monma, K. Hashizume & K. Saio: *Agric. Biol. Chem.*, 51, 1231 (1987).
- 4) M. Monma, T. Sugimoto, K. Hashizume & K. Saio: *Agric. Biol. Chem.*, 54, 1847 (1990).
- 5) 浅野三夫, 大久保一良, 山内文夫：日食工誌, 37, 375 (1990).
- 6) 斎尾恭子：化学と生物, 24, 48 (1986).
- 7) J. N. A. Lott & M. S. Buttrose: *Aust. J. Plant. Physiol.*, 5, 89 (1977).
- 8) 門間美千子, 杉本敏男, 河村幸雄, 斎尾恭子：農化誌, 62, 357 (1988).
- 9) 斎尾恭子：化学と生物, 24, 396 (1986).

(門間美千子, 農林水産省食品総合研究所)

1: 胚軸皮相細胞, 2, 3: 胚軸中心柱細胞, 4: 皮相細胞のレプリカ像, 5: 子葉細胞の蛋白質ボディ, 6: 胚軸のプラスチド
 PB: プロテインボディ, IM: 内胞膜, SG: ソフトグロバイド, PG: フィチングロバイド, PL: プラスチド, M: ミトコンドリア,
 PF: ファイトフェリチン, LB: リピッドボディ