腫瘍マーカーとしての α -フェトプロテイン

玉置大器*

その発現調節の分子機構を考える

1956年に臍帯血清中に発見された α -フェトプロテイン (AFP) は、7年後にはヒト肝癌患者血清中にも発見され、現在までにその生化学的解析も進み、肝癌の診断や予後判定への利用も確立されている。AFP遺伝子は4番染色体上アルブミン遺伝子の下流にタンデムに存在するが、両者は同じ祖先遺伝子に由来したものと考えられている。ここでは、AFP遺伝子発現の調節機構、特に発現抑制機構を中心に紹介する。

腫瘍マーカーとしての α -フェトプロテイン (AFP) の重要性は、1963年にソ連の G. I. Abelev, ついで S. Y. Tatarinov によって発見された⁽¹⁾。二人とも今も元気である。ただ御存知のように、ゴルバチョフ政権以前はソ連との学术交流も容易でなく、特に Abelev は国外に出ることが難しかったようで、筆者も AFP の仕事を始めてからすでに13年になるが、まだ3回しか会ったことがない。1990年、この二人の主催で、International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine の年会がモスクワで開催された。あいにくソ連は経済的に苦しい状態にあり、外国からはパンや水まで持参して参加した者もいた。そのような中での学会の準備・運営に、二人の苦労にも並々ならぬものがあったことと思われる。筆者もこの学会に招待されたのだが、モスクワ空港到着時、荷物などで予想以上の時間を費やし、やっとの思いで外に出た。二人が近づいて来るのを見て、何とも言えぬ安堵感と親近感を感じたのを覚えている。また、AFP、さらに腫瘍マーカー一般の研究について印象的なことは、この分野での日本人研究者の活躍と貢献であり、筆者としても大いに勇気づけられてきた。

さて、胎児性物質が成人体内に見いだされる意味について、1874年すでに、次のような見解が述べられている。

“Elements which have retained their anatomic embryonal characters in the adult organism represent, in my opinion, the generative elements

of every tumor variety and specifically those of a malignant nature.”

F. Durante

また、1884年には、癌を理解するためには、正常細胞分化の研究の重要であることが述べられている。

“...before we shall ever be able to answer the question of why or how tumors form... we must be able to solve the problem of normal growth and development.”

H. Savoy

その後、数人の研究者がそれぞれ異なった分野で、細胞分化と癌化との間に密接な関係のあることを次のように表現した。

“Neoplasia : a disease of differentiation”

C. Markert (Developmental Biology), 1968
“Oncogeny is blocked ontogeny.”

V. R. Potter (Cancer Biochemistry), 1969
“Carcinoma is a caricature of the process of tissue renewal.”

G. B. Pierce (Pathology), 1970

このような概念は、最近、癌遺伝子・癌抑制遺伝子が細胞の分裂・分化に関与することが明らかにされて、ますます強固になったと思われる。

発生・分化の異常が癌化に通ずるとすれば、癌細胞中に発生・分化過程で発現する物質が存在する可能性が生じる。これまでに発見された胎児性物質として、種々の胎児性アイソザイム、ホルモンのほか、AFP, carcinoembryonic antigen (CEA) がある。これらの物質を、腫瘍マーカーとして応用する試みが盛んに行なわれ、いくつかは癌診断に貢献している。なかでも FAP と CEA は、臨床面のみならず基礎生化学・分子生物学面でも、深く研究されてきた。

α -Fetoprotein as a Tumor Marker

* Taiki TAMAOKI, カナダ国カルガリー大学医学部生化学科

AFP は 1956 年 Bergstrand と Czar により電気泳動で、臍帯血清中に存在するが成人血清中には存在しないタンパク質として発見された。1963 年, Abelev は、肝癌を持ったマウスの中に、新生児血清中にあるタンパク質と同じものが存在することを見いだした。その後間もなく、Tatarinov によってヒト肝癌患者血清中にも発見された。これをきっかけに、AFP 産生と肝癌・肝障害との関係について、主として免疫学的方法を用いた解析が盛んに行なわれるようになった。同時に、AFP の生化学的解析も進み、その結果、AFP の肝癌に対する診断的価値・予後判定に対する価値が確立された⁽²⁾。しかし、AFP の基礎生物学的現象については未だ不明な点が多い。たとえば、胎児の正常発育に伴って AFP 産生が低下する機構、逆に肝癌発生に伴って AFP が再発現する機構、肝癌の間でも AFP 産生量に大きな違いがある原因などである。本稿では、これらの興味ある点についての最近の分子生物学的な解析を紹介したい。

AFP およびその遺伝子の構造^(3~6)

ヒト AFP 遺伝子の cDNA は 15 個のエクソンに分断されて、ゲノム DNA 上約 19 kb にわたって配列されている。4 番染色体 (4q 11-13) 上に、アルブミン遺伝子から約 14.5 kb 下流に存在する (図 1)。マウスやラットの AFP 遺伝子も非常によく似た構造を持ち、アルブミン遺伝子とタンデム配列をなして、同じ染色体上に存在して

いる。この場合も両遺伝子間の距離は約 14 kb であり、この距離が遺伝子発現制御に関係があることを示唆している。アルブミン遺伝子も 15 個のエクソンから成り、AFP と同じ祖先遺伝子から由来したものと考えられている。

タンパク質のレベルでは、AFP、アルブミンはともに分子量は約 70,000、3つの繰り返しドメインから成っており、アミノ酸配列では約 40% の相同性を示す。大きな構造上の違いは糖鎖の有無で、アルブミンは非糖鎖タンパク質であるが、AFP には約 4% の糖が存在する。今のところ、AFP 糖鎖の役割は明らかではないが、胎児発育過程、また肝癌の悪性度の違いによって、産生される AFP の Con A やレクチン結合性に違いが認められることから、診断への応用が検討されている⁽⁷⁾。AFP の生理的な役割については、それが胎児発育中に大量に産生され、出生後急速に消失することから、胎児発育に重要な働きをしていると推測されている。また、AFP が胎児の脳細胞で特異的なレセプターを介してとり込まれる現象、mitogen によるリンパ球の分裂を阻止する効果、免疫反応を抑制する現象など、興味ある報告があり、今後の研究が期待される。

AFP 遺伝子の発現調節^(3~5)

AFP 遺伝子の発現調節についての興味は、胎児血中 AFP 濃度が胎生約 13 週を境として減少し、生後半年でほとんど検出できなくなるが、肝癌発生に伴って再発現する現象である。筆者らは、この発現変化の機構を分子レベルで解析するため、2つのヒト肝癌細胞株 HuH-7 と huH-1 を用いた。HuH-7 は大量の AFP とその約 1/3 量のアルブミンを、huH-1 は少量の AFP (HuH-7 の約 1/70) と大量のアルブミン (HuH-7 の約 3 倍) を産生する (表 1)。この AFP とアルブミン産生量の相違や肝特異的な酵素活性の相違から、HuH-7 は胎生初期の、huH-1

図 1 ■ヒト α-フェトプロテインとアルブミン遺伝子の配列
ヒトα-フェトプロテインとアルブミン遺伝子はともに 15 個のエクソンから成り、4 番染色体 q11-13 にタンデムに存在する。

表 1 ■ 2種の肝癌細胞株による α-フェトプロテインとアルブミンの産生量^{a)}

細胞株	α-フェトプロテイン	アルブミン
HuH-7	146	49
huH-1	2	166

a) 10⁴ 細胞当たりの培地中への放出量を ng/24hr で示した。

は胎生後期の肝の機能を代表する細胞株と考えることができる。そこで筆者らは、AFP 遺伝子発現促進機構を調べるためには主として HuH-7 を、逆に発現抑制機構を調べるためには huH-1 を使って実験を行なった。

1. AFP 遺伝子発現促進に関与する塩基配列およびタンパク質転写因子

遺伝子発現は、一般的にその遺伝子上流側にある転写制御塩基配列に、タンパク質(転写因子)が結合して調節されるという機構が見いだされている。ヒト AFP 遺伝子転写を促進する塩基配列領域を検出するために、筆者らは AFP 遺伝子上流部位をクロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ(CAT)遺伝子に結合し、これを HuH-7 にリン酸カルシウム法でトランスフェクションし、2日後に CAT 活性を測定した(図 2)。その結果、転写開始点の上流 4.9kb と 2.9kb の間(−4.9〜−2.9 kb 領域)に、強力なエンハンサーの存在することが明らかになった。これは、距離、位置、方向に関係なく、異種(SV 40)のプロモーター活性を増強する典型的なエンハンサーである。また、このエンハンサーは、AFP 産生肝癌細胞(HuH-7, Hep G 2, Hep 3 B など)では活性を示すが、他の組織由来の AFP 非産生細胞では活性を示さない、すなわち細胞特異性を持っている。

このエンハンサー領域には、数個の転写制御配列が存在する。その中で最もよく調べられているものは、約 −3.4 kb に存在する AT モチーフである。これは AT-rich な塩基配列(TGATT AATAATTACA)を持ち、その活性は肝特異的、その他上記の典型的なエンハンサー作用を示す。ゲルシフト法で、AT モチーフに結合する核タンパク質が HuH-7 細胞に見いだされるが、AFP

図 2 ■ CAT レポーター遺伝子を用いたヒト α-フェトプロテイン遺伝子上流に存在する転写発現促進領域の同定
異なった長さの AFP-5' 側 DNA を CAT 遺伝子に連結し、HuH-7 ヒト肝癌細胞にトランスフェクションし、2日後に CAT 活性を測定した。+は CAT の発現を示す。プラスミドの名前の中の数字は AFP 遺伝子 DNA の長さ(kb)を示す。B: Bam HI, E: Eco RI, H: Hind III

非産生細胞中には検出されないの、これが AFP エンハンサーの肝特異性を決定すると考えられる。筆者らは、この AT モチーフに結合し、エンハンサー活性を促進する因子を AFP 1 と命名した⁽⁸⁾。

上記のエンハンサー AT モチーフに類似の塩基配列は、ヒト AFP プロモーター領域に2つ存在する(−130〜−118 bp および −59〜−47 bp)。さらに、アルブミンなど肝特異的に発現する数個の遺伝子のプロモーターにも、類似の塩基配列が存在する。これらプロモーター AT-rich 配列を制御する転写因子は、hepatocyte nuclear factor 1 (HNF-1, 別名 LF-B 1, APF) と名付けられている⁽⁹⁾。HNF-1 は遺伝子転写の細胞特異性を決定する重要な因子であることが明らかにされている。競合ゲルシフト法で調べると、これと同じタンパク質が、ヒト AFP エンハンサー AT モチーフに結合するとの結果が出る。しかし、そ

の間の結合力は、HNF-1 とプロモーター AT-rich 因子間の結合力の 1/10 である。したがって、HNF-1 はプロモーター領域にのみ働く因子ではないかとの意見も出されている。また、免疫グロブリン遺伝子の発現調節に関与するオクタマー配列などで明らかにされているように、AT モチーフにも、2 種以上のタンパク質が結合する可能性も考えられる。筆者らは最近、HNF-1 と異なる AT モチーフ結合タンパク質の cDNA を分離した。はたしてこれが、AFP エンハンサー活性を調節しているかどうか、現在検討中である。

ヒト AFP プロモーター中に、AT-rich 配列が 2 個存在することはすでに述べた。その中の 1 つ、-130 から -118 bp に存在する AT 配列 (proximal AT) に対する HNF-1 の結合は、DNase I フットプリント法で容易に検出できる。これに反して、-59 から -47 bp に存在する AT 配列 (most proximal AT) に対する HNF-1 の結合は、この方法では検出し難い。しかし、点突然変異を導入すると CAT 活性を支持する能力が減少することから、いずれの AT 配列もプロモーター活性に必須であると考えられる。したがって、ヒト AFP 遺伝子では、エンハンサーの AT モチーフを含めて、合計 3 個の AT-rich 配列が存在することになる。マウスやラットでは、この 2 つのプロモーター AT 配列は存在するが、エンハンサーには AT モチーフが存在しない。

この AT 配列繰り返しの生物学的意義は明らかではない。もし HNF-1 が、プロモーター AT 配列のみならず、エンハンサー AT モチーフも調節するとすれば、後者に対する親和性が低いことから、高濃度の HNF-1 の存在が必要となる。つまり、胎児肝では HNF-1 濃度が成人の肝よりずっと高いことが期待される。しかしマウスやラットでは、これを支持する報告はない。ヒトについて、この線に沿った研究が望まれる。

AFP エンハンサー・プロモーターには、HNF-1 以外のタンパク質が数種結合することが知られている。たとえば、プロモーターの場合、NF 1/CTF (nuclear factor 1/CCAAT box-binding factor) および C/EBP (CCAAT/enhancer bind-

ing protein) 転写因子の結合が報告されている。これらは普遍的な転写因子であり、AFP 遺伝子発現の細胞特異性決定には直接関与しないと思われる。しかし、AFP 遺伝子転写は HNF-1 だけでは不可能であり、種々の転写因子の共同作用によってのみ可能である。したがって、これらのタンパク質因子間の相互作用、それに伴う転写活性の変化を調べるのが将来の大きな課題になる。ヒト AFP エンハンサーの場合も、CAT 法により、AT モチーフ以外にも数個の転写制御配列の存在することが見いだされている。ゲルシフト法でこれらの転写制御配列にタンパク質が結合することも認められている。したがって、エンハンサー活性にもタンパク質因子間の相互作用が重要である可能性があり、今後の研究が望まれる。

2. AFP 遺伝子発現に対するホルモンの影響

AFP 産生は、種々のホルモン、特にグルココルチコイドによって影響を受けることが知られている。HuH-7 細胞ではデキサメサゾン処理によって AFP 産生が増加する。このデキサメサゾンの影響は、-175~-161 bp に存在する glucocorticoid responsive element (GRE) によって媒介されることが明らかになった。興味あることには、培養ラット肝癌細胞では、デキサメサゾンによって、AFP 産生が増加する場合と、逆に低下する場合とがある。また、マウスやラットの新生児肝では、デキサメサゾンが AFP 遺伝子転写を阻害することが認められている。どうしてこのような逆の影響が現われるのか、今のところ明らかではない。

筆者らは、HuH-7 細胞においては、デキサメサゾンとレセプターの複合体が GRE に結合し、AFP 遺伝子転写を促進することを認めた。これに対し、インスリンのように特異的な細胞膜レセプターを持つものは、それに結合する結果生ずるシグナルが、種々のメディエーターを通じて核に伝達され、遺伝子転写に影響を及ぼすと考えられる。このような外からの成長・分化を左右する物質の影響およびそれに関与するシグナル伝達系を調べることは、胎児発育と AFP 遺伝子発現

との関連を知る上に、役立つものと思われる。

3. AFP 産生抑制機構

正常に発育している胎児では、AFP 産生は胎児の成長とともに低下する。この原因として2つの可能性が考えられる。第一は、AFP 遺伝子発現を促進する因子の活性が低下すること、第二は、AFP 遺伝子発現を抑制する機構が活性化すること。このいずれであるかを調べるために、筆者らは AFP 産生が非常に低い huH-1 細胞を使って実験を行なった⁽¹⁰⁾。

まず第一の可能性を調べるため、ゲルシフト法を用いて、huH-1 と HuH-7 との間に AT モチーフ結合因子 (HNF-1/AFP 1) の活性に差があるかどうかを調べた。その結果、huH-1 中のこの因子の活性は、HuH-7 よりも約 30% 低いことがわかった。しかし、この程度の差では、1/70 以下という AFP の低値を説明することは難しい。また、同じようにゲルシフト法で、AFP プロモーター領域に結合する NF 1/CTF 転写因子を調べると、この因子は huH-1 中に HuH-7 よりも約 70% 多く存在する。これらの結果は、huH-1 の AFP 産生が著しく低いのは、転写を促進する因子の減少によるものではないことを示している。

そこで、第二の可能性を調べるために、異なった長さの AFP 遺伝子の upstream 部位を CAT 遺伝子に結合し、huH-1 および HuH-7 細胞にトランスフェクションし、発現した CAT 活性を比較した。その結果、HuH-7 では、AFP エンハンサーは AFP プロモーター活性を 25 倍増加させるが、huH-1 ではわずか 1.5 倍の増加にとどまった。これに対し、アルブミンエンハンサーによるアルブミンプロモーター活性の増加度は、huH-1 のほうが HuH-7 よりも高い。すなわち、huH-1 細胞では、AFP エンハンサーの AFP プロモーターに対する影響が著しく低下していると考えられ

図 3 ■ AFP サイレンサー領域の同定
AFP エンハンサーとプロモーター間の DNA をいろいろな長さで除去 (点線部分) し、HuH-7 細胞と huH-1 細胞で CAT 発現を支持する活性の変化を調べた。+は CAT の発現を示す。E_A, E_B はそれぞれ AFP エンハンサードメイン A, B を示す。S_1, S_2 はそれぞれ上流サイレンサーおよび下流サイレンサーを示す。

た。
この原因が、AFP エンハンサーとプロモーターの間に存在する抑制塩基配列による可能性があるかどうかを調べるため、この部位から DNA をいろいろな長さで除去し、残存した DNA を CAT 遺伝子に結合し、HuH-7 と huH-1 細胞にトランスフェクションした (図 3)。HuH-7 細胞では、いずれの DNA 部分の除去によっても CAT 活性は変わらない。一方、huH-1 細胞では、除去した DNA 部位によって、CAT 活性に変化の生ずることが認められた。特に -1.8 ~ -1.4 kb, -402 ~ -174 bp 領域を除去すると CAT 活性が顕著に上昇する。これは、この領域に AFP エンハンサー活性を阻止する塩基配列、“サイレンサー”が存在することを示している。HuH-7 細胞では、このような影響がみられないことから、HuH-7 内では、このようなサイレンサーは活性化を受けていないと考えられる。
上記 2 つのサイレンサー領域のうち、上流 (-1.8 ~ -1.4 kb) のものは下流 (-402 ~ -174 bp) のものより抑制作用が強いので、この部位をとり出し、SV 40 エンハンサーに及ぼす影響を調べた (図 4)。その結果、サイレンサーはエンハンサーとプロモーターの間に存在するときには働くが、エンハンサーの上流またはプロモーターの下

図 4 ■ AFP サイレンサー活性の位置依存性

上流サイレンサー領域を、SV 40 エンハンサー内の *Bgl* II (もとは *Sph* I) サイトに挿入すると、方向に関係なく CAT 発現を抑制する。しかし、SV 40 エンハンサーの上流、*Acc* I サイトまたは CAT 遺伝子の 3' 末端 *Bam* HI サイトに入れた場合は、抑制効果がみられない。

流では作用しないことが明らかとなった。これは、サイレンサー活性が位置に依存性であることを示している。サイレンサーは、この特定の位置にある限り、方向に関係なく抑制活性を発揮する。また、AFP 非産生細胞の HeLa でも、弱い抑制活性を発揮する。すなわち、サイレンサーは細胞特異性を持っていない。さらに、上記のように、サイレンサーは SV 40 エンハンサー活性をも阻害するので、遺伝子特異性を示さないことがわかる。しかし、抑制作用が位置依存性であるため、結果的には AFP 遺伝子に特異的に働くことになる。筆者らは、サイレンサー活性を示す塩基配列を同定するため、上流サイレンサー領域に塩基変異を導入し、転写抑制効果の変化を調べた。その結果、CTTCATAACTAATACTT の塩基配列がサイレンサー活性を示す因子として働くことが明らかとなった。この塩基配列は、上流サイレンサー領域に 4 個、下流サイレンサー領域に 1 個存在する。サイレンサー活性は、サイレンサー塩基配列の数とともに高まる。したがって、上流サイレンサー領域と下流サイレンサー領域の活性の差は、サイレンサー塩基配列の数の違いによるものと考えられる。

サイレンサーが huH-1 においてのみ働くことは、この細胞株に、サイレンサーを活性化するタンパク質因子が存在するためと考えられ、これはゲルシフト法で確認された。これに反して HuH-7 では、サイレンサー結合タンパク質因子活性は低い。

huH-1 では、HNF-1/AFP 1 が十分存在することにかかわらず、AFP 遺伝子転写が抑えられることから、サイレンサー活性化タンパク質因子は、他の転写促進因子に対して、優性に働くものと考えられる。したがってこのタンパク質因子は、ヒト肝癌中の AFP 産生量を決定する重要な要因と考えられる。

サイレンサーは、どのようにして転写を抑制するのであろうか？ Ptashne⁽¹¹⁾ は、エンハンサーがプロモーターを刺激するにはそれぞれの塩基配列に結合したタンパク質因子が相互に作用し、その結果エンハンサーとプロモーターが接近するようになり、同時にその間の DNA はループを形成すると提案した。もし、サイレンサーにタンパク質が結合すると、エンハンサーとプロモーター間の DNA ループ形成が妨げられ、エンハンサー作用を発揮できなくなる可能性がある。このように考えると、AFP サイレンサーの位置依存性も説明できる。

マウス AFP 遺伝子の場合、-838~-250 bp 領域に転写抑制活性が存在すると報告されている。この抑制活性は、成熟マウス肝では認められるが、胎児肝では検出されない。したがって、この抑制因子は正常発育に伴う AFP の産生低下に関与する可能性が強い。どの塩基配列が重要であるかはまだ明らかにされていないが、この領域内にヒト AFP サイレンサー因子に類似の塩基配列が存在しており、マウスでもヒトと同じ因子が働いている可能性がある。

ここで強調したいのは、ヒトとマウスのサイレンサーは、エンハンサーがプロモーターを刺激することを阻止するが、エンハンサー自体は失活させないことである。それでは、まだ活性を持っているエンハンサーはどのような役割を果たしているのだろうか？ Camper と Tilghman⁽¹²⁾ は、トランスジェニックマウスの成熟肝で、AFP エンハンサーがその近接部位に組み込んだアルブミンプロモーターを刺激すると報告している。すなわち、成熟肝では、AFP エンハンサーは、AFP 遺伝子の転写ではなくアルブミン遺伝子の転写を促進している可能性がある。筆者らは、これを支持する結果を次のような実験から得た。

HuH-7 細胞を用いて EGF (epidermal growth factor) および TPA (12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate) の存在下で CAT アッセイを行なうと、AFP エンハンサー・プロモーター両者の活性が相乗的に抑制される (図 5)。また、AFP mRNA 量の減少も見られる。これに反し、アルブミンエンハンサー・プロモーター活性は影響を受けないが、それにもかかわらずア

ルブミン mRNA が減少する。これは、HuH-7 細胞で、アルブミンプロモーターも AFP エンハンサーによって刺激を受けていることを示唆する。皮肉なことに、このようにして AFP エンハンサーのアルブミンプロモーターに対する作用が明らかになると、“AFP” エンハンサーという名称は適当でなくなってしまう。

以上の結果から、次のような可能性があげられる。胎児初期では AFP エンハンサーは AFP プロモーターを刺激し、AFP 産生を高める。胎児

図 5 ■ヒト α -フェトプロテインとアルブミン遺伝子転写調節塩基配列活性に対する EGF および TPA の影響

AFP 遺伝子上流 DNA 5.1kb (A) あるいはアルブミン遺伝子上流 DNA 12kb (B) を CAT 遺伝子に結合し、HuH-7 細胞にトランスフェクションし、EGF のみ、TPA のみ、あるいは両者の存在下で 2 日間培養し、CAT 発現を測定した。AFP-DNA の場合、EGF・TPA 共存下では著明に転写活性が抑制されている。+、- は EGF、TPA の存在、非存在を示す。3-Ac はクロラムフェニコール 3-酢酸、1-Ac はクロラムフェニコール 1-酢酸、Cm はクロラムフェニコールを示す。

図 6 ■正常発育に伴うヒト α -フェトプロテイン遺伝子の抑制とアルブミン遺伝子発現の増加機構
胎児肝 (上図) では、AFP エンハンサー (E_A , E_B) は主に AFP プロモーター (P) を刺激する。成熟肝 (下図) では、AFP サイレンサー (S_A , S_B) によりこのエンハンサー作用が妨げられる。逆に、上流アルブミンプロモーターが刺激されるようになる。アルブミンエンハンサー (E_6 , $E_{1.7}$, $E_{0.3}$) 活性は胎児肝と成熟肝の間に大差はないと仮定する。

の発育とともにサイレンサー活性が上昇し、AFP プロモーター 刺激が 妨げられる ようになると、AFP エンハンサーは上流の アルブミンプロモーターを刺激するようになる (図 6)。このように考えると、胎児の 発育 とともに AFP 産生が低下し、同時にアルブミン産生が増加することが説明できる。AFP サイレンサーは AFP エンハンサーの働きの方向を替える“分子スイッチ”の役割を果たすのであろう。

4. AFP 遺伝子発現に対する成長因子・癌遺伝子の影響

EGF と TPA が、HuH-7 細胞で AFP エンハンサー・プロモーター 活性を 特異的に抑制することはすでに述べた。TGF- β 1 (transforming growth factor- β 1) は、主として AFP プロモーター活性を抑制するが、アルブミンのエンハンサー・プロモーターには影響を及ぼさない。また、癌遺伝子 *ras*、特に活性化 *ras* (oncogenic *ras*) を HuH-7 に導入すると、やはり主として AFP プロモーター活性が低下する⁽¹³⁾。この場合も、アルブミンエンハンサー・プロモーター活性は変化しない。また、*jun* あるいは *fos* のトランスフェクションによっても、AFP プロモーター活性の特異的な低下がみられる (図 7)。

以上の結果は、AFP 遺伝子の発現に成長因子・

癌遺伝子が影響を及ぼすことを示している。その機構の詳細は明らかではないが、細胞膜レセプターあるいは G-タンパク由来のシグナルが核に伝達され、転写因子に変化をもたらすためと考えられる。一般的に、こうしてひき起こされる遺伝子発現の変化が、成長・分化をひき起こすと考えられているので、AFP 遺伝子発現も成長・分化過程と密接に関連していることが容易に推測できよう。また、成長因子・癌遺伝子がサイレンサー活性の誘導または抑制に関与する可能性も十分にあり、将来の研究課題と考えている。

*

本稿では、ヒト AFP 遺伝子発現の調節機構、特に発現抑制機構の面に重点を絞った。これまでの筆者らの研究によれば、この抑制機構がヒト肝癌の AFP 産生量の決定に大きな役割を果たしていることがうかがわれる。肝癌診断の面からも、また肝癌治療への分子生物学の応用の面からも興味ある点である。また、肝癌中にみられる AFP 発現抑制機構が、正常発育に伴う AFP 産生の低下、さらにアルブミン産生の増加現象にも結びつく可能性がある。加えて、成長因子・癌遺伝子による AFP 遺伝子発現調節機構の解析を進めることによって、正常の分化と遺伝子発現の関係を知らず手掛かりが得られよう。

図 7 ■ ヒト α -フェトプロテインとアルブミン遺伝子領域に存在する転写制御配列と成長因子・癌遺伝子の作用部位
 E_6 , $E_{1.7}$, $E_{0.3}$ はアルブミンエンハンサー, E_A , E_B は AFP エンハンサー, S_d , S_p は AFP サイレンサー, G は GRE, P はプロモーターを示す。遺伝子領域の上側に記載した癌遺伝子は矢印の塩基配列の活性を促進させ、下側に記載した癌遺伝子・成長因子は矢印の塩基配列の活性を抑制する。

謝辞：本稿の執筆に当たって、西信三教授（北大医学部生化学）と橋本知子講師（兵庫医大遺伝学）に貴重な助言をいただいたことを深謝する。

文献

- 1) G. I. Abelev : *Adv. Cancer Res.*, 14, 295 (1971).
- 2) H. Hirai : *Methods in Cancer Res.*, Vol. XVIII, 39 (1979).
- 3) 玉置大器, 中林秀和 : ‘ヒト α -フェトプロテイン遺伝子発現調節機構’, “腫瘍マーカー最近の進歩”, 中外医薬社, 1991.
- 4) 西 信三 : 医学のあゆみ, 156, 665 (1991).
- 5) A. Camper, R. Godbout & S. M. Tilghman : *Prog. Nucl. Acids Res. Mol. Biol.*, 36, 131 (1989).
- 6) T. Morinaga, M. Sakai, T. G. Wegmann & T. Tamaoki :

Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 80, 4604 (1983).

- 7) 遠藤康夫 : 医学のあゆみ, 156, 668 (1991).
- 8) K. Sawadaishi, T. Morinaga & T. Tamaoki : *Mol. Cell. Biol.*, 8, 5179 (1988).
- 9) D. B. Mendel & G. R. Crabtree : *J. Biol. Chem.*, 266, 677 (1991).
- 10) H. Nakabayashi, T. Hashimoto, Y. Miyao, K.-K. Tjong, J. Chan & T. Tamaoki : *Mol. Cell. Biol.*, in press.
- 11) M. Ptashne : *Nature*, 322, 697 (1986).
- 12) S. A. Camper & S. M. Tilghman : *Genes Dev.*, 3, 537 (1990).
- 13) K. Nakao, D. Lawless, Y. Ohe, Y. Miyao, H. Nakabayashi, H. Kamiya, K. Miura, F. Ohtsuka & T. Tamaoki : *Mol. Cell. Biol.*, 10, 1461 (1990).

ラグタイム ♪♪♪

Time Lag

カニバリズム

今年2月号の本欄で低迷庵氏の「雖非易牙入厨房（易牙に非ずといえども厨房に入る）」のタイトルを見て思わずニヤリとされた読者も多いであろう。その内容はと目を走らせれば、電子レンジでローストビーフが旨く焼けるかという問題を食品工学的に解説しておられ、その取り合わせの妙に再度感心した次第である。

易牙は春秋五霸の一人、斉の桓公の庖丁人として数々の逸話を残し、これより転じて名料理人の異名となった。当時の君主付の料理人は政治家でもあったらしく、桓公の宰相として有名な管仲亡き後、桓公の国政を助けて活躍した人物でもある。しかしこれは表の陽の当たる部分、易牙の名が出る陰の部分として、桓公が「旨い料理も食い飽きた。何ぞ変わったものを」との意を受けて、我子を蒸し焼きにしてさし出したという。司馬遷の『史記』にも記されている事実（齊太公世家）であるが、無分別な奴、君主におもねる奴との批難こそあれ、特に道徳的に糾弾されていないところを見ると、当時の中国ではカニバリズム（人肉嗜好）がある程度は認められていたのかもしれない（どうです、タイトルとローストビーフの取り合わせは、！）

カニバリズムがキリスト教によって厳しく禁じられたためか、近世ヨーロッパの征服者や宣教師は、異国の野蛮さ（非キリスト教文化）を強調する手段として、必要以上にカニバリズムの事実を記録、宣伝したものである。不幸にも今日なお、これらの文献をうのみにして食文化史を不用意に論じることが跡を断たない。

ヨーロッパのカニバリズム思想は、厳しい抑圧の下にあって、反って妙な噴火を起こすことがある。『ガリバー旅行記』で有名なジョナサン・スウィフトは1729年に「貧乏人の子沢山を救う一方法（原文はモノスゴク長いのでこれだけにした）」に関して論文を発表した。その内容たるや、アイルランドの貧困を救うためには、文字通り子沢山の貧乏人の子を一歳くらいで食用として輸出すれば、本国（イギリス）の貴族・地主共は大いに喜ぶであろう。育てる費用いくら、値段はいくらと徴に入り細をうがって数字を羅列する。これだけ読めば、スウィフト狂ったりとしか思えないが、末尾の「どうせ今まで、（幼児の）親達を喰いつくして来た連中だから子供の肉も喜んで食べるであろう」という一節に至って、植民地的収奪にあえぐアイルランドのため、半生をかけて闘って来たスウィフトの痛烈な批判の書であることがわかる。

カニバリズムとはまったく無縁の日本では、このように血なまぐさい糾弾の文はあるまいと思われがちだが、さにあらず。安政年間にカラフト探検で有名な松浦武四郎の『近世蝦夷人物誌』（1860年）では、アイルランドと同じく本国によって収奪され、虐待されるアイヌ族の悲惨な状況が述べられている。文中で作者はこれによって利を得ている役人や悪徳商人の宴会の様子を夢で見るといふ場面があり何ともすさまじい。「盤中の刺身は、皆紅血滴るばかりの人肉、ひたし物と思ひしは土人の臓腑、美肉は骨節アバラの数々、盃中の物は皆な血」読者の食欲を考えてこの辺で打ち切るが、批評の手段としてのカニバリズムは、我国でも立派に生きていたのである。（応多夢）