染谷信孝^{*1}，阿久津克己^{*2}

化学薬剤による植物病害の防除，いわゆる“ケミカルコントロール”による環境への負荷が問題となっている現在，微生物機能を利用して植物病害の軽減を図る“バイオコントロール”にはその補助的手段として期待が寄せられている．バイオコントロールには根圏細菌および糸状菌をエージェントとして利用する例が多く，またその作用機構は，栄養競合，抗生，溶菌，そして宿主植物に対する抵抗性誘導作用などが主としてあげられる⁽¹⁾（図1）．バイオコントロールでは，導入したエージェン

トの増殖・定着により効果が持続的に発揮されること、宿主植物の除去により定着微生物が衰退し、化学薬剤のような長期残留性の危険性が少ない、自然環境に由来生息していた生物を用いるために環境に対する負荷が少ない、などのメリットが期待されている。しかし、生物機能を利用するがゆえに、「効果がマイルド（低い）」、「効果が不安定」、「農薬としての取り扱いが難しい」などのデメリットが問題となり、農業現場における普及は進んでいない。しかしながら、永続的で環境調和的な病害防除体系の確立には、バイオコントロールの実用化が必要不可欠であると考えられる。

さて、上述のようにバイオコントロールには適用条件に制限があり、常に期待通りの病害防除効果が得られるとは限らない。このことがバイオコントロールの普及を

*¹Nobutaka SOMEYA, *²Katsumi AKUTSU, *¹農業環境技術研究所, *²茨城大学農学部

妨げている一因となっている。しかし、こうした問題はバイオコントロール研究に限らず、私たちの目に触れる研究成果はほとんどが成功例であり、当たり前のようではあるが、期待通りの成果が認められなかった研究結果は人の目に触れることはほとんどない。ただ、特にバイオコントロール研究分野では、実験室内において効果が期待されたバイオコントロールエージェントが、農業現場では期待通りの効果をあげられないこともしばしばあるのである。確かに病害防除の見地から見ると、そのバイオコントロールは失敗であったらう。

こうした失敗例の原因はこれまで、自然環境における栄養条件や温度条件など、非生物的環境要因の影響であると考えられていた。確かにこれら非生物的環境要因は、バイオコントロールの効果を不安定にさせる要因には違いない。その一方で、農業現場が自然環境下であることを失念してはならない。言うまでもなく、植物の葉面、根面、そして植物体内に至るまで、バイオコントロールにおいて生物間相互作用が起こる部位には多様な生物相が成り立っている。バイオコントロールはもともと、2種類以上の生物間相互作用を利用する技術であるが、拮抗微生物-病原菌もしくは拮抗微生物-植物-病原菌間の相互作用が起こりうる以上、そこに夥しく存在している様々な微生物との間に何らかの相互作用が起こらないとは考えづらい。

バイオコントロール効果を左右する生物的要因

最近、こうしたバイオコントロール効果が様々な生物的環境要因の影響を受ける可能性が指摘され始めた。たとえばバイオコントロールエージェントの防除対象である病原菌自身がバイオコントロールエージェントの抑制

要因に対する防御機構を有している場合がある。一部の植物病原菌はバイオコントロールエージェントが産生する抗菌物質に対する分解酵素を産生し、またあるものは抗菌物質を体外に排出する機能によりエージェントの抗生作用を無力化させる⁽²⁾。この場合、病原菌の化学薬剤に対する耐性獲得と同じように、病原菌に対するバイオコントロール効果は低下するか失われる。植物病原菌が宿主植物の病害抵抗性システムに対する耐性を示す例が知られているが、同じことが拮抗微生物との関係においても見られる。また、病原菌の中にはバイオコントロールエージェントの遺伝子発現にまで影響を及ぼすものも存在する^(2~4)。一部の病原菌が産生するフザリン酸やデオキシニバレノールなどは、バイオコントロールエージェントの抗菌物質や溶菌酵素の生合成を抑制することがわかってきた(表1)。植物と病原菌間において互いの防御機構を上回ろうとする機構はよく知られているが、病原菌と拮抗微生物間にもそれは成り立っているのである。そして、バイオコントロールエージェントの抗菌要因発現に影響を及ぼすのは植物病原菌だけではない。植物に土着している微生物もまた関与しているのである。

筆者らの研究グループは *Serratia marcescens* という細菌をエージェントとしてバイオコントロール研究を進めている。*S. marcescens* はグラム陰性の環境常在菌で、土壌、水中、動植物体表面および食品中など幅広い環境に生息している。一部の菌株は動植物に対する日和見感染菌として知られており、バイオコントロールエージェントとしては *Burkholderia cepacia*, *Pseudomonas aeruginosa* などと同じく、その病原性について論議されることがしばしばある⁽⁵⁾。一方、非病原性が確認されている菌株はキチナーゼなどの溶菌酵素、抗菌物質 prodiginosin および宿主植物に対する全身的な病害抵抗性誘導

表1 ■ 拮抗微生物の抗菌要因発現に対する植物病原菌の影響 (Duffy *et al.* 2003 を改変)

病原菌	拮抗微生物	シグナル分子	影響する形質
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis-lycopersici</i>	<i>Pseudomonas fluorescens</i>	フザリン酸	2,4-DAPG*生合成阻害
<i>F. oxysporum</i>	<i>P. fluorescens</i>	フザリン酸	2,4-DAPG 生合成阻害
<i>F. graminearum</i>	<i>Trichoderma atroviridae</i>	デオキシニバレノール	キチナーゼ生合成阻害
<i>F. culmorum</i>	<i>T. atrovieidae</i>	デオキシニバレノール	キチナーゼ生合成阻害
<i>Phytophthora parasitica</i>	<i>Pseudomonas putida</i>	未知	ジアセチルグリセロール キナーゼおよび ABC トランスポーター発現誘導 抗菌要因遺伝子発現誘導 根圏定着および窒素同化能低下
<i>Pythium debaryanum</i>	<i>P. fluorescens</i>	トレハロース	
<i>P. ultimum</i>	<i>P. fluorescens</i>	未知	
<i>P. ultimum</i>	<i>P. fluorescens</i>	未知	2,4-DAPG 生合成促進

*2,4-ジアセチルフロログルシノール

図2 ■ バイオコントロールエージェントの抗菌要因発現に対する土着微生物の影響⁽¹⁰⁾

イネ葉面および根圏より分離された細菌株 #101, #206, #315 による、拮抗細菌 *S. marcescens* strain B2 の溶菌酵素キチナーゼおよび抗菌物質 prodigiosin 生合成に対する影響。横方向に塗布培養した *S. marcescens* strain B2 のキチナーゼ産生（コロニー周囲のキチン分解帯から判断）および抗菌物質 prodigiosin 産生（コロニー着色から判断）に対するイネ関連細菌株（縦方向コロニー）の影響をキチン含有培地重層法で検定した。#101：ともに影響なし。#206：キチナーゼ産生には影響しないが prodigiosin 生合成を抑制。#315：キチナーゼおよび prodigiosin とともに抑制。

能などを有し、植物病害に対して高い防除効果をもたらす^(6~8)。本菌は植物根圏における定着性も高く、有望なバイオコントロールエージェントとして期待されている。しかし、筆者らが試験を行なった際に、本菌による病害防除効果がしばしば低下する事例が見られた。そこで筆者らは、本菌によるバイオコントロール効果に対する外的要因、特に生物的要因の影響を調べてみた。

まず、イネ葉面および根圏から土着細菌を収集し、*S. marcescens* の抗菌要因発現に対する影響を調べてみたところ、約 2 割弱の細菌株が *S. marcescens* の菌体生育を阻害し、さらに約 7 割の細菌株が *S. marcescens* の菌体生育を阻害しないにもかかわらず、抗菌物質 prodigiosin の生合成を抑制したのである⁽⁹⁾。また、それら土着細菌株のいくつかは、さらに *S. marcescens* のキチナーゼ生合成をも抑制することが明らかになった⁽¹⁰⁾（図 2）。*S. marcescens* の菌体生育および抗菌要因発現、両方に対して影響を及ぼさなかった細菌株は 1 割にも満たなかった。この結果は、通常培地での分離培養が可能な細菌株のみによる結果であるため、実際の植物体上では *S. marcescens* はさらに多くの土着微生物の影響を受けることが推察される。このようにバイオコントロール効果の不安定性には、抗菌要因発現を阻害する微生物という生物的要因が影響することがわかってきた。

抗菌要因の発現制御機構

さて、バイオコントロールエージェントの抗菌要因発現を調節しているシグナル分子はいくつか報告されている。中でもよく知られているのはホモセリンラクトン（*N*-acyl homoserine lactones; AHLs）によるシグナル伝達機構である⁽¹¹⁾。実は筆者らが研究している *S.*

marcescens においても、抗菌物質 prodigiosin の生合成が AHLs シグナル伝達機構の制御を受けている⁽¹²⁾。AHLs は側鎖長によりシグナル分子としての違いが認識される。こうしたシグナル分子がバイオコントロールの抗菌要因生合成を誘導もしくは抑制的に制御しているのである。しかし、このシグナル分子による形質発現制御機構はグラム陰性細菌に共通の機構である。そして、これらシグナル分子は同じものであっても、異なる微生物にそれぞれ異なる生理作用をひき起こす。すると、植物根圏や葉面では多様な微生物コミュニティが共通のシグナル分子を用いる場合、同じシグナル分子が一方には正の、一方には負の作用が起ころうとも不思議はない。こうした複雑な生物間相互作用が上述のようなバイオコントロールエージェントの形質発現に影響を及ぼしているのではないだろうか。

しかし、その生物間相互作用がもし一方による意図的な場合はどうであろうか。ある微生物種が自らのために周辺微生物の遺伝子発現を調節することはあるのだろうか？ その答えは明らかではないが、そのような関係が成立していることは事実である。実際、微生物はその生息環境（この場合は根圏および葉面）において、機能や遺伝情報を相補しつつ、コミュニティとして生存している⁽¹³⁾。バイオコントロールエージェントの形質発現が他微生物の影響を受けることは、自然界という複合的生物コミュニティでは当然のように起こりうる現象（成立する関係）なのかもしれない。人為的に多量のバイオコントロールエージェントを導入した直後はともかく、植物病原体の増殖をバイオコントロールエージェントの機能により抑えつける関係は、自然界では緩和されていくべき関係なのであろうか。

また、こうした生物間相互作用は細菌間のみにとどま

らない。植物から分泌されるミミック (AHLs signal-mimics; 生理的作用は AHLs と同じであるが化学的に異なる物質) が自らに定着している細菌の AHLs シグナル伝達機構を調節している可能性がわかってきたのである⁽¹⁴⁾。これもまた、植物が意図的にこれら根圏および葉面微生物における特定の形質発現を調節しているのかどうかはまだわかっていない⁽¹⁵⁾。しかし、こうしたシグナル分子を介した遺伝子発現制御が、バイオコントロールという植物・微生物間相互作用に重要な影響を与えていることは想像に難くない。

拮抗微生物の抗菌物質および溶菌酵素生合成が、AHLs に代表される様々なシグナル分子により誘導および抑制される機構が解明されてきた。この相互作用は、バイオコントロール効果の不安定性を裏付ける原因の一つである可能性が高い。一方で、この問題を解決して、さらに安定したバイオコントロール効果を得ようとする試みも行なわれている。バイオコントロールエージェントの抗菌要因発現の多くが AHLs により制御されているため、この機構の促進的な制御技術はバイオコントロール効果を増強させることが期待されるのである。

これまで、複数のバイオコントロールエージェントを組み合わせて使用すると、効果が増強する事例と、かえって効果が低下する事例が知られている。これら相反する結果は、組み合わせるバイオコントロールエージェントの相性が重要であることを示唆している。それを裏付ける事例として、Pierson らは地理的に異なる場所から分離された根圏細菌の分泌物が、バイオコントロールエージェントのひとつである *Pseudomonas aureofaciens* の抗菌物質、フェナジンの発現に対して促進的に作用することを報告している⁽¹⁶⁾。筆者らもまた、*S. marcescens* の抗菌要因生合成に対して促進的に機能するシグナルを産生する微生物を探索しているが、まだ見いだせていない。もしそのような微生物株の組み合わせが見いだせたならば、バイオコントロール効果を高めることが期待され、バイオコントロールがより実用性の高い防除手段になるのではないだろうか。

この他、AHLs シグナル伝達機構は植物病原菌の病原性発現に関わることが示唆されているが⁽¹⁷⁾、シグナル分子である AHLs を分解する酵素 AHL ラクトナーゼなどを産生する微生物は、直接的な抗菌活性を有さないにもかかわらず、病原菌の病原性を低下させ、発病を抑制する⁽¹⁸⁾。しかし、こうしたシグナル分解者もしくは AHLs ミミックは、バイオコントロールエージェントの抗菌活性をかく乱する可能性もある。自然界における生物間相互作用は複雑であり、それを人為的に農業へと利

用するバイオコントロールは様々な問題を乗り越えてゆかなければならない。しかし、徐々に解明されてきた生物間の情報伝達機構に関する知見は、バイオコントロールにおける新たな可能性を拓くと期待される。

遺伝子組換え微生物によるバイオコントロール

さて、バイオコントロールエージェントの抗菌要因発現機構の解明は、安定した抗菌要因発現に役立つ可能性は高い。しかし、抗菌要因発現を抑制する微生物集団が植物根圏および葉面に生息している事実は、バイオコントロール効果を安定させる上で避けることができない障害となる。また、筆者らが研究している *S. marcescens* strain B2 をはじめとして、これまで報告された幾つかのエージェント候補微生物は、日和見感染菌としての一面を有し⁽⁵⁾、その安全性において解決しなければ問題を抱えている。これら諸般の事情を鑑み、筆者らの研究グループではより安全で、安定したバイオコントロール効果を期待できるバイオコントロールエージェントを遺伝子組換え技術で作出することを試みている。

Erwinia ananas NR1 はイネ葉面に生息するグラム陰性細菌である。本菌はイネ葉面における定着性が高く、かつ動植物に対する非病原性が確認されている。しかし、本菌はキチナーゼなどの抗菌要因をもたず、これまでバイオコントロールエージェントとして利用されることはなかった。そこで本菌に抗菌活性が付与されたならば、優れたバイオコントロールエージェントになるという期待から、遺伝子組換え細菌の宿主として選拔された。

まず、*S. marcescens* の主抗菌要因であるキチナーゼをコードする *chiA* 遺伝子を単離し、*E. ananas* に導入した。その結果、遺伝子組換え細菌はキチナーゼ産生能を示した (図 3-A)。このようにキチナーゼ非産生微生物に、キチナーゼ遺伝子を付与して新規バイオコントロールエージェントを作出する試みはいくつか報告されている⁽¹⁹⁾。しかし、これらの遺伝子組換え細菌は *in vitro* では確かに抗菌活性の増強が認められたが、キチナーゼ発現量および *in vivo* での病害防除効果はまちまちであった。一部の研究者たちは、その原因を導入遺伝子発現に利用したプロモーターによる発現強度の違いと発現条件によると考えていた⁽²⁰⁾。そこで筆者らは、*E. ananas* 内における導入遺伝子の高発現と同時に、先述のような生物的・非生物的な環境条件の影響を受けない導入遺伝子発現系の構築を目指した。

まず、*E. ananas* のゲノム DNA からプロモーター

図3 ■ 遺伝子組換えバイオコントロールエージェント利用による生物的影響の回避

(A) 土着微生物（イネ葉面細菌 *E. ananas*）ゲノムからプロモータートラップ法により集められたプロモーターライブラリーの制御下で抗菌要因遺伝子（キチナーゼ遺伝子 *chiA*）を発現させる。（B）望ましい発現特性を有するプロモーター（pcf53 など）制御下で抗菌要因遺伝子（*chiA*）を発現させた遺伝子組換え細菌は、バイオコントロールを実施する際に問題となる環境条件（*S. marcescens* のキチナーゼ発現を阻害する土着細菌の影響下など）でも安定して抗菌要因（キチナーゼ）を産生する。

ラッピング法を用いてプロモーター活性を示す断片を収集した⁽²¹⁾。得られたプロモーターは既知配列と相同性を示さないものも多く存在した。そこで実際に、得られた各プロモーター断片の制御下でキチナーゼ遺伝子 *chiA* を *E. ananas* 内で発現させた結果、形質転換株はそれぞれキチン分解能を示したが、用いたプロモーターにより、そのキチナーゼ活性およびバイオコントロール効果に差が認められた。たとえば低栄養条件下で高発現する pcf53 プロモーター利用株は、低栄養条件下での発現量が低い pcf9 プロモーター利用株よりも、閉鎖温室試験において高いイネいもち病防除効果を示した⁽²²⁾。これらの形質転換株はさらに、前述の *S. marcescens* のキチナーゼ発現を抑制する作用を有する土着細菌の影響下でもキチナーゼを産生することが確認された⁽¹⁰⁾（図3-B）。pcf53 は既知配列との相同性が見られなかったため、このプロモーター制御下において導入遺伝子がどのような発現制御を受けるかについてはまだよくわかっていない。しかし結果として、こうした遺伝子組換え微生物は、非遺伝子組換え微生物において抗菌要因発現が抑制される条件下においても抗菌要因を発現し、安定したバイオコントロール効果を望める可能性が示唆された。また同時に、バイオコントロール効果に関与する形質を、導入

図4 ■ バイオコントロール効果に対する生物的・非生物的要因の影響と遺伝子組換え技術による回避

BCA：バイオコントロールエージェント

先環境において最も定着が望める微生物資材に導入可能であることを示した。

最近、Dunn らはトマト根圏から分離された *Bacillus cereus* のゲノム DNA から同じようにプロモーターを収集し、その中から宿主であるトマト植物滲出物によって、もしくは同じく根圏細菌の一種である *Pseudomonas aureofaciens* によって発現が誘導されるプロモーターを選抜できることを報告している⁽²³⁾。こうした植物根圏もしくは葉面における微生物間の遺伝子発現調節に関する知見、および導入遺伝子の発現制御技術は、今後のバイオコントロール実用化に大きく寄与すると考えられる（図4）。

ところで、言うまでもなく、遺伝子組換え生物の野外への放出については以前から論議の的となっている。我が国ではようやく遺伝子組換え生物規制法⁽²⁴⁾が施行されたが、遺伝子組換え微生物の農業利用はいまだ進んでいないのが現状である。その理由としては、遺伝子組換え微生物を野外に放出することによる生態系のバランス崩壊や周辺生物への導入遺伝子移行の可能性など、科学的見地に基づく懸念もあるが⁽²⁵⁾、遺伝子組換え生物に対する不信感によるところも大きい。しかし、環境に対する遺伝子組換え微生物の影響については、非遺伝子組換え微生物との間に有意な差がないという報告もあり、その産業利用を期待する声も存在する⁽²⁶⁾。バイオコントロールの分野においても、徐々に遺伝子組換え微生物利用の可能性が出てきたが、実用に供する前には十分なリスク評価による安全性の確保と公的理解を得ることが必要不可欠になるのは言うまでもない。この問題に関しては遺伝子組換え微生物に限らず、非遺伝子組換え生物ともに、バイオコントロールにおける生態系への影響を注意深く調査するなど、継続的な調査と評価が必要となるであろう⁽²⁷⁾。

バイオコントロールが植物病害防除における補助的手段として着目され始めたのはかなり昔のことである。我が国では諸外国に先駆けてトリコデルマ製剤が実用化されたにもかかわらず、その後実用化されたバイオコントロールエージェント、つまり微生物農薬はほとんど存在しなかった。しかし、ここ数年の間に新規に農薬登録された微生物殺菌剤数が急増している。これはひとえに微生物農薬開発者の努力によるものであるが、これまでの膨大なバイオコントロール研究に関する知見が寄与したことは間違いないだろう。今後もバイオコントロール研究は、農業において重要な地位を占める病害防除という課題に有益な知見をもたらすことが期待される。限られた耕地において環境調和的な農業生産を営むためには、バイオコントロールの有効利用が重要であるのは間違いない。もちろん、バイオコントロールこそが環境調和的な病害防除手段というわけではない。病害防除の主役であるケミカルコントロールとの効果的な併用法の確立が重要となってくるであろう。

最後になるが、古くから病害抑止土壌と呼ばれ、他の地域で問題となる土壌病害がほとんど発生しない地域が存在する⁽²⁸⁾。これは、自然界でバイオコントロールが成立している希有な見本といえる。これまで研究者たちは、このような自然の妙を人為的に成立させようとあの手この手を尽くしてきた。それはまだ可能になったとはとてもいえないが、この半世紀の間、一步步づつ着実にバ

イオコントロールに関する知見は積み重ねられてきた。そして、環境保全型農業への関心が高まっている近年、微生物農薬の実用化が急増してきており、バイオコントロールの実用化を目指した先人たちの研究成果が大きく花開いてきたのではないだろうか。食糧増産と環境保全という両立が困難な課題の中で、バイオコントロールの果たすべき役割は明確である。成功例と失敗例、科学的根拠など様々な知見を糧として、今後ともより多く、より効果的な微生物農薬の実用化に期待したい。

文献

- 1) 本間善久：化学と生物，**29**, 503 (1991).
- 2) B. Duffy, A. Schouten & J. M. Raaijmakers : *Annu. Rev. Phytopathol.*, **41**, 501 (2003).
- 3) M. P. Lutz, G. Feichtinger, G. Défago & B. Duffy : *Appl. Environ. Microbiol.*, **69**, 3077 (2003).
- 4) R. Notz, M. Maurhofer, H. Dubach, D. Haas & G. Défago : *Appl. Environ. Microbiol.*, **68**, 2229 (2002).
- 5) 土屋健一：バイオコントロール研究会レポート，**8**, 1 (2003).
- 6) N. Someya, N. Kataoka, T. Komagata, K. Hirayae, T. Hibi & K. Akutsu : *Plant Dis.*, **84**, 334 (2000).
- 7) N. Someya, M. Nakajima, K. Hirayae, T. Hibi & K. Akutsu : *J. Gen. Plant Pathol.*, **67**, 312 (2001).
- 8) N. Someya, M. Nakajima, T. Hibi, I. Yamaguchi & K. Akutsu : *J. Gen. Plant Pathol.*, **68**, 177 (2002).
- 9) N. Someya, M. Nakajima, K. Watanabe, T. Hibi & K. Akutsu : *J. Gen. Plant Pathol.*, **69**, 342 (2003).
- 10) N. Someya, S. Numata, M. Nakajima, A. Hasebe & K. Akutsu : *J. Gen. Plant Pathol.*, **70**, 371 (2004).
- 11) D. Haas & C. Keel : *Annu. Rev. Phytopathol.*, **41**, 117 (2003).
- 12) N. R. Thomson, M. A. Crow, S. J. McGowan, A. Cox & G. P. C. Salmond : *Mol. Microbiol.*, **36**, 539 (2000).
- 13) 福井 糧：バイオコントロール研究会レポート，**8**, 11 (2003).
- 14) W. D. Bauer & M. Teplitski : *Aust. J. Plant Physiol.*, **28**, 913 (2001).
- 15) T. S. Walker, H. P. Bais, E. Grotewold & J. M. Vivanco : *Plant Physiol.*, **132**, 44 (2003).
- 16) E. A. Pierson, D. W. Wood, J. A. Cannon, F. M. Blachere & L. S. Pierson III : *Mol. Plant-Microbe Interact.*, **11**, 1078 (1998).
- 17) S. B. von Bodman, W. D. Bauer & D. L. Coplin : *Annu. Rev. Phytopathol.*, **41**, 455 (2003).
- 18) L. Molina, F. Constantinescu, L. Michel, C. Reimann, B. Duffy & G. Défago : *FEMS Microbiol. Ecol.*, **45**, 71 (2003).
- 19) A. Herrera-Estrella & I. Chet : in "Chitin and Chitinases", ed. by P. Jollès and R. A. A. Muzzarelli, Birkhäuser Verlag, 1999, p. 171.
- 20) L. S. Chernin, L. de la Fuente, V. Sobolev, S. Haran, C. E. Vorgias, A. B. Oppenheim & I. Chet : *Appl. Environ. Microbiol.*, **63**, 834 (1997).
- 21) S. Numata, S. Ui, M. Tomiyama, A. Hasebe, M. Nakajima & K. Akutsu : *J. Gen. Plant Pathol.*, **70**, 69 (2004).
- 22) N. Someya, S. Numata, M. Nakajima, A. Hasebe, T. Hibi & K. Akutsu : *J. Gen. Plant Pathol.*, **69**, 276 (2003).

- 23) A. K. Dunn, A. K. Klimowicz & J. Handelsman : *Appl. Environ. Microbiol.*, **69**, 1197 (2003).
- 24) 依田次平 : 蛋白質 核酸 酵素, **49**, 559 (2004).
- 25) J. R. Stephenson & A. Warnes : *J. Chem. Tech. Biotechnol.*, **65**, 5 (1996).
- 26) N. Amarger : *Biochimie*, **84**, 1061 (2002).
- 27) R. J. Cook, W. L. Bruckart, J. R. Coulson, M. S. Goettel, R. A. Humber, R. D. Lumsden, J. V. Maddox, M. L. McManus, L. Moore, S. F. Meyer, P. C. Quimby, J. P. Stack & J. L. Vaughn : *Biol. Control*, **7**, 333 (1996).
- 28) M. N. Schroth & J. G. Hancock : *Science*, **216**, 1376 (1982).

プロフィール

高橋 征司 (Seiji Takahashi) <略歴> 平成13年筑波大学大学院生物科学研究科博士課程修了/同年理化学研究所植物分子生物学研究室協力研究員/同年東北大学多元物質科学研究所助手, 現在にいたる<研究テーマと抱負>高等植物におけるイソプレノイド合成酵素の機能解析, 植物の環境応答機構に学ぶ環境改善植物の作出を目指している<趣味>映画鑑賞, ノラ猫と遊ぶこと

竹村 玲子 (Reiko Takemura) <略歴> 2002年京都府立大学農学部生物資源化学科卒業/同年京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻入学, 現在, 同博士後期課程在学中<研究テーマと抱負>ストレス条件下での mRNA 核外輸送機構の新しいモデル図を提唱したい<趣味>放浪

丹野 史典 (Fuminori Tanno) <略歴> 平成12年新潟大学大学院自然科学研究科博士後期課程修了(農博)後, ポストドクトラルフェロー(京都大学など)を経て, 16年新潟大学超域研究機構特別研究員, 現在にいたる<研究テーマと抱負>イネのジーンサイレンシングに関する研究<趣味>釣り

土屋 英子 (Eiko Tsuchiya) <略歴> 昭和54年東京大学大学院農学系研究科博士課程修了/同年広島大学助手/平成元年同助教授/9年同大学大学院先端物質科学研究科教授, 現在にいたる<研究テーマと

抱負>細胞内のブラックボックス, 核とクロマチンの謎を少しでも明らかにしたい<趣味>物を作ること, 現在, 園芸に挑戦中

筒井 直昭 (Naoaki Tsutsui) <略歴> 1996年埼玉大学理学部生化学科卒業/2001年東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了/同年日本学術振興会特別研究員/2002年(独)国際農林水産業研究センター重点研究支援協力員/2004年同非常勤職員, 現在にいたる<研究テーマと抱負>甲殻類の成熟を制御する分子機構の解明<趣味>読書, 分析機器の前で転寝

藤川 清三 (Seizo Fujikawa) <略歴> 1969年北海道大学農学部林産学科卒業/1974年同大学農学研究科博士後期課程修了(農博)/1975年同大学低温科学研究所助手/1995年同助教授/2000年同大学農学研究科教授, 現在にいたる。この間, 1980~81年英国ロンドン大学医学部特別研究員, 1990~91年米国コーネル大学農学部客員教授<研究テーマと抱負>植物, 特に凍結抵抗性のチャンピオンである北方樹木の寒気適応機構の解明<趣味>庭いじり, キノコなどを撮りながらの山歩き, ゴルフ

牧野 周 (Amane Makino) <略歴> 1980年東北大学農学部農芸化学科卒業/1985年同大学大学院農学研究科博士課程後期修了/同年同研究科助手/1995年同

助教授, 現在にいたる<研究テーマと抱負>光合成の機能およびイネの生産性

宮澤 陽夫 (Teruo Miyazawa) <略歴> 昭和57年東北大学大学院農学研究科博士課程後期修了(農博)/同年同大学農学部助手/62年同助教授/平成10年同大学大学院農学研究科教授, 現在にいたる<研究テーマと抱負>食品, 特に脂質類の機能化学, 分析化学, 栄養化学, 食糧を化学で解くこと<趣味>テニス, 映画, 酒

矢崎 一史 (Kazufumi Yazaki) <略歴> 1986年京都大学大学院薬学研究科博士後期課程修了後, 岡山大学薬学部助手, A. V. Humboldt 財団奨学生, 京都大学薬学部助手, 同大学大学院農学研究科助教授, 同大学院生命科学研究科助教授を経て, 2002年同大学木質科学研究所教授/2004年同大学生存圏研究所教授, 現在にいたる<研究テーマと抱負>植物 ABC タンパク質の機能と生理的役割, 二次代謝全般と植物低分子化合物の代謝工学, 植物による環境浄化<趣味>スキー, 食べること, 飲むこと

吉村 文彦 (Fumihiko Yoshimura) <略歴> 1968年京都大学農学部農林生物学科卒業後, 同大学研修員, 同志社女子大学教員を経て, 現在, 岩泉まつたけ研究所所長<研究テーマと抱負>アカマツ林土壌の細菌からマツタケを見ると何が見えるか<趣味>生物の写真撮影