栄養ストレスに対する応答と適応の分子機構 植物ホルモンを介した制御

広瀬直也，榊原 均

独立行政法人理化学研究所植物科学研究センター

植物は土壤中の不均一かつ可変的な養分分布に応答し、必要な栄養素を効率的に吸収・同化するように根の代謝や形態を変化させている。すなわち、根は植物体を支え、生育に必要な水分・養分を吸収するばかりでなく、周囲の環境を検知する器官としても機能している。また、植物は土壤中の栄養環境と他の環境因子（光・温度・病害虫感染など）を統合的に検知して、植物体全体としての生長バランスを適切に保つシステムも獲得している。このような適応は、外環境変化の指標となる外来シグナル分子もしくは体内シグナル分子の受容→シグナル伝達系を介しての標的遺伝子・タンパク質機能のコントロール→代謝機能や形態の変化、という一連のスキームの上に成り立っている。ただし、植物生長に影響を与える環境因子は膨大かつ複雑であり、これらすべてのスキームを包括的に理解するには至っていない。しかし近年、シロイヌナズナの分子遺伝学を基盤にした研究から、個々の環境適応機構の素過程に関わるシグナル分子や鍵遺伝子が明らかになりつつある。栄養ストレスへの応答機構については、栄養状態の指標となる体内シグナルとして、従来の中間代謝産物に加え、いくつかの植物ホルモンが重要な役割を演じていることが明らかにされた。本稿では、植物体の需要量が大きくかつ土壤中で不足しやすい窒素とリン栄養に対する植物の応答と適応戦

略について、植物ホルモンを介した制御機構に焦点をあてて解説する。

窒素栄養に対する応答と適応

窒素栄養は植物生長・生産性を左右する重要な化学環境因子である。窒素は硝酸イオン (NO_3^-) やアンモニウムイオン (NH_4^+) といった無機態として、あるいはアミノ酸や尿素などの有機態として土壤中に存在するが、施肥する場合を除いて窒素は不足しがちな栄養素であり、常に近隣の植物間で争奪状態にあるといってもよい。このように刻々と変化する土壤中からの窒素栄養供給の量と質に応じて、植物は輸送系や代謝系、形態制御系に関わる多くの遺伝子の発現をコントロールしている。具体的な遺伝子や制御機構の詳細については紙面の都合上他の総説^(1,2)を参照していただくことにして、最近報告された植物ホルモンを介した根系形態の制御と栄養情報の長距離伝達の2つの応答機構に話題を絞り解説する。

1. 窒素栄養環境に応答した根系形態の制御

植物の根系形態が窒素栄養環境の制御下にあることは古くから知られており、その制御機構、とりわけ硝酸イオンに応答した側根形成の制御機構は、モデル植物であ

連載開始にあたって

位、3位にランク付けされる領域となっていること、③ポストゲノムシーケンスの目覚ましい展開期を迎えた現在、いわゆるシステム生物学として植物のストレス応答の実態やその情報伝達の見解が大きく、また急速に拡大していること、によるものであろう。

このセミナーのシリーズを通して、植物科学研究領域に新しい切り口や新しい方向性が萌芽し、展開されることをコンビナーとして切望する。

杉山達夫

図の破線はシグナル伝達、実線は輸送過程、白抜き矢印は側根形成の進行過程を示す。-----は阻害を、——→は促進を表わす。

寒天培地上でシロイヌナズナを生育させる際、通常条

件 (MS 培地の場合, 1% スクロース, 20 mM NH_4NO_3) に比べ, 高濃度 (たとえば 4.5%) のスクロースかつ低濃度 (たとえば 0.01 mM NH_4NO_3) の窒素源条件下では側根形成の開始が阻害される. Malamy らはこの阻害機構に働く遺伝子を明らかにすべく, 上述の環境条件下においても多くの側根を形成できる変異体をスクリーニングし *lin1* (*lateral root initiation 1*) と命名した⁽³⁾. この *lin1* 変異の原因遺伝子は高親和性硝酸イオントランスポーターと推定される *NRT2.1* であった⁽⁴⁾. 実際に *lin1* 変異

体では硝酸イオンの取り込み能は低下していた。一連の実験結果から論文の著者らは、NRT2.1が硝酸イオンの取り込みに関与するばかりではなく、低濃度の硝酸イオンを検知するセンサー、およびそのシグナルを下流に伝える因子であると推察している⁽⁴⁾。では、NRT2.1が硝酸イオンセンサーと仮定した場合、なぜ高濃度のスクロースの共存が阻害に必要なのか？

この疑問に対しては、低濃度の硝酸イオン存在下ではNRT2.1の発現がスクロース添加により誘導されるという事実に基づくモデルで説明できるかもしれない。具体的には、NRT2.1とは別の未知のセンサーがNRT2.1と協調して高濃度のスクロース/低濃度の硝酸イオンの共存状態を検知し、NRT2.1の発現を誘導する。そして、蓄積量の増加したNRT2.1タンパク質を介して側根形成の開始のステップが阻害されるというモデルである。NRT2.1以降のシグナル伝達系について詳しいことは何もわかっていないが、高スクロース/低硝酸イオン濃度条件下では胚軸にオーキシンの蓄積することから、何らかの仕組みで茎葉部から根へのオーキシンの輸送が滞ったために阻害が起こったと推測されている⁽³⁾。NRT2.1の検知した窒素栄養環境情報が、どのような仕組みでオーキシン情報へと変換され側根形成の開始の阻害が起こるのかを、今後明らかにする必要がある。

2) 高濃度の硝酸イオン環境下における側根分裂組織活性化の抑制

土壌中の窒素栄養が潤沢な場合、茎葉部の生長が促進される一方、根の生長は抑制される。この現象は、根には高濃度（たとえば >10 mM）の硝酸イオンを検知するシステムが存在し、それを介して側根分裂組織の活性化が抑制されるため起こると考えられている。この抑制は硝酸還元酵素の欠損変異体においてさらに顕著になることから、硝酸イオンの同化産物ではなく植物体内の硝酸イオン濃度の上昇自体が抑制機構の引き金として作用していると推測される⁽⁵⁾。最近の研究から、この下流のシグナル分子としてアブシジン酸の関与が示唆されている。アブシジン酸非感受性変異体である *abi4*, *abi5* において、高濃度の硝酸イオン処理による抑制の緩和されることが示されたためである⁽⁶⁾。また、アブシジン酸欠損変異体においても同様に抑制が緩和されたが、その効果は部分的であったことから、アブシジン酸依存性と非依存性の2つの異なるシグナル伝達系が下流に存在すると想定されている。高濃度の硝酸イオンという栄養環境が、どのようにアブシジン酸へと変換されるのかはわかっていないが、アブシジン酸の外生投与により、側根形成が側根分裂組織の活性化の手前で停止するという結

果から、硝酸イオンがアブシジン酸の生合成を促進すると考えられている⁽⁷⁾。

3) 硝酸イオンによる側根伸長の局所的な促進

植物にとって通常の土壌環境は慢性的な窒素欠乏状態であるが、施肥や動物の死骸などにより局所的に窒素の豊富な領域の生ずる場合がある。このような状況において、植物はその領域に近接した根の側根を局所的に伸長させる。シロイヌナズナにおいて、この形態的な応答はアンモニウムイオンではなく硝酸イオン処理でのみ再現できること、硝酸還元酵素の欠損変異体においても野生型と同様に側根伸長の促進が起こることから、硝酸イオンそれ自身がシグナル分子として機能していると考えられている。この局所的な硝酸イオンを検知するセンサーが、1) で述べたNRT2.1であるのか否かは未だ不明であるが、下流のシグナル伝達系については、硝酸イオン誘導性のMADSボックス型転写制御因子であるANR1の関与が指摘されている⁽⁷⁾。ANR1発現の抑制されたシロイヌナズナ形質転換体では、硝酸イオン添加による側根伸長の促進効果が抑制されるからである。また、オーキシン耐性変異体である *axr4* では、硝酸イオンによる側根伸長の促進効果がほとんど起こらないことから⁽⁵⁾、この制御に関わる硝酸イオン情報伝達系とオーキシン情報伝達系には接点があると推測される。AXR4はオーキシンの流入担体の機能を調節する1回膜貫通型のタンパク質であることが判明しており⁽⁹⁾、ANR1より制御系の下流に位置し、オーキシン輸送の調節を行なうことで側根伸長の制御に関与していると予想されている⁽⁵⁾。

以上、硝酸イオンに応答した側根形成の制御に関して述べた。これとは別に興味深いこととして、寒天培地上で生育させたシロイヌナズナの幼植物を低濃度（ $50\text{ }\mu\text{M}$ ）のグルタミン酸を含む培地に移すことにより、主根伸長の著しく阻害される現象が最近報告された⁽¹⁰⁾。グルタミン酸以外のアミノ酸処理によっては阻害が起こらず、また側根の初期生長では影響を受けないものの、後期生長においては主根と同様にグルタミン酸による阻害を受けた。以上のグルタミン酸特異的な阻害効果は、グルタミン酸を含む培地に直接接した根端部に限定されることから、培地中のグルタミン酸を検知し細胞分裂速度の低下をひき起こす仕組みが、根端の細胞に備わっていると推察された。グルタミン酸を検知するセンサーの候補としてグルタミン酸受容体に相同性を示す遺伝子 *AtGLR* が挙げられている⁽¹⁰⁾。

2. 植物ホルモンを介した窒素栄養情報の長距離伝達

根を取り巻く環境の窒素化合物の量と質の変動に応答

図2 ■ 根から茎葉部への窒素栄養環境情報の伝達による葉の展開の制御モデル

図の破線はシグナル伝達，実線は輸送および代謝過程を示す．詳細は本文を参照．

して，葉の生育速度は短時間で変化する．たとえば，窒素源としてアンモニウムイオンのみを含む水耕液で前培養したトマトに硝酸イオンを与えると葉の展開速度は急速に上昇し，逆に硝酸イオンを含む水耕液で前培養した植物へのアンモニウムイオンの供給，あるいは窒素源除去により葉の展開速度は急速に低下する⁽¹¹⁾．このとき，硝酸イオン添加により道管内のサイトカイニン濃度が上昇していることから，この情報伝達系にサイトカイニンの関与する可能性が指摘されている⁽¹¹⁾ (図2)．根におけるサイトカイニンの生合成は硝酸イオンに応答して増大することが，シロイヌナズナやトウモロコシ，オオムギなどの植物種において報告されている．また，窒素制限条件下で生育させたトウモロコシに硝酸イオンを補填すると，輸送型のサイトカイニンの1種であるトランスゼアチンリボシドの道管内での輸送速度が上昇する⁽¹²⁾．以上の結果は，硝酸イオンがサイトカイニン合成活性と輸送に影響を与えることを示唆している．実際に，シロイヌナズナにおいてサイトカイニン生合成の鍵酵素であるアデノシンリン酸イソペンテニルトランスフェラーゼ (IPT) をコードする遺伝子群の1つ *AtIPT3* の発現が，硝酸イオンに特異的に誘導されることが報告された^(13,14)．*AtIPT3* 変異株では硝酸イオンに応答したサイトカイニン蓄積が著しく減少したことから，この遺伝子が硝酸イオンに応答したサイトカイニン生合成制御の鍵遺伝子の1つであることが示されている⁽¹⁴⁾．

サイトカイニンの情報伝達は His-Asp リン酸リレー

系が担っている⁽¹⁵⁾．サイトカイニンを介した窒素栄養情報の長距離伝達機構に His-Asp リン酸リレー系の関与が指摘されるようになったのは，トウモロコシから単離されたサイトカイニン誘導性のレスポンスレギュレーター (*ZmRR1*) の発現が，切り取り葉ではサイトカイニン誘導性であるのに対し植物体では根への窒素栄養の供給によって誘導されたためである⁽¹⁶⁾．一般的にセンサー・ヒスチジンキナーゼ・リン酸トランスミッター・レスポンスレギュレーターの3種のコンポーネントからなる His-Asp リン酸リレー系では，主にレスポンスレギュレーターが，転写制御や他のタンパク質との相互作用により下流へとサイトカイニン情報を伝えている⁽¹⁵⁾．近年，DNA マイクロアレイ解析により，サイトカイニン処理により転写産物量の変動する遺伝子が網羅的に同定されるようになってきた⁽¹⁷⁾．それらの中に His-Asp リン酸リレー系の下流に位置し，葉の展開の制御に関わる遺伝子が含まれているかもしれない．実際，エクспанシン遺伝子ファミリーに属する *AtEXP1* の発現はサイトカイニン処理により誘導される⁽¹⁷⁾．エクспанシンは細胞壁構造を緩めることで細胞の生長を制御する鍵因子であるとされている．今後は，蓄積しつつある DNA マイクロアレイ解析データを手がかりにして，レスポンスレギュレーターと相互作用するタンパク質やゲノムのシス配列を様々な手法を用いて同定することにより，His-Asp リン酸リレー系の下流の標的遺伝子とその生理的機能の分子の実体が明らかにされてゆくと思われる．

リン酸欠乏に対する応答と適応

リンは窒素栄養とともに植物生長を規定する重要な因子であるが，土壤中において植物の利用できる形態であるリン酸，すなわち有効態リン酸の濃度は低い．植物は窒素栄養と同様に低リン酸栄養環境に対しても様々な応答を示すが，その分子機構の一端がシロイヌナズナの分子遺伝学的解析により明らかになりつつある (図3)．リン酸欠乏により，リン酸イオントランスポーターや分泌性ホスファターゼなどのリン酸欠乏誘導性 (phosphate starvation inducible; PSI) 遺伝子の発現が誘導され，植物体内へのリン酸の取り込み能が増大するとともに，根圏の有効態リン酸濃度が上昇する．また，根系の形態にも変化が生じる．具体的には，主根の生長が阻害される一方で，根毛伸長と側根形成の促進が引き起こされる．一般に，地中深いほど多量栄養素の存在量の少なくなることが知られていることから，リン酸欠乏に応答した根系形態の変化は，地表面近くに存在するリン酸の獲

図3 ■ リン酸欠乏に対する応答と適応の分子機構

植物体外の低濃度のリン酸 (Pi) 環境に反応して PSI 遺伝子の発現誘導と根系形態の制御が起こる。PSI 遺伝子の発現は植物体全体のリン酸濃度環境によっても影響を受けるが、その過程にサイトカイニンが関与すると推察されている。SIZ1 はリン酸欠乏応答において中心的な役割を果たしている。PDR2 が SIZ1 の下流に位置する実験的証拠はまだないことに注意されたい。図の破線はシグナル伝達を示す。

得を優先した適応現象とみなされる。なお、以上のリン酸欠乏応答は、リン酸の類縁体であるホスファイト (phosphite, H_2PO_3^-) の外生投与により消失したことから、リン酸の代謝産物ではなく、リン酸それ自体がシグナル分子として機能していることが示唆されている。

最近、SUMO 修飾*がリン酸欠乏応答において重要な役割を担っていることが報告されている⁽¹⁸⁾。シロイヌナズナの SUMO E3 リガーゼである SIZ1 の欠損変異体において、リン酸欠乏条件下で認められる主根の生長阻害や、根毛伸長と側根形成の促進といった形態変化が野生型に比べてより著しくなった。このことは、根系形態の制御において SIZ1 は負の制御因子として機能していることを示唆している。リン酸充足条件下において、ある種の PSI 遺伝子 (*AtPT2*, *AtPS2*, *AtPS3*) の発現レベルは、野生型に比較して SIZ1 欠損変異体のほうが高かった。また、リン酸欠乏条件下ではこれらの PSI 遺伝子の発現は、SIZ1 欠損変異体においても野生型と同等のレ

ベルまで誘導されていた。しかし、他の PSI 遺伝子 (*AtIPS1*, *AtRNS1*) の中には、リン酸欠乏における発現誘導が、野生型よりも SIZ1 欠損変異体で遅れるものもあった。以上の結果は、PSI 遺伝子群の発現制御においては SIZ1 が正負、両方の制御因子として機能することを示唆している。また、PSI 遺伝子の発現誘導に SIZ1 の機能は必須ではないことから、リン酸検知を担う未同定の因子が SIZ1 の上流に存在することが予想されるが、植物におけるリン酸イオンセンサーについては、その存在も含めてまったく解明されていない。一部の PSI 遺伝子の発現は、Myb 様の転写活性化因子である PHR1 の制御下にある⁽¹⁹⁾。PHR1 が SIZ1 に依存した SUMO 修飾の標的タンパク質であることが *in vitro* で示され、SUMO 修飾により活性化された PHR1 が、*AtIPS1*, *AtRNS1* の転写を促進すると推測されている⁽¹⁸⁾。リン酸欠乏条件下の植物へのサイトカイニンの外生投与により PSI 遺伝子の発現が抑制されることから、植物個体内のリン酸栄養情報の一部がサイトカイニンに変換され PSI 遺伝子の発現を制御している系の存在が推測されている⁽²⁰⁾。しかし、現在までのところ、その変換機構の分子の実体は不明である。

リン酸濃度環境に応じた根系の形態制御過程のうち、少なくとも一部にオーキシンの関与する可能性が示唆されているが、主根の生長や根毛伸長、側根形成のいずれの過程がオーキシンの制御下にあるのか統一的な見解は得られていない。最近の研究から、リン酸欠乏状態にさらされると根系のオーキシン分布の変動する可能性が示された⁽²¹⁾。この変動は、オーキシンの合成ではなく輸送の変化に起因するものと予想されている。今後、リン酸濃度環境に反応したオーキシン輸送の制御機構を明らかにする必要がある。また、リン酸欠乏に反応した側根伸長の促進が、エチレンの制御下にあることも示されている⁽²²⁾。このように、リン酸欠乏に反応した根系形態の制御は、オーキシンをはじめとする複数の植物ホルモンの相互作用により行なわれていると推測されている。

リン酸欠乏に反応した根系形態の制御を担うタンパク質因子としては、上述の他に PDR2 (phosphate deficiency response 2) が報告されている⁽²³⁾。PDR2 欠損変異体では、リン酸欠乏に反応して野生型よりも根が短くなることから、PDR2 はリン酸濃度に応答して根の分裂組織の活性を制御していると考えられている。リン酸欠乏に反応した PDR2 欠損変異体の表現型は、オーキシンなどの植物ホルモンの投与により回復しないことから、PDR2 はリン酸濃度環境を特異的に検知するシステムの構成因子であると想定される。今のところ PDR2 の

*SUMO (small ubiquitin-related modifier) は、分子構造的にユビキチンに類似したタンパク質であり、ユビキチンと同様、標的タンパク質と化学的に共有結合することで、その標的タンパク質の機能を制御する。これを SUMO 修飾という。SUMO 修飾は、標的タンパク質それぞれに特有の立体構造の変化をもたらす、細胞内局在やタンパク質間の相互作用を変化させたり、ユビキチン化を競合的に阻害したりする。数多くのタンパク質が SUMO 修飾されることが知られており、とりわけ遺伝子の発現制御において SUMO 修飾系は大きな役割を担っている。

「植物のストレス耐性とシグナル伝達」連載予定

(各タイトルは仮題)

1. 栄養ストレスに対する応答と適応の分子機構
広瀬直也, 榊原 均
2. 植物の光環境ストレス耐性の分子機構
鹿内利治
3. 植物の重金属ストレス回避機構
前島正義
4. 高塩濃度と乾燥ストレス
篠崎和子
5. ストレス耐性の分子機構
射場 厚
6. 細胞死と環境ストレス
川合真紀, 内宮博文
7. 植物免疫研究の新しい展開
白須 賢, 市村和也, 能年義輝
8. 植物の非病原菌に対する防御機構
一瀬勇規

塩基配列は報告されていないため、PDR2がSIZ1の下流に位置するの否かについては現時点で判断を下すことはできないが、リン酸欠乏応答に多面的な役割を担っているSIZ1がPDR2の上流に存在すると考えられている。

今後の展望

本稿では、窒素とリン酸栄養に応答した生理的、形態的適応の分子機構について、とりわけ根系形態の形成制御における植物ホルモンの関与を中心に解説した。根系形態に関わる形質（根系の根量や側根の数、密度など）は、農業生産にとって重要な量的形質である。本稿で解説したように、根系形態の形成は栄養環境情報と植物ホルモン情報の複雑な相互作用により制御されていることから、多くの遺伝子がそれらの形質に相加的・相乗的に関与していると予想される。したがって今後は、従来の変異体スクリーニングに加えて、QTL (quantitative trait locus) マッピングなどの量的遺伝学の手法を取り入れることにより、未だ不明な点の多い栄養環境情報と植物ホルモン情報の接点の分子実体の解明が進展すると思われる。

本稿で述べたように、外部の栄養環境の変化に伴い植物ホルモンの内在量や分布に時空間的変動の生じることが判明している。植物ホルモンの生合成系や情報伝達系は近年急速に解明されてきたが、植物個体内での移動や分布、内生レベルの制御機構に関する知見は乏しい。多種多様な環境変化にさらされている植物個体における各々の組織、細胞、オルガネラ内に極微量存在する植物ホルモンを、リアルタイムに定量分析する技術の開発が必要であろう。植物ホルモンの輸送制御機構に関しては、近年、オーキシン輸送体遺伝子の同定と機能解析において画期的な進歩がなされた⁽²⁴⁾。サイトカイニン輸送体遺伝子については、その存在の有無も含めて未解明であったが、最近、本ホルモンの輸送体と目される遺伝子

の同定が相次いで報告された^(25, 26)。しかしながら、それらの遺伝子産物が環境変化に应答した植物の発生や分化の制御にどのように関与しているのかは不明であり、今後の研究の展開が期待される。

文献

- 1) 榊原 均, 山谷 知行: “植物代謝工学ハンドブック”, 新名惇彦, 吉田和哉編 エヌティーエス, 2002, p. 366.
- 2) 榊原 均: 蛋白質 核酸 酵素, (2003年11月号増刊), 2006 (2003).
- 3) J. E. Malamy & K. S. Ryan: *Plant Physiol.*, **127**, 899 (2001).
- 4) D. Y. Little, H. Rao, S. Oliva, F. Daniel-Vedele, A. Krapp & J. E. Malamy: *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **102**, 13693 (2005).
- 5) H. Zhang, A. Jennings, P. W. Barlow & B. G. Forde: *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **96**, 6529 (1999).
- 6) L. Signora, I. De Smet, C. H. Foyer & H. Zhang: *Plant J.*, **28**, 655 (2001).
- 7) I. De Smet, L. Signora, T. Beeckman, D. Inzé, C. H. Foyer & H. Zhang: *Plant J.*, **33**, 543 (2003).
- 8) H. Zhang & B. G. Forde: *Science*, **279**, 407 (1998).
- 9) S. Dharmasiri, K. Mockaitis, R. Swarup, N. Dharmasiri, M. Bennett & M. Estelle: *ASPB Plant Biology 2005 abstract #285*.
- 10) S. Filleur, P. Walch-Liu, Y. Gan & B. G. Forde: *Biochem. Soc. Trans.*, **33**, 283 (2005).
- 11) Y. S. Rahayu, P. Walch-Liu, G. Neumann, V. Römheld, N. von Wirén & F. Bangerth: *J. Exp. Bot.*, **56**, 1143 (2005).
- 12) K. Takei, H. Sakakibara, M. Taniguchi & T. Sugiyama: *Plant Cell Physiol.*, **42**, 85 (2001).
- 13) K. Miyawaki, M. Matsumoto-Kitano & T. Kakimoto: *Plant J.*, **37**, 128 (2004).
- 14) K. Takei, N. Ueda, K. Aoki, T. Kuromori, T. Hirayama, K. Shinozaki, T. Yamaya & H. Sakakibara: *Plant Cell Physiol.*, **45**, 1053 (2004).
- 15) F. J. Ferreira & J. J. Kieber: *Curr. Opin. Plant Biol.*, **8**, 1 (2005).
- 16) H. Sakakibara, M. Suzuki, K. Takei, A. Deji, M. Taniguchi & T. Sugiyama: *Plant J.*, **14**, 337 (1998).
- 17) A. M. Rashotte, S. D. B. Carson, J. P. C. To & J. J. Kieber: *Plant Physiol.*, **132**, 1998 (2003).
- 18) K. Miura, A. Rus, A. Sharkhuu, S. Yokoi, A. S. Karthik-eyan, K. G. Raghothama, D. Baek, Y. D. Koo, J. B. Jin, R. A. Bressan, D. J. Yun & P. M. Hasegawa: *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **102**, 7760 (2005).
- 19) V. Rubio, F. Linhares, R. Solano, A. C. Martín, J. Iglesias, A. Leyva & J. Paz-Ares: *Genes Dev.*, **15**, 2122 (2001).
- 20) L. M. Franco-Zorrilla, A. C. Martín, R. Solano, V. Rubio, A. Leyva & J. Paz-Ares: *Plant J.*, **32**, 353 (2002).
- 21) P. Nacry, G. Caneviève, B. Muller, A. Azmi, H. Van Onckelen, M. Rossignol & P. Dumas: *Plant Physiol.*, **138**, 2061 (2005).
- 22) Z. Ma, T. I. Baskin, K. M. Brown & J. P. Lynch: *Plant Physiol.*, **131**, 1381 (2003).
- 23) C. A. Ticconi, C. A. Delatorre, B. Lahner, D. E. Salt & S. Abel: *Plant J.*, **37**, 801 (2004).
- 24) J. J. Blakeslee, W. A. Peer & A. S. Murphy: *Curr. Opin. Plant Biol.*, **8**, 494 (2005).
- 25) L. Bürkle, A. Cedzich, C. Döpke, H. Stransky, S. Okumoto, B. Gillissen, C. Kühn & W. B. Frommer: *Plant J.*, **34**, 12 (2003).
- 26) N. Hirose, N. Makita, T. Yamaya & H. Sakakibara: *Plant Physiol.*, **138**, 196 (2005).