堆積泥への底生藻類の発生と種の遷移

森本 優希¹・三戸 勇吾²・中本 健二³・日比野 忠史⁴

¹正会員 広島大学大学院 工学研究科 (〒739-8527 広島県東広島市鏡山1-4-1)

E-mail: d155719@hiroshima-u.ac.jp

²正会員 復建調査設計株式会社 環境技術部 環境技術課 (〒732-0052 広島市東区光町2-10-11)

E-mail: y-mito@fukken.co.jp

³正会員 広島大学大学院 工学研究科 (〒739-8527 広島県東広島市鏡山1-4-1)

E-mail: d134328@hiroshima-u.ac.jp

⁴正会員 広島大学大学院准教授 工学研究院 (〒739-8527 広島県東広島市鏡山1-4-1)

E-mail: hibinot@hiroshima-u.ac.jp

多量に堆積した有機物が嫌気分解して強く還元化し底生生物が生息できなくなった底質環境において、生物が再生していく過程を現地実験により検討した。本研究の目的は現地実験を通し還元土壌における底生藻類の発生、種の遷移していく過程を明らかにすることである。実験では、生物再生を促すため、電子受容体の供給によって土壌の還元状態を抑制した。電子受容体を還元土壌に供給する方法として、土壌を浅場（干潟）に設置する方法とアルカリ剤である石炭灰造粒物基盤を構築する方法を併用した。この結果、大型生物の生息に繋がる底生動植物の出現およびそれらの種の遷移、底生藻類の遷移が起こる動植物間の関連性、水泥質等との関係について明らかにされた。

Key Words : granulated coal ash, sludge, pH-ORP relation, macrobenthos

1. はじめに

未処理下水が放流され、有機物の堆積が続く広島県福山港の内湾奥部で生物再生実験を行なった。実験では生物再生のため電子受容体の供給によって土壌の還元化を抑制した。電子受容体を還元土壌に供給する方法として、土壌を浅場（干潟）に設置する方法とアルカリ剤である石炭灰造粒物基盤を構築する方法を併用した。石炭灰造粒物は石炭灰をセメントで固化しており、 $\text{Si}(\text{OH})_3\text{O}^-$ 、 Ca^{2+} 等のミネラルを溶出する SiO_2 、 CaO 、 Al_2O_3 を主な成分とする。石炭灰造粒物の効果として還元状態にある土壌のpH、ORPの上昇、 $\text{S}(\text{II})$ や PO_4^{3-} の固定、および陽イオン交換に引き続く土粒子の団粒構造化、透水性の向上等がある²⁾。

広島県は過去に堆積した有機泥と今後堆積する有機泥処理のため、2014年10月に石炭灰造粒物を内湾奥部海底に散布した。福山市の下水対策により2015年3月に放流下水BODを40%以下に減少しているが、有機泥の沈降は継続している。石炭灰造粒物の散布直後からハゼ等の魚類が回遊し、2年後にはフレリトゲアメフラシが生息した。フレリトゲアメフラシは海藻を餌としており、底生藻類が繁茂する等の大型動物が生息可能な食物連鎖の初

図-1 実験区と籠の設置概要

期の構造が形成されたことを示している。

本論文では大型生物の生息に繋がる底生動植物の出現から、それらの種の遷移について理解するとともに、底生藻類の遷移が起こる動植物間、水泥質等との関連について検討した。生態系が崩れ底生動物が消滅した内港に

図2 季節変化に伴う底生生物と珧藻綱の種の遷移 (上段: 礫, 下段: 原泥, 下段: 石炭灰造粒物)

において現地動植物再生実験を行い、生態系が再生していく過程で出現した底生動植物の遷移特性について考察を行っている。

2. 底生藻類の遷移過程の解明の試み

現地実験条件を図-1, 表-1に基盤材料を示す。籠は大潮干潮時には籠が干出するD.L.+0.5m程度に設置した。底生動植物の出現と種の遷移の調査は2014年10月から3季節に行われた。底生動物は、一定面積 (0.019m²) の基盤を深度10cm程度まで採取し、1mmメッシュのふるいで篩い、ふるい上の残渣分について種の同定と個体数・湿重量の計測を行った。底生植物については、基盤表面の堆積物を深さ1cm, 面積3cm²程度、スポイド等を用いて採取し、採取した試料について種の同定と細胞数の計測を行った。底生動植物調査に合わせて、泥内水質 (間隙水) の測定をした。本論文で用いた測定項目はDO (電極法-WTW製FDO925), NH₄-N (イン

ドフェノール青吸光光度法-島津製作所製UVmini-1240), TOC (TOC計-島津製作所製TOC-VCSH) である。間隙水は籠内に埋設したポーラストーンを通して採水した。実験開始時には現地海底に石炭灰造粒物の底質改善事業 (広島県) が行われている。図-2には冬季~秋季の3期の調査で行った (a) 底生動物, (b) 珧藻綱, (c) 藻類 (珧藻綱を除く) での季節変化に伴う種の遷移が示されている。図の上段には礫 (花崗岩), 中段には原泥, 下段には石炭灰造粒物の各基盤での調査結果が比較されている。図中のNo.は動植物の種を表しており、動物種を表-2, 珧藻綱を表-3(a), 珧藻綱以外の藻類は表-3(b)に示されている。表-2には出現した珧藻綱の172種の内、400cells/mm²以上の出現があった種を記述しており、最右列には各期, 各基盤に出現した最大数 (×100 cells/mm²) を示している。

(1) 再生基盤によって異なる底生生物の出現

底生生物の発生状況は基盤によって異なっており、還

表-1 実験ケースと条件

ケース	投入した地盤材料
1, 2 ()	石炭灰造粒物 100%
3 ()	礫 (天然) 100%
4 ()	原泥 (福山内港泥)

注) シンボルは図での凡例に対応しており塗りつぶしの有無により調査期を示している

表-2 3季の調査で出現した底生動物 (No.は図-2(a)の種に対応)

No.	門	綱	目	科	種名
1	刺胞動物	花虫	イザンチャク	テジマイザンチャク	<i>Haloplanelle lineata</i>
2				Actiniaria	イザンチャク目
3	軟体動物	二枚貝	ガイ	Mytilus galloprovincialis	ミヅガイ
4				<i>Xenostrobus securis</i>	コウロエンカワヒバリガイ
5				<i>Musculista senhousia</i>	ホトギスガイ
6				Mytilidae	ガイ科
7			蚌	イサガキ	イサガキ科
8			マルガレガイ	ニッコウガイ	ニッコウガイ科
9	環形動物	多毛	サバゴガイ	Typosyllis sp.	Typosyllis属
10				Syllidae	シリス科
11				<i>Neanthes succinea</i>	アサガゴガイ
12				<i>Hediste</i> sp.	カゴガイ属
13				Nereididae	ゴカイ科
14			ズビ	ズビ	<i>Pseudopolydora</i> spp.
15			イトガイ	イトガイ	<i>Capitella</i> sp.
16			ケリムシ	カザシムシ	<i>Ficopomatus enigmaticus</i>
17				Serpulidae	カザシムシ科
18		貧毛		OLIGOCHAETA	貧毛綱
19	節足動物	顎脚	無柄	フジツバ	<i>Balanus amphitrite</i>
20				<i>Balanus eburneus</i>	アサカザツバ
21				<i>Balanus improvisus</i>	ヨロヅツバ
22				<i>Balanus</i> sp.	Balanus属
23		軟甲	端脚	ドコガムシ	<i>Corophium</i> sp.
24			十脚	カレガニ	Pinnotheridae
25		昆虫	甲虫	ヒムシ	COLLEMBOLA
26			厩	ヌリカ	Chironomidae
27				DIPTERA	厩目

元状態を緩和できる石炭灰造粒物基盤において動植物の発生数、発生種類とも多くなっている。原泥基盤においては汚濁耐性が高い *Capitella* sp. (15), *Pseudopolydora* spp. (14), OLIGOCHAETA (18) の泥内生息動物 (環形動物) のみが12月に出現しており、これらの環形動物が酸素残量の比較的多い冬季に生息できている (種名(No)は図-2中の動植物種に対応)。しかし、高温期に向かう6月になると動物の生息は数個体に減少し、9月には1個体の生息もない。礫基盤、石炭灰造粒物基盤では *Xenostrobus securis* (4) (コウロエンカワヒバリガイ) が優先しているが、礫基盤では6月のみで出現量が多い。全動物を対象にみると、高温期を経験した9月には両基盤において生息数が大きく異なり、間隙水の交換が期待できる礫基盤においても生息している動物は数個体のみである。これに対し、石炭灰造粒物基盤においては継続的な動植物の生息がある。原泥基盤では間隙水の交換が少ないことに加えて原泥の酸素消費能力が高く、酸素消費量が多くなる高温期には酸素呼吸ができない状態にあると考えられる。石炭灰造粒物基盤では礫材の特性である間隙水の交換能に加えてミネラルの溶出が硫化水素等の毒性を緩和するとともに還元物質を固定して酸素の消費を迎える等、動物の生息可能な場の形成に至ったと考えられる¹⁾。

(2) 底生藻類のつくる動物生息環境

表-3 3季の調査で出現した底生藻類

(a) 珪藻綱 (No.は図-2(b)の種に対応, 最右列は最大出現数)

No.	目	科	種名	出現
12	円心	テラシラ	<i>Skeletonema costatum</i> s.l.	40
14			<i>Thalassiosira</i> spp.	12
17	楕円	メシラ	<i>Melosira nummuloides</i>	7
39	羽状	テイアトマ	<i>Fragilaria construens</i>	4
40			<i>Fragilaria construens</i> v. <i>binoides</i>	19
42			<i>Fragilaria pinnata</i>	21
44			<i>Fragilaria</i> spp.	7
54			Diatomaceae	15
56	アナンテス		<i>Achnanthes brevipes</i>	9
78	アビキユ		<i>Amphora angusta</i>	6
163			<i>Nitzschia sigma</i> s.l.	12

(b) 珪藻綱以外の藻類 (No.は図-2(c)の種に対応)

No.	綱	目	科	種名
1	藍藻	ユレモ	-	OSCILLATORIALES
2	渦鞭毛藻	アノケンタム	アノケンタム	<i>Prorocentrum dentatum</i>
3		テイノフィス	テイノフィス	<i>Oxyphysis oxytoxoides</i>
4		ペリテインム	アノペリテインム	<i>Protoperdinium quinquecorne</i>
5	緑藻	ヨコミト	セキスス	<i>Scenedesmus</i> spp.
6	不明鞭毛藻類			unidentified flagellates

魚類等の高等生物は植物プランクトン、藻類から生成される有機物、酸素を利用している。したがって高等動物の再生は藻類の生育状況の影響を受けると考えられる。図-3には(a)設置から8ヶ月を経た6月と9月に出現した藻類の総細胞数と間隙水DO, (b) 間隙水DOと泥内棲息動物 (環形動物) との関係が示されている。各基盤で藻類の細胞数に対するDOの勾配は異なっているが、藻類の増加がDOの増加に寄与していると判断できる (図-3 (a))。DO/細胞数比が異なるのは各基盤のDO消費能力、透水性が基盤材料の特性により変化するためであり、DOの増加は植物量のみ依存しないことによる。図-3 (b)から環形動物は各基盤においてDO必要量が異なるが、DOの増加に伴って生息量が増加する傾向にあることがわかる。石炭灰造粒物基盤で低いDO状態で環形動物が多く生息できるのは、石炭灰造粒物層では還元物質が灰成分により酸化されDOの消費が減少する土壌が形成されるためである¹⁾。これらの結果により植物の増殖と動植物の生息数の関係では植物の発生 DOの増加 底生動物の生息に関連があり、植物が底生動物の生息環境を作る機構が形成されることにより動物の生息に繋がることを説明できる結果が得られた。

(3) 発生初期に優先する微細藻類 (珪藻と藍藻) の変遷

福山内港で優先する微細藻類は藍藻綱と珪藻綱である。藍藻綱はOSCILLATORIALES (1) (ユレモ) の単種であるが、珪藻綱では173種の出現がある。図-4には(a) 礫~石炭灰造粒物, (b) 礫~原泥での各基盤に出現した珪藻種の細胞数が比較されている。対数表示しているため出現のない種は1としている。珪藻種の細胞数も動物と同様に石炭灰造粒物、礫、原泥の順に多く出現しており、藻類の出現数も基盤の状態に影響を受けることがわかる。

図-3 動物への植物の寄与（6月，9月）

図-4 各基盤での珪藻綱細胞数（図-2(b)）の比較（1は未出現）

各調査期で卓越する種はどの基盤においても差がないことから、珪藻は広い場での水質に依存しており、対象海域で出現した珪藻種の内、各付着基盤に形成された生活環境に対応できた種が生き残ると考えられる。珪藻綱には種の遷移があり3期（全ての季節）を通じて卓越した種の出現はない。生態系再生の初期にある本実験では水質等の生息条件の変化に依存して科の分類で出現する種が異なる場合が多くなっている（図-2）。*Skeletonema costatum* s.l. (12)（スケルトネマ）は赤潮を形成するタラシオシーラ科に属する浮遊性の植物プランクトンである。原泥において他の基盤に卓越して多く出現しているのは、内港で発生した赤潮の一部が実験区に着定し還元性の強い原泥基盤上においても最も生息に適した生活環境が形成されていたと考えられる。

本実験で出現した珪藻綱以外の藻類においても1年間を通じて卓越して生存する種は少なく、原始的な単細胞の藻類では周辺環境の変化に応じて種が入れかわると考えられる。図-2(c)から全ての基盤においてユレモは実験当初（設置後2ヶ月の12月）から6月まで珪藻綱よりも卓越して出現しているが、9月には個体数が激減している。また、石灰灰造粒物基盤のみで渦鞭毛藻、緑藻が9月にも出現していることから基盤毎に異なる地盤表面の環境が存在していると考えられる。石灰灰造粒物から溶出するシリカ（ $\text{Si}(\text{OH})_3\text{O}^-$ ）は珪藻が利用できる化学種であり³⁾、さらに、鉄、マンガン等のミネラルの溶出が他の藻類の出現も促進させる可能性がある。

図-5 $\text{NH}_4\text{-N}$ およびTOCと藻類の細胞数の関係

(4) 底生藻類の種、細胞数の栄養塩への依存性

図-5には高温期（6月，9月）の間隙水中の溶存 $\text{NH}_4\text{-N}$ とTOCに対する(a) *Skeletonema costatum* s.l.を除いた珪藻綱、(b) *Skeletonema costatum* s.l.、(c) OSCILLATORIALES（ユレモ）の細胞数との関係が示されている。図-5と図-6に関する議論では*Skeletonema costatum* s.l.を除く珪藻綱を珪藻綱と表現する。スケルトネマと珪藻綱、ユレモでは $\text{NH}_4\text{-N}$ およびTOCに対して生息の状況が異なっている。 $\text{NH}_4\text{-N}$ は生物に対する毒性が強く、沿岸域の底生微細藻類（主に珪藻綱）では、約7mg/L以上で増殖に障害が出ることが報告されている⁴⁾。原泥では $\text{NH}_4\text{-N}$ 濃度が10mg/L以上であり、原泥の珪藻綱の細胞数は少なくなっていた（図-2(a)）。一方で、原泥においても比較的高密度で出現した図-2(b)*Skeletonema costatum* s.l. (4)、*Fragilaria pinnata* (42)、図-5(c) OSCILLATORIALES (1)の $\text{NH}_4\text{-N}$ に対する耐性は強いと考えられる。特にスケルトネマは高い $\text{NH}_4\text{-N}$ 状態で生息できており、高いアンモニア濃度は増殖に必要な栄養塩として利用されることが予想される。藻類の

図6 動植物間の相互関係

出現数が有機物量 (TOC) に依存する必然性はないが、栄養塩濃度は有機物の分解量に依存することから有機物量 (栄養塩濃度) の高い状態は基盤の還元状態を示す指標となる。スケレトネマは還元的な状態にある基盤環境下において生息できており、増殖には高い栄養状態が優位に働くことを示唆している。珪藻綱、コレモのTOCに対する細胞数は石灰造粒物、磯、原泥の各基盤で異なっており、各基盤が形成する還元状態の緩和度に依存する傾向を示している。コレモは磯基盤で多く、 $\text{NH}_4\text{-N}$ 、TOCの高い原泥においても出現しており、有機性状が直接コレモの増減に寄与していないことがわかる。

(5) 植物の遷移と底生動物の生息

冬季～秋季の3調査期間での動物と植物の遷移を比較すると動物では3期を通じて出現する種が複数存在し、各個体数が増減しているのに対し、植物では3期を通して出現する種は少ないが植物の種を変化させて存在している。図-2、図-4において石灰造粒物基盤では磯、原泥に比較して底生動物の出現数が多く、藻類の細胞数も多くなっている。石灰造粒物 (酸化) から溶出されるミネラルが植物の増殖を促し、植物は泥上生息動物の生息環境を形成することはこれまでの調査^{1)~3)}からもわかっている。出現する動物の個体数が植物の種類数と相関があるのは、植物が泥上生息動物の生息を支えているためと考えられる。

図-6には植物、動物の種 (綱) 間の関係が示されている。ここでは出現数が最も多いコウロエンカワヒバリガ

イとコレモ、泥内に棲む環形動物、スケレトネマと3調査期を通して出現数が多いスケレトネマを除く全種の珪藻綱を対象とした。コウロエンカワヒバリガイは有機汚濁に強く⁵⁾対象海域では最も優先する動物である。スケレトネマが出現した時期にはコウロエンカワヒバリガイ、環形動物、コレモ、珪藻綱の出現は乏しく、スケレトネマの発生条件は他の動植物の生息を阻害していることが予想される (図-6(a), (b), (c))。図-5で示したようにスケレトネマは栄養塩、有機物量に対して正の相関を持っており、過剰な有機物の堆積 (富栄養状態) がスケレトネマの出現を制限することはないが、富栄養状態、あるいはスケレトネマの発生がスケレトネマ以外の動植物の発生を阻害する要因となると考えられる。過剰有機物の分解 (富栄養化) は還元化に引き続く貧酸素状態を形成する要因であり、基盤面での植物量の低下はさらなる貧酸素化の促進に繋がると考えられる (図-3)。

コウロエンカワヒバリガイは珪藻綱の増殖後に増加する傾向がある (図-6(d))。一方、発生初期の12月、6月においては珪藻綱に対する環形動物の出現個体数はコウロエンカワヒバリガイと逆の生息状態にあり、コレモ、珪藻綱の発生により生息量が減少される傾向がある (図-6(e), (f))。ただし、原泥を除けば珪藻綱の増殖に伴った環形動物の増加が現れている。安定した生態系の発達のためには食物連鎖が定常的に起こる必要があり、動植物の発生当初では基盤内で流れが起こり易い間隙空間の大きい磯状の基盤が有利と考えられる。

表-4 堆積泥層と間隙水の水質

	籠執権条件		石炭灰造粒物 干潟内
	石炭灰造粒物 100%	礫 100%	
堆積泥量 (g/kg)	99	64	47
DO (mg/L)	9.1	6.7	7.5
ORP (mv)	95	13	49
TOC (mg/L)	3.2	3.5	3.5

3. 干潟と試験籠内での環境の相違

石炭灰造粒物の散布後に発生したフレイトゲアメフラシは、散布後1年を経て安定した底生動植物相が形成された証拠の一つと考えられる。石炭灰造粒物により構築された広範な実干潟と閉ざされた籠内に作られた干潟では地盤環境（生態系の再生）が異なることが考えられる。

そこで、石炭灰造粒物で構築された実干潟と籠内において堆積した泥量および間隙水質DO、ORP、TOCを測定し、比較した。間隙水の試料の採取は冠水時に行い、実干潟では上層（0～10cm）とその下層（10～20cm）において試料を採取した。表-4に測定結果が示されている。籠基盤も実干潟と同様に石炭灰造粒物で構成されている基盤であるが、籠上面を除いて異なる境界条件となっている。基盤内に堆積した泥量は実干潟の上層47g/kg、下層21g/kgに対し、籠試験では99g/kgであり、籠試験で2倍程度あるが間隙を埋める量ではない。酸化還元状態は実干潟、籠内とも生物が生息できない状態ではなかった。実干潟では籠内に比較して堆積泥量が少なく、酸化状態が弱い傾向にあることから、実干潟では沈降泥が造粒物層内で移動し易い、または有機物の分解量が多い状態にあることが推定される。ただし、それらの差は小さく、籠試験結果は実干潟の環境を再現するものと考えられる。籠試験結果は実海域における大型動物の発生を説明する指標として利用できる可能性が高い。

4. おわりに

- (1) 底生生物の発生状況は基盤性状によって異なり、還元状態を緩和できる石炭灰造粒物基盤において動植物の発生数、発生種類とも多くなっている。

- (2) 石炭灰造粒物基盤では礫材の特性である間隙水の交換能に加えてミネラルの溶出が硫化水素等の毒性を緩和するとともに還元物質を固定して酸素の消費を迎える等、高温期においても動物の生息可能な場が維持されていると考えられる。
- (3) 各基盤間の動植物とDO状態から植物の増殖と動植物の生息数の関係では植物の発生 DOの増加 底生動物の棲息に関連があり、植物が底生動物の棲息環境を作る機構が形成され、動物の生息に繋がっている。
- (4) 籠試験のような限られた空間における底生動植物の再生実験結果であっても有機物が堆積し還元化した実海域における再現実験として利用可能である可能性が高い。

謝辞：本研究は科研費（課題番号26630229，15H05221）により実施された。また福山市からの受託研究の一部でもあり、使用データは受託研究で得られたものである。記して謝意を表する。

参考文献

- 1) 日比野忠史，金城信隆，TOUCN NARONG，福岡捷二：還元化した下水系土壌での生態系の再生，土木学会論文集 B3（海洋開発），特集号（Vol.71.No.2），pp.910-915，2015.
- 2) 日比野忠史，中本健二，廣中伸孝，樋野和俊：アルカリ剤造粒物により浄化された河岸ヘドロの有機物特性評価，土木学会論文集 B3（海洋開発），特集号（Vol.70.No.2），pp.1110-1115，2014.
- 3) 森本優希，中本健二，中下慎也，日比野忠史：堆積泥への灰分（ミネラル）の供給と消費機構，土木学会論文集 B3（海洋開発），特集号（Vol.72.No.2），CD，2016.
- 4) Admiraal, W. : Tolerance of estuary benthic diatoms to concentrations of Ammonia, Nitrite, Nitrate Ion and Orthophosphate, Vol.43, pp.307-315, 1977.
- 5) 小濱剛，門谷茂，梶原葉子，山田真知子：ムラサキイガイおよびコウロエンカワヒバリガイの個体群動態と過栄養海域における環境との関係，日本水産学会誌，Vol. 67，No.4，pp.664-671，2001.

(2016.3.16 受付)

GROWTH AND TYPE TRANSITIONS OF BENTHIC ALGAE IN SEDIMENT

Yuki MORIMOTO, Yugo MITO, Kenji NAKAMOTO and Tadashi HIBINO

Anaerobic digestion in organic matter-enriched sediment forms a strong reduced environment which inhibits benthos living. Here, we aim at examining the growth and type transition of algae in a strong reduced sediment through field experiments. We supplied electron acceptors to the sediment to lower the reduced condition of the sediment. The supplying method is the same to that of used in shallow regions (e.g., tidal flat) in combination with the construction method of using alkaline material (i.e. granulated coal ash) as a basement. Experiment results showed that supplying electron acceptors induces to the growth and type transition of benthic flora, fauna and algae. We also revealed correlations of the transition of benthic algae with benthic flora and fauna, and with the quality of water and sediment.