原 著

Moraxella に関する研究

第3報 新しい Moraxella bovis の溶血 試験用培地について

昭和薬科大学微生物研究室

井 上 勇 新 井 武 利

関東中央病院臨床検査科

吉 沢 一 太

東京共済病院臨床検査科

横 沢 光 博

Key words: Moraxella, Haemolysin test

まえがき

著者らは前報¹⁾において Moraxella の溶血性では M. bovis がウマ脱繊維素血液を特異的にβ溶血し、この性状が M. bovis の同定に有力な手がかりになることを報告したが、今回、臨床検査において M. bovis の溶血性を検査するための培地について検討したので報告する。

I. 実験材料および実験方法

1. 使用菌株

耳漏、喀痰、尿分離の M. bovis 20株、M. lacunata 18株、M. nonliquefaciens 8株、M. osloensis 2株、その他の Moraxella 6株、合計54株を用い、また基礎培地の検討には M. bovis 3株、M. lacunata 1株、M. nonliquefaciens 1株、M. osloensis 1株、合計6株を用い、すべて実験に際しては HI プイヨンにて30℃、24時間前培養を行なった。

2. 基礎培地の検討

(1)各種培地における溶血性

ハートインフュージョン寒天(HI)、ブレインハートインフュージョン寒天(BHI)、普通寒天(N)それぞれにウマ脱繊維素血液を5%の割合に添加し平板培地を作り、被検菌株を塗抹し30℃、24時

間培養後、集落周囲の溶血環の有無および状態を観察した。

(2)溶血性におよぼす酵母エキスの影響

HI 寒天に酵母エキスを0.2, 0.5, 1, 2%に添加し、それぞれにウマ脱繊維素血液を5%の割合に加えて平板培地を作り、被検菌株を塗抹し、30℃、24時間培養後、集落周囲の溶血環の状態を観察した。

(3) 溶血性におよぼす pH の影響

HI 寒天に酵母エキス1%を添加し、培地のpHを5. 6. 7. 8. 9の5段階に調製してウマ脱繊維素血液を5%の割合に加えて平板培地を作り、被検菌株を塗抹し、30℃、24時間培養後、集落周囲の溶血環の状態を観察した。

3. 新溶血試験用培地における臨床分離株の成績

新培地に M. bovis 20, M. lacunata 18, M. nonliquefaciens 8, M. osloensis 2, その他の Moraxella 6, 合計54株の培養菌を塗抹し30℃、24時間培養後1夜冷蔵庫に保存し溶血の状態を観察した。

II. 結 果

1. 基礎培地の検討

Table 1 Haemolysis of *Moraxella* sp. on various media

No.	species	media		
		HI agar	BHI agar	N agar
1	<i>M. bovis</i>	β	α	α
2	"	β	α	α
3	"	β	β	α
4	<i>M. lacunata</i>	(-)	(-)	(-)
5	<i>M. nonliquefaciens</i>	(-)	(-)	(-)
6	<i>M. osloensis</i>	α	α	α

used blood..... 5% horse blood defibrinated

(1) 各種培地における溶血性

各種培地における溶血性は Table 1 のとおりである。すなわち *M. bovis* は HI 寒天ではすべて β 溶血を示したが、BHI 寒天では 2 株、N 寒天では 3 株が α 溶血を示し、*M. osloensis* はすべて α 溶血を示し、*M. liquefaciens*, *M. nonliquefaciens* は各培地とも溶血性は認められなかった。

(2) 溶血性におよぼす酵母エキスの影響

溶血性におよぼす酵母エキスの影響を検討した結果は Table 2 のとおりである。すなわち *M.*

Table 2 Effect of Yeast extract on the haemolysis of *Moraxella* sp.

No.	species	concentration (%)				
		control	0.2	0.5	1	2
1	<i>M. bovis</i>	++	++	++	+++	±
2	"	++	++	++	++	+
3	"	++	++	++	++	±
4	<i>M. lacunata</i>	-	-	-	-	-
5	<i>M. nonliquefaciens</i>	-	-	-	-	-
6	<i>M. osloensis</i>	+	++	+++	+	+

used medium.....HI agar, used blood..... 5% horse blood defibrinated

bovis は 1% までは強い β 溶血を示したが、2% では溶血性がやや弱くなった。*M. osloensis* は 0.2, 0.5% では強い α 溶血を示したが 1% 以上では弱い溶血を示した。

(3) 溶血性におよぼす pH の影響

溶血性におよぼす pH の影響を検討した結果は Table 3 のとおりである。すなわち *M. bovis*,

Table 3 Effect of pH on haemolysis of *Moraxella* sp.

No.	species	pH				
		5	6	7	8	9
1	<i>M. bovis</i>	-	+	++	+++ (β)	+++
2	"	-	+	+++	+++ (β)	+++
3	"	-	+	++	+++ (β)	+++
4	<i>M. lacunata</i>	-	-	-	-	+++
5	<i>M. nonliquefaciens</i>	-	-	-	-	+++
6	<i>M. osloensis</i>	-	+	++	++ (α)	+++
	control	-	-	-	-	+++

used medium.....

HI agar containing yeast extract (1%)

used blood..... 5% horse blood defibrinated

Table 4 A medium for haemolysis test of *M. bovis*

Beef heart, infusion from	500 g
Peptone	10 g
Sodium chloride	5 g
Yeast extract	10 g
Agar	15 g
Dist water	1000ml
Horse blood defibrinated	5%

pH 8.0

M. osloensis は pH 7 以上で強い溶血性を示したが、pH 8 では *M. bovis* はすべて β 溶血を、その他はすべて陰性であった。しかし pH 9 ではすべて β 溶血様を示したが、control も赤褐色となり、また増殖も不良であった。

(4) 新溶血試験用培地の組成

以上の実験成績に基づいて著者らは Table 4 のとき *M. bovis* の新溶血試験培地を考案した。すなわち培地 1.000ml あたりウシ心臓浸出液 500 g, ペプトン 10g, 塩化ナトリウム 5g, 酵母エキス 10g, 寒天 15g を溶解後 pH を 8.0 とし、120°C, 15 分間高圧滅菌し、ウマ脱繊維素血液を 5% の割合で添加して血液寒天培地とする。

2. 新溶血試験用培地における臨床分離株の成績

新溶血試験培地を用いての臨床分離株の溶血試験成績は Table 5 のとおりである。すなわち

Table 5 Results of *Moraxella* sp. on the medium for haemolysis test of *M. bovis*

species	No. of strains	haemolysis		
		β	α	(-)
<i>M. bovis</i>	20	19(95)	1(5)	0
<i>M. lacunata</i>	18	0	0	18(100)
<i>M. nonliquefaciens</i>	8	0	6(75)	2(25)
<i>M. osloensis</i>	2	0	1(50)	1(50)
others <i>Moraxella</i>	6	0	3(50)	3(50)

each figures in parenthesis are indicates percentage

M. bovis は95%が β 溶血をし, *M. lacunata* は100%非溶血, *M. nonliquefaciens* は75%が α 溶血, 25%が非溶血であり, *M. osloensis*, その他の *Moraxella* も同様な成績を示した.

III. 考 察

Moraxella の溶血性に関しては *M. bovis* がウマ血液を β 溶血することが古くから知られているが, 著者らも前報¹⁾において *M. bovis* がウマ, ヒツジ血液を, *M. nonliquefaciens*, *M. osloensis* がヒト, ウサギ血液を溶血することを報告した.

Moraxella の溶血性は Cowan の manual²⁾や, 著者らの前報¹⁾に記してあるように菌種によつて異なり鑑別に利用し得る. 一般に溶血レンサ球菌³⁾, 腸炎ビブリオ⁴⁾やコレラ菌⁵⁾など多菌種について報告があるように溶血毒産生は培養条件や培地組成によつて異なる. 溶血レンサ球菌の場合はブドウ糖が含有されていると溶血が妨げられるが³⁾, 著者らの実験によると *Moraxella* の場合でも HI 寒天に比してブドウ糖を含有している BHI 寒天の方が溶血能が劣り, 一部の菌株は α 溶血を示した. このことはブドウ糖の影響のみではなく, 脳浸出物の影響も考えられるが, 詳細は不明であり今後の検討を要する. また N 寒天においても α 溶血が観察されたが, この原因についても不明であり, 心浸出物と肉エキスとの相違などについて今後の検討が必要である.

浅川⁴⁾は腸炎ビブリオにおいては酵母エキスの添加は溶血能に直接影響が認められなかつたと

報告しているが, 著者らの実験では *Moraxella* においては酵母エキスを1%添加した場合, control に比してやや溶血能が促進され, 2%添加では逆に抑制された. 増殖度との関係は直接的に観察していないが, 別に行なつた実験⁶⁾では, 静置培養では酵母エキスを HI 培地に添加しても増殖度にはほとんど差を認めなかつたので, 溶血能がやや促進されたものと思われ, また *M. osloensis* の溶血能は酵母エキスの1%添加で抑制されるので, *M. bovis* の溶血試験用培地に酵母エキスを添加することは有用であると考え.

溶血能はまた pH によつても異なり, 腸炎ビブリオでは中性がよく, アルカリ性に傾くに従つて低下するが⁴⁾, *Moraxella* の増殖至適 pH は弱アルカリ性にあり⁶⁾, 溶血能も pH 8 程度のアルカリ性の方が良好であった.

以上の結果から著者らの考案した *M. bovis* の溶血試験用培地は作成も簡単であり, かつ臨床分離株の95%が本培地で陽性を示し, 日常検査における *M. bovis* の同定に十分利用し得るものと考え.

結 論

著者らは *Moraxella* の溶血試験用培地について検討し, 次のような結論を得た. すなわち, 1%酵母エキス添加 HI 寒天 (pH 8.0) にウマ脱繊維素血液を5%添加した培地において *M. bovis* の溶血能は良好となり, 他の *Moraxella* との鑑別が容易となり, 本培地は日常検査にも使用可能である.

本論文の要旨は第49回日本感染症学会総会において報告した.

なお御助言, 御校閲下さつた東邦大学医学部桑原章吾教授に深甚の謝意を表します.

文 献

- 1) 吉沢一太, 横沢光博, 井上 勇, 新井武利: *Moraxella* に関する研究. 第2報, *Moraxella* の生化学的性状による同定法について, 日本感染症学会誌に投稿中.
- 2) Cowan, S.T.: "Manual for the identification of medical bacteria" 2nd ed. 1974, 坂崎利一訳, 114—117, 近代出版社, 東京.
- 3) Topley and Wilson's.: "Principles of Bacteriology.

- Virology and Immunity" 6th ed., vol. 1. 716—717, 1975.
- 4) 浅川 豊, 赤羽荘資, 野口政輝: "腸炎 ビブリオの溶血性について" メディアサークル 13, 163—167, 1967.
- 5) 新井武利: "Vibrio El Tor のアミノ酸要求について" 日細誌, 17, 371—375, 1962.
- 6) 新井武利, 井上 勇: "Moraxella bovis の溶血毒について", 日細誌, 30 (1): 237, 1976.

Studies on Moraxella III

Studies on a New Haemolysin Test Medium for Moraxella Bovis

Isamu INOUE and Taketoshi ARAI

Department of Microbiology, Showa College of Pharmaceutical Sciences

Ichita YOSHIZAWA

Department of Laboratory, Kanto Chuo Hospital

Mituhiko YOKOZAWA

Department of Laboratory, Tokyo Kyosai Hospital

The authors studied on a new haemolysin test medium for *M. bovis*, and we obtained the following results.

- 1) HI agar medium showed the best function as basal medium for haemolysin test of *M. bovis*.
 - 2) *M. bovis* showed the best haemolysis on HI agar medium containing 1% yeast extract at pH 8.0.
 - 3) Ninety five percent of the strains of *M. bovis* isolated from clinical materials showed β -haemolysis, and other *Moraxella* species showed α -haemolysis or non-haemolysis on the new medium.
-