<総 説>

肝臓に対する分子標的治療

田中 真二 有井 滋樹

索引用語: EGFR VEGF VEGFR シグナル伝達 Aurora kinase B

緒 言

1983 年, 癌遺伝子 *sis* が細胞増殖因子 PDGF と, そして癌遺伝子 *erbB1* が細胞増殖因子レセプター EGFR と同一遺伝子によってコードされていることが相次いで発見され, その後の分子生物学的解析は, レセプターのリン酸化が惹起するシグナル伝達経路と癌遺伝子産物との関連を明らかにした¹⁾. そして遺伝子工学と分子設計などの発展により, これらの癌関連分子群を直接標的とする阻害剤が次々と開発されている²⁾. 肝細胞癌においてもマルチキナーゼ阻害剤 Sorafenib の第 III 相臨床試験により有効性が報告され, 分子標的剤の新しい時代を迎えようとしているが³⁾, 本稿では肝細胞癌における実際の臨床応用を鑑みて, 細胞増殖因子 EGFR (epidermal growth factor) と VEGF (vascular endothelial growth factor)/VEGFR, 細胞内シグナル伝達経路に対する分子標的治療を中心に論述し, さらに最近我々が肝細胞癌で解析している新規分子標的 Aurora kinase について紹介する⁴⁾.

EGFR

EGFR/ErbB1/Her1 は, ErbB2/Her2/Neu, ErbB3/Her3, ErbB4/Her4 とともにレセプター・チロシンキナーゼファミリーを構成する⁵⁾ (Fig. 1). EGFR/ErbB1 のリガンドは, EGF のみならず TGF- α , Amphiregulin, HB-EGF, β -cellulin, Epiregulin などが報告されている. ErbB3/Her3 のリガンドは Heregulins, Epiregulin, NRGs など, ErbB4/Her4 のリガンドは Heregulins, Epiregulin, HB-EGF, β -cellulin, NRGs などとされているが, ErbB2/Her2/Neu のリガンドは同定されていない. EGFR/ErbB1 と ErbB2/Her2/Neu は, 様々な固形癌で高発現している. EGFR/ErbB1 にリガンドが結合すると, EGFR 同士で homodimer を形成して, 或

いは ErbB2/Her2/Neu, ErbB3/Her3 などと heterodimer を形成して, 細胞内チロシンキナーゼに ATP が結合して活性化され, 自己リン酸化を起こして (ErbB3/Her3 以外), MAP キナーゼ (MAPK), PI3 キナーゼ (PI3K) などのシグナル伝達経路を亢進する. MAPK 経路は細胞増殖を促進し, PI3K 経路は抗アポトーシス作用をもつ AKT を活性化して癌細胞の生存を促す. 肝細胞癌において TGF- α の高発現が発癌早期から認められ, VEGF 発現亢進にも関与している⁶⁾.

EGF/EGFR に対する治療標的はレセプターが中心であり, EGFR/ErbB1 阻害剤は 2 つのタイプに分類される^{7,8)} (Table 1). 1 つは ATP 結合阻害によって EGFR チロシンキナーゼ活性を抑制する低分子チロシンキナーゼ阻害剤であり, もう 1 つはリガンドと EGFR の結合を阻害するモノクローナル抗体である. モノクローナル抗体は元来マウス由来であり, 反復投与によりマウス蛋白に対する異種抗体, すなわちヒト抗マウス抗体 (human antimurine antibody; HAMA) が出現し, 臨床応用を阻んでいた. 遺伝子工学の進歩により, 抗体の定常部 Fc をヒト由来の遺伝子と組換えたキメラ化抗体が設計されたことにより, 免疫原性は低下し, 血中半減期が長くなり, 臨床応用可能となったのである⁹⁾. さらにキメラ化蛋白に対する抗体, すなわちヒト抗キメラ抗体 (human antichimeric antibody; HACA) を克服するため, 完全ヒト化抗体の技術も開発されている.

低分子チロシンキナーゼ阻害剤

Gefinitib (Iressa, ZD1839)

Gefinitib はキナゾリン骨格を持つ, 経口の EGFR チロシンキナーゼ阻害剤である¹⁰⁾. ErbB2, VEGFR など他のチロシンキナーゼに対する作用は 1/100 程度であり, EGFR への選択性が高い (Fig. 1). 非小細胞性肺癌での臨床試験の結果, Gefinitib の効果は EGFR 遺伝子変異と正の相関を示すことが報告されている^{11,12)}.

肝細胞癌における第Ⅱ相臨床試験の結果、31 名中 1 名に PR、7 名に SD を認めたが、全生存期間中央値が 6.5 カ月、無増悪期間が 2.8 カ月であり単独投与では明らかな効果が認められていない¹³⁾。

Erlotinib (Tarceva, OSI774)

Erlotinib も、キナゾリン骨格経口 EGFR チロシンキ

Fig. 1 Molecular targets in EGF family and EGFR family. Targeted agents indicated by arrows.

ナーゼ阻害剤である。他のチロシンキナーゼに対する作用は 1/1000 程度であり、EGFR への選択性が高いことが知られている¹⁴⁾ (Fig. 1)。肝細胞癌における第Ⅱ相臨床試験が 2 つのグループによって報告されている。Philip らによると全生存期間中央値が 13 カ月、奏功率は 59% であった。副作用は皮膚毒性、下痢などを認め、26% に減量が必要であった¹⁵⁾。Thomas らの報告では、全生存期間中 10.75 カ月であったが、副作用による減量は認められなかった。投与効果と EGFR 発現との相関は認められていない¹⁶⁾。

その他、EGFR/ErbB1/Her1 および ErbB2/Her2/Neu のチロシンキナーゼ阻害剤 Lapatinib (Tykerb, GW572016) や BMS-599626 の臨床試験も進められている。

抗体型阻害剤

Cetuximab (Erbitux, IMC-C225)

Cetuximab は、ヒト EGFR に対するマウス IgG1 抗体 M255 の結合ドメイン Fab と、ヒト抗体の定常部 Fc のキメラ化モノクローナル抗体である¹⁷⁾。Cetuximab

Table 1 Molecularly targeted agents for hepatocellular carcinoma

Agent	Classification	Function	Clinical trial
Gefitinib (Iressa)	small molecule compound	EGFR/ErbB1/Her1 tyrosine kinase inhibitor	phase II
Erlotinib (Tarceva, OSI774)	small molecule compound	EGFR/ErbB1/Her1 tyrosine kinase inhibitor	phase II
Lapatinib (Tykerb, GW572016)	small molecule compound	EGFR/ErbB1/Her1 and ErbB2/Her2/Neu tyrosine kinase inhibitor	phase II
BMS-599626	small molecule compound	EGFR/ErbB1/Her1 and ErbB2/Her2/Neu tyrosine kinase inhibitor	phase II
Cetuximab (Tykerb, GW572016)	monoclonal antibody	EGFR/ErbB1/Her1-neutralization	phase II
Sorafenib (Nexabar, BAY43-9006)	small molecule compound	VEGFR2, VEGFR3, PDGFR tyrosine kinase, Raf serine/threonine kinase inhibitor	phase III
Sunitinib (Sutent, SU11248)	small molecule compound	VEGFR1 VEGFR2, PDGFR, Flt-3, c-KIT tyrosine kinase inhibitor	phase II
Valatinib (PTK787/ZK222584)	small molecule compound	VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFR, c-KIT tyrosine kinase inhibitor	phase II
Cediranib (AZD2171)	small molecule compound	VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFR, c-KIT tyrosine kinase inhibitor	phase II
Bevacizumab (Avastin)	monoclonal antibody	VEGF-A-neutralization	phase II
AZD6244 (ARRY-142886)	small molecule compound	MEK serine/threonine · tyrosine kinase inhibitor	phase II
Everolimus (RAD001)	small molecule compound	mTOR serine/threonine kinase inhibitor	phase I/II
Bortezomib (Velcade)	small molecule compound	proteasome inhibitor	phase I/II

Fig. 2 Molecular targets in VEGF family and VEGFR family. Targeted agents indicated by arrows.

はヒト EGFR の細胞外領域に結合するが (Fig. 1), その親和性は EGF, TGF- α などより高く, これら内因性リガンドとの結合を阻害する競合的拮抗剤として作用する. その結果, EGFR の二量体形成, 自己リン酸化が起こらないという質的变化だけでなく, EGFR の細胞内取り込み (internalization), 分解が誘導され, EGFR 数が減少するという量的変化も起こるため, EGFR シグナル伝達経路が阻害される結果となる¹⁸⁾. 肝細胞癌では第 II 相臨床試験の結果, 30 例中 5 例が SD (4.2 カ月) であったが, 全生存期間中央値が 9.6 カ月, 無増悪期間が 1.4 カ月であり単独投与では明らかな効果を認めなかった¹⁹⁾.

VEGF-VEGFR

VEGF は血管内皮細胞の最も強力な増殖因子, 遊走因子の 1 つであり, 前駆細胞や造血幹細胞にも作用する重要な機能を持つ²⁰⁾. リガンドである VEGF ファミリーは, VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, PlGF-1, PlGF-2, そしてウイルス由来の VEGF-E から成立し, VEGF-A, VEGF-B には splicing variant が存在する²¹⁾. レセプターである VEGFR ファミリーには, VEGFR-1/Flt-1, VEGFR-2/KDR/Flk-1, VEGFR-3/Flt-4, などが存在するが (Fig. 2), VEGFR-1, VEGFR-2 は血管発生, 血管新生に関与し, VEGFR-3 はリンパ管新生との関連が報告されている²²⁾.

VEGF-VEGFR は, 多くの腫瘍で亢進している. 我々は肝細胞癌臨床検体を解析し癌部における VEGF 発現が非癌部より高く, vascularity と相関することを報告した²³⁾. 肝細胞癌において腫瘍部の VEGF 抗原陽性が非腫瘍部に比較して高く²⁴⁾, 細胞増殖, 血管浸潤, 多発腫瘍などとの臨床病理学的因子との相関が指摘されている²⁵⁾. さらに VEGF 発現は肝細胞癌の浸潤や転移と相関し²⁶⁾, 術後再発との関連も報告されている²⁷⁾. また, 我々は肝細胞癌の血管新生スイッチには, Angiopoietin 2/Tie2 シグナルが関与することを報告しているが^{28/29)}, その血管新生効果には VEGF シグナルを必要とすることが知られている³⁰⁾.

VEGF 発現は, 癌細胞の微小環境と遺伝子変化によって制御されている. 低酸素状態 (hypoxia) は癌血管新生の鍵となる環境因子であり, hypoxia-induced factors (HIFs) によって VEGF 発現が亢進することが知られている^{31/32)}. 肝細胞癌における VEGF 発現亢進は転写レベルのみならず mRNA 安定性による制御が認められている³³⁾. また, p53 や HBx などが VEGF 発現に関与するとの報告もある^{34/35)}. さらに, 炎症メディエーターを誘導する cyclooxygenase-2 (Cox-2) も VEGF 発現を促進することが知られている³⁶⁾. また, VEGF のレセプター VEGFR1 (Flt-1), VEGFR2 (KDR/Flk-1) が, 肝組織における血管内皮細胞だけではなく, 肝癌細胞においても発現していることが報告されている³⁷⁾. VEGF は, 血管系のみならず肝細胞癌そのものの浸潤能亢進に関与することが示唆されている³⁸⁾.

最近, VEGF によって刺激された造血幹細胞が転移形成にも作用していることが報告された³⁹⁾. 転移に先立ち間質細胞が細胞外基質を蓄積し, VEGF レセプター 1 を発現した造血幹細胞が, そのインテグリンによって間質の基質と結合して, クラスターを形成し (pre-metastatic niche), MMP-9 発現を促して癌転移を誘導する^{39/40)}. このように, VEGF シグナルは血管新生のみならず, 血液由来前駆細胞を介した癌の浸潤・転移そのものを規定する可能性が明らかとなり, その重要性が益々高まっている⁴¹⁾. VEGF シグナル伝達系の分子標的剤の開発には, リガンドである VEGF に対する抗体型阻害剤と, VEGFR チロシキナーゼに対する低分子阻害剤が挙げられる⁴²⁾. 低分子チロシキナーゼ阻害剤には, VEGFR に対する選択的阻害剤だけではなく, 複数のチロシキナーゼを標的とした“マルチターゲット阻害剤”の開発が注目されている⁴³⁾.

Fig. 3 Molecular targets in MAPK and PI3K signal transduction pathways stimulated by the receptor tyrosine kinases. Targeted agents indicated by arrows.

低分子チロシンキナーゼ阻害剤

Sorafenib (Nexavar, BAY43-9006)

Sorafenib は VEGFR-2, VEGFR-3, Flt-3, PDGFR, FGFR-1 などのレセプター・チロシンキナーゼの他に, Ras/Raf/MEK/MAPK 経路の Raf キナーゼを阻害するユニークな性質を併せ持つマルチターゲット阻害剤である⁴⁴⁾⁴⁵⁾ (Fig. 2, Fig. 3). 腎細胞癌を始めとする固形癌で有効性が示されており, 本邦でも認可される方針である⁴⁶⁾. 肝細胞癌における単剤投与の第 II 相臨床試験で効果を認め⁴⁷⁾, 最近, 第 III 相臨床試験 SHARP (Sorafenib HCC Assessment Randomized Protocol) の結果が報告された⁴⁸⁾. 肝細胞癌 602 例を対象にして Sorafenib 経口投与群とプラセボ投与群を無作為に割り付けて検討した結果 (299 例 vs. 303 例), Sorafenib 投与群では全生存期間中央値が 10.7 カ月であり, プラセボ群 7.9 カ月に比較して 44% 延長した (HR=0.69, $p=0.00058$). 増殖抑制期間も Sorafenib 投与群では 6 カ月であり, プラセボ群 3.1 カ月に比較して改善を認め (HR=0.58, $p=0.000007$), 肝細胞癌に対する新しい治療戦略として注目を集めている. 副作用は皮膚毒性, 消化管毒性 (食欲不振, 下痢) などであり, 他の抗瘍剤併用にも耐用可能とされている. 本邦において TAE 併用の臨床試験が進められている.

Sunitinib (Sutent, SU11248)

Sunitinib はインドリノン骨格を有し, VEGFR-1,

VEGFR-2, PDGFR, c-Kit, Flt-3, RET などのスプリット-キナーゼ・ドメインファミリーのチロシンキナーゼを阻害するマルチターゲット阻害剤である⁴⁹⁾ (Fig. 2). c-Kit 阻害剤 Imatinib に耐性を示す GIST を対象とした臨床試験が本邦でも進められている⁵⁰⁾. 切除不能肝細胞癌に対して, Sunitinib 単剤投与の第 II 相臨床試験の結果が報告された⁵⁰⁾⁵¹⁾. Sunitinib 50 mg/日を 4 週経口投与, 2 週休薬を 1 クールとして, 切除不能肝細胞癌患者 37 名に投与した結果, SD を 18 名に認めた. PR は 1 名, 3 カ月以上の SD は 13 名であった. 全生存期間は 45 週であり, 25 名に腫瘍密度の減少を認め, 今後の臨床展開が期待されている. 有害事象 Grade 3/4 のうち, 血小板減少症を 35%, 好中球減少症を 24% に認めており, 他の分子標的剤に比べて骨髄抑制が強い傾向を示す.

Vatalanib (PTK787/ZK222584)

Vatalanib はキナゾリン骨格を有し, VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFR, c-Kit のチロシンキナーゼに対する経口阻害剤である⁵¹⁾⁵²⁾ (Fig. 2). 肝癌細胞に対して in vitro, in vivo の抑制効果があり, 血管新生以外の作用も報告されている⁵³⁾. 転移性結腸癌で化学療法併用として有効性が報告されており⁵⁴⁾⁵⁵⁾, 肝細胞癌での第 II 相臨床試験が進められている⁵⁶⁾.

Cediranib (AZD2171)

Cediranib も VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFR, c-Kit のチロシンキナーゼに対する経口阻害剤

である⁵⁷⁾。肝細胞癌での第II相臨床試験が報告されたが、28名中19名に副作用を認め、そのうち16名が倦怠感、高血圧、食欲不振などGrade3であった³⁾。現在、減量した臨床試験が計画されている。

抗体型阻害剤

Bevacizumab (Avastin)

Bevacizumabは、ヒトVEGF-Aの全アイソフォームを特異的に認識するヒト化モノクローナル抗体である⁵⁸⁾(Fig. 3)。マウスIgG1結合ドメインFabの超可変部は3%で、残りの97%はヒト由来蛋白から成り立っている。近年、Bevacizumabと抗癌剤イリノテカン、5-FU、ロイコボリン併用治療が、大腸癌肝転移の第III相臨床試験にて有効であることが確認され、一層の注目を集めるに至っている⁵⁹⁾。肝細胞癌に対するBevacizumab単独投与の第I相臨床試験では、25例中2例にPR、18例にSDを認め、増殖抑制期間は6.5カ月であった⁶⁰⁾。第II相臨床試験では、24例中3例にPR、7例に少なくとも16カ月間のSDを認めている⁶¹⁾。最近、切除不能や転移を伴う肝細胞癌患者に対してBevacizumabとgemcitabine+oxaplatin抗癌剤併用療法(GEMOX)を施行した第II相臨床試験の結果、併用効果を認めることが報告された⁶²⁾。また、Erlotinib⁶³⁾、capecitabine⁶⁴⁾、capecitabine+oxaliplatin⁶⁵⁾などとの併用療法の第II相臨床試験も始まっている。

細胞内シグナル伝達経路

増殖因子レセプター型チロシンキナーゼから惹起される、典型的なシグナル伝達経路をFig. 3に示した⁶⁶⁾。チロシンキナーゼは自己リン酸化により、Grb2やp85-PI3キナーゼなど主にSH2ドメイン含有蛋白質と特異的に会合し、その構造や局在の変化などにより次々とシグナルを伝えていく⁶⁷⁾。アダプター分子Grb2はSH3ドメインによりSOSを細胞膜下に局在化させ、SOSによりRasをGDP型からGTP型に変換して活性化させる⁶⁸⁾。Rasはフェルネシル化されて細胞膜下に局在しているが、このフェルネシルトランスフェラーゼに対する阻害剤も開発され、膵癌などで臨床試験が進められている⁶⁹⁾。活性化型Rasはセリン・スレオニンキナーゼRafを活性化させる。マルチキナーゼ阻害剤Sorafenibには、Rafキナーゼに対する阻害活性が認められる⁴⁴⁾⁴⁵⁾。活性化型Rafは二重特異性キナーゼMEKのセリンをリン酸化して活性化するが、MEK阻害剤も開発されておりAZD6244 (ARRY-142886)を用いた肝細胞癌第II相臨

床試験も始まっている(NCT00550719)。活性化されたMEKは、Erk1、Erk2といったMAPキナーゼのスレオニン、チロシンをリン酸化し、Erkは核内移行して転写因子を活性化する。この一連のシグナル伝達は、肝細胞癌の増殖に必須である⁷⁰⁾⁷¹⁾。

PI3キナーゼはSH2、SH3ドメインを持つアダプターサブユニットp85と、酵素サブユニットp110からなるヘテロダイマーであるが、その活性化によりPIP2がリン酸化されてPIP3が生成され、PIP3に結合するPDKとAktを細胞膜下に局在化させる⁷²⁾⁷³⁾。Cowden病の原因遺伝子である癌抑制遺伝子PTEN産物は、PIP3を脱リン酸化して負に制御している。AktはPDKにより活性化型となり、mTOR、IKK、Bad、GSK3など様々な蛋白をリン酸化して細胞増殖やアポトーシス阻害などのシグナル伝達を誘導し、肝細胞癌の維持に必須である⁷⁴⁾⁷⁵⁾。セリン・スレオニンキナーゼmTOR(mammalian target of Rapamycin)は4E-BP1やp70S6Kといった翻訳開始分子を制御し、新たな分子標的として注目されている⁷⁶⁾。免疫抑制剤RapamycinはイムノフィリンFKBP12(FK506-binding protein 12)と複合体を形成してmTOR活性を抑制するが、その誘導体としてmTOR阻害剤Temozolomide(CCI-779)や経口剤Everolimus(RAD001)などが開発されている⁷⁷⁾⁷⁸⁾。癌細胞の増殖抑制のみならず血管内皮細胞のVEGF活性も抑制するため血管新生阻害剤としても注目されている⁷⁹⁾。肝細胞癌に対しては、RapamycinとBevacizumab併用の第I相臨床試験や(NCT00467194)、Everolimusの第I/II相臨床試験が進められている⁸⁰⁾。

Nuclear factor- κ B(NF- κ B)はinhibitory κ B(I κ B)との結合により抑制されている⁸¹⁾。I κ Bが活性化IKK(I κ Bキナーゼ)によりリン酸化されると、ユビキチン修飾を受け26Sプロテアソームによって蛋白分解されるため、NF- κ Bは核内へ移行して転写因子として機能するようになる。NF- κ Bの標的遺伝子にはサイトカイン、VEGF、Bcl-2、Cox2などがあり、細胞増殖やアポトーシス抑制に働き、肝細胞癌発生においても重要な役割を持つことが明らかとなっている⁸²⁾。このユビキチン-プロテアソームシステムによって分解される蛋白には、I κ Bの他にもp53、CDK阻害分子など多くの細胞内蛋白が知られており⁸³⁾、重要な分子標的として注目されている。26Sプロテアソームは蛋白分解コア(20S)と活性化因子(19S)の複合体であるが、低分子化合物Bortezomib(Velcade, PS-341)は、20S蛋白分解コアに直接結合して酵素活性を阻害する分子標的剤として開発

Fig. 4 Gene expression analysis using cDNA microarray in relation to HCC recurrence exceeding Milan criteria. (A) The hierarchical clustering of primary hepatocellular carcinoma with recurrence exceeding the Milan criteria. The patients with aggressive recurrence clustered on the right. (B) Representative array-CGH profiles from samples demonstrating either low (upper panel) or high (lower panel). FGA: fraction of genome altered (FGA).

された⁸⁴⁾。静注された Bortezomib は速やかに臓器に拡散するが、脳、脊髄、精巣、眼内には取り込まれない。そのユニークな作用機序は、他の化学療法剤作用とは独立しており併用効果も期待される。既に多発性骨髄腫への臨床応用が始まっており、肝細胞癌でも第 I/II 相臨床試験が進められている⁸⁵⁾。

新しく注目される分子標的

肝細胞癌は治療切除後であっても再発率が高いが、再発しても再切除やラジオ波焼灼などの根治的治療が可能であれば、比較的予後が良好である⁸⁶⁾。あるいはいわゆるミラノ基準内であれば、サルベージ肝移植といった選択も可能であり、例え肝機能が低下していても良好な予後が期待できる⁸⁷⁾。しかしながら、適切な再発治療が出来ない場合の予後は極めて悪い。2000 年 4 月からの当科における肝細胞癌の初回手術症例 260 例について解析すると、術後再発を 111 例に認めている。再発形態をミラノ基準によって分類すると、再発診断時にミラノ基準内の再発であった症例は 64 例で 5 年生存率は 68.6% であったが、いきなりミラノ基準外の再発をきたした症例 47 例の 5 年生存率はわずか 12.7% である⁸⁸⁾。このように肝切除症例の予後は、その再発形態が大きく左右している。再発がミラノ基準内である限りにおいては治療選択も多く予後が期待できるが、ミラノ基準外となれば治療抵抗性であり死に直結する。肝

細胞癌の治療戦略には再発形態を予測することが重要であるが、それは可能であろうか？

そこで我々は、ミラノ基準外再発症例を分子生物学的に解析した⁸⁹⁾。cDNA マイクロアレイによる網羅的発現解析により、101 個の遺伝子発現パターンがミラノ基準外再発と相関し、その最も有意な遺伝子として分裂期キナーゼの 1 つ Aurora kinase B を同定した (Fig. 4A)。免疫組織学的解析により Aurora kinase B 蛋白は肝癌細胞に強く発現し、多変量解析の結果ミラノ基準外再発を規定する唯一の独立因子と認められた。Aurora kinase B の異常は aneuploidy を誘発し、染色体不安定性が起きることが報告されているが、CGH アレイ解析の結果 Aurora kinase B 発現と不安定性に有意な相関を認めている (Fig. 4B)。

細胞分裂は主として蛋白質のリン酸化と分解という二種類の化学反応によって厳密に調整されている⁹⁰⁾。このリン酸化を担う分裂期キナーゼには、Cyclin-CDK, Aurora kinase, Polo kinase, NimA kinase など一群のセリン・スレオニンキナーゼが知られているが、様々な基質のリン酸化により分裂の促進やチェックポイントといった複雑なイベントを制御している。ヒト Aurora kinase には A, B, C の 3 種類が存在する⁹⁰⁾。Aurora kinase B は INCENP, Borealin, Survivin/BIRC5 とコンプレックスを形成し、分裂期では染色体に乗って移動し、中途から動原体を經由して微小管に乗り換え、

Fig. 5 Aurora kinase B localization and function during cell cycle. Black spots: the chromosomal passenger Aurora kinase B. The target substrates in italic.

最終的には分裂溝に局在するという、列車を乗り換えるような特徴的な移動を示すことから「染色体パッセンジャー」と呼ばれている⁹¹⁾。細胞分裂の各時期における Aurora kinase B の局在と、その代表的基質を Fig. 5 に示した。分裂前期(prophase)では、Aurora kinase B はコンデンシンやクロマチン蛋白質ヒストンをリン酸化して、染色体凝縮や形成に制御している。分裂中期(metaphase)では Aurora kinase B は紡錘体チェックポイントにおける微小管と動原体の連結を制御し、整然とした染色体の分配を遂行する。さらに分裂終期(telophase)においても、MgcRacGAP, Myosin II regulatory light chain, Vimentin, Desimin などリン酸化し、細胞質分裂の最後まで重要な役割を持つと考えられている。

Aurora キナーゼの異常発現は多くの癌種で報告されており、重要な分子標的として注目されている⁹²⁾。Aurora キナーゼ全体の阻害剤として MK-0457 (VX-680) が開発されたが、第 II 相臨床試験において心副作用の可能性が指摘されている⁹³⁾。Aurora kinase B 阻害効果はより癌細胞特異性が高いことが報告され、その特異的阻害剤も開発されている⁹⁴⁾。我々の解析でも肝細胞癌の前臨床試験において Aurora kinase B 特異的阻害剤の高い有効性を示しており、慢性骨髄性白血病などで第 I 相臨

床試験が始まっている。

結 語

2003 年 4 月 14 日、ヒトゲノム計画の完全終了が宣言され、ヒト遺伝子の 99% が 99.99% 以上の精度で解読された⁹⁵⁾。さらに、蛋白蛋白間、蛋白遺伝子間などの相互作用の情報も蓄積され、BIND や KEGG といったデータベース化が進んでいる⁹⁶⁾。設計図と回線表が手に入ったポストゲノム時代において、分子標的剤の開発は最も重要な課題の 1 つである^{95/97)}。当初、分子標的剤は cytostatic drug と呼ばれ、腫瘍縮小効果は乏しく SD の維持作用しかないと考えられていた。ところが実際に臨床応用が始まると、腫瘍縮小効果が十分にあることが報告され、さらに従来の化学療法との併用にも適応が高いことも示され、分子標的剤の開発に一層拍車がかかっている。近年、肝細胞癌は米国でも増加しており⁹⁸⁾、メタボリックシンドロームを基盤とした NASH の増加と肝細胞癌の発生が問題となっている⁹⁹⁾。臨床解析に基づく分子標的の同定と、新たな治療開発が急務である。

文 献

- 1) Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell 2000; 100: 57-70

- 2) Sawyers C. Targeted cancer therapy. *Nature* 2004; 432: 294—297
- 3) Zhu AX. Development of sorafenib and other molecularly targeted agents in hepatocellular carcinoma. *Cancer* 2008; 112: 250—259
- 4) Tanaka S, Sugimachi K, Maehara S, et al. Oncogenic signal transduction and therapeutic strategy for hepatocellular carcinoma. *Surgery* 2002; 131: S142—147
- 5) Normanno N, De Luca A, Bianco C, et al. Epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling in cancer. *Gene* 2006; 366: 2—16
- 6) Yamaguchi R, Yano H, Iemura A, et al. Expression of vascular endothelial growth factor in human hepatocellular carcinoma. *Hepatology* 1998; 28: 68—77
- 7) Marshall J. Clinical implications of the mechanism of epidermal growth factor receptor inhibitors. *Cancer* 2006; 107: 1207—1218
- 8) Ciardiello F, Tortora G. EGFR antagonists in cancer treatment. *N Engl J Med* 2008; 358: 1160—1174
- 9) Fan Z, Mendelsohn J. Therapeutic application of anti-growth factor receptor antibodies. *Curr Opin Oncol* 1998; 10: 67—73
- 10) Couzin J. Cancer drugs. Smart weapons prove tough to design. *Science* 2002; 298: 522—525
- 11) Paez JG, Janne PA, Lee JC, et al. EGFR mutations in lung cancer: correlation with clinical response to gefitinib therapy. *Science* 2004; 304: 1497—1495
- 12) Lynch TJ, Bell DW, Sordella R, et al. Activating mutations in the epidermal growth factor receptor underlying responsiveness of non-small-cell lung cancer to gefitinib. *N Engl J Med* 2004; 350: 2129—2139
- 13) O'Dwyer PJ, Giantonio BJ, Levy DE, et al. Gefitinib in advanced unresectable hepatocellular carcinoma: results from the Eastern Cooperative Oncology Group's Study E1203. *J Clin Oncol (Meeting Abstracts)* 2006; 24: Abstract 4143
- 14) Moyer JD, Barbacci EG, Iwata KK, et al. Induction of apoptosis and cell cycle arrest by CP-358,774, an inhibitor of epidermal growth factor receptor tyrosine kinase. *Cancer Res* 1997; 57: 4838—4848
- 15) Philip PA, Mahoney MR, Allmer C, et al. Phase II study of Erlotinib (OSI-774) in patients with advanced hepatocellular cancer. *J Clin Oncol* 2005; 23: 6657—6663
- 16) Thomas MB, Chadha R, Glover K, et al. Phase 2 study of erlotinib in patients with unresectable hepatocellular carcinoma. *Cancer* 2007; 110: 1059—1067
- 17) Prewett M, Rockwell P, Rockwell RF, et al. The biologic effects of C225, a chimeric monoclonal antibody to the EGFR, on human prostate carcinoma. *J Immunother Emphasis Tumor Immunol* 1996; 19: 419—427
- 18) Riemer AB, Kurz H, Klinger M, Scheiner O, Zielinski CC, Jensen-Jarolim E. Vaccination with cetuximab mimotopes and biological properties of induced anti-epidermal growth factor receptor antibodies. *J Natl Cancer Inst* 2005; 97: 1663—70
- 19) Zhu AX, Stuart K, Blaszkowsky LS, et al. Phase 2 study of cetuximab in patients with advanced hepatocellular carcinoma. *Cancer* 2007; 110: 581—589
- 20) Kowanetz M, Ferrara N. Vascular endothelial growth factor signaling pathways: therapeutic perspective. *Clin Cancer Res* 2006; 12: 5018—5022
- 21) Shibuya M, Claesson-Welsh L. Signal transduction by VEGF receptors in regulation of angiogenesis and lymphangiogenesis. *Exp Cell Res* 2006; 312: 549—560
- 22) Tammela T, Enholm B, Alitalo K, et al. The biology of vascular endothelial growth factors. *Cardiovasc Res* 2005; 65: 550—563
- 23) Mise M, Arai S, Higashitani H, et al. Clinical significance of vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor gene expression in liver tumor. *Hepatology* 1996; 23: 455—464
- 24) Park YN, Kim YB, Yang KM, et al. Increased expression of vascular endothelial growth factor and angiogenesis in the early stage of multistep hepatocarcinogenesis. *Arch Pathol Lab Med* 2000; 124: 1061—1065
- 25) Ng IO, Poon RT, Lee JM, et al. Microvessel density, vascular endothelial growth factor and its receptors Flt-1 and Flk-1/KDR in hepatocellular carcinoma. *Am J Clin Pathol* 2001; 116: 838—845
- 26) Li XM, Tang ZY, Zhou G, et al. Significance of vascular endothelial growth factor mRNA expression in invasion and metastasis of hepatocellular carcinoma. *J Exp Clin Cancer Res* 1998; 17: 13—17
- 27) El Assal ON, Yamanoi A, Soda Y, et al. Clinical significance of microvessel density and vascular endothelial growth factor expression in hepatocellular carcinoma. *Cancer* 2007; 110: 1059—1067

- lar carcinoma and surrounding liver: possible involvement of vascular endothelial growth factor in the angiogenesis of cirrhotic liver. *Hepatology* 1998; 27: 1554—1562
- 28) Tanaka S, Mori M, Sakamoto Y, et al. Biologic significance of angiopoietin-2 expression in human hepatocellular carcinoma. *J Clin Invest* 1999; 103: 341—345
- 29) Tanaka S, Sugimachi K, Yamashita Yi, et al. Tie2 vascular endothelial receptor expression and function in hepatocellular carcinoma. *Hepatology* 2002; 35: 861—867
- 30) Holash J, Maisonpierre PC, Compton D, et al. Vessel cooption, regression, and growth in tumors mediated by angiopoietins and VEGF. *Science* 1999; 284: 1994—1998
- 31) Sugimachi K, Tanaka S, Taguchi K, et al. Angiopoietin switching regulates angiogenesis and progression of human hepatocellular carcinoma. *J Clin Pathol* 2003; 56: 854—860
- 32) Yasuda S, Arii S, Mori A, et al. Hexokinase II and VEGF expression in liver tumors: correlation with hypoxia-inducible factor 1 alpha and its significance. *J Hepatol* 2004; 40: 117—123
- 33) von Marschall Z, Cramer T, Hocker M, et al. Dual mechanism of vascular endothelial growth factor upregulation by hypoxia in human hepatocellular carcinoma. *Gut* 2001; 48: 87—96
- 34) Tsukamoto A, Kaneko Y, Yoshida T, et al. Regulation of angiogenesis in human hepatomas: possible involvement of p53-inducible inhibitor of vascular endothelial cell proliferation. *Cancer Lett* 1999; 141: 79—84
- 35) Lee SW, Lee YM, Bae SK, et al. Human hepatitis B virus X protein is a possible mediator of hypoxia-induced angiogenesis in hepatocarcinogenesis. *Biochem Biophys Res Commun* 2000; 268: 456—461
- 36) Tsujii M, Kawano S, Tsuji S, et al. Cyclooxygenase regulates angiogenesis induced by colon cancer cells. *Cell* 1998; 93: 705—716
- 37) Schmitt M, Horbach A, Kubitz R, et al. Disruption of hepatocellular tight junctions by vascular endothelial growth factor (VEGF): a novel mechanism for tumor invasion. *J Hepatol* 2004; 41: 274—283
- 38) Arii S. Role of vascular endothelial growth factor on the invasive potential of hepatocellular carcinoma. *J Hepatol* 2004; 41: 333—335
- 39) Kaplan RN, Riba RD, Zacharoulis S, et al. VEGFR1-positive haematopoietic bone marrow progenitors initiate the pre-metastatic niche. *Nature* 2005; 438: 820—827
- 40) Hiratsuka S, Watanabe A, Aburatani H, et al. Tumour-mediated upregulation of chemoattractants and recruitment of myeloid cells predetermines lung metastasis. *Nat Cell Biol* 2006; 8: 1369—1375
- 41) Gao D, Nolan DJ, Mellick AS, et al. Endothelial progenitor cells control the angiogenic switch in mouse lung metastasis. *Science* 2008; 319: 195—198
- 42) Ferrara N. VEGF and the quest for tumour angiogenesis factors. *Nat Rev Cancer* 2002; 2: 795—803
- 43) Hicklin DJ, Ellis LM. Role of the vascular endothelial growth factor pathway in tumor growth and angiogenesis. *J Clin Oncol* 2005; 23: 1011—1027
- 44) Wilhelm SM, Carter C, Tang L, et al. BAY 43-9006 exhibits broad spectrum oral antitumor activity and targets the RAF/MEK/ERK pathway and receptor tyrosine kinases involved in tumor progression and angiogenesis. *Cancer Res* 2004; 64: 7099—7109
- 45) Liu L, Cao Y, Chen C, et al. Sorafenib blocks the RAF/MEK/ERK pathway, inhibits tumor angiogenesis, and induces tumor cell apoptosis in hepatocellular carcinoma model PLC/PRF/5. *Cancer Res* 2006; 66: 11851—11858
- 46) Bracarda S, Caserta C, Sordini L, et al. Protein kinase inhibitors in the treatment of renal cell carcinoma: sorafenib. *Ann Oncol* 2007; 18 suppl 6: vi22—25
- 47) Abou-Alfa GK, Schwartz L, Ricci S, et al. Phase II study of sorafenib in patients with advanced hepatocellular carcinoma. *J Clin Oncol* 2006; 24: 4293—4300
- 48) Llovet J, Ricci S, Mazzaferro V, et al. Sorafenib improves survival in advanced hepatocellular carcinoma (HCC): results of a phase III randomized placebo-controlled trial (SHARP trial). *J Clin Oncol* (Meeting Abstracts) 2007; 25: Abstract LBA1
- 49) Mendel DB, Laird AD, Xin X, et al. In vivo antitumor activity of SU11248, a novel tyrosine kinase inhibitor targeting vascular endothelial growth factor and platelet-derived growth factor receptors:

- determination of a pharmacokinetic/pharmacodynamic relationship. *Clin Cancer Res* 2003; 9: 327—337
- 50) Goodman VL, Rock EP, Dagher R, et al. Approval summary: sunitinib for the treatment of imatinib refractory or intolerant gastrointestinal stromal tumors and advanced renal cell carcinoma. *Clin Cancer Res* 2007; 13: 1367—1373
- 51) Wood JM, Bold G, Buchdunger E, et al. PTK787/ZK 222584, a novel and potent inhibitor of vascular endothelial growth factor receptor tyrosine kinases, impairs vascular endothelial growth factor-induced responses and tumor growth after oral administration. *Cancer Res* 2000; 60: 2178—2189
- 52) Yang ZF, Poon RT, Liu Y, et al. High doses of tyrosine kinase inhibitor PTK787 enhance the efficacy of ischemic hypoxia for the treatment of hepatocellular carcinoma: dual effects on cancer cell and angiogenesis. *Mol Cancer Ther* 2006; 5: 2261—2270
- 53) Liu Y, Poon RT, Li Q, et al. Both antiangiogenesis and angiogenesis-independent effects are responsible for hepatocellular carcinoma growth arrest by tyrosine kinase inhibitor PTK787/ZK222584. *Cancer Res* 2005; 65: 3691—3699
- 54) Koehne C, Bajetta E, Lin E, et al. Final results of CONFIRM 2: A multinational, randomized, double-blind, phase III study in 2nd line patients (pts) with metastatic colorectal cancer (mCRC) receiving FOLFOX4 and PTK787/ZK 222584 (PTK/ZK) or placebo. *Proc Am Soc Clin Oncol* 2007; 4033a
- 55) Koehne C, Bajetta E, Lin E, et al. Results of an interim analysis of a multinational randomized, double-blind, phase III study in patients (pts) with previously treated metastatic colorectal cancer (mCRC) receiving FOLFOX4 and PTK787/ZK 222584 (PTK/ZK) or placebo (CONFIRM 2). *Proc Am Soc Clin Oncol* 2006; 3508a
- 56) Koch I, Baron A, Roberts S, et al. Influence of Hepatic Dysfunction on Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of PTK787/ZK 222584 in Patients with Unresectable Hepatocellular Carcinoma (HCC). *J Clin Oncol* 2005; 23 suppl 16: 4134
- 57) Wedge SR, Kendrew J, Hennequin LF, et al. AZD 2171: a highly potent, orally bioavailable, vascular endothelial growth factor receptor-2 tyrosine kinase inhibitor for the treatment of cancer. *Cancer Res* 2005; 65 (10): 4389—4400
- 58) Willett CG, Boucher Y, di Tomaso E, et al. Direct evidence that the VEGF-specific antibody bevacizumab has antivascular effects in human rectal cancer. *Nat Med* 2004; 10: 145—147
- 59) Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novotny W, et al. Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. *N Engl J Med* 2004; 350: 2335—2342
- 60) Schwartz JD, Schwartz M, Lehrer D, et al. Bevacizumab in unresectable hepatocellular carcinoma (HCC) for patients without metastasis and without invasion of the portal vein. *J Clin Oncol (Meeting Abstracts)* 2006; 24: Abstract 4144
- 61) Malka D, Dromain C, Farace F, et al. Bevacizumab in patients (pts) with advanced hepatocellular carcinoma (HCC): preliminary results of a phase II study with circulating endothelial cell (CEC) monitoring. *J Clin Oncol (Meeting Abstracts)* 2007; 25: Abstract 4570
- 62) Zhu AX, Blaszkowsky LS, Ryan DP, et al. Phase II study of gemcitabine and oxaliplatin in combination with bevacizumab in patients with advanced hepatocellular carcinoma. *J Clin Oncol* 2006; 24: 1898—1903
- 63) Thomas MB, Chadha R, Iwasaki M, et al. The combination of bevacizumab (B) and erlotinib (E) shows significant biological activity in patients with advanced hepatocellular carcinoma (HCC). *J Clin Oncol (Meeting Abstracts)* 2007; 25: Abstract 4567
- 64) Hsu C, Yang T, Hsu C, et al. Modified-dose capecitabine + bevacizumab for the treatment of advanced / metastatic hepatocellular carcinoma (HCC): a phase II, single-arm study. *J Clin Oncol (Meeting Abstracts)* 2007; 25: Abstract 15190
- 65) Sun W, Haller DG, Mykulowycz K, et al. Combination of capecitabine, oxaliplatin with bevacizumab in treatment of advanced hepatocellular carcinoma (HCC): a phase II study. *J Clin Oncol (Meeting Abstracts)* 2007; 25: Abstract 4574
- 66) Farazi PA, DePinho RA. Hepatocellular carcinoma pathogenesis: from genes to environment. *Nat Rev Cancer* 2006; 6: 674—687
- 67) Pawson T. Specificity in signal transduction: from phosphotyrosine-SH2 domain interactions to complex cellular systems. *Cell* 2004; 116: 191—203

- 68) Rowinsky EK, Windle JJ, Von Hoff DD. Ras protein farnesyltransferase: A strategic target for anticancer therapeutic development. *J Clin Oncol* 1999; 17: 3631—3652
- 69) Macdonald JS, McCoy S, Whitehead RP, et al. A phase II study of farnesyl transferase inhibitor R115777 in pancreatic cancer: a Southwest oncology group (SWOG 9924) study. *Invest New Drugs* 2005; 23: 485—487
- 70) Tanaka S, Ito T, Wands JR. Neoplastic transformation induced by insulin receptor substrate-1 overexpression requires an interaction with Grb2 and Syp signaling molecules. *Journal of Biol Chem* 1996; 271: 14610—14616
- 71) Tanaka S, Smidt EV, Mohr L, et al. Biological effects of human insulin receptor substrate-1 overexpression in hepatocytes. *Hepatology* 1997; 26: 598—604
- 72) Jiang BH, Liu LZ. PI3K/PTEN signaling in tumorigenesis and angiogenesis. *Biochim Biophys Acta* 2008; 1784: 150—158
- 73) Luo J, Manning BD, Cantley LC. Targeting the PI3K-Akt pathway in human cancer: rationale and promise. *Cancer Cell* 2003; 4: 257—262
- 74) Tanaka S, Wands JR. A carboxy-terminal truncated IRS-1 dominant negative protein reverses the human hepatocellular carcinoma malignant phenotype. *J Clin Invest* 1996; 98: 2100—2108
- 75) Tanaka S, Wands JR. Insulin receptor substrate-1 overexpression in human hepatocellular carcinoma cells prevents transforming growth factor-beta1 induced apoptosis. *Cancer Res* 1996; 56: 3391—3394
- 76) Chiang GG, Abraham RT. Targeting the mTOR signaling network in cancer. *Trends Mol Med* 2007; 13: 433—442
- 77) Raymond E, Alexandre J, Faivre S, et al. Safety and pharmacokinetics of escalated doses of weekly intravenous infusion of CCI-779, a novel mTOR inhibitor, in patients with cancer. *J Clin Oncol* 2004; 22: 2336—2347
- 78) Beuvink I, Boulay A, Fumagalli S, et al. The mTOR inhibitor RAD001 sensitizes tumor cells to DNA-damaged induced apoptosis through inhibition of p21 translation. *Cell* 2005; 120: 747—759
- 79) Frost P, Shi Y, Hoang B, et al. AKT activity regulates the ability of mTOR inhibitors to prevent angiogenesis and VEGF expression in multiple myeloma cells. *Oncogene* 2007; 26: 2255—2262
- 80) Hopfner M, Schuppan D, Scherubl H. Growth factor receptors and related signalling pathways as targets for novel treatment strategies of hepatocellular cancer. *World J Gastroenterol* 2008; 14: 1—14
- 81) Luo JL, Kamata H, Karin M. IKK/NF-kappaB signaling: balancing life and death—a new approach to cancer therapy. *J Clin Invest* 2005; 115: 2625—2632
- 82) Maeda S, Kamata H, Luo JL, et al. IKKbeta couples hepatocyte death to cytokine-driven compensatory proliferation that promotes chemical hepatocarcinogenesis. *Cell* 2005; 121: 977—990
- 83) Rajkumar SV, Richardson PG, Hideshima T, et al. Proteasome inhibition as a novel therapeutic target in human cancer. *J Clin Oncol* 2005; 23: 630—639
- 84) Teicher BA, Ara G, Herbst R, et al. The proteasome inhibitor PS-341 in cancer therapy. *Clin Cancer Res* 1999; 5: 2638—2645
- 85) Hegewisch-Becker S, Sterneck M, Schubert U, et al. Phase I/II trial of bortezomib in patients with unresectable hepatocellular carcinoma. *J Clin Oncol* 2004; ASCO annual meeting proceedings: 22 suppl 15: 4089
- 86) Shimada M, Takenaka K, Taguchi K, et al. Prognostic factors after repeat hepatectomy for recurrent hepatocellular carcinoma. *Ann Surg* 1998; 227: 80—85
- 87) Belghiti J, Cortes A, Abdalla EK, et al. Resection prior to liver transplantation for hepatocellular carcinoma. *Ann Surg* 2003; 238: 885—893
- 88) Tanaka S, Noguchi N, Ochiai T, et al. Outcomes and recurrence of initially resection of hepatocellular carcinoma meeting Milan criteria: Rationale for partial hepatectomy as first strategy. *J Am Coll Surg* 2007; 204: 1—6
- 89) Tanaka S, Arii S, Yasen M, et al. Aurora kinase B is a predictive factor for aggressive recurrence of hepatocellular carcinoma after curative hepatectomy. *Br J Surg*, in press
- 90) Malumbres M, Barbacid M. Cell cycle kinases in cancer. *Curr Opin Genet Dev* 2007; 17: 60—65
- 91) Ruchaud S, Carmena M, Earnshaw WC. Chromosomal passengers: conducting cell division. *Nat Rev*

- Mol Cell Biol 2007; 8: 798—812
- 92) Keen N, Taylor S. Aurora-kinase inhibitors as anti-cancer agents. *Nat Rev Cancer* 2004; 4: 927—936
- 93) Harrington EA, Bebbington D, Moore J, et al. VX-680, a potent and selective small-molecule inhibitor of the Aurora kinases, suppresses tumor growth in vivo. *Nat Med* 2004; 10: 262—267
- 94) Girdler F, Gascoigne KE, Eyers PA, et al. Validating Aurora B as an anti-cancer drug target. *J Cell Sci* 2006; 119: 3664—3675
- 95) Collins FS, Green ED, Guttmacher AE, et al; US National Human Genome Research Institute. A vision for the future of genomics research. *Nature* 2003; 422: 835—847
- 96) Rivenbark AG, Coleman WB. Dissecting the molecular mechanisms of cancer through bioinformatics-based experimental approaches. *J Cell Biochem* 2007; 101: 1074—1086
- 97) Aoki-Kinoshita KF, Kanehisa M. Bioinformatics approaches in glycomics and drug discovery. *Curr Opin Mol Ther* 2006; 8: 514—520
- 98) Ince N, Wands JR. The increasing incidence of hepatocellular carcinoma. *N Engl J Med* 1999; 340: 798—799
- 99) Bugianesi E, Leone N, Vanni E, et al. Expanding the natural history of nonalcoholic steatohepatitis: from cryptogenic cirrhosis to hepatocellular carcinoma. *Gastroenterology* 2002; 123: 134—140

Molecularly targeted therapy for hepatocellular carcinoma

Shinji Tanaka, Shigeki Arii

Key words: EGFR VEGF VEGFR signal transduction Aurora kinase B

Kanzo 2008; 49: 133—144

Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery, Tokyo Medical and Dental University