新しい肝疾患診断法

<司 会> 三 辺 謙 (慶大)

1. 肝表面を中心とする形態学的診断

川 村 耕 造*

肝表面の形態学的診断は目下、Kalk の分類を中心に
行われている。しかし演者の経験によれば Kalk の分類

の腹腔鏡診断に当って陥凹、肝辺縁の所見をくわしく観
察する必要性を強調している。このように肝表面を詳細

表 1. Comparison between Laparoscopic and Histological Diagnosis in 300 cases

	NL	AH	CH	PNC	PC	AC	FL	fibrosi.	hepat.	intrahe. chole.	extra. obst.	other	total
NL	41		6	1	1		1	2				2	53
AH		15	3	1									19
ICH	1	5	29										35
ACH		1	29	3	1			2					36
PNC			2	24	1	2							29
PC				4	12								16
AC					1	18							19
FL	2	1	2		2		24	2					34
fibrosis			1				1	3					5
hepatom					1	1			8				10
obst. cho.										7	8		15
others	2	1	3	1	2		1	3				15	28
Total	46	23	75	34	27	21	27	12	8	7	8	11	300

を含めての腹腔鏡診断と肝生検組織診断の間には必ずしも一致をみず、21%に discrepancy が見出された(表1)。

1. 肝表面の客観的所見の把握 (肝辺縁および陥凹像)

肝の腹腔鏡所見を検討すると色調、肝縁の鈍化、被膜の肥厚、硬度等主観的所見が多く、形態学的に客観性をもって把握される所見ははなはだ少ない。演者は肝表面の客観的所見として陥凹および肝辺縁の変化に注目し、正常肝、急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変の肝表面像の特徴について検討を行った。陥凹を形の上より円形、線状、楔状、星状、地図状の5型に、また陥凹の大きさを大中小に分類すると各種肝疾患に特徴的なパターンを示し、特に非活動性と活動性慢性肝炎に著しい差がみられた。また肝辺縁の性状についても然りであった。演者は肝炎

に観察するようになった時点より腹腔鏡症例を第1期、第2期に分け discrepancy を検討した結果、慢性肝炎では組織診断よりみた discrepancy は減少しても腹腔鏡診断よりみた discrepancy はかえって増加しており、肝表面所見の読みすぎの併害がみられた。その点、肝硬変の discrepancy は、原点近くで最も診断が容易といえるが、他疾患においては20%の discrepancy の壁は目下の所厚いといえる(図1)。

2. 肝被膜および被膜直下の組織像および病態

腹腔鏡診断はあくまで肝被膜を通しての観察であり、今後さらに discrepancy を減少させ正確なる診断をくだすためには、肝表面像のより詳細かつ客観的な所見を把握し、それらの所見を従来より盲点であった肝被膜および被膜下の病態を組織学的かつ病態生理学的に解明することにより、いっそう正確なる診断が可能であると考え

* K. Kawamura: 市立四日市病院内科 (四日市市浜田)。

NL : Normal liver C : Cirrhosis
 AH : Acute hepatitis PNC : Postnecrotic C
 ICH : Inactive chronic hepatitis
 PC : Portal C.
 ACH : Active chronic hepatitis

図 1.

以下実験的、臨床的に種々検討を行ってみた。

肝硬変では再生結節に伴って必ず血管、胆管の異常がみられる。正常肝、慢性肝炎、肝硬変の肝被膜下の病態を追求するため、おのおの剖検肝の門脈、静脈、動脈にそれぞれ青、赤、黄色に着色した neoplene ratex を注入し、血管の cast を作製し被膜下の脈管像について検討を加えてみた。正常肝では小葉内に多量の門脈血の流入を認めるが、肝硬変では少なく、ほとんど動脈性であり、慢性肝炎はその中間を示す。正常肝の cast は門脈、静脈より注入された針頭大の小さいツボミ状をなして配列し、特徴的な終末部分が見られる。すなわち正常の小葉に似た規則正しい配列を認める。また肝動脈は肝硬変に見られるごとき樹枝状を呈さず、門脈に沿って蛇行状に走行する。肝硬変では門脈、静脈、動脈の間に吻合が生じ、特に肝表面に吻合が著明であり、また同時に門脈の sinusoid への灌流のブロックされた部位が観察された。慢性肝炎の肝表面を注意深く観察すると、ツボミ状の欠損する場所がみられ、すなわちこれらの所見が癭痕（陥凹）の存在と vascular shunt による肝内圧の増大をもたらす原因と考えられる。

3. 腹腔鏡直視下による鉗子生検の臨床的意義と考察

演者は従来より肝被膜および被膜直下の組織像および病態を解明するため、腹腔鏡直視下にて肝辺縁の punch

biopsy を施行しており、その臨床的意義を検討した成績について述べる。

現在、新鉗子を作製し直径約 5～6 mm の組織片が採取される。肝被膜をマイクロメーターで測定すると、肝疾患と肝被膜の間に相関がみられ、正常肝、急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変と進展するに従って、肝被膜の肥厚が認められた。また腹水を伴った肝硬変では特に著しい肥厚が認められた。また、慢性肝炎、肝硬変と経過するにしたがって肝被膜に血管および胆管、リンパ管の増生がみられた。急性肝炎の鉗子生検と針生検による組織像を比較すると一部症例に肝被膜下は中心部に比べ、グ鞘の fibrosis、胆管増生がやや多く認められた。また慢性肝炎ではグ鞘の細胞浸潤、線維化、胆管増生、小葉内線維化がより著明に認められた。

次に四塩化炭素にてラットの慢性肝炎を作り、屠殺前に H^3 -thymidine を注入し、肝表面組織の autoradiograph を作製し検討すると、被膜下の血管および毛細胆管、間葉系細胞、fibroblast への thymidine の取り込みがみられ、被膜下にこれらの細胞の活発なる増生が観察された。肝硬変の鉗子生検による肝被膜組織を電顕学的に観察すると、著しい Mesothelial cell の増生と増高が認められ、また microvilli の腹腔内への逸脱が観察された。さらに、mesothelial cell 層下の肥厚せる結合組織の増生および mesothelial cell の立ち上り現象が

表 2. Cases of Punch-Biopsy

Liver Diseases	Number of Cases	P+S*	Discrepancy
NL	3	3	
AH	41	29	
ICH	6	6	1
ACH	19	17	7
PNC	7	4	
PC	10	6	
AC	3	0	
Hepatose	4	2	
Hepatoma	3	2	
GS	4	2	2
Cholestasis	8	5	2
FL	5	4	1
SL	1	1	
Others	5	3	
Total	119	84	13

* P+S Cases of Punch-Biopsy together with conventional Needle Biopsy under Peritoneoscope

表 3. Cases of discrepancy between punch biopsy and needle biopsy in the histological diagnosis

Case No.	Name	Sex	Age	Clinical Diagnosis	Peritoneoscop. Diagnosis	Needle Biopsy Diagnosis	Punch Biopsy Diagnosis
1	KH	M	56	CH	A CH	A CH	P N C
2	HM	M	40	CH	A CH	A CH	P C
3	RI	M	63	C E	Chr. Hepatitis	Chol. Hepatitis	Bil. C
4	IT	M	43	N	CH	N	G S
5	MI	M	60	Ext. Obst. Chol.	Chr. Cholecystitis	Hepatoma	Ext. Obst. Chol
6	MH	M	65	CH	A CH	A CH	A C
7	TM	F	38	CH	A CH	A CH	C
8	MI	F	55	CH	F L	I CH	A H
9	SK	M	56	F L	F L	F L	A H
10	SM	M	55	Ext. Obst. Chol	Ext. Obst. Chol	A H	Cholestasis
11	NH	F	55	CH	A CH	A CH	C
12	IO	F	33	CHole stasis	N	Hepatose	Cholangitis
13	SO	M	43	CH	A CH	A CH	A H

特徴的であった。

次に鉗子生検と針生検を同時に施行せる84例の組織診断の discrepancy を検討すると、discrepancy は13例に認められ、その内針生検で活動性慢性肝炎と診断され、鉗子生検で肝硬変と診断された症例が5例に認められた(表2, 3)。

その1症例は36才男で食欲不振と全身倦怠感にて入院。腹腔鏡所見は粗顆粒を示し、活動性慢性肝炎と診断された。針生検では、被膜直下の線維化が強く、中心部は活動性慢性肝炎と診断されたが、鉗子生検では再生結節を伴った偽小葉を形成せる portal cirrhosis と診断された。その臨床経過は肝機能の改善悪く、A/G 比の低下、GOT, GPT の悪化、 γ -globuline の増加がみられた。Discrepancy を示した5例の6ヵ月～2年の予後経過はいずれも悪く、治療にも抵抗を示し、将来、肝硬変への進展が予想されうる。

以上より、鉗子生検と針生検の併用により、肝炎の進展に関する動的観察が可能であり、慢性肝炎の予後判定、特に肝硬変への移行を推定しうる可能性があり、今後の検討にまちたい。

4. 腹腔鏡直視下色素撒布法

肝表面の陥凹、凸凹をより詳細に観察するため、正常肝、肝硬変、慢性肝炎、急性肝炎の剖検肝にインジゴカルミン色素を撒布すると、正常肝は平滑であるが、壊死後性肝硬変では大小不同の結節が一層著明となり、慢性肝炎では隆起も結節性ではなく、顆粒状で青色部が陥凹像と

してとらえられる。劇症肝炎の肝表面を拡大すると近接にて肝硬変のごとき凹凸がみられるが、凹凸は1mm内外であり、組織像で隆起は肝細胞の島状残存部で陥凹部は肝細胞壊死部として理解される。

腹腔鏡症例を供覧すると、壊死後性肝硬変では、色素撒布により、結節の他に地図不正形の陥凹部が明瞭に観察された。慢性肝炎では肝表面の皺、顆粒が明瞭となり、通常の腹腔鏡撮影では観察しにくい浅い陥凹像も把握された。また、急性肝炎は大赤色肝として観察されるが、一見平滑に見える肝表面も色素撒布により、浅い小斑点状陥凹像が観察され、肝細胞壊死部に相当するものと考えられる。このように通常の撮影方法では把握されない凹凸不平、陥凹像も、色素撒布法により、簡単に観察されることから有用な方法と考えられる。

5. 色素門脈注入法

次に肝表面をさらに微細に観察するため、正常犬にて門脈色素注入法を試みた。正常犬を開腹し、その門脈より5%パテントブルー 1ml を注入し、注入直後より肝表面に拡大下にて、連続撮影を行った。注入数秒後に肝表面に規則正しい青い網目状の肝紋理の出現をみ、この肝紋理はさらに拡大融合し、ついには肝全体が青色となり、約1分後に褪色する。

網目状紋理をさらに拡大撮影すると、肝表面に6角～4角の規則正しい紋理が観察され、紋理の中心部に中心静脈を思わせる斑点がみられた。これらの紋理が肝小葉に一致するか否かは目下検討中である。しかし三宅らの

図 2.

行った色素 Gelatin 注入チェロイジン透徹標本でみられた肝小葉の輪郭に相当するものと考えられ、終末門脈枝と想像している。

今回は、正常犬の試みにとどまったが、臨床的には臍静脈より色素を注入することにより、腹腔鏡 8 mm シネにも十分応用可能と考えられる。

6. 肝表面蛍光撮影法

さらに微細病変を把握するため、蛍光撮影法を試みた。第1は正常犬を開腹し、門脈よりフルオレスチン 5 ml を注入し、2秒間隔で拡大下にて連続撮影を行った。注入数秒後に蛍光色に輝く規則正しい肝紋理が観察された。(図2)肝紋理は、色素法と同様融合し、10秒後には肝表面全体に蛍光を発するようになる。

第2は静脈注射にてフルオレスチンを注入すると、最初豊富な蛇行せる細少動脈網が、肝被膜に撮影され、次いで規則正しい肝紋理が出現した。人体にて正常肝の症例にフルオレスチンを静脈注射し、蛍光撮影を行なう

と、正常犬同様規則正しい紋理が拡大して認められた。

今後、腹腔鏡の改造により、シネ撮影の蛍光撮影を試みることにより、肝被膜および被膜直下の血管像、肝紋理の変化、陥凹、結節部の病態がさらに明確になるものと考えられる。

結 論

1) 肝表面の変化は肝実質内障害の先行像として良く反映される。

2) 特に陥凹、肝辺縁線の変化を客観的に詳細にその形態を把握することにより、一層正確なる診断が可能であり、色素撒布法は、有用なる方法と考える。

3) 鉗子生検と針生検の併用により、肝炎経過の動的観察が可能であり、また肝被膜および肝被膜直下の組織像の病態把握に有用である。

4) 肝表面の微細病変把握のため、色素門脈注入法、蛍光撮影法は有力なる方法であり、臨床的に今後の検討にまちたい。

*

*

*

2. 肝リンパ流の観察法

島田 宜浩*

1. 緒 言

肝リンパ動態の臨床的研究に対する最近の報告は A. E. Dumont ら¹⁾ の thoracic duct lymph drainage に関係した文献があり、また、肝、脾および脾のリンパ系へ色素を移行せしめんとする S. Godart²⁾ の実験があるが、全般にこの方面の研究はきわめて少ない。また、Godart の報告においても肝リンパ系への色素の移行は非常に困難で、白鼠を用いて肝実質内に直接注入または脾を介して門脈内に投与された patent blue violet 色素は容易に胆汁中に移行するために、肝リンパ系を染色せしめ得ないとされている。ところが、一方、犬の肝実質内に注入された Patent blue V. 色素の一部が速かに肝門部リンパ管に流下することが橋本³⁾ および著者⁴⁾ の経験から明らかになったので、腹腔鏡直視下で肝内にこの色素液を注入する肝リンパ流の観察法を試みた。

2. Patent Blue V. 色素液肝内注入方法およびその判定

実験動物および対象症例の肝内に11%の patent blue V. 水溶液 0.3 ml を 0.5 cm の深さに注入し、色素の移動を観察した。その判定方法を以下の密、粗、散、線の4項目に分類し観察した。すなわち、色素液注入後、注入部位を中心に濃い色素斑（密）を作るが（図1）、あるものは門脈枝の終末部に点状の濃い色素を残して他の部位は速かに褪色するために粗らかな斑理（粗）を示すようになる。また、注入条件では最初から粗らかな斑理を作ることもある。この密、粗は本質的に異なるものであるが、いずれも正常肝リンパ動態時に認められるものである。ところが異状肝リンパ動態を示すものとして、色素注入部位よりやや隔った場所に別個の色素斑を作るもの（散）や色素で着色したリンパ管がこれらの色素斑から線状に延びるもの（線）がある。また、症例によっては注入された色素が肝表面リンパ系から胆のう表面のリンパ管に移行するものがある。

図1. Patent Blue V. 色素液肝内注入法により肝表面に出現した色素の分布形式を示す。①は色素注入部の周辺に濃い色素浸潤のみを示す(密)。②は色素注入部より隔った場所に色素斑の再出現あり(散)。③は肝表面の線状リンパ管に色素が移行している(線)。④は胆のう表面への色素の移行を示す。

3. 対象および成績

1) 犬を用いた動物実験

門脈内に silica gel powder (100~200 mesh) を注入した12頭の門脈閉塞犬と肝静脈を止血鉗子で部分閉塞した5頭の肝静脈閉塞犬および5頭の正常犬を対象とした。基礎麻酔として 50 mg/dl の Nembutal 0.5 ml/kg を静注麻酔し腹部正中線で開腹した後に、Patent Blue V. 色素液を実験犬の各肝葉のほぼ中央に注入して、色素の移動の状態を観察した。

その結果表1に示したように、5頭の正常無処置犬では全例密のみの分布であった。門脈閉塞犬では、silica gel power注入直後に門脈圧が一過性に急上昇（平均400 mm 水柱）し、5頭の各肝葉の成績では約1/3に散の形式を示したが線を示すものはなく、残りはすべて密・粗の

* Y. Shimada: 岡山大学第1内科 (主任: 小坂淳夫教授)。

表 1. 門脈内に silica gel power を注入し長期飼育した実験犬の成績を示し、飼育期間に平行して門脈圧が増加し、かつ肝リンパ循環の異常が観察された。また止血鉗子で肝静脈を急速閉塞した実験犬では色素注入法で全例胆のうに色素が出現した。

	Numbers of Canines	Dense or Coares Pattern	Scattered Pattern	Linear Pttren	Appearance of Dye on Gall-Bladder	Average of Portal Veocus Pressure mmH ₂ O
Control non-infused Canine	5	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				160
10-20minutes after infusion of Silica Gel powde into portal veins	5	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●			400
3-8months after infusion of Silica Gel powder	4	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			150
12-19months after infusion of Silica Gel powder	3	● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ●	200
Canine with ligation of hepatic veirs	5				● ● ● ● ●	210

形式であった。silica gel power 注入3~8カ月後で門脈圧が正常値を示し、門脈周辺に中等度の線維化を認めた4頭の実験では密・粗と散がほぼ同数であった。注入後12カ月以上経過して、門脈周辺から肝小葉への線維の増加が認められ、門脈圧の軽度上昇(平均 210 mm 水柱)を示した3例の成績では、約 $\frac{1}{3}$ が散に $\frac{1}{4}$ が線の形式であり、胆のう表面のリンパ管に色素が移行する症例もあった。

2) 臨床例に対する検討

急性肝炎9例、慢性肝炎110例および肝硬変47例に対して、腹腔鏡直視下で本色素注入法を実施した。その結果、表2に示したように急性肝炎では密、粗、散、線および胆のう表面への色素出現の4項目のいずれにも、ほぼ同率に分布した。慢性肝炎においては、肝表面の平滑な一般型と新しい陥没のみの認められる症例では密・粗の形式が多く、散と線は少数例に認められるのみであった。これに反して、肝表面に古い癒痕のあるものおよび斑紋肝では密・粗の形式は少く、散と線がほぼ同数であり、一部の症例では胆のう表面のリンパ管に色素が移行した。また、肝硬変では大部分の症例が線の形式に属し、散は少なく、密・粗の形式は認められなかった。すなわち、慢性肝炎から肝硬変へと病像が進展するに従い線と散の

形式が増加した。また、このことは推計学的に有意と判定された。この現象は肝小葉の変形または改築による肝リンパ形成量の増加と肝門部へのリンパ液の移送の異常によるものであり、慢性肝炎時の間質の病変もまた、肝リンパ管移送の異常の原因になることが推定された。

3) 肝リンパ移送の異常に対する門脈域と肝静脈周辺部との比較

慢性肝炎では間質の病変が肝リンパ移送の異常に関与することが判明したが、さらに、このことを門脈域と肝静脈周辺部を区別して比較検討した。対象症例として肝小葉の変形を認めない6例の慢性肝炎を選定した。検索方法は肝生検材料の連続切片再構築法により門脈域と肝静脈周辺の病変を比較しながら、本法による色素分布形式を検討した。その結果、門脈域に病変の乏しいものは肝静脈周辺に強い細胞浸潤と線維化を示す症例においても散のみで、リンパ管への色素の移行は認められなかった。反対に、門脈域に線維化の強い症例は全例肝表面のリンパ管へ色素が移行(線)した。このことは肝リンパ移送の異常に対して、門脈域側がより強い影響を示すことを示唆する。

4) 肝表面リンパ管の走行

表 2. 腹腔鏡診断と色素注入法の比較であり、肝小葉構造の変形および間質線維化の増加と平行して異常リンパ循環動態の分布が増加することを示している。

		Liver Surface			Appearance of dye on Gall Bladder
		Dense or Coarse Pattern	Scattered Pattern	Linear Pattern	
Acute Hepatitis		● ● ●	● ●	● ●	● ●
Chronic Hepatitis	Main Signs: hepatomegaly smooth surface white coat	● ●	● ●	● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
	Further whth : new depression	● ●	● ●	●	
	portal hypertension	●	●	●	●
	scar formation	●	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ●
	patched markings		● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	●
Liver	early nodular liver		● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Cirrhosis	nodular liver		● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● ●

上記の Patent Blue V. 色素注入法で肝疾患時のリンパ流の走行が明瞭になった。すなわち、急性肝炎のように新鮮な肝病変では、肝表在性リンパ管は本来の姿である網目構成を示すが(図2)、病変が慢性化するとリンパ液の流れは網目構造の一部分に固定し、しかもその部のリンパ管は太くなる。このために、色素注入法では太く蛇行した線状のリンパ管が染色される。次に、リンパ流の起始部と流れの方向の問題では図3のように、肝右葉右上端より胆のう付着部に向って斜に引いた線より上・中央側に注入した色素はすべて上方または左上方に流れて、横隔膜あるいは肝鎌状靱帯に向うリンパ管に移行するが、この線より側下方に注入した色素はすべて下方に流れ、肝縁に達し、または、これを貫通して肝裏面を肝門に向うリンパ管に流入する。また、あるものは肝裏面のリンパ管より胆のう表面のリンパ管に色素の移行を認めた。

4. 総括ならびに考案

肝リンパ系に対する基礎的研究は古くは J. Disse⁵⁾, E. R. Clark⁶⁾ 最近では J. L. Bollman⁷⁾, S. Magari⁸⁾ らの報告があるが、臨床的研究はきわめて少なく特に肝疾患症例を対象とした肝リンパ動態の観察法についてはい

図 2. 急性肝炎患者に色素注入法を実施したもので、網目状のリンパ管に色素が移行している。肝表面リンパ管の基本構造が表現されている。

図 3. 色素注入法で出現した肝表面リンパ管の走行を示すもので、斜に引いた破線より上・中央側は横隔膜と肝鎌状靱帯に向うリンパ管に、破線より下・側方に注入した色素は肝縁に向うリンパ管に流入している。また、肝裏面と胆のう表面のリンパ管は互に交流を示している。

まだ報告がない。著者はさきに肝内に注入された patent blue V. 色素が肝表面のリンパ管に移行することを腹腔鏡直視下で観察し報告⁴⁾しているが、この事実より出発して Patent Blue V. 色素肝内注入法による肝リンパ動態の観察法を確立した。すなわち、11% patent blue V. 色素液を肝内に注入後、色素の移動状態を密、粗、散、線の4形式に分類し、この4形式の出現機序を検討するために動物実験と臨床症例における観察を実施した。その結果、肝小葉の変形による肝リンパ液形成量の増加と間質内を流下するリンパ液の疎通性の異常が問題になり、肝リンパ循環の異常形式として散と線の分布を示すことが判明した。すなわち、肝内に注入された色素はリンパ液の流れに従って、間質内を流下し、胸管に移行するが、リンパ液の過形成および間質の疎通性の異常により、本管に向って流下したリンパ液が途中から末梢部に逆流して、一方では肝表面に再出現する現象（散）を示し、他方では肝リンパ液の副行路とも考えられる肝表面や胆のう表面のリンパ系へ色素が移行する（線）。さらに、リンパ疎通性の異常に対して、門脈域と肝静脈周辺部とを比較すると門脈域におけるリンパ液の疎通異常がより重要な意味を有することが判明した。

これらの事実は本色素注入法により、肝リンパ循環の状態を知り得るのみでなく、さらに、肝形態の異常をも推定し得るものと思われる。

肝表在性リンパ管の走行については、E. R. Clark は肝右葉のリンパ管は肝冠状靱帯を経て上腹リンパ腺に向うものと、肝門部にある肝リンパ腺に向うものがあり、さらに肝鎌状靱帯の近くでは同靱帯を経て横隔膜上にある

前縦隔洞リンパ腺と肝門部にある肝リンパ腺にはいるものが存在すると記載している。著者の色素注入法による検討でも Clark の報告とはほぼ同様で右葉の外側端より胆のう付着部に向って斜に引いた線より上・中央側では上行して横隔膜にはいるもの、および、いったん肝鎌状靱帯にはいった後に上行して横隔膜に至るものと、下行して肝門リンパ線に向うものがあった。また、この線より下・側方に起始部を有するものは肝縁に向って下降し、肝縁をめくりまたは肝縁を貫通して肝裏面のリンパ管に移行する。肝・胆のうリンパ系の交流については W. L. Winkenwerder⁹⁾, C. K. Drinker et al¹⁰⁾ の報告のように、肝裏面と胆のう表面のリンパ系の間に交通が存在した。

5. 結 論

肝リンパ流の観察法として、腹腔鏡下で 11% patent blue V. 液 0.3 ml を 0.5 cm の深さに肝内に注入した色素の移動状態を検討した。

1) 門脈内に silica gel 末を注入し、長期間飼育した実験犬では門脈周辺に次第に線維が増加し、門脈圧が増加するが、この飼育期間と門脈圧に平行して、肝リンパ循環異常が出現することが色素注入法により判明した。

2) 腹腔鏡直視下で本法を実施した成績では、肝炎が慣性化して、Glisson 鞘の病変と肝小葉の変形が増加するに従い、異常リンパ循環が増加することが観察された。

3) 肝表面リンパ流の走行は肝右葉の右側端より胆のう付着部に向い斜に引いた線より上方のものは上行して横隔膜または肝鎌状靱帯にはいるが、この線より側・下方のものは肝縁に向い、肝裏面を経て肝門部に入る。また、肝・胆のうリンパ系に相互の交通が証明された。

文 献 1) Dumont, A. E., Muljolland, J. H., New Engl. J. Med. 263: 471, 1960. 2) Godart, S.: Progress in lymphology, ed. by A. Ruttimann, G. Thieme, Stuttgart, 1967, P. 384. 3) 橋本宏之, 岡医誌 78: 211, 1965. 4) 島田宜浩ほか, 肝臓 7: 346, 1966. 5) Disse, J.: Arch. Mikr. Anat., 36: 203, 1890.

6) Clark, E. R.: Morris Human Anatomy 5th Ed. ed. by C. M. Jackson, P. Blakiston's son & co., Philadelphia, 1914. 7) Bollman, J. L.: Studies of hepatic lymphatics. Liver Injury. Trans. 9th Conf. J. Macy Found., New York. 1951. 8) Magari, S.: Japanese Circulation J. 28: 39, 1964.

9) Winkenwerder, W. L. : Bull. John Hopkins Hosp., 41: 226, 1927. 10) Drinker, C. K. & Yoffery, J. M. : Harward Univ. Press Cambridge Mass., 1941.

質 問 : 山本貞博(名大) 肝被膜リンパ管を観察された島田先生に、腹水硬変症例での観察経験をお聞きしたい。

これは現在は直接外科治療の対象からは除外されているが、門脈圧亢進症の腹水硬変例について、開腹下に肝表面を観察した経験からいうと、湧出性にかんりの量が

肝表面に流れ出しているもので、その局在性というか湧出点が硬変肝において、再生結節の頂点か、周辺にあるいは結節間の癒痕部にあるかを知ることは、腹水成因を考えるのに大変に興味がある。

答 : 肝表面に円形のリンパ小水泡がときにみらる。これが破れた後に肝硬変の肝表面によく認められる白色の円形小苔皮になると思われるが、その位置については定見がない。これが肝リンパが腹腔に漏れ出た後だと考えている。

3. 肝 血 管 撮 影 法

杉 浦 光 雄	坂 本 啓 介	阿 部 秀 一
三 浦 健	小 倉 正 久	市 原 莊 六
築 瀬 正 邦	室 井 龍 夫	出 月 康 夫
野 村 満	二 川 俊 二*	

肝血管撮影を肝疾患の診断、あるいは病態生理研究に用いたのは、われわれは元来門脈圧亢進症から出発しており、どちらかというと肝腫瘍の診断よりも門脈圧亢進症の病態把握が中心となっている。今回の報告は肝腫瘍の診断面に関しては不十分な面もある。

肝血管撮影には表1で見ると主として5種類の方法があり、門脈撮影(表2)に関しては6種類の方法が報告されている。撮影法が数種類存在することはそれぞれが利点、欠点を持ち、また目的、用途によって使い分けられることを示す。

門脈撮影は335例に行い、肝腫瘍、6例であるが、肝内腫瘍に対しての陽性所見はほとんど100%に近いが、これら症例はいずれも大きい腫瘍が多く、小腫瘍に関しては今後の検討を要する。X線所見からは肝腫瘍例では肝内門脈枝の圧排像を見るのみで、むしろ門脈圧亢進症での肝内外の門脈系の所見を得るのに有効である。いわゆるパンチ症状群では肝内門脈枝の疎細化を主体とし、肝組織所見でみるグリソン鞘内門脈枝のつぶれをX線的に裏書きした所見をみる。門脈圧亢進の程度によって肝外の著明な副血行路を造影する症例が多い。経脾門脈撮

影で従来行なった方法は造影剤、約20~30ccで脾内注入終了直前に撮影したが、最近の方法は造影剤の量を50~60ccとし、撮影時間を注入終了直前とすることによって肝内門脈細枝の明瞭な所見を得られ、肝外副血行路の状態も食道静脈瘤や傍食道静脈瘤の拡張、蛇行を含めて明瞭な造影所見を得ている(図1)。図1で見える症例は66才肝硬変例である。食道静脈瘤は中部食道に達し、噴門部静脈瘤も認め、図1の経脾門脈撮影所見から完全なParaesophagogastric devasculauzationを必要とする症例であることがわかる。

経脾静脈性門脈撮影は肝内門脈枝が末梢迄十分造影されるが、肝外門脈枝の所見を得るには経脾門脈撮影より劣るようである。経動脈性門脈撮影は連続撮影により静脈相で所見を得るものである。いずれにしても門脈系の造影に関しては鮮明度が劣る欠点がある。しかし開腹しないで門脈系の重要な手がかりを得る手段として高く評価されるべきものであろう。われわれはこの方法を用い、脾切除後の症例の門脈系副血行路の状態把握、血管吻合後の症例で吻合口開存確認に用い、同時に血管吻合後の門脈系血行動態を知るのに大いに役立った。たとえば脾腎静脈吻合後では吻合口の大きく開存した症例ではほとんどの門脈血が吻合口を通して大静脈系に逆流を示す症例があり、門脈下大静脈吻合ばかりでなく脾腎静脈吻合

* M. Sugiura, K. Sakamoto, S. Abe, K. Miura, M. Ogura, S. Ichihara, M. Tsuchise, T. Muroi, Y. Idezuhi, M. Nomura, S. Nihawa : 東京大学第2外科.

表 1. 肝血管撮影の利点と欠点 (S44.7)

方 法	例 数	利 点	欠 点
肝 静 脈 撮 影	245	肝硬変と肝線維症の鑑別	肝左葉の局在性病変判定に難
門 脈 撮 影	335	門脈系副血行路の判定	経脾法で時に出血例もある
肝 動 脈 撮 影	104	肝内腫瘍性病変, 脾摘後の肝外門脈系	血栓, 血腫の形成
逆行性門脈造影	169	肝内門脈枝造影が良好. 特に門脈幹閉塞	肝外門脈系造影不良, 肝静脈カテーテル必要.
Hepatography	48	断層撮影により肝内病変部位確認良	造影剤注入部位が問題

表 2. 門 脈 撮 影 (S44.7)

方 法	特 徴
経 脾 性	肝外門脈系の造影良好. 特に門脈圧亢進症に適. 脾穿刺が必要
経 腸 間 膜 静 脈 性	開腹手術が必要 肝門部, 肝内門脈系の造影良好
経 動 脈 性	静脈相で造影され, 陰影不鮮明 開腹の要なく, 脾摘後も可能
経 臍 静 脈 性	開腹せず. 全例成功とは限らない. 肝内門脈系造影良好. 肝外不良
経 直 腸 静 脈 性	不成功例が多い
経 肝 法	臨床応用に疑問あり

においても門脈下大静脈側側吻合を行うのと同じ適応基準を用いるべきであるという根拠となった. また血管吻合後, 数年後に吻合口が閉鎖しているにもかかわらず食道静脈瘤の改善, あるいは消失例も認め, 現在の食道離断術を多用する根拠ともなった.

逆行性門脈造影は肝静脈撮影時に同時に行なう方法であり, 主として肝内門脈枝の造影に主眼がおかれる. 正常例では肝内門脈枝ばかりでなく門脈幹造影も得られる. 肝嚢胞例では肝内門脈枝の圧排像を認め, 原発性肝癌でも同様所見であるが, 転移性肝癌では肝静脈枝相互間吻合が多いことから逆行性門脈造影の所見を得られない症例もある. 肝門部門脈幹閉塞例, 特にわれわれがいわゆる先天性門脈異常と称した症例は経脾門脈造影ではほとんど似た所見を得るのに反し, この撮影法によって肝内門脈枝の状況は症例によってまったく異なることを知り得た. 肝内門脈細枝が末梢に至るまで閉塞した症例から肝内門脈左右主枝付近まで正常に近い状態で開存した症例に至るまで閉塞の度合いはまったく種々である. 初発症状や臨床症状などは閉塞の度合いが異なってもかなり似た傾向を示すことから現在ではいわゆる先天性門脈異常と称していたものがむしろ門脈系, 特に肝門部を中心とした門脈系の血栓性静脈炎性閉塞が病因であろうか

図 1.

と考えている。経直腸静脈性門脈撮影は3例に試みたが1例も成功していない。

肝動脈撮影に関してはすでに諸家によって報告もされ、多数の経験例もあることから今回は省略する。

肝静脈撮影はわれわれは主に肝線維症と肝硬変の鑑別診断に用いて著しい効果をあげている。われわれが仮に分類したB型肝線維症が三宅教授の分類した乙'型肝線維症の軽度のものであり、A型肝線維症はグリソン鞘に円型に線維化の限局した肝線維症である。正常例の肝静脈撮影では肝静脈枝は規則正しい分枝を示し、のびのびとした像が見られるのに対し、B型肝線維症ではしだれ柳状の所見を特徴としている。A型肝線維症ではしだれ柳状の所見に加えて肝静脈枝相互間の吻合の発達した症例が多くみられる。すでに報告したようにA型肝線維症の大多数が、20~50才代の女子に限られることと、術前の肝機能障害が著明でないのに門脈下大静脈吻合、脾腎静脈吻合後にしばしば高度のEck瘻症状群を多発している特徴的な症例群である。これらの特徴的な所見に関しては今後尚検討を要する。胆管炎や日本住血吸虫症の症例ではA型肝線維症と似た所見を呈し、肝静脈枝相互間吻合が著明に発達しており、A型肝線維症で胆管炎を経過した症例が多く含まれることとなんらかの病因的な関連性があることが推定されるようである。乙'型肝線維症と乙型肝硬変症とは肝静脈撮影で似た像を呈し、しばしば誤った判定をする原因となり得る。しかし肝静脈枝が肝硬変症では再生結節によって迂曲する像があるので、これの有無が判定の根拠となり得る。甲型肝硬変症と甲'型肝硬変症とは肝静脈枝は太い枝の変型、細い枝のちぢれがみられ、枯枝状と表現される所見を呈する。教室、小倉は乙型肝硬変とこれらと比較し、乙型はほぼ等しい大きさをもつ再生結節による圧排、迂曲をみる例が多く、甲型、甲'型では圧排を示す再生結節の大きさが不均等であることをすでに発表している。

アメーバ性肝膿瘍では肝静脈枝の膿瘍による圧排がみられ、また胃癌肝転移例でも同様所見がみられるが、転移肝癌例では肝静脈枝相互間の吻合が著明である。

Hepatography はすでに学会や誌上でも発表している。現在まで48例に試み、肝腫瘤例の陽性所見を得ているのは約80%である。方法はLipiodol ultra fluid, 約0.15 cc/kgを門脈系に注入し、肝内門脈細枝の変化を観察する。注入後、数時間後の平面写真と3日後の断層撮影が最も診断に適しているようである。注入後の門脈圧の変

化は注入量によって多少異なるが、通常用いる注入量では著変を認めない。組織学的には肝内門脈細枝の血管壁に造影剤が付着しているのを認める。注入直後のX線写真と3日後とを比べると日を経るにつれて肝内にびまん性に造影剤がゆき渡るのがみられる。注入後2週ではほとんど造影剤の残留がなく、3週後ではこの傾向はさらに著明である。脾臓癌で肝右葉に転移を認めた症例の肝動脈撮影では腫瘍による圧排像がみられるが、Hepatographyで注入後3日目のX線写真では腫瘍の存在部位が陰影欠損として明らかに示される。さらに同一症例の断層撮影ではより腫瘍の拡がりについて詳細な情報が得られた。しかし油性造影剤を門脈系に注入することは通常開腹下に行われるが、開腹しない注入法として、臍静脈、直腸静脈、脾臓穿刺が考えられる。直腸静脈を用いる方法は下直腸静脈、中直腸静脈と大静脈系との吻合の存在を考慮して、ここからの注入法は目下検討中である。臍静脈法は今後多く用いられるべき方法と思われるが、挿入したカテーテルの位置が問題となり、カテーテルを挿入しすぎるとカテーテル先端が肝右葉内にはいり、肝右葉外側のみの所見がしばしば得られる。油性造影剤を注入する前に経臍静脈性門脈撮影を行ない、カテーテル先端の位置と造影度を確認してから油性造影剤の注入を行なったほうがよいかと考えている。注入方法と撮影時の体位は造影剤と血液の比重の関係から、造影剤の肝内偏在の傾向があり、一考を要する。

以上、肝血管撮影について簡単にふれたが臨床応用の面では、要は血管撮影ばかりでなく、他の検査法を組み合わせ、その目的によって使い分けることが肝要と思われる。

追 加 早野薫夫(岐阜大中央手術部) 1 肛門結膜を切開して、上直腸静脈枝に挿管をすれば門脈造影が可能である。また門脈圧も測定できるが、痔核などの症例では門脈圧亢進症患者と同様に高値を示すことがある。なおこの方法はtime-consumingである。上直腸動脈枝に造影剤を注入するほうが簡単であり、これで門脈も造影される。

2 経臍静脈的に油性造影剤を注入し、3~4日後のhepatogramの得られる時期に断層撮影を行なえば、径1 cmの病巣でも診断される。従来の経脾門脈造影や肝シンチではspace-occupying lesionの診断可能限界は径3 cmといわれているので、本法の意義は大きい。

4. 新しい肝疾患診断法

—超音波診断法—

浪久 利彦

和賀井 敏 夫*

疾患の診断に当り、電子工学的方法を導入することが広く行われつつあるが、超音波診断法は生体組織を超音波により映像化しようとする方法の一つで、高い周波数の音波を生体組織に発信放射し、反射波を電気信号に変換増幅してブラウン管上に映像化し、組織の音響的性質の変化を認識しようとするものである。

医学の領域に超音波検査法が導入されたのは、すでに1949年であったが、その後わが国において急速な進歩をとげ、広範な分野において利用されている。

現在臨床医学の分野で使用されている方法は主として反射法であるが、表示方式は大別して二つに分けられる。その一つはAモード方式あるいはAスコープ方式と呼ばれるものであって、探触子は振動子と受信器とをかね、水晶あるいはチタン酸バリウム系の振動子より発信された超音波は、生体内組織により反射され、探触子によって受信されるが、この反射を受信器で増幅し、ブラウン管の縦軸に負荷し、映像化するものである。この方式は、構造も比較的簡単で、手軽に使用することができるが、超音波が一方にのみ放射されることから観察が限局され、広い面の検査には時間を要する。

Bモード方式あるいはBスコープ方式は、探触子を自動あるいは手動により移動させ、それに伴って変化する反射波を、ブラウン管上で合成し、輝点として映像化し表示するものである。探触子の走査方式により、liner, arc, sector, radial 等の方式があるが、それぞれの臓器に適した方式が選択される必要がある。

肝の超音波検査は、主としてAモード方式と、Bモード方式の中2種以上の走査を組合せた方式が行われ、特に探触子を皮膚面に直接接触して走査を行うコンタクトコンパウンドスキヤニング方式（以下 CCS）が広く使用されている。

Aモード方式により得られた肝の超音波像は、大別し

て5種類に分けられるが、正常型は肝内よりの反射波が少ないかあるいはほとんど認められず、線維化型はこまかい鋭い反射波がみられ、硬変型は比較的大きい鋭い反射波が連続的にみられ、嚢腫型は鋭い大きい反射波が孤立あるいは散発して観察され、腫瘍型は粗大な大小不同な反射波が不規則的に観察される。これらのうち、線維化型と硬変型は互に移行あるいは混合することがあるので、明瞭に区別し得ない場合も少なくない。

Ccs方式においても5型に分けることは可能であるが、線維化型と硬変型の区別はAモード方式よりさらに困難となる。すなわち、正常型においては、肝内よりの反射波は少なく、均一な像を呈し、線維化型は小さな輝点の不連続に多数みられ、硬変型においてはその輝点が微細な線状になることが特徴である。肝腫瘍あるいは肝嚢腫においては嚢腫型を呈し、肝組織の反射波像に均一な欠損像として認められ、腫瘍型の場合にはこれとは逆に大小不同の輝点の集合として認めることができる。

剖検時に近く超音波検査を施行できた数例について、剖検肝と生前の超音波像とを比較してみると、肝癌においては特有な腫瘍型の像を確認することができ、さらに肝硬変と肝癌とが合併した例においては、硬変型の像の中に腫瘍型の像が存在することが理解された。

肝硬変の例においては、甲型および乙型共に完成された型のものにおいては明らかな硬変型の像が見られたが、甲型と乙型との区別はつげがたかった。

手術および腹腔鏡にて確認された嚢胞肝においては、その嚢胞の大小により超音波像にもその型が示され、大略の数も知ることができた。また肝腫瘍の例においては、肝腫大が主要症状であったが、超音波像において明らかな嚢腫型が認められ、肝癌との区別が容易になされた。

以上の結果から、超音波像が組織の変化にしたがって変化することは明らかであり、そのおのおの特有な型を示すことは疑いがないところであるが、超音波検査の特徴として、感度を上昇させるにしたがって微細な反射波を認識することが可能で、特に肝においてはこの傾向

* T. Namihisa (内科), T. Wagai (超音波センター) : 順天堂大学。

図 1. 正常肝の超音波像 周波数 2.25 MHz BaTiO₃ 10 φ (homogenous pattern)

図 2. 慢性肝炎肝の超音波像 周波数 2.25 MHz BaTiO₃ 10 φ (fibrotic pattern)

図 3. 硬変肝の超音波像 周波数 2.25MHz BaTiO₃ 10φ (cirrhotic pattern)

送パ
ス
信ル

囊エ
腫コ
性I

C. C. S. (cystic pattern) 断層像

図 4. 囊胞肝の超音波像 A スコープ

C. C. S. 断層像 (tumor pattern)

図 5. 肝癌肝の超音波像Aスコープ.

表 1. 各種肝疾患における超音波パターン (I).

	肝 嚢 腫	肝 腫 瘍	肝 硬 変	慢性肝炎	急性肝炎	異常なし	計
cystic	3	1					4
tumor		10					10
fibrotic (cirrhotic)			17(10)	14	5	1	37
homogenous			4	7	12	5	28
	3	11	21	21	17	6	79

が著明である。正常肝においても感度を上昇してゆくとあたかも線維化像のごとく認識することもみられるので、正常型、線維化型あるいは硬変型の区別をする際にはこれにたいする考慮が必要となる。すなわち、超音波像において量的な問題を論ずる際、組織の音響インピーダンスの差が問題となると同時に、機器の特性や映像化の条件が非常に重要な因子となる。この解決方法として、装置の諸条件の中、受信器の増幅度のみを段階的に変化し、その差を比較する方式、すなわち Sensitivity graded tomogram pairs を用い、良い成績を得ている。

以上の点を考慮しつつ、生検、剖検あるいは腹腔鏡で確認された79例について、超音波検査法に熟達している同一検者により得られた成績と病理学的所見と対比検討すると、肝嚢腫においては100%に、肝癌においては91%にその存在が確認されたが、肝硬変においては、硬変型は45%、線維化型を加えても81%であり、慢性肝炎で線維化型を呈したものは66%で、急性肝炎では49%であった。もちろん組織学的な分類と超音波学的な分類は完全には一致するものではないが、この成績からしても、肝癌および肝嚢腫の診断にはほぼ満足すべきものがあるが、肝硬と変肝炎との鑑別には困難な点があるものと考えら

図 6. 各種肝疾患における超音波パターン (II)

れる。

以上、超音波検査法の概要とその臨床的な位置づけについての一端にふれたが、現在超音波診断法は質的な認識より量的な認識に移行しつつあるもので、定量化への進展が行われるにしたがって、肝疾患における超音波像の鑑別も容易になるものと考えられる。

超音波診断法も種々な肝疾患診断法の一つであり、したがってこれのみでなく他の方法と併用すべきことは言

うまでもないが、この方法は非観血的に、また患者に苦痛を与えることがないことから今後益々広く利用されるものと考えられる。

5. 新しい肝疾患診断法*

志 水 洋 二

河 田 肇**

最近、核医学の分野に導入されたシンチレーションカメラは従来の rectilinear scanner に比し、scanning time を著明に短縮し、小児や重症患者の検査、または反覆検査を容易に行ない得るようになったばかりでなく、体内 radioisotope 分布の急速な変化にも対応でき、臓器の形態と機能を同時に観察するという、いわゆる dynamic study in vivo が可能となった。

一方、Taplin らは1955年、 ^{131}I -rose bengal 静注後、external gamma ray scintillation counting technique を用いて、黄疸の鑑別診断に有用であると報告したが、この方法は collimeter を当てる患者の部位の決定に十分注意が必要で、わずかの位置の変化が測定結果を大幅に変化させるため、reproducibility が悪く、この点が一般臨床検査への応用の隘路となっていた。

われわれは ^{131}I -rose bengal とシンチレーションカメラを併用し、色素の肝摂取、肝の形態、胆のう、胆管の機能を簡単にしかも患者に苦痛を与えることなく、経時的に肉眼的に確かめ得るという Burke らの報告を支持する成績を得た。われわれの使用した Nuclear chicao 社製の PHO III型ガンマ・カメラは $11\frac{1}{2}$ インチ直径の crystal を用いているので、著明な肝腫大例を除き、肝とともに心内血液プール、infrahepatic area を同時に観察し得、したがって従来の難点であった collimation の問題が解決され、容易に正確な結果が得られるようになった。

100 μc の ^{131}I -rose bengal を肘静脈内投与後、5分ごとにポラロイド写真を撮影すれば、健常肝では心内血液プールの放射能は30分後にはほとんど消失、25~30分後、肝の radioisotope 濃度は最高となり、同時に胆嚢部の色素集積が観察される。総胆管部および腸管内の色素出現はこれより遅れ、35~40分後に明瞭になってくる。その

後、肝内放射能は次第に低下し、それとともに腸管内放射能が増加するのが認められる。

肝細胞障害を伴わない肝外閉塞性黄疸では肝の色素摂取速度は正常で、心内血液プール内の放射能は30分後には消失するが、肝の放射能濃度は30分後もおお増加傾向を示す。胆嚢は一般に造影されないが、20分後ごろより肝門部に色素集積像がみられることが多く、肝内胆管部での色素停滞を示すと考えられた。また、総胆管部で radioisotope の停滞像が見られる症例では、総胆管末梢部の閉塞を認めたものが多かった。腸管内への色素排泄は、胆道閉塞の程度によって異なるが、いずれも著明に遅延し、ことに完まった閉塞例では数時間後でも全く腸管内に radioisotope を検出し得なかった。さらに、悪性腫瘍による肝外閉塞性黄疸には、肝に cold area を認め、術前に悪性腫瘍肝転移を診断し得た症例もある。

Intrahepatic cholestasis で肝細胞障害を伴わない Dubin Johnson 症候群、drug induced hepatitis では、肝への色素摂取は同様に正常、胆嚢の出現は遅延するが radioisotope の濃縮は正常に認められ、また腸管内への色素排泄も観察される。肝門部の色素停滞像はまったく認められない。

Radioisotope 肝内摂取の遅延は、肝細胞障害時にみられ、ことに急性肝炎極期、肝硬変症末期では遅延が著明で、肝細胞障害の程度とはほぼ平行すると考えられた。肝内摂取が非常に遅延する症例では、胆嚢部色素集積像が得られないこともあるが、腸管内への色素排泄は認められる。さらに、反覆、または遅延せる肝外閉塞性黄疸、ことに悪性腫瘍による閉塞例で、肝細胞障害を示すものは、同様に色素の肝内摂取が遅延し、その程度により術後の予後をかなりよく推測し得た。

Time laps camera を用いて ^{131}I rose bengal 静注後、1分ごとに連続写真を撮影すれば、より詳細な色素代謝の様相が観察でき、さらに pancreozymin 静注を併用す

* Dynamic Hepatocholecystoscintigraphy.

** Y. Shimizu, H. Kawada: 大阪労災病院内科.

れば、胆嚢の収縮、胆管内色素通過など、胆嚢、胆道の動態も肉眼的に確かめ得るようになる。

さらにわれわれは、time laps camerer で撮影した 35 mm フィルムを現像後、film densitometer attachment を装着した Beckman 社製の Analytrol を用いて scanning を行い、これら data の数量化を試みた。図 1 は健常肝の肝臓部、胆嚢部および総胆管部の density 変化の積分値を時間に対して plot したもので、図 2 は急性肝炎極期症例について得られたものである。健常肝の radioisotope uptake は色素投与 5 分後ころまで急速に上昇、その後、徐々に上昇して約 30 分で最高値に達し、以後徐々に下降する。胆嚢部色素集積は 21 分後ころより明らかとなり、急速に増加する。また総胆管部では 22 分後ころよ

図 1. Radioisotopic Rose Bengal Test
S. K. 34 y. o. Female Normal

り、肉眼的にはいまだ明らかでない時期より放射能の増加するのが認められる。Pancreozymin 100 単位静注後、胆嚢部放射能は一時上昇、約 5 分後より低下、約 15 分後より再度増加し、総胆管部では注射直後より急速に radio-isotope が増加するのがみられる。これに反し、急性肝炎極期では、肝細胞内色素摂取、胆嚢、総胆管部への色素出現がいずれも著明に遅延するのが明瞭に認められる。

以上、シンチレーションカメラを応用した ^{131}I rose bengal test は諸種黄疸の鑑別、特に外科的療法の適応決定に有用であり、さらにその data の数量化を行えば、より詳細な肝胆道系の形態と機能の変化を追及し得ると考えられた。

図 2. Radioisotopic Rose Bengal Test
K. S. 59 y. o. Female, Acute Hepatitis

6. RI および電磁流量計による肝血流量測定

山 本 貞 博*

肝臓の循環異常が、形態変化と密接な関係で変動し、これがさらに肝機能異常状態について重要因子となって作用することは、さまざまな肝疾患の病態把握に必要な知識となっている。

肝血流量の測定法として、色素または RI を使用するクリアランス法も、電磁流量計を使用する方法も、原理や実際適用については特に新しい知見ではない。

Indicator clearance 法として Bradley らが初めて臨

床に使用した BSP は、肝臓以外における摂取も多く、再吸収の問題もからんで、肝血流量測定の indicator としては不十分なことが理解され、Galactose, ICG, ^{131}I -MAA, ^{198}Au コロイド等が相前後して検討されるようになった。これらは indicator の末梢血中消失率 (K) より最小有効肝血流量を算出しようとするもので、さらに肝静脈カテーテルによって肝静脈血中濃度が検討できれば、肝排除率 (ER) を知り得て、肝血流量全体と肝臓の indicator 排除機能を推測することが可能であるとさ

* S. Yamamoto: 名古屋大学第 2 外科。

図 1. Measurement of hepatic blood flow (portacaval shunt)

れ、広く臨床応用がすすめられている。本法は容易に体外から反覆検討し得る利点があるが、しかしさまざまな病態下の肝血流の経時的変動は知り得ず、また肝血流を構成する肝動脈と門脈の個別の血量変動は観察できない欠点がある。

電磁流量計は、既知径の血管を流れる電解質液としての血液の量は速度と比例し、血流速度は血管を包む磁界中での起電力として捕え得ることを原理とした測定法である。肝臓を対象としては、無搏動性低流量の静脈血流量の測定が必要であり在来からの正弦波或は矩形波では信頼度に問題がある。私どもは梯形波を用いプローブを流れる電流波形について補正回路を付加した独自の電磁流量計によって確実な測定を行ない得るようにしている。本法では物理的に門脈、肝動脈それぞれの流量を経時的に測定し、その合算から肝血流量が知られるのであるが、しかし開腹下に目標とする血管を露出遊離する必要がある、臨床的適用には著しい制約があり、また反覆検討は甚だ困難なものである。

したがってここには、さまざまな病態肝を実験的に作製し、この際電磁流量計使用に indicator 法を合併することによって、K あるいは ER 値の意義について比較検討を進め、臨床応用に際しての考慮事項を知ろうとしたのである。

材料と方法

12 kg 前後の雑種成犬を用い、機械的な肝血流の変換、特に流入血の削減としては、1) 門脈遮断—一端側門脈下

大静脈吻合後 2 時間、2) 肝動脈遮断—肝門部で全遮断後 2 時間、3) 全流入血遮断—1+2、機能的肝全剔除後 2 時間を検討し、一方肝臓の機能容積削減法としては、4) 肝部分切除—約 40%、左全葉切除後 2 時間、5) 総胆管結紮後 1 週間、6) CCl₄ 急性中毒—経口 2 cc/kg 投与後 2 日、について検討した。

流量計プローブは 1 個を門脈幹に、他の 1 個を胃十二指腸動脈等の分枝を遮断した肝動脈幹に装着した。

反覆採血には、末梢は股静脈よりカテーテルを腹部大静脈に留置し、肝静脈には、その一枝内にカテーテル先端を留置し本体は肝表面を穿破して体外に誘導する独自の“引抜法”を適用し確実に採血し得るように工夫した。

Indicator には ICG, ¹⁹⁸Au コロイドを使用し、舌下静脈より確実に注入し、反覆検討を行うため 1 回使用量は ICG 0.3 mg/kg, ¹⁹⁸Au コロイド 1 頭平均 50 μ c とし、注入後 10 分まで 3~5 回の反覆採血を行なった。

結 果

それぞれの検討対象群において、個々例について術前正常状態における ICG および ¹⁹⁸Au コロイド投与後の末梢および肝静脈血中の消失状態を観察し K および ER を算出するとともに、電磁流量計による門脈血、肝動脈血流量を記載し、さらに術後検討した結果と対比したのである。

1. 門脈遮断群

端側門脈下大静脈吻合術により門脈血肝内流入をまったく遮断すると、図 1 に 1 例を示したように、術後 2 時

図 2. Hepatic blood flow following portacaval anastomosis

間で肝動脈血は明らかに増加して、門脈遮断による全肝血流量減少をかなり代償しようとする過程が観察される。一方 indicator 法では ^{198}Au コロイドでも ICG でもともに末梢消失率(K)は激減し、他方肝排除率(ER)は総血流量の減少を代償するようになりかなり著しい上昇が認められる。このような変化は本群のすべてに共通する所見であって、平均値をもって表現することはかなり問題があるのであるが、一括すると、図2に示すようになって、全体の変動の傾向をかなり正確に表現したのである。この場合、 $\text{HBF} = \text{BV} \times K$ で知られるように、他に動物の体重あるいは血液量を加味して検討をすすめると、肝血流量の変動の状態は indicator では ICG より ^{198}Au コロイドにより密接に関連することが観察された。しかし肝動脈血の代償性増加と ER の関連で観察すると、この際は ICG による成績が電磁流量計による測定結果と、より密接した関連を示すことが観察されたのである。

すなわち門脈流入遮断群においては、その後の興味ある血流順応状態に併せて、電磁流量計による計測結果を基準にする限り、肝総血流量は ^{198}Au コロイドによる末梢消失率がよりすぐれた追随性を示し、肝動脈に依る流量と機能の代償については ICG による肝排除率がより密接しているものと判断された。

2. 肝動脈遮断

肝門部において、総肝動脈とその分枝とともに、個々の肝動脈を綿密に結紮切断を行い、その肝内流入を遮断した6例で2時間後に反復検討を行なった結果を図3に概括した。

この際は門脈遮断とことなり、電磁流量計では総肝血流量の減少は肝動脈流量を上まわり、門脈血そのものの減少をも誘発した。これを indicator 法で観察すると、IC

図 3. Hepatic blood flow following hepatic artery ligation

Gは K , ER ともに術前とほとんどかわらずこの際の血流変動を表現し得なかったが、 ^{198}Au コロイドでは K 下降は総肝血流量の減少に追随し、一方 ER の下降は門脈血流量減少を模倣するものであった。

肝動脈結紮に伴う肝機能荒廃や実質形態崩壊の変化は初期はゆるやかに、その後急速に進行するものであって、術後2時間の時間設定になお問題はあろう。しかしこの時点までの変化では、電磁流量計と ^{198}Au による成績が密接に関連して流量減少を表現したと思われるのに、ICG の成績は不変であって、むしろ肝臓の喰機能の維持されることを表現したのは興味深い点といえよう。

3. 機能的肝全摘

端側門下大静脈吻合によって門脈血の肝内流入をまったく遮断し、次いで肝動脈流入をまったく遮断した。この際はすでに流量計プローブは使用し得ず、肝静脈血も採取し得ないので、末梢血中消失率のみを indicator 法で検討した。その結果 ^{198}Au コロイドも ICG もともに、10分までの採血時間内の消失は観察し得ず、すべて単純な水平線を画いたのである。

4. 肝部分切除

肝臓の機能容積を機械的に削減する目的で40%肝切除を行ない前後の成績を比較すると図4のごとく、流量計では門脈血の減少が強く肝動脈血がやや増加するが総量として減少をきたすことがみられ、 ^{198}Au ではこの際の流量特に門脈血減少を良く表現するが、ICG では肝動脈血の代償的増量に密接した変動を示し、総量の変化の表現とは一致しないことが認められた。すなわち流量表現には ^{198}Au がすぐれ、ICG はむしろ肝臓の機能状態を表現すると思われる。

図 4. Hepatic blood flow following left hepatic lobectomy

5. 総胆管遮断

総胆管遮断後1週で胆道系の著しい拡張と黄疸を合併し、indicatorの摂取、代謝或は排泄に阻害状態を作り、その際の成績を正常対照群の結果と比較した。同一個体を使用しがたくまた術後1週という時間設定になお問題はあろうが、流量計では門脈血の激減のため、肝動脈血の増加が起こっても総量の減少が推測され、此の変化はむしろICGによるK, ER値によく反映されたのであるが、¹⁹⁸Auではほとんど変化はないに等しかった。すなわちこの際の血流変化の追従には¹⁹⁸Auは妥当な結果を与えがたく、色素がindicatorとして用いられたほうがより近似した成績を得易いという結果で、黄疸症例に対するindicator撰定と成績判定に指標となろう。

6. CCl₄ 急性中毒

2 cc/kg 投与後2日の成績を対照と比較したが、流量計の結果は著変なく、形態的には強い脂肪変性とうつ血、出血像を見たにもかかわらずER値は¹⁹⁸AuもICGもほぼ正常のままであり、Kは¹⁹⁸Auでわずかに上昇、ICGではかなり明瞭な下降を記録した。これは、CCl₄の投与量と投与後時間設定になお問題のあることを示唆するものと思われ、ICGの成績がむしろ実情を反映するものと推測させるものがある。

以上の諸成績を一括することはかなり困難であるが、現時点で私どもの梯形波電磁流量計による測定成績を基準として肝血流量をみる限りは、¹⁹⁸Auの末梢消失率がよく密接した成績を示すものと解される。しかし肝自体に障害を持つ際は、特に黄疸合併時のごときはICGの成績がより重視せらるべきであり、又その肝排除率はかなり肝臓の機能代償を表現することのある点に留意する必要があるであろう。

付

肝血流を構成する門脈血肝動脈血の流入比率を知ることは重要であり、電磁流量計或はindicator法による知見を確実なものにする。私どもが外科的に臨床例で実施し10年余になるが最近肝門脈帯を通じ肝内門脈に挿管

図 5.

可能となって検討がすすめられる機運にある。この際半導体検出器2本を一对とし、門脈幹と肝静脈に挿入しRIを流せば、それぞれこの計測値をもとに希釈度から流量比率が算出され、門脈幹と脾静脈に配置しその構成比率も知り得るはずで、indicator法による総肝血流量の構成の分析や流量計による一部の実測値から全体を推測することに役立つ。核種と量、記録法はなお十分ではなく臨床成績を得ないが、図5に本法による門脈血分析結果を提示した。

質問：三辺 謙（慶大内科） ¹⁹⁸Au と ICG とを使用してK, ER.などに差があるようであるが、ICGが肝実質にとりこまれ一時的に貯蔵されることが、とりこまれない¹⁹⁸Auとの成績の差とは考えられないか、

答：肝血流量測定という見方での、K, ERの取扱いに疑義なり否定的というわけではなく（それしか現在体外から計算する方法がないのですから、そう云うことになると困る、ただ物理的に測定が可能なら、Indicator使用のものより安心感がある。

電磁流量計で測定できる、これを比較の基準としてみたいのであり、その見方からすると、肝血流量そのものとは金コロイドのKがよく関連するようで、ICGには、肝臓の機能関与が大きいはたらいっているようだと考えている。貯蔵能は考慮していない。

質問 迫田晃郎(鹿児島大学秋田外科) 1) 総胆管結紮直後の肝血流量の変動について、肝動脈血流量の増加、門脈血流量の減少が認めておられるようだが、われわれも Shumacker の肝静脈血流量測定法で、結紮直後、著明な血流量の減少を認めている。総胆管結紮直後の門脈血流量の減少の機序についてどう考えているか、

2) 門脈血流量の結紮直後の減少について、肝静脈の Spasmus も考えられるのではないかと思っている。

答:胆道遮断直後のものは検討していない。

約1週後再開腹測定しているが、この際は門脈血流量の減少があり、肝動脈血流量の増加が明瞭に捕えられる。その機構は肝小葉内変化までもちこむまでもなく、胆道系(小葉下の肝内肝外胆道)を包む門脈鞘内の変化のみでも推測できる。つまり閉塞によって胆道が急速に拡張してくるが、肝外部では抵抗がなく1cmあるいは以上にも太くなるのに肝内部では肝実質内での抵抗がある。したがって胆道と併走する門脈肝動脈にも側圧が及び、まず門脈の削減が起こり、より高圧の肝動脈が代償することとなるためと考えられる。

7. 肝疾患における血清グアナーゼの臨床的意義

滝野 辰郎

木村 政美*

緒 言

グアナーゼはグアニンを脱アミンしてキサンチンにかえる酵素である。この酵素は1932年 Schmidt¹⁾により家兎の肝ホモジネイトで最初に発見された。その後 Roush ら(1950)²⁾, Hirshberg ら(1952)³⁾, Levines (1963)⁴⁾ が腫瘍におけるグアナーゼ活性について報告している。1962年 Passananti がウィルス性肝炎において血清中のグアナーゼ活性が上昇することを見出してから、最近 Hue ら(1965)⁵⁾, Whitehouse ら(1964)⁶⁾, Knights ら(1965)⁷⁾, McLeod ら(1967)⁸⁾ によって肝機能検査の一つとして血清グアナーゼ活性の意義が検討されつつある。しかし肝疾患における本酵素に関する研究はそれほど多いものではない。したがって肝疾患におけるグアナーゼ活性の意義についてはまだ一定の見解がなく、この報告が血清グアナーゼの臨床的意義を理解していただくための一助ともなれば幸である。

1. 血清グアナーゼの正常値

血清グアナーゼの測定は1965年 Knights らの発表し

た方法を一部変更し、血清 0.2 ml をグアニン基質と1時間 incubate し、pH 4.0の磷酸緩衝液で反応を止め、245 m μ で吸光度を測定した。

正常者 100 例についての平均値は 2.6 I. U. で標準偏差は ± 2.0 であった。Knights ら(1965)⁷⁾, Caraway ら(1965)¹⁰⁾は正常人では 0~3 I. U., McLeod (1967)⁸⁾は29人の正常人で 0~3.4 I. U., 柴田(1966)⁹⁾は 0~6.6 I. U. と述べている。しかしこれらの報告者の中でも実際の判定には 10 I. U. を正常限界とみなしているものもあり一定しない。われわれの得た成績に基づき正常域を平均値 ± 2 SD とすると正常範囲は 0~6.6 I. U. となり、6.7 I. U. 以上を異常と判定した。

2. 肝疾患におけるグアナーゼ活性(図 1)

対象とした肝疾患は黄疸性血清肝炎 9 例、無黄疸性血清肝炎 16 例、急性肝炎 6 例、急性肝炎回復期 7 例、非活動型慢性肝炎 33 例、活動型慢性肝炎 10 例、代償期肝硬変 17 例、非代償期肝硬変 5 例、その他混合型閉塞性黄疸 2 例、単純閉塞性黄疸 2 例、脂肪肝 4 例、原発性肝癌 2 例、体質性黄疸 2 例、計 115 例、256 件について検討した。

グアナーゼ活性の平均値は黄疸性血清肝炎、急性肝炎において著明に高く、無黄疸性血清肝炎、活動型慢性肝

* T. Takino, M. Kimura: 京都府立医科大学増田内科。

図 1. 各種肝疾患における血清グアナナーゼ

炎、肝硬変症、原発性肝癌では中等度の上昇を示した。非活動型慢性肝炎、脂肪肝などは軽度の上昇を示したが急性肝炎の回復期、代償期肝硬変症、単純性閉塞性黄疸、体質性黄疸では正常であった。すなわち血清グアナナーゼの上昇はかなり活動性の肝障害を反映するものと考えられる。このことは Knights ら (1965)⁷⁾、Whitehouse ら (1964)⁶⁾ が伝染性肝炎におけるグアナナーゼ活性の上昇を強調し、Knights⁷⁾ ら (1965)、McLeod ら (1967)⁸⁾ によって単なる閉塞性黄疸ではたとえ GOT, GPT が上昇してもグアナナーゼ活性は上昇しないということから、グアナナーゼ活性が内科的黄疸と外科的黄疸の鑑別上有意義であるとした報告を支持するものである。

3. 他疾患におけるグアナナーゼ活性 (表 1)

最近多くの酵素活性が肝機能検査としてとりあげられている。GOT, GPT, LDH, LAP コリンエステラーゼ、アルカリフォスファターゼ、ICD (isocitric dehydrogenase) 5'-ヌクレオチダーゼなど肝疾患の診断上有用なものが多い。しかし GOT は心疾患で、アルカリフォスファターゼは骨疾患で、LDH, LAP は広く病的な状態において上昇し、ICD, コリンエステラーゼ, 5'-ヌクレオチダーゼは肝疾患の鑑別診断上不正確さをまねがれないという欠点がある。これに対して McLeod (1967)⁸⁾ は、GOT やアルカリフォスファターゼと異なりグアナナーゼ活性の肝疾患における特異性を強調している。しかし多くの報告者によって或る種の癌 (McLeod⁸⁾、柴田⁹⁾、Knights ら⁷⁾ 結核、高血圧、腎炎 (柴田⁹⁾、などにおいても上昇することが示された。われわれも表のごとく、

癌、血液疾患、腎疾患、循環器疾患、糖尿病、胃腸疾患その他42例について60回の検索を行った結果、癌性腹膜炎、骨髄腫、急性白血病、脳卒中、糖尿病、甲状腺機能亢進症においてグアナナーゼ値の上昇をみた。しかしこれらの中には同時に GOT, GPT の異常を示すものがあり、他の肝機能検査の成績を考慮すると、肝障害を伴わないでグアナナーゼ値の異常をみたのは癌性腹膜炎、骨髄腫、脳卒中の3例 (5%) であった。GOT が上昇を示すとされている心筋梗塞、急性肺炎などにおいては正常であり鑑別診断上の意味をもつと考えられる。

4. 血清グアナナーゼとトランスアミラーゼの相関

Knights によれば、一般に血清グアナナーゼ活性は S-GOT に平衡するとされている。しかしグアナナーゼが低値あるいは欠除していても S-GOT の高値を示す場合がある。また McLeod によればグアナナーゼ活性は GOT より鋭敏であるともいわれている。われわれは各種肝疾患におけるトランスアミナーゼとの相関を検討した。

血清肝炎では GOT の相関係数 $r=0.764$ で 1% の危険率でよく相関し、GPT においても同様によく相関している (図 2)。急性肝炎においても $r=0.68$, $r=0.59$ で GOT, GPT とともに相関を認めた。しかし慢性肝炎では相関係数は GOT, GPT とともに低く (図 3)、肝硬変症ではグアナナーゼとトランスアミナーゼの間に相関を認めなかった。このことは急性肝障害においては両酵素活性の変動はよく平行する傾向を認めるが、慢性肝障害におけるグアナナーゼ活性の上昇は、トランスアミナーゼとは異なった臨床的意義をもつことを示唆するものと思う。

表 1. 肝疾患以外の各種疾患における血清グアナナーゼ

		cases	samples	No. of samples with abnormal guanase activity
Cancer	Oesophagus cancer	1	1	0
	Stomach cancer	2	3	0
	Cholioepithelioma	1	1	0
	Peritonitis carcinomatosa	1	1	1
	Brain tumor	1	1	0
Blood disorders	Myeloma	3	6	1
	A. M. L.	1	2	1
	Promyelocytic leukemia	1	3	2
	Aplastic anemia	2	3	0
	Thalasemia minor	1	1	0
	Cong. hemolytic anemia	1	1	0
	Hodgkiss disease	1	1	0
Disease of kidney	Nephrosclerosis	1	1	0
	Chronic Nephritis	2	2	0
Disease of cardiovascular	Arteriosklerosis	4	4	0
	Apoplexia	2	2	1
	Cardiac infarction	2	6	0
	Hypotension	2	2	0
Diabetes mellitus		5	10	1
Disease of gastrointestine	Stomach ulcer	4	4	0
	Duodenal ulcer	1	1	0
	Acute pancreatitis	1	2	0
Miscellaneous	Hyerthyroidism	1	1	1
	Pleuritis exsudativa	1	1	0
Total		42	60	3(5%)

太字は Showed abnormal value in transaminase

5. 血清グアナナーゼと LDH, LAP, コリンエステラーゼとの相関

各種肝疾患について血清グアナナーゼと LDH, LAP, コリンエステラーゼの相関をみたが、相関係数は0.30, 0.18, -0.07でいずれも5%以上の危険率を示し、相関を認めることができなかった。Caraway¹⁰⁾はLDHの上昇が認められる場合のグアナナーゼ活性測定によって、それが肝性か否かの鑑別に役立つと述べている。しかしわれわれの成績はこのことを必ずしも支持するものではない。

6. 血清肝炎の各期におけるグアナナーゼとトランスアミナーゼ

輸血後、われわれがグアナナーゼ値, GOT, GPT その他の肝機能を追求し得た症例は85例で、そのうち5.9%の黄疸性血清肝炎と、18.8%の無黄疸性血清肝炎を認めた。図4は血清肝炎発症前後のグアナナーゼ, GOT, GPTの異常値出現頻度を示したものである。症例が少ないので決定的なことはいえないが黄疸性の場合には発黄前4週間で20%, 2週間前で50%のトランスアミナーゼの上昇がみられる。この時期にはグアナナーゼの異常は認めな

図 2. 血清肝炎における血清グアナーゼとトランスアミナーゼとの相関

図 3. 慢性肝炎における血清グアナーゼとトランスアミナーゼとの相関

った。これに対して無黄疸性の場合は発症 4 週間前に 33 %，2 週間前に 53.3% のグアナーゼ異常を認め、この異常頻度は GOT の異常頻度より高く、GPT とはほぼ一致した。また黄疸性血清肝炎回復期におけるグアナーゼの異常頻度はトランスアミナーゼよりも高いが、無黄疸性血清肝炎では GPT の異常頻度が各時期とももっとも高率を示した。このことは肝炎の予知および経過観察についてグアナーゼ活性がトランスアミナーゼとはまた別の意義をもつことを示すものであると考える。

7. 血清グアナーゼ活性と組織所見 (表 2)

GOT, GPT に関係なく持続してグアナーゼ活性の上昇を示した血清肝炎、急性肝炎、肝硬変症 31 例について、その組織所見を検討した。グリソン鞘への細胞浸潤、Kupffer 細胞の動員、線維化などが高率にみられ、肝実質細胞の障害、境界層の破壊が約半数にみられた。したがってグアナーゼ活性の上昇するものはかなり著明な肝病変のあることを示唆するに思ふ。

以上血清グアナーゼの肝疾患における臨床的意義について報告した。

結 語

1) 健常者 100 例について血清グアナーゼを測定し、 2.6 ± 2.0 I.U. を得た。平均値 ± 2 SD を正常範囲として血清グアナーゼの正常域は 0 ~ 6.6 I.U. であった。

2) 各種肝疾患におけるグアナーゼの平均値は黄疸性血清肝炎 29.1，無黄疸性血清肝炎 10.8，急性肝炎 21.2，急性肝炎回復期 6.2，慢性肝炎非活動型 6.9，慢性肝炎活動型 7.5，肝硬変代償期 6.1，肝硬変非代償期 10.5，混合型閉塞性黄疸 11.8，単純性閉塞性黄疸 1.1，脂肪肝 6.7，原発性肝癌 7.3，体質性黄疸 5.6 であった。

3) 肝疾患以外の他疾患では、骨髄腫、脳卒中、癌性腹膜炎で血清グアナーゼの上昇を認めた。

4) 血清グアナーゼの上昇はある程度肝疾患に対して特異的である。

5) 血清グアナーゼとトランスアミナーゼは、血清肝炎、急性肝炎ではよく相関し慢性肝炎では軽度の相関を認め、肝硬変では相関を認めなかった。

6) 血清グアナーゼと LDH, LAP, コリンエステラ

図 4. 血清肝炎各期における血清グアナーゼとトランスアミナーゼ

表 2. 血清グアナーゼ活性と組織所見

Histological Findings	Cases	Frequency of abnormal Findings
Eosinophilic degeneration	5	16
Ballooning	6	19
Fatty infiltration	8	25
Degeneration of parenchymal cell	12	40
Mobilisation of kupffer cell	28	90
Cell infiltration in glisson's capsule	30	97
Destruction of limiting plate	15	48
Fibrosis	25	80

ーゼとの間には相関を認めなかった。

7) 血清グアナーゼとトランスアミナーゼの鋭敏性については明確な結論を得ることができなかった。

8) 持続してグアナーゼ活性の上昇するものでは、組織学的にグリソン鞘への細胞浸潤、Kupffer 細胞の動員、線維化、肝細胞の障害、限界層の破壊などがみられた。

ご指導ならびに御校閲を賜った増田正典教授、葛谷覚元助教授に深謝する。またご協力いただいた増田内科肝研究班、国立神戸療養所の諸兄に感謝する。

文 献 1) Schmidt, G.: Über den fermentativen Abbau der Guaninyl säure in der Kaninchenleber. Z. Physiol. Chem. 208: 185, 1932. 2) Roush, A., and Norris, E.R.: Deamination of 8-Azaguanine by Guanase, Arch. Biochem, 29: 124, 1950. 3) Hirschberg, E., Kream, J. and Gellhorn, A.: Enzymatic Deamination of 8-Azaguanine in Normal

and Neoplastic Tissues. Cancer Res. 12: 524, 1952.

4) Levine, R., Hall, T.C., and Harris, C.A.: Guanase Activity in Normal and Neoplastic Human Tissue. Cancer, 16: 269-272, 1963. 5) Hue, A.C., and Free, A.H.: An Improved Method for the Determination of Guanase in Serum or Plasma. Clin. Chem. 11: 708, 1965.

6) Whitehouse, J.L., Knights, E.M., Santos, C.L., and Hue, C.A.: Clinical evaluation of serum guanase as a liver function test. Clin. Chem. 10: 632, 1964. 7) Knights, E.M. Jr., Whitehouse, J.L., Hue, A.C., and Santos, C.L.: Serum guanase determination: A liver function test. J. Lab. and Clin. Med. 65: 355, 1965. 8) McLeod, S.: Evaluation of serum guanase as a liver function test. Canad. J. of Med. Tech., 29: 60, 1967.

9) Shibata, H.: Study on the Serum Guanase

Activity in various Diseases. Acta hepatologica japonica 7: 46, 1966. 10) Caraway, W. T.: Colorimetric Determination of Serum Guanase Activity. Clin. Chem. 12: 187, 1966.

追加: 新田俊男 (国立神戸療養所) 私ども国立療養所の11施設が参加して, この2年間に行った共同研究の成績を追加する。主に胸部手術前後の同一血清の3750件のうち GPT が51単位以上の異常値を示したものは12.7%であるが, guanase 6単位以上の異常値を示したものは24.1%に達した。トランスアミナーゼの陽性度が高度になるにつれて guanase も漸次上昇して相関することが認められた。GOT についても同様の結果を得た。

次にトランスアミナーゼ陰性の保存血について, さらにグアナーゼ検査を行い, 血清肝炎の発生率を比較検討した結果, 神戸療養所では135件の保存血液中22件16.3

%の高率に guanase 陽性をみており, 肝炎の発生率は183例中37.2%, そのうち黄疸は9.8%にみている。

これに反し旭川療養所ではグアナーゼ陽性の保存血は203件中6件わずかに2.9%にすぎず肝炎発生率も125例中11.2%, 黄疸は3.2%と神戸に比し約 $\frac{1}{3}$ 以下の発生率であった。

日本輸血学会の血清肝炎調査報告でも北海道地区とそれ以外の地区で血清肝炎発生率に著しい差のあることが指摘されているが, 私どもの行った保存血のグアナーゼ陽性率にも地域的に有意の差が認められた。血清肝炎の予防はトランスアミナーゼのみのスクリーニングでは未だ満足すべき結果を得ていないのが現状であり, この点では guanase による二重スクリーニングを行うことにより, 血清肝炎の発生率を少しでも減少せしめ得るのではないかと考えられ, 今後検討を続けたい。

8. アイソザイムよりみた肝疾患の診断

沢 木 侑 二*

現時点での isozyme の肝疾患における診断的応用と今後の方向について多くの研究者の報告を総括して述べることにする。現在用いられている材料としては血清, 尿, 肝, 胆汁, 腹水などをあげることができるが, 日常臨床的には血清が最も広く用いられている。また, 肝疾患に用いられる酵素として次のごとき酵素が知られている (表1)。

1. LDH isozyme の肝疾患への応用と問題点

急性肝炎, ビール性肝炎にて血清 LDH₅ 分画の上昇することは多くの研究者の認めることであり, 慢性肝炎, 肝臓にて LDH₃, LDH₅ 分画の上昇すること, 黄疸のない肝炎の発見に LDH₅ 分画の上昇がしばしば有用であることは周知のことであろう。この場合特に重要なことは測定方法, 測定条件の影響であろう。すなわち次のごとく臨床的に tetrazolium の還元反応を用いる場合と, NADH の蛍光を利用する場合とでその値に差異のみられることである。カラムクロマトによる分離と比較して

表 1. 肝疾患に主として用いられる isozyme

Alcohol dehydrogenase	(EC. 1. 1. 1. 1)
Aldolase	(EC. 4. 1. 2. 13)
Aminopeptidase	(EC. 3. 4. 1. 1)
Alkaline phosphatase	(EC. 3. 1. 3. 1)
Adenosine deaminase	(EC. 3. 5. 4. 4)
Glutamate dehydrogenase	(EC. 1. 4. 1. 3)
GOT	(EC. 2. 6. 1. 1)
GPT	(EC. 2. 6. 1. 2)
β -Glucuronidase	(EC. 3. 2. 1. 21)
Glutaminase	(EC. 3. 5. 1. 2)
Hexokinase	(EC. 2. 7. 1. 1)
ICD	(EC. 1. 1. 1. 42)
LDH	(EC. 1. 1. 1. 27)
MDH	(EC. 1. 1. 1. 37)
5'-nucleotidase	(EC. 3. 1. 3. 5)
Ribonuclease	(EC. 2. 7. 7. 16)

もこのことは当然起こり得ることである。また tetrazolium の還元反応を用いるときでも水素伝達系として

* Sawaki: 名古屋大学第3内科。

PMS と diaphorase とでは当然差異が生ずるのである。このようなことより各研究者による各臓器 LDH isozyme の比を比較してもその値が異なっているのに気づく。さらに tetrazolium の還元反応に関係するものとして蛋白, SH, "Nothing" dehydrogenase, 2 次的に NADH oxidase などが注目されよう。これらの影響をどう解釈するかがきわめて大切であろう。現在 "Nothing" dehydrogenase として次のごとき酵素反応に関係するものと考えられている。一方 NAD 不要な LDH (おそらく flavin 酵素?) の存在も忘れてはならないであろう。したがっていずれにしても阻害剤などを用いて LDH であることを確認することが必要である。最近私たちは LDH の基質特異性について注目し, LDH isozyme の生理的意義を考える場合極めて重要であることを指摘してきた。現在表 3 のごときものが LDH の基質となり得るのである。

また, LDH isozyme の half life が疾病時に短縮することも知られている。これらの複雑な問題を種々の角度より検討し臨床的に応用することが LDH isozyme の研究をさらに一歩すすめるために重要なことであろう。

2. 肝の障害度を示す酵素としてのミトコンドリアの酵素

ビィルス性肝炎, 肝障害度の強さに応じて, ミトコンドリア局在 GOT の血清への遊出が知られている。一般に血清中では β - γ への移動度を示してくるが, その血清中での存在様式についてはなお十分明らかにされていない。同様のことは MDH, ICD, GPT などにおいても認められる。ある場合にはステロイド剤の効果がみられ, しばしば必要である。

3. 肝癌における血清酵素アイソザイムの変動

肝の癌化。肝への癌の転移に際して血清酵素特性の変化がその診断に広く利用されてきた。

なかんずく LDH₃, LDH₅ 分画の上昇, alkaline Pase の上昇と特性の変化, 特に alkaline pase の胎盤化, 高

表 2. Nothing dehydrogenase に関係する反応系

- 1) Peare, A. G. E. (1959) Protein-bound SH
- 2) Barnett, H. (1962) Protein-bound SH
- 3) Barnett, H. (1963) LDH
- 4) Graymore, C. (1965) LDH
- 5) Shaw, C. R. & Koen, A. L (1965) ADH
- 6) Sawaki, S. et al (1966) LDH, ADH.
- 7) Pashev, I. G. (1967) GDH.
- 8) Robbins, J. H. (1967) Aldehyd. dehydrogenase
- 9) Ressler, N. et al (1967) GDH, MDH

表 3. LDH の基質特異性について

- 1) 1950 : Meister,
Pyruvate
 α -Ketobutyric acid
 α, γ -diketovaleric acid
 α, γ -diketocaproic acid
⋮
- 2) 1959 : Markert & Møller
Lactate
 α -Hydroxybutyrate
 α -Hydroxy-N-caproate
⋮
- 3) 1964 : Fishbein & Bessman
 γ -hydroxybutyrate
↔ Succinic semialdehyde
- 4) 1965 : Meister
Glyoxylate → Glycolate
1967 : Sawaki 氏
Glyoxylate → oxalate

分子 alkaline Pase の出現などが注目されてきた。一方 aldolase の基質として F-1.6-P/F-1-P 比の上昇, glucokinase より hexokinase への変異, DNA polyn:e-ase の変化などが癌化の診断として応用されている。おそらく今後癌の診断と本態解明への一つの手段として重要な位置を占めるものといえよう。

4. 肝疾患における酵素蛋白の変化および血清酵素の存在様式について

肝のある種の病態に対して肝内酵素の質的变化が次第に注目されてきた。たとえばヒトの肝 alcohol dehydrogenase がアルコール中毒患者では K_m , half life, 至適 pH などが変化するといわれる。肝 alcohol-dehydrogenase の変異と考えることができる。一方血清内における

図 1. LDH isozyme を測定する反応

酵素蛋白の質的变化として、抗体との関係を含めて肝の自己免疫疾患の表示として興味をひいてきた。なかんずく Lupoid 肝炎における IgA と LDH の Linkage 肝の線維化、肝硬変症などにおける IgA, IgM と LDH の Linkage など興味深い。肝硬変における macromolecule amylase の出現、 α_2 -macroglobulin と cationic GOT との interaction などが現在注目されている。このような血清内における酵素蛋白の存在が自己免疫とどのような病態生理学的意義を有するかは今後の課題である。

5. 結 論

現時点での肝疾患における isozyme の診断的意義としては肝疾患の補助的診断、肝の病態解明への手段、肝癌の診断、病態解明への応用、自己免疫疾患としての肝

疾患への応用などが考えられる。今後の進展を期待したい。

文 献 1) Latner, A. L. et al: Isozymes in Biology & Medicine, Academic Press, 1968. 2) 高橋浩: 臨床病理 14: 417, 1966. 3) Levitt, M. D. et al.: New. Eng. J. Med. 278: 474, 1968. 4) Villa, L. et al.: Klinwchsch 45: 444, 1967. 5) 高杉年雄: 医学のあゆみ 59: 515, 1966. 6) 服部信: 肝臓, 10: 69, 1969. 7) 宮地一馬ほか: 日内会誌, 57: 940, 1968. 8) 鈴木宏: 医学のあゆみ 65: No. 2. おほえがき, 1969. 9) 沢木信二: 第17回日本医学会総会学術講演集 1: 442, 1967. 10) 沢木信二ほか: 生物物理化学 13: 242, 1968,

9. ICG クリアランスよりみた肝疾患の診断

安 部 井 徹*

Indocyanine Green (以下 ICG) は、肝外排泄の少ない点や、副作用のない点で、肝の色素代謝異常を知るのに、BSP よりも用い易い。一般には、ICG を体重キログラム当たり 0.5mg 静注し、15分後の血中濃度を測定し、零時の濃度を 1mg/dl とみなして、15 分後の血中停滞率 (R_{15}) を計算し、肝の色素代謝異常の指標としている。

このようにして定められた停滞率の臨床的意義は、肝のびまん性炎症や巣状病変によって起こるところの、肝細胞全体の機能量を、停滞率が代表しているということである。確かに、他の肝機能検査に比べて、BPS や ICG は最も鋭敏に肝機能量と平行することが、臨床では知られている。

しかしながら、理論的には、必ずしも ICG 停滞率は肝細胞の機能と、量的に平行するとは限らない。

ICG を静脈内注射したのち、血中 ICG 濃度は、正常人では図1のごとく変化する。半対数グラフ上では、図のごとく、まず直線状に下降し、ある時点から変曲が

図 1. a source of overestimation of plasma disappearance rate

起こり、以後はゆるやかに下降する。直線の部分では、ICG が直線の勾配 K という唯一の常数によって規定されて、血中から消失していることを示している。この K

* T. Abei: 東邦大学阿部内科.

は血中消失率と呼ばれていて、肝細胞の ICG 摂取率によって定まると一応考えられている。肝細胞の ICG 摂取率は、一つには肝細胞の機能量と平行するので、血中消失率は肝細胞の機能量の指標ともなり得る。しかし変曲してから以後の曲線の変動には、肝内の ICG 蓄積量や、肝内移送、胆汁への分泌などが関係してくる。したがって停滞率がこの ICG 曲線のどの部分で測定されたかによって、停滞率の意味するものは違っているはずである。図1のごとく R_{15} が変曲以後に測定されると、停

図 2.

滞率は血中消失率だけではなく、ICG の肝内蓄積状態や肝内移送、胆汁への排出状況にも影響されていることになる。図の点線で示したように ICG が 15 分後に尙直線状に下降している場合には、停滞率は消失率 K とまったく同一の意味をもつ。そして図2に示すように、 K と R_{15} との関係は、図に示した曲線で示されるはずである。

多数の肝胆道疾患について、実際に K と R_{15} との関係をしらべてみると、図2の点のごとく分布する。多くの場合、これらの点は曲線からそうはなれたところに分布していないので、統計的には、 R_{15} と K とは同一の

意味をもったものと考えても悪くはない。しかしなお曲線からはずれた例もかなり認められ、 R_{15} を K の代用とすると、 K の過大評価をきたし得るのである。

消失率 K は表1のごとく、肝実質障害の程度とかなり平行した値を示す。したがって肝実質障害を知るには、 K が R_{15} よりもより適当であるように思われるが、 K は肝細胞の機能と同時に ICG を肝に運ぶところの、肝血流量にも影響される。イヌに Pitressin を毎分 0.2 単位で注射すると、肝血流量の変化とともに K が減少することがみられる。

このように停滞率も血中消失率も、厳密に言えば、決して肝細胞機能量の指標ではない。

そこでもっと肝細胞機能量と直接的な関係にある指標として、われわれは肝の ICG 保持容量 (Capacity) を提案した。

肝の ICG 容量とは、ICG 25mg 静注後数 10 分して起こる ICG 血中濃度曲線の変曲までに、ICG が血中から消失した量である。実際には ICG 静注後、留置テフロン針を用いて、50 分間 3 ないし 5 分ごとに採血して、濃度曲線を半対数グラフ上に書き、変曲点を求めるのである。変曲時点の血中濃度に、零時の ICG 濃度から計算される血漿量を乗ずると、変曲時点に血中に残った ICG 量が算定される。注射量 25mg からこの残留量を減じた値は、変曲までに血中から肝に通過した ICG 量である。この量は、変曲時点に肝内にはいつている ICG 量と変曲までに肝から胆汁に分泌された ICG 量との和である。変曲が起こるのは、肝が ICG で飽和されたことを示すと考えるならば、この肝にはいつている ICG 量は、肝が ICG を保持し得る最大量（この条件下における）であると考えることが可能である。したがって真の保持量は、血中から消失した量から、胆汁に逃げた量

表 1. Icg cleance in various diseases

	No. of cases	Retention (R_{15})	UP-TAKE (K)	Capacity (mg)
Control	20	2.8	0.270	>23.8
Cirrhosis	24	43.2	0.064	13.8
Hepatitis acute stage	5	23.3	0.102	19.1
intermediate	5	13.7	0.153	22.5
convalescence	12	12.3	0.196	23.4
chronic	15	11.2	0.193	22.5
Hepatoma	10	14.3	0.140	19.7
Biliary tract disease	10	17.4	0.158	21.2
Dubin-Johnson Syndrome	1	10.1	0.350	23.6

図 3. serum icg curve & distribution of the dye with time in a healthy dog

を差引いた値であるが、この時点までに胆汁に逃げる量は、イヌで実験してみると図3ごとく胆道閉塞のない、すなわち最も大量に胆汁に逃げ得る条件でもせいぜい投与量の1割にも満たない。胆汁への分泌の障害された場合、即ち病肝や胆道閉塞性疾患ではもっと少ないはずである。したがって、これを無視して、血中から肝に通過した量を肝の ICG 保持能と考えても、大した誤差にはならない。

ICG 保持能は、血中から ICG が消失する速度には無関係である。したがって胆血流量の変化はこれに影響しないはずである。肝の ICG を保持し得る能力は、肝の大きさ、いいかえれば肝細胞機能の量と平行すると考えることができる。胆道閉塞などによって起こるビリルビンの肝細胞内蓄積が、ICG の保持量に直接影響するかどうかは、いまだ検討していないが、患者についてみれば、表1のごとく、胆道閉塞性疾患では、Kが落ちているに比して、Capacity はよく正常に保たれている。Capacity の多少の低下は、特に長期の閉塞でみられるから、むしろ二次的な肝細胞機能量の低下によると考えられる。

ICG Capacity は、肝の慢性実質障害においては、血中アルブミン濃度とは、5%以下の危険率で正の相関を示すが、他の肝機能検査とはまったく相関はない。慢性肝実質障害では、血中アルブミン濃度は、実質障害の程度に平行することを考えるならば、この関係はむしろ当然といえよう。

肝硬変症についてみると、表1のごとく、本症では、血中消失率 K が最も小さく、また、Capacity も最も低下している。これを門脈高血圧の有無でみると図4のごとく、門脈高血圧のない患者では、K が大きく、ある患者では K が小さい。図の○印は門脈高血圧、腹水ともに

図 4. Correlation between ICG Capacity & Uptake Rate in Cirrhotic Patients

ある患者である。また腹水なき患者では Capacity が大きく、腹水のコントロールのむずかしい患者では、Capacity が小さい。腹水の成因として門脈高血圧だけでなく、肝実質の機能障害が重要な因子であることを考えるならば、図4に示す関係は、Capacity の意味するものをよく示していると考えられる。矢印は、患者の経過と K、Capacity の変化を示している。

したがって Capacity と K との比較によって、ICG の血中停滞の要因が肝細胞量の低下によるか、肝血流量の低下によるかを判断することも可能で、肝硬変症の診断や予後決定するうえに役立つと思われる。

以上の実験的、臨床的実験成績からわれわれは ICG クリアランスの判定上、ICG 保持容量を一つの指標とすることを提案する次第である。ICG 保持量は、肝細胞機能量の大きさを最もよく反映し、これは肝血流量には影響されず、また胆汁うっ滞そのものにも影響されない点で停滞率や血中消失率よりも、すぐれた指標であると考えられるのである。

質問 山本貞博(名大第2外科) 安部井先生には、肝切除と胆道閉塞の場合は ICG clearance はあまりかわらないというお示しの結果につき、私どもの知見と多少異なる点があるが、いかがであろう。私どもの経験では、肝切除の場合、次第に切除範囲を拡大すると20~30%ごろに一度 data の混乱期があり、それをすぎると次第に減少傾向が安定し、その後60~80%に至ると激しい肝血流量減少を生ずるようである。それから胆道閉塞も程度と進行状態がさまざまな影響をもっていると思う。

答 肝切除は30%ぐらいまでしか行っていない。この範囲では K には変化を認めないが、ICG Capacity には明らかな変化を示した。

閉塞黄疸症は患者の実例で発黄後3日目に行ったものである。黄疸の長くなった場合には、Kは小さくなる傾向があるが、ICG capacity はよく待たれている点興味あることと考えている。

質問 河田 肇(大阪労災病院内科) 肝腫瘍の超音波診断で false negative のパーセンテージはAスコープ方法とBスコープまたはコンパウンド方式でどの位相違があるか。また腫瘍の場所による発見の難易の差はいかか。私どもは肝右葉の横隔膜直下、肋弓内肋内にかくれ

た部位では、シンチカメラの正面および側面像で確認した腫瘍を超音波では検出しがたい例が多いように思う。

答 1) 腫瘍の場所および広さにより異なるので一概には申し難いが、Aスコープ、Bスコープ併用して肝癌の発見率は91%であり、したがって見のがした率は9%である。

2) detect され難い場所は左葉である。横隔膜附近の腫瘍はコンタクト・コンパウンド・スキニング方式よりむしろAスコープのほうがdetectしやすい。

10. 電顕よりみた肝疾患の診断

伊 藤 進*

電子顕微鏡的に肝疾患を観察することは、その現われる細胞内小器官の病変が、多くは非特異的所見を示すこと、個々の細胞によって、かなり病変を異にすること、さらに、きわめて限局性の部分であることなどから、肝疾患の診断というよりは、むしろ光顕的に所見の不明な部分を、より明確に把握し、さらに種々なる肝の機能との関連を考察することによって、病態・病変あるいはそのメカニズムを、より精細に理解する点にあり、これに欠くべからざる方法であろうと考える。

最近、臨床的にもはなはだ興味ある基礎的実験が報告されている。すなわち、第1に、Phenobarbital を動物に注入することによって、肝における薬物代謝の亢進が見出され、これは、薬物代謝酵素の誘導を意味することがわかったこと。かつ、電顕的には、smooth surfaced endoplasmic reticulum の増生が認められることが判明した。第2に脂溶性薬剤は、酸化還元加水分解抱合の反応を受け、Polarization によって、より水溶性となるが、その行われる場は同じく SER であるということである。これらの事実が、たとえば肝疾患時の薬剤代謝、薬物に対する耐性、過敏症、中毒、薬剤性黄疸などの諸々の現象に対し、いかなる意味をもつか、人一般に対して妥当性があるか否か、ということの究明はなお将来の問題であるが、以上の実験的事実の上に立って広義の

中毒性病変の形態的变化を検討してみたい。もともと電顕の方法は、なお操作が至って煩雑であり、その途次の操作いかんによって、微細な病変の正当性か否かを解説するに際し、はなはだ困却を覚える場合が少なからずあることを述べておく必要がある。

用いた材料は、健常肝機能者に phenobarbital 投与例2, indomethacin 例1, chlorpromazine 黄疸例2, sulfisomezole 黄疸例1, 同患者に sulfisomezole の challenge 例1, kerophenilbutazone, novobiocin, propylthiouracil 黄疸例各1, ajmalin 黄疸例2, methyltestosterone 黄疸例およびその challenge 例各1, oxymetron 投与例11, アルコール性肝疾患例20, 同アルコール challenge 例2, 反復性妊娠性肝内胆汁うっ滞例1, Wilson 病1, porphyria intermittent acuta 1の計50標本について検討を加えた。以下代表的薬剤例につき、その微細構造的変化を述べる。

Phenobarbital 例: この例は、正常肝機能検査所見を示す者に、Phenobarbital 0.5g 5日間連日経口投与したもので、電顕像は、肝細胞質内に、SER が軽度で増しており、RER の一部には ribosome が一部認められぬ所がみられる(図1)。動物実験ほどの大量を与えることは、人の場合、不可能であるが、人においても、同様の機構が肝細胞内に働いているものと推察される。しかし、この場合、肝機能検査所見はまったく正常である。

* S. Ito: 千葉大学第1内科。

図 1. Phnobarbital 例. SER の軽度の増生, RER の一部の ribosome は認められない, mitochondria には著変がない (×8,700)

Indomethacin 例: これも肝機能検査正常所見者に Indomethacin 3 カ月経口投与したもので, 投与後も肝機能肝組織所見は正常である. 電顕像では SER が細胞質を埋めてかなり増加し, mitochondria 周囲の RER には ribosome を一部欠くが, その他の小器官には変化を認めない. しかし glycogen 顆粒は増している. これら肝機能正常者でも薬剤に対しては肝の薬剤代謝酵素が存在するといわれる SER の活潑な反応即ち増生が認められ, 一つの stress に対する細胞の適応と考えられる所見である.

Chlorpromazine 黄疸例: この場合の SER に関しても, きわめて増生が著しく, 同時に RER も増している部分が認められる.

図 2. Propylthiouracil 黄疸例. glycogen 顆粒は整然と 1 列に並び, SER 増生を示す glycogen body, この近傍には Polysome と mitochondria が多数認められる (×14,600)

Propylthiouracil 黄疸例: Hyperthyroidism に, Propylthiouracil 20 日間投与後発黄したものであるが, 過ビリルビン血症, 軽度のトランスアミナーゼ, アルカリ・フォスファターゼの上昇時の像では, glycogen 顆粒が列をなして並列し, これと密接な関係があるといわれる SER も増生し, glycogen body を形成し, その SER の一部は, RER と連っている部分が認められる (図 2).

Ajmalin 黄疸例: 服用 1 カ月後に発黄, さらに続けて, 4 カ月後に中止. その 20 日後 challenge を施行. アルカリ・フォスファターゼの上昇をみた. その 10 日後生検を施行したもので, 軽度の過ビリルビン血症, トランスアミナーゼ, アルカリ・フォスファターゼの軽度の異常値を示したが, 電顕像では毛細胆管は microvilli の消失を伴って拡大し, 胆色素が見られるが mitochondria の形の不整, その matrix の淡明化, cristae mitochondriales の消失断裂が認められると同時に, 数多く見られる大小さまざまな不整な SER が認められた.

Sulfisomezole 黄疸例: 発黄後約 10 日目に生検を施行したもので, 肝機能検査では, 過ビリルビン血症, トランスアミナーゼ, アルカリ・フォスファターゼが軽度上昇した. 同様に肝細胞内には SER が増し, 一部は不整な大小の形をなして網目状となり, glycogen 顆粒は減少消失している (図 3).

図 3. Sulfisomezole 黄疸例, SER の網目状の増生が著しく, 一部は RER に接続する. 右上部の内腔は microvilli の消失を伴って, 胆色素を容れる毛細胆管 (×8,300)

Challenge は同患者の黄疸消退期に行ったもので, 一過性にトランスアミナーゼ, アルカリ・フォスファターゼの上昇をみた. この場合 SER, RER ともに増生しているが, おそらく再生的な時期に相当したものである. 通常では惹起されぬ薬剤黄疸が, 過敏症として説明さ

れることがある。薬剤によって肝細胞障害がいかんして生ずるか、その解明は今後の問題としても薬剤代謝酵素のなんらかの異常が関与して SER の異常をきたし、いわゆる toxic な病変を惹起するものと推測する。しかし、形態学的になにが toxic か、なにが適応の形かということはおおらかな検討がなされねばならないにしても、この例のように薬剤によって SER が増大し、網目状に大小不規則な配列を示していることは、肝の障害を物語り得るといえるであろう。なお、この例では glycogen 顆粒は減少消失している。

Oxymetron 例：黄疸の出現をみず、一過性の肝機能異常が出現したときのものです、この像では SER, RER ともかなり発達し、同時に mitochondria の巨大化、crystalization がみごとに見出されている。

反復性妊娠性肝内胆汁うっ滞例：本邦ではきわめて稀な疾患であるが、この肝には毛細胆管の microvilli の消失、胆色素出現、mitochondria の cristalloid 形成、sinusoid 側の microvilli の異常な発達とともに、steroid 代謝にも関与するという SER の著明な増生がみられることは興味深い(図4)。この疾患の病因は現在

図4. 妊娠性黄疸例。やや右上部には、胆色素をいれた毛細胆管。左下方は増生をみる microvilli, その間に著明な SER の増生に伴って glycogen 顆粒が豊富にみられる(×9,300)

なお不明とされているが、さきの steroid 剤 oxymetron の肝変化、methyltestosterone 黄疸病変と考え合せ、steroid hormone 代謝にかんする遺伝的な代謝課程の欠陥によるものと推測する。

Alcoholic Hyalin：次に Alcohol, 乱用者にみられ、その特長的所見といわれる Mallory's alcoholic hyalin について若干述べる。まず、Alcohol 乱用者で、やや肝

図5. Alcoholic Hyalin. 右上方の核と左中央の毛細胆管との間に、不規則に走る線状構造とその間をやや電子密度の低い ribosome 様顆粒が散在し、周囲の RER と連る部分もみられる(×7,100)

機能の回復した時期に Alcohol 170g 4日間経口負荷したものの電顕像を見ると、毛細胆管を囲み増加した SER, lysosome のほかに、sinusoid 側の microvilli が著明に入り組んで増生した像が見られる。同時にまた、RER が著しく増している部分も認められる。一方、他の肝細胞には、核に近く無秩序性に走行する線状の構造物が錯綜して見られ、その間に ribosome 様の顆粒が散在し、一部は RER に連続する病変部が認められる(図5)。すなわち Hyalin の初期病変と考える所見が得られた。つぎに、光顕的に典型的な Hyalin 部分を電顕的に検索してみると、核の周囲にやや不整な排列を示す RER と polysome が認められ、さらにこれと連続して、指紋状の層状構造物および変性した ribosome 様顆粒からなる層が形成され、さらにこの層は融合した顆粒を思わせる電子密度の高い不整な集塊を周囲に散在させる電子密度の高い稠密な部分に移行している。この稠密な部分の内部にも細線維状構造物が不規則に走行している。

従来 Hyalin に関して、あるいは mitochondria 由来、あるいは一部に RER 由来と考える説がある。しかし、上述の所見になお明らかでない点もあるが、われわれは ER とくに RER の denaturation と考え、しかも ER の増生と変性とが強く相互に惹起された結果であろうと推測している。

次に特殊な代謝性疾患である Wilson 病, Porphyria について言及する。

Wilson 病：いままで述べた薬剤性変化と異なり、これは lysosome 内に、細顆粒状の電子密度の高い集合体

がみられ、また lysosome の融合体と考えられる像の内部にも同様の細顆粒が見出せる。これは、銅色素と密接に関連し Wilson 病に特異的な病変と考える。さらに、光顕的に多数見出し得る空胞化した核は、電顕的にはほぼ glycogen β 顆粒大のものが充満し、Wilson 病に伴った特長的な所見であるといえる。

Acute intermittent porphyria : 肝細胞内に異常に glycogen 顆粒がみられる特異的所見があるとともに、血中 cholesterol 値がやや高値であるのに伴ってか、細長い大小の cholesterol 結晶が認められる。SER は cholesterol 合成にも関与するといわれている点でも興味ある所見である。

以上種々の薬剤、Alcohol その他特異的代謝疾患につき肝細胞の微細構造を述べた。すなわち SER は脂溶性薬剤の Polarization に重要な役割を演ずるほか、cholesterol, steroid 代謝にも関与し、一方、RER は蛋白の合成分泌に与かるといわれる。これらが薬剤の影響を受け、SER が増生し、その一部は RER と連続し、かつ RER も一部増生している変化がみられた。また一部の病変部では SER が網目状に細胞質を埋め、さらに、mitochondria の病変も一部疾患で認められた。妊娠性胆汁うっ滞では蛋白同化 steroid, methyltestosterone 例と同様の病変が認められたことから、病因的にも手がか

りがつかみえたこと、Alcoholic Hyalin は ER とくに RER の変性と考えられること等を述べた。SER の増生は、それ自体の増大であって、これに RER の行う蛋白合成が関与するといわれることは興味深い。中毒代謝異常時には、これら小器官が増生と変性、すなわち適応と中毒性病変とを相互に関連させつつ変化するものと考え、この臨床・組織および電顕像すなわち形態と機能との関連性がさらに精細に解明されることを期待する。

質問：大岡照二（国立大阪病院内科）

Alcoholic hyalin body の電顕像について、

1) 場所をかえて観察することにより hyalin の時間的推移を観察することができたか、

2) Hyalin を含む肝細胞の周辺には特長的な組織反応がみられるが、電顕的にはどうであったか。

答：第1問に対しては、提示した写真の最初のものは hyalin の初期像と考えるもので、同一標本の中にも各種の発展段階がある。

第2問に対しては、rER の発達が著明で free ribosome や polysome が富んでおり、一部は hyalin 構造に移行しており、mitochondria はこれに比し、著変はなく、Hyalin は mitochondria からのものとは考えない。

* * * * *