第6回日本肝臓学会総会 シンポジウム (V)

自由主題

<司会> 中 村 隆 (東北大学 内科 教授)
山 田 弘 三 (名古屋大学 内科 教授)

1. 四塩化炭素肝硬変における肝内血液循環の 変化と病理形態学的変化との相関について

中 田 勝 次 藤 本 圭 一 福 本 攻*

本研究は肝硬変症における肝血流量減少や門脈高血圧の原因発生を、形態学的変化との関連に重点をおいて解析することを目的として行われた。

ウイスター系雄ラット 21 匹に、四塩化炭素・オリーブ油等量混合液を体重 100g 当たり 0.1ml/ ずつ週 2 回、4~6 ヶ月間皮下に注射し、肝硬変 (7 匹) および肝線維症 (12 匹) を作った。肝を摘出し、灌流実験装置にかけて、肝血流量、肝血流量/ 灌流圧関係を測定した。灌流液はヘパリンを添加したラットの新鮮血で、Ht 値は 36%、酸素飽和度は 85% 以上である。灌流実験終了後に門脈よりバリウム・ゲラチン混合液を注入し、フォルマリン固定後 X 線撮影を行って肝内門脈の走行を調べ、第 1 次より第 8 次分枝にいたる肝内門脈の内径を計測し、さらに灌流実験に供した肝臓の組織切片を作り、H-E 染色、アザン・マロリー染色および鍍銀染色を施して病理組織学的変化を調べ、また integrating ocular lense を用いて肝実質単位面積内における肝細胞と類洞の積分を測定し、この値と肝血流量との相関を検討した。

1) 本実験で生じた肝硬変は肉眼的に微細な顆粒状を呈し、偽小葉はほぼ輪状で acinus に相当し、中心静脈周囲に増殖した幅の狭い結合組織隔壁に取り囲まれている。グ氏鞘は偽小葉のはほぼ中央に位置し、中心静脈は偽小葉の最外層に偏位している。グ氏鞘にはほとんど線維増殖を認めなかった。なお肝線維化の程度に止まったもの (12 匹) においては、中心静脈の周囲に種々の程度の線維増殖と、著明な肝細胞の再生像を認めた。硬変肝およ

び線維化肝の肝細胞は正常肝細胞に比して明らかに腫大しており、正常ラット肝細胞の平均直径が約 16 μ であるのに対して線維化肝および硬変肝では 18~19 μ 、なかには 20 μ を越える例もあった。また、線維化肝、硬変肝では肝細胞にしばしば脂肪変性や硝子滴封入体がみられ、核は大きく、分裂像や 2 核細胞がみられた。かかる肝細胞の腫大とは逆に類洞は著明に狭窄されていた。Integrating ocular lense による肝実質単位面積内肝細胞および類洞の占める率は、正常肝においては、それぞれ平均約 75% および 25% であったが、線維化肝においては 83~87% および 17~13%、硬変肝では約 90% および 10% となり、後 2 者においては腫大した肝細胞によって類洞床が著しく減少していた (図 1)。

2) 正常ラット摘出肝における肝血流量 (門脈血のみ) は灌流圧 13.5 cm (肝門=0 cm)、Ht 値 36% の条件で平均 3.24 ml/g/min である。線維化肝および硬変肝においては同じ条件で 1.5~2 ml/g/min、すなわち正常肝血流量のはほぼ 1/2~2/3 に減少していた (図 2)。灌流圧の上昇または下降に伴う肝血流量の変化は正常肝においては図 2 上の線の示すごとくであるが、線維化肝や硬変肝においては図 2 下の線のごとく低く、かつ勾配が著しく緩くなっていた。これは線維化肝や硬変肝においては肝内血流抵抗が上昇し、肝内血管が強直化していることを示す。また、線維化肝や硬変肝においての肝血流量を正常肝血流量にするには、20 cmH₂O 以上の灌流圧を必要とした。この事実は、門脈高血圧は硬変肝における肝血流量をできるかぎり正常に保つための合目的現象であることを示唆するものと考えられる。

*K, Nakata, K. Fujimoto, O. Fukumoto: 大阪医科大学 病理学教室。

図 1. Intergration of liver cell and sinusoid in liver parenchyma

図 2.

図 3. Relationship between intergration of liver cell in paranchyma and hepatic blood flow

3) 維線化肝や硬変肝における肝内門脈樹の走行および分布のパターンは、正常肝のそれに比してややぎこち

ない感じを与える。しかし、門脈枝の末梢にいたるまで均等に造影剤が注入されており、肝内門脈の狭窄や「つぶれ」はみられなかった。肝門部より第8次分枝にいたる各分枝の内径に関しては、線維化肝や硬変肝と正常肝の間には、ほとんど差がなく、第9次以下の門脈枝については組織学的に検索されたが、ここにも目立った狭窄や閉塞などを見出すことができなかった。

4) 肝血流量（灌流圧 13.5 cm H₂O 時）と肝実質内肝細胞占有率との関係は図3に示すごとくであった。すなわち、肝細胞が実質内において占める面積 80% 強を中心として、S字型のカーブを描く相関関係が見出された。この成績は肝血流量は肝実質内における肝細胞面積に逆相関、類洞床面積の2乗に正に相関し、線維化肝や硬変肝における肝血流量減少は肝細胞の腫大、類洞床の減少に基因することを示している。

5) 本実験においては中心静脈周囲に種々の程度の線維増殖がみられた。かかる線維増殖と肝血流量減少とは必ずしも密接な相関関係はないように思われた。

総括 四塩化炭素肝硬変はヒトの粗大結節性硬変とは、かなり様相を異にしている。したがって肝血流量の減少に pre-postsinusoidal block がほとんど関与していないという本実験成績を、そのままだちにヒトの肝硬変症の肝血流量減少や門脈高血圧症の発生原因に適用するわけにはいかない。しかし偽小葉内において肝細胞は腫大しており、それとは逆に類洞床が著明に減少しているという成績は、ヒトの肝硬変においても肝細胞の腫大による類洞床減少が、門脈高血圧の重要な発生原因になることを示唆しているように思われる。

質問：島田宜浩（岡山大 小坂内科） 四塩化炭素肝障害における肝循環動態の成績はヒトにおける Virus 肝炎→肝硬変の成績と比較して、きわめて興味があった。ところで、このような研究において、門脈と肝類洞にある分配静脈、類洞と中心静脈の間にある集合静脈が主要な役割をもっていると考えますが、先生のご意見とその研究方法についてご教示いただきたい。

答：中田勝次 動物における四塩化炭素硬変はヒトの肝硬変とはかなり様子が違い、また形態学的変化を定量的に表現するのは大変むずかしいことである。ただ integrating ocular を使うと類洞や肝細胞の直径や面積をかなり正確に測定できるので、これらの成績と肝血流量との相関については、かなりはっきりしたことがいえ、その結果は先に申し上げたとおりである。

四塩化炭素肝硬変の場合には、グ氏鞘に線維化や門脈

最終枝のつづれなどはみられずバリウムを注入するとバリウムが類洞の始まりの部分までよく注入されている。したがって、こういうところには血流を阻止するような変化はないと思われる。

集合静脈や中心静脈の回りには線維増殖が起こっているが、その程度と肝血流量との間には有意の相関はない。しかし、線維増殖の結果、あるいは他に血管の、たとえばびずみのようなものがあって類洞血の流出を阻害して

いるとしても、その変化を客観的（定量的）に表現するのは非常にむずかしいことと思う。今後工夫していきたいと考えている。

追加：志方俊夫（東大 病理） 人体の、ことに肝炎性肝硬変に近い病変を示すモデル実験として、黄変米を適量与えた実験、あるいは門脈領域に変化を与える蟻酸アシル、黄変米の含塩素ペプチド等による実験による肝内血流量の変化をぜひお調べいただきたい。

2. 門脈肺循環短絡を活用する門脈永久遮断の 生体に及ぼす影響について

迫 田 晃 郎 小 野 二六一 海 田 紀 夫 井 上 博 水
川 田 拓 郎 有 馬 義 孝 武 末 昌 治
上 村 俊 朗 猪 島 康 公 秋 田 八 年*

目的 門脈血流遮断時の病態生理の究明と遮断後生存を可能ならしめる方法の開拓は、なお今日の課題の一つである。我々は先に、Eck 型門脈下大静脈吻合術に代り得る門脈の急性永久遮断を可能ならしめる方法として、脾肺固着術により予め、門脈肺循環短絡路を準備する方法を提示した。今回はこの方法による門脈急性遮断の生体に及ぼす変化を追究検討した。

方 法：正常対照群（Ⅰ群）、胸部下大静脈狭窄群（Ⅱ群）、脾肺固着+胸部下大静脈狭窄群（Ⅲ群）について、門脈本幹の急性遮断を行い大腿動脈血圧、門脈圧、中心静脈圧、血液ガス分析、肝、脾その他の臓器の組織学的変化を観察した。

成 績 1) 門脈遮断後Ⅲ群の門脈撮影で著明な門脈肺循環短絡路が造影され、遮断後期日の経過とともに、さらに向肝性副血行路が形成され、奇静脈への副血行路形成の加わるものもある。2) 動脈圧はⅠ、Ⅱ群で門脈遮断後急激に下降し遮断2分後対照値の $1/2$ に下降以後漸進的下降がみられる。Ⅱ群では血圧下降の度合いがⅠ群に比しやや軽度であるが、結局Ⅰ群と同じく、数時間以内にはほとんど死亡する。Ⅲ群では遮断後下降はみられる

が、Ⅰ、Ⅱ群に比し著明でなく、一定の血圧を維持し生存する（表1）。3) 門脈圧は門脈遮断後3群とも著明な上昇がみられるが、Ⅲ群の上昇の度合いは他の群に比較し軽度である。Ⅰ、Ⅱ群ではショックの進行に伴って、遮断によって上昇した門脈圧の低下がみられた。Ⅲ群も遮断によって上昇した門脈圧の低下がみられたが、低下の度合いがⅠ、Ⅱ群に比し著明で、動脈圧が一定に維持されていることから、門脈肺循環短絡路に流入する門脈血流が遮断後増加することによるものと考えられた（表2）。4) 中心静脈圧の変動もⅠ、Ⅱ群でショックの進行とともに低下を示したが、Ⅲ群ではほとんど変動がみられなかった。5) 動脈血 pH は、Ⅰ、Ⅱ群で遮断30分後、それぞれ 7.201 ± 0.053 , 7.193 ± 0.057 と著明な Acidosis がみられたが、Ⅲ群ではほとんど遮断による変動はみられなかった。Base deficit もⅠ、Ⅱ群で遮断30分後、それぞれ -17 ± 2 , -15 ± 7 と著明な増加がみられたが、Ⅲ群ではほとんど変動はみられなかった。6) 動脈血 PO_2 はⅠ群で遮断後30分 100.5 ± 9.1 mmHg と著明に増加、 PCO_2 は著明に減少し、ショックによる Hyperventilation の影響と考えられた。Ⅱ群では PO_2 にはほとんど変動はみられなかったが、 PCO_2 には減少がみられた。これに対してⅢ群では、遮断前 PO_2 75.9 ± 5.0 mmHg から遮断後10分 68.6 ± 8.2 mmHg、30分後

*K. Sakoda, J. Ono, N. Kaida, H. Inoue, T. Kawada, Y. Arima, M. Takesue, T. Kamimura, Y. Inoshima, H. Akita: 鹿児島大学 第2外科.

表 1. 動 脈 圧 の 変 動 (mmHg)

	例数	遮断前	遮断後 2 分	遮断後 4 分	遮断後 6 分	遮断後 8 分	遮断後 10 分	遮断後 20 分	遮断後 30 分
I 群	7	130±21*	64±25	42±21	36±18	33±17	29±15	24±12	22±9
II 群	5	145±3	78±6	61±2	61±2	55±6	48±25	43±7	38±6
III 群	7	121±17	84±19	79±26	79±26	75±26	76±29	73±29	73±17

*.....Mean±S. D.

表 2. 門 脈 圧 の 変 動 (mmH₂O)

	例数	遮断前	遮断後 2 分	遮断後 4 分	遮断後 6 分	遮断後 8 分	遮断後 10 分	遮断後 20 分	遮断後 30 分
I 群	7	102±22*	713±204	585±170	543±167	516±162	499±153	441±139	440±133
II 群	5	122±32	753±130	667±145	601±124	580±121	542±101	474±75	457±56
III 群	7	123±31	634±200	540±190	467±144	436±133	412±120	350±90	333±75

*.....Mean±S. D.

70.6±9.6 mmHg と有意の低下がみられ、PCO₂にも減少の傾向がみられた。これらのことは門脈肺循環短絡路を介して、門脈遮断によって PO₂ の低下した門脈血が全身循環に流入することを示唆する。

静脈血 PO₂ も動脈血 PO₂ の変動と相まって低下がみられた。I, II 群でも静脈血 PO₂ の低下がみられたが、動脈血 PO₂, PCO₂ の変動からみてショックに伴うものと考えられる。酸素飽和度は I 群で遮断後軽度上昇の傾向がみられ、II, III 群で軽度の低下の傾向がうかがえた。

7) I, II 群で門脈を遮断すると、腸間膜静脈は著明に拡大怒張し、腸間膜は出血斑で被われる。小腸は暗赤紫色となり、一過性に腸蠕動は著しく亢進する腸間膜の動脈の拍動が数分後みられなくなる。脾は、腫大うっ血が著しい。

組織学的に I 群で肝は中心静脈、類洞の拡張、軽度のうっ血がみられ、中心帯に肝細胞壊死、肝細胞索の乱れなど観察されるものもある。

II 群では、胸部下大静脈狭窄による変化が著しいが、遮断によって類洞の拡張、肝細胞索の乱れなどの増強がみられる。脾は I, II 群とも赤色脾随内に赤血球の充満が著明で、うっ血が著しいが、リンパ濾胞には著明な変化はみられない。腸粘膜はうっ血および出血が著しい。以上の対照群の変化に対して、III 群では門脈遮断後一過性に腸は軽度の赤紫色を呈するが、しだいに回復し正常に復する。腸間膜動脈の拍動は消失せず、腸間膜に出血もみられない。III 群の肝は胸部下大静脈狭窄による影響が著しく軽減され、軽度の類洞の拡張がみられるぐらいで、門脈遮断直後の変化は著しくない。門脈遮断後 2 日の肝ではグリソン鞘内のリンパ管の拡張、中心静脈、類

図 1. Pog. No. S-24

脾肺固着+胸部下大静脈狭窄犬門脈遮断 2 週間後の肝洞の軽度拡張、肝動脈拡張、中心帯血液量の増大などがみられる。一部に肝細胞索の乱れがみられた。遮断 2 週後の肝で被膜下およびグリソン鞘内リンパ管の拡張、中心静脈の拡張、肝動脈の拡大肥厚、グリソン鞘結合組織の軽度の増加を認めたが、類洞の拡張はなく、肝細胞索の乱れはみられなかった。遮断 4~5 週後も同様な変化がみられたが、1 例に中心帯の空胞変性、類洞の拡張、肝細胞索の乱れ、中心静脈血栓がみられた。門脈遮断後 8 ヶ月、1 年以上の生存犬の肝は上述の変化がかなり改善され、正常に近い組織像がみられた。これは門脈造影でみられたように向肝性副肝行路形成による肝血行動態の改善によるものであろう。脾にはうっ血の所見はみられず、固着部で新生血管の拡張、静脈洞の拡張、赤血球の充満などがみられる。腸粘膜には組織学的に著変はみられなかった。

結 論 脾肺固着術で予め門脈肺循環短絡路を準備し

ておくことにより生体は門脈の急性遮断に耐え、長期に生存が可能なことを明らかにし、その時の血行動態の変動、肝、脾、腸管などの変化を述べた。

質問：福益良尙（鹿児島大 生化学） 1) 単なる一平面の X ray または鋳型標本のみで門脈～肺循環短絡路といえるか。鋳型標本作成で証明とのことであるが、鋳型標本作成時の注入圧はいかがか。また、後腹膜、横隔膜に発達してできる副血行路発達との鑑別はどうか。

2) PO_2 , PCO_2 の変化との関連において、Pyruvate, Lactate の比の変化は具体的にどのようになっているか。また肝機能との関係として、たとえば TCA-cycle 等にどのような影響を及ぼしているか。

答：迫田晃郎 門脈肺循環短絡路は脾静脈より注入したネオプレンラテックス鋳型標本でも、直視下に肉眼的に脾より肺静脈に向かう副血行路が観察される。また門脈撮影で、前後像、側面像から常識的に判断しても門脈脾静脈を経て脾から肺静脈、左心房にいたる門脈肺循環短絡路と立証される。ここに提示した門脈撮影像でも十分観察いただけると思う。

2) 門脈遮断により Hypovolemia などの原因で Shock を招来する。したがって Acidosis, Hyperventilation により動脈血 PO_2 の上昇, PCO_2 の減少をきたす。TCA-cycle との関連性等についてはいずれ報告したい。

3. 末期肝硬変症に対する胸管成形術

—Thoracic duct-jugular venous anastomosis—

小林 迪夫 小川 勇一郎 井口 潔*

肝硬変性食道出血に対する外科治療成績向上のためには、肝障害の程度に応じて、適正な手術術式を選択することが必要である。我々は、先に、調節的脾腎静脈吻合術、左胃静脈下大静脈吻合術等の諸術式を考案して、外科治療の適応拡大に努めてきたが、今回は、これら術式の適応となり得ない肝障害高度な症例にも、安全に施行できる外科治療法として、胸管成形術を新たに考案したので、救急吐血例、末期肝硬変症例を中心に、本術式を施行した結果を、胸管ドレナージの経験と合わせ報告する。

先に、Dumont らが肝硬変症例に胸管内挿管を行い、正常の数倍に達する胸管内圧の上昇、リンパ流量の増加を認め、これを体外に排出することにより、腹水の減少、門脈圧の低下、食道静脈瘤出血の停止が認められたと報告して以来、胸管ドレナージは門脈圧亢進症、とくに、救急吐血例、腹水例に対する治療法として、実地臨床に用いられるにいった。

我々も、過去、救急吐血例 9 例、肝硬変性腹水例 1 例に本法を施行したが、表 1 に示すように、胸管内径は 4～5 mm、胸管内圧は平均 306 mm 水柱、開放時リンパ

流量は平均 3.9 cc/min と著明に増加し、食道出血に対する効果も 9 例中 5 例に認められた。

しかし、肝硬変症例では、胸管リンパの蛋白含有量は正常例に比して高く、最高 6.4 g/dl、平均 3.3 g/dl もあり、また、胸管リンパの電解質組成は血清の値に近似しているので、リンパを体外に排出させる胸管ドレナージは、術前より低蛋白血漿、電解質のアンバランスな状態にある救急出血例や肝硬変症例にとって、はなはだ不都合な治療法ということになる。また、流出量を調節しても、胸管ドレナージの効果は半減し、ドレナージの閉塞、再吐血をきたす欠点がある。事実、我々も、十分量のリンパを排除できず、ドレナージ閉塞後数時間で再吐血をきたした 3 症例の経験を有している。

以上の経験を通して、我々は胸管ドレナージと同じ効果を永続的に得る目的で、胸管成形術を考案するにいった。

本術式は局麻のもと、左鎖骨線に沿って、約 6cm の皮膚切開を加え、胸管と内頸静脈を血管吻合器を用いて、端々に吻合するものである。胸管は 4～5 mm に拡張しているので、血管吻合器を用いれば容易に吻合でき、また大きな内頸静脈と端々に吻合するので、リンパの流入抵抗の減少が期待できる。事実、本術式施行前後の胸管

*M. Kobayashi, Y. Ogawa, K. Iguchi: 九州大学 井口外科。

表 1. 胸管ドレナージ施行症例

Cases	Diseases	Diameter of Thor. Duct	Pressure of Thor. Duct	Opening Flow Rate	Max Lymph Flow/day	Duration of Drainage	Effect on Bleeding
U. S. 48♀	Cirrhosis	5 mm	350 mmH ₂ O	3.0 ml/min	1.5 l	8 days	+
M. H. 42♂	"	5 "	400 "	3.0 "	1.6 "	2 "	—
I. E. 43♂	"	4 "	—	2.0 "	1.2 "	2 "	—
H. K. 69♂	"	4 "	—	2.0 "	0.9 "	2 "	—
K. S. 56♂	"	5 "	320 "	4.0 "	1.0 "	3 "	+
T. T. 54♀	"	3 "	120 "	1.5 "	0.8 "	1 "	+
S. A. 37♂*	Budd-Chiari Synd.	5 "	600 "	6.0 "	0.4 "	7 "	—
E. T. 30♂	"	3 "	300 "	10.0 "	1.9 "	3 "	+
S. K. 58♀	Prehepatic Obst	3 "	240 "	3.0 "	2.9 "	17 "	+
O. H. 54♀	"	3 "	70 "	3.0 "	1.0 "	1 "	—
Mean value		4.0 mm	306 mmH ₂ O	3.9 ml/min	1.32 l	4.6 days	55%

* Elective cases

内圧を Pressure Transducer を用いて比較すると、シヤント前平均 212 mm 水柱の胸管内圧が、シヤント後平均 133 mm 水柱まで下降し、さらに、リンパの流入抵抗の変化を、シヤント前後における胸管閉鎖時と開放時の胸管内圧の下降度で比較すると、図 1 に示すように、シヤント前平均 39.2% にすぎない下降度が、シヤント後平均 57.8% となり、本術式によるリンパの流入抵抗の減少を明らかにし得た。また、Lymphography により、シヤント後の吻合口の開存と吻合部形状の改善を認め得た。

我々は本術式を現在まで、救急吐血例 4 例を含む 19 例に施行し、救急吐血例では Blakemore's Tube との併用により 3 例の止血に成功した。

待期的手術 15 例では、手術死亡は 1 例もなく、最長 2 年の遠隔調査で、末期肝硬変症の 1 例が術後 9 ヶ月目に再吐血により死亡したのみで、末期肝硬変症に対しても安全な手術法であると同時に、延命効果も期待できるようである (表 2)。

本術式の食道静脈瘤出血に対する持続的効果については、なお慎重な検討が必要であるが、術前吐血例 7 例中、再吐血は 1 例で、救急吐血例、末期肝硬変症例に対する安全な手術法のない現在、まず、最初に試みてよい手段ではないかと考えられる。

さらに、本術式の腹水、肝機能に及ぼす影響をみると、難治な腹水症例に対し、抗アルドステロン剤等の利尿剤との併用により、尿量の増加が認められ、腹水例 11 例中 10 例に、臨床的効果を認めることができた。

図 1. 胸管成形術による胸管内圧下降度の変化

また、肝機能に及ぼす影響についても、Densitometer を用いての術後 ICG 消失率の追跡で、その改善が認められ、血清蛋白も好転する症例が多数認められた。

したがって、本術式施行後、または本術式を併施することにより、肝硬変症例 12 例中 5 例に Major Surgery を施行し得た。

今後、さらに、症例を重ねて、本術式の効果を検討したい考えであるが、本術式の適応としては、

- 1) 食道静脈瘤出血例に対する救急処置として、Blakemore's Tube と併用して有効であること、
- 2) 従来の外科治療法を適応できない末期肝硬変症例

表 2. 胸管成形術の成績 (待期的手術例15例)

	Cases	Postop. Death	Recurrent Bleeding	Effect on Ascites	Improving Liver Function
Cirrhosis of Liver	12	1*	1/5	9/10	5/12
Banti's Synd.	1	0	0/1		1/ 1
Prehepatic Obst.	2	0	0/1	1/ 1	2/ 2
Total	15	1	1/7(14%)	10/11(91%)	8/15(53%)

* Died of recurrent bleeding, postop 9 M.

に対する治療法の一つとして期待されること、

3) 腹水、肝障害を改善して、Major Surgery を安全に行うための補助手段となり得ることなどが挙げられよう。

最近、内科治療の進歩に伴い、肝硬変症例の長期生存が期待できるようになるにつれ、肝障害高度な末期肝硬変症例の出血例が増加し、これら症例に対する適切な治療法のない現在、胸管成形術は適応範囲の広い、意義ある術式となりうるものと考えられる。

質問：山本貞博 (名大 外科) 自験結果からは、胸管リンパを放流すれば、これを血中にもどさなければショックに進入し、採取量を血中にもどせば、何も起こらないものである。本来静脈に還流する胸管を、手術で場所を変えただけで効果があると判断するならば、その機構、たとえば、その圧、流量等をいかに考えておられるのか。

答：小林迪夫 門脈圧亢進症、とくに postsinusoidal に閉塞のある症例では、胸管リンパ流量は正常の数倍に増加し、胸管の拡張がみられる。これを開放してやると胸管の拡張が消失する。このことは thoracic-venous junction に増加したリンパ流に対し、生理的狭窄を生じていることを示している。胸管成形術はこの狭窄を除去して、腹水の生成を減少せしめ、また、腹腔内リンパ床におけるリンパのうっ滞を除去し、ひいては、救急出血例に止血効果をもたらし、さらに、末期肝硬変症例に腹水、肝機能の改善をみて、根治手術を行い得るよう期待して行ったものである。

臨床例の検討でも、本術式の効果は明らかであると思う。

本術式の理論的根拠については、いろいろの意見もあるので、今後慎重に検討したいと考えている。

4. 肝 循 環 の 研 究

——肝再生と肝動脈・門脈循環の関係——

柿 木 千 昌	津 保 善次郎	寺 島 肇
菊 池 武 雄	真 田 勝 弘	長 井 章
森 文 一	吉 橋 重 遠	登 内 真*

肝癌の外科的治療としての広範囲肝切除は残存肝にみられる再生を前提として行われており、肝再生の良否が肝切除の予後を大きく左右する。肝切除後の肝循環動態は大きな変動を受けるにもかかわらず、肝再生の唯一の

原動力として重要な使命を要求されている。我々はこの肝動脈および門脈の血行動態が肝切除後の肝再生に際し、いかなる態度をとり、いかに作用しているかを解明するために以下の実験を行い、若干の知見を得たのでここに報告する。

雑種成犬を用いて 1) 70%相当の広範囲肝切除を行い、これを第 1 群とし、切除直後 24 時間後、48 時間

*C. Kakinoki, Z. Tsubo, H. Terajima, T. Kikuchi, K. Sanada, A. Nagai, F. Mori, S. Yoshihashi, M. Tono-uchi : 東京医科歯科大学 第 1 外科.

後、1週間後、4週間後に肝動脈および門脈の血圧と血流量を測定した。再生肝重量および切除前推定肝重量より再生率を求め、肝循環動態と再生率の関係を検討した。2) 70%相当の肝切除を4週間の間隔で2分割して行い、これを第2群とした。3) 30%相当の肝切除に加えて40%相当の門脈枝を結紮し、これを第3群とした。第2群、第3群の4週間後の血行動態と再生率を検討した。なお測定には電気血圧計および電磁流量計を使用した。

第1群について、動脈圧の変動は、切除直後には下降し、その後若干の変動を経て、4週間後には上昇するが、切除前値には復帰し得なかった。門脈圧は切除直後約40%の上昇を示したが、24時間後、48時間後、1週間後と漸次下降して4週間後には切除前の圧に近い値を示した。

肝動脈血流量は図1に示すごとく、切除直後には減少を示したが、24時間後には、すでに切除前値に回復し、その後の変動は僅少で、動脈圧の変動とは平行しなかった。門脈血流量は肝動脈に比し変動が大きく、切除直後には約30%の減少を示したが、24時間後には一時的に高い値を示したのち、48時間後、1週間後、4週間後と順次血流量は増加し、切除前値に近づく傾向を示した。

これらの血流量を残存肝100g重量当たりの血流量に換算すると、図2に示すごとく肝動脈血流量は切除前に

図1. 肝切除と血流量

図2. 肝切除と単位肝血流量

比し、切除直後には25.3%と増加を示し、その後時間の経過とともに徐々に減少し、切除前値に近づく傾向を示した。門脈血流量は切除前に比し、切除直後216%、24時間後232%と増加した後しだいに減少し、4週間後には132%を示した。すなわち単位肝重量当たりの血流量についてみると、肝動脈、門脈ともに切除直後著明に増加し、その後しだいに減少しているが、肝動脈の全血流量は肝切除後、圧の変動にもかかわらず、経過中の変動が少ない。一方、門脈の全血流量は圧の変化とともにかなりの変動を示している。

これを血管抵抗よりみると図3に示すごとく肝動脈は切除直後若干の抵抗の増大をみたのち、24時間後では、ほとんど切除前値に復し、その後さらに減少しているが、門脈抵抗は切除直後著明な増大を示した後しだいに減少するも、24時間後より1週間後にかけて約2倍の値を保持し、4週間後にいたってはほぼ切除前に近い値に回復している。

肝循環動態と再生率との関係を検討するに際し、再生率の良好な30%相当切除、50%相当切除を70%相当切除に加えて対照群として比較検討した。再生率と単位肝重量当たりの門脈血流量との関係は図4に示すごとく、対照群では単位肝重量当たりの門脈血流量が少ないほど再生率が高い傾向を示し、高い相関関係を有している。第

図3. 肝切除と血管抵抗

図4. 再生率と単位肝門血流量

表 1. 再生率との相関

	切除法	数	相関係数	相関
再生率と HAF/100g 肝	第 1 群	10	-0.51	—
	第 2 群	10	-0.38	—
	対照群	32	-0.39	—
再生率と PVF/100g 肝	第 1 群	10	-0.62	+
	第 2 群	10	-0.06	—
	対照群	31	-0.72	+
再生率と RA	第 1 群	10	-0.26	—
	第 2 群	10	0.43	—
	対照群	32	-0.18	—
再生率と Rv	第 1 群	10	-0.22	—
	第 2 群	10	0.41	—
	対照群	31	0.43	+

1 群は対照群と同様の相関関係を認められるが、第 2 群については相関関係が認められない。一方、単位肝重量当りの肝動脈血流量と再生率とは相関関係が認められなかった。

再生率と門脈抵抗および肝動脈抵抗との関係をみると対照群の再生率と門脈抵抗との間に有意な相関を認めたが、他は相関を示さなかった (表 1)。

第 1, 2, 3 群の切除 4 週間後における肝循環動態および再生率を比較すると、単位肝重量当りの門脈血流量が少ない第 2 群の再生率をもっとも良好であった。

結 論 広範囲肝切除による急激な血管床の減少は、必然的に血管抵抗の増大をもたらす。これは切除直後の門脈系に著明であり、肝動脈系では僅少である。再生現象は諸説があるが、再生の開始される時期の変化として

肝動脈血流量が相対的に増大した状態で開始され、進行して、再生が完成するに従い、切除前の肝循環に復帰するものと考えられる。門脈血流は血管床の変化に対し受動的な態度をとり、血管床の代償的拡張により循環が保たれ、再生の進行に伴い、切除前の循環に復帰する。

第 1, 2, 3 群の再生については単位肝重量当りの門脈血流量が少ない群ほど再生率が良好であった。

追加: 後藤明彦 (岐阜大 第 1 外科) 1) 肝再生の初期に肝動脈血流量が増加することは、肝切除後の核分裂が 48 時間後に peak になるという事実と一致して興味深い。

2) 門脈血流の肝再生に関する問題は私が 10 数年前に Rat を用い、CCl₄, DAB を投与し、肝部分切除および門脈枝結紮により肝再生実験を行ったが、残存葉の肝再生は門脈下大静脈吻合および門脈枝結紮により抑制されることより、肝再生には門脈血流が重要な役割をなすと報告した。

演者は門脈血流が肝再生に対し受動的であるといわれたが、肝部分切除後に門脈血流量が、たとえ減少しても、残存肝への全肝血流量をみると、そのなかで門脈血流量の割合は大きいと考える。

追加: 水戸迪郎 (北大 第 1 外科) 肝再生における肝動脈、門脈血流の意義に関しては、すでに約 10 年前の消化器総会で私たちが発表している。その結果は肝動脈、門脈いずれを欠いても、再生機転、再生像の初期像は電顕上、光顕上、差がないもので (肝切 1 除週内)、その後、門脈血を欠く場合は、再生した肝細胞が萎縮する (術後 2 週) ことから、門脈血は分裂増殖した肝細胞の維持に意義があると考え、追加する。

5. 門脈圧亢進症の外科的治療

—paraesophago-gastric devascularization (東大第2外科法)—

杉 浦 光 雄 市 原 莊 六 野 村 満
二 川 俊 二 羽 田 野 茂*

教室での門脈圧亢進症は359例に達するが、外科的治療の目的は現在では、食道静脈瘤破裂による出血の抑制と防止と脾機能亢進症状である。我々は長年の間、血管吻合術に独自の工夫を加えて施行し、手術適応についても厳重な吟味を行った。しかし、結局は血管吻合例では36%以上もの術後 Eck 瘻症状群の発生をみた。

我々は術後脳症状の多発と肝障害増悪例の多いことから、6年来、Walker の単純食道離断術に2種の合併手術を加え成績を検討してみた。

食道離断術は現在まで70例に行い、うちわけは肝硬変30例、肝線維症25例、先天性門脈異常13例、日本注血吸虫症1例、脾癌による肝外門脈閉塞1例である。術式としては単純食道離断術(Walker)26例、左胃静脈切除合併14例、paraesophago-gastric devascularization 合併(東大第2外科法)30例である。手術例の年齢は9ヵ月～68才で高令者群に長期遠隔成績を含め、死亡例が多いのは当然であろうが、各年齢層とも手術には十分耐えている。

手術死亡は70例中2例、2.9%で甲型肝硬変で肝性昏睡に陥入った吐下血例と、乙型肝炎例の縫合不全によるものの2例である。血管吻合術の手術死亡12.9%に比べてはるかに良好である。術後合併症は、食道離断術に関連するもの各種がみられた。縫合不全3例で1例は死亡したが、他の2例はごく軽度の漏洩で2～3日絶食で十分治癒しうる程度のものである。血清肝炎は3例で1例は乙型肝炎に血清肝炎併発し、肝不全進行して死亡した。食道離断部狭窄は2例にみられたが、それぞれ術後5年、1年で食道鏡下に切開可能な、膜状の狭窄で、切開により症状消失をみた。術後腹水貯溜は5例にみたが肝硬変4例、肝線維症1例でいずれも術後2週間後からの内科的治療で十分抑制可能であった。胸水貯溜は1例である。術後黄疸出現は5例であるが、全例が肝

硬変症で、血清肝炎による例を除けば、4例は一過性で術後2～3週で完全に消失している。迷走神経切断様症状は7才の症例にみられたが、術後3週までで、それ以後消失し、1年以上を経過し健康に過ごしている。

食道静脈瘤に対する効果は血管吻合術に比べてもはるかに良好であり、食道静脈瘤破裂で出血再発をみても、脾腎静脈吻合15例中9例、門脈下大静脈吻合55例中8例、脾摘除17例中10例、食道離断術59例中5例である。また予後も良好で、食道離断術では85%以上が生存し、大部分が社会復帰をしており、脳症状は血管吻合術のような Eck 瘻症状群や肝性昏睡はみられず、肝硬変症からの肝不全が2例にみられたのみである。肝硬変症への食道離断術の成績は甲型肝炎はまったく不良で、2例で手術死1例、3ヵ月で肝不全死1例に終わり、甲型および乙型肝炎硬変症では十分手術に耐え、現在までそれぞれ71%、81%の生存率である。

手術死、後期死を含め食道離断術70例中現在までの死亡例は10例で、手術死2例、肝不全死3例、肝癌併発死1例、吐血死1例、出血再発再手術後死亡2例である。

食道離断術および合併手術を加えた症例と比較すると、Walker の術式では26例中5例の出血再発をみ、静脈瘤も不変5例、改善3例であり、静脈瘤が中部食道を越える高度の症例では単純食道離断術のみでは静脈瘤の消失しない症例がある。また左胃静脈拡張例で単純食道離断術のみで終わった症例は出血再発をみている。左胃静脈切除合併例は単純食道離断術より成績はよいが、食道静脈瘤消失に関しては必ずしも十分ではない。Paraesophago-gastric devascularization 合併例(東大第2外科法)は手術死を除き、全例に食道静脈瘤の消失をみ、出血再発もない。食道離断術全例で静脈瘤の消失率87.0%、改善率92.8%である。単純食道離断術後4年で出血再発し、左胃静脈切除はもちろぬ、腹部食道から食道裂孔にかけ十分に食道を遊離しても、静脈瘤が消失しない

*M. Sugino, S. Ichihara, M. Nomura, S. Futakawa, S. Hatano : 東京大学 第2外科。

表 1. 食道離断術の手術成績 (疾患別 昭 45.8月)

疾 患	例 数	手術死	出血再発	予 後
肝 硬 変 症	30	2	2	{ 3~6ヵ月 吐血死 1, 肝不全死 2, 4年後吐血→再手術 3年2ヵ月 肝癌→死亡
肝 線 維 症	25	0	2	吐血再発再手術後6ヵ月死亡, 1年7ヵ月 吐血再発死亡
先 天 性 門 脈 異 常	13	0	1	1年2ヵ月 軽度吐血
日 本 住 血 吸 虫 症	1	0	0	手 術 死 2
その他(肝外門脈閉塞)	1	0	0	出 血 再 発 5 (死亡 3)
				肝 不 全 死 2
				原因不明死 1
				肝 癌 死 1
計	70	2	5	静脈瘤改善率 92.8%

表 2. 食道離断術と合併手術 (昭 45.8月)

術 式	例 数	手術死	出血再発	静脈瘤の転帰
食道離断 Walker	26	1	5 死亡 3	消失 17, 改善 3, 不変 5
食道離断+左胃静脈切除	14	0	0	消失 13, 改善 1
食道離断 Devascularization (東大第2外科法)	30	1	0	消失 29
計	70	2	5	消失率 87.0%, 改善率 92.8%

症例をみている。我々は以上の成績から食道静脈瘤例は、できれば東大第2外科法による食道離断術を行うべきと考えているが、肺門部までの食道の devascularization による離断部の血行障害も考慮される必要がありそうである。静脈瘤が下部食道にのみ限局する症例は食道離断術に左胃静脈切除と下部食道、腹部食道の devascularization の合併でよいと現在では考えている。

長期生存率をみると、血管吻合例に比較し、手術死が少なく、肝不全発症も少ないことから食道離断術が良好な成績を示している。4年生存血管吻合 52%, 食道離断術 76%, 5年生存血管吻合 49%, 食道離断術 66% であり、今後、症例数をまし、年数を経るに従って生存率はさらに改善されるものと推定している。

食道離断術の手術適応は、年令にとくに制限がなく、肝組織像からは甲型肝炎を除けば、あらゆる種類の食道静脈瘤例が手術適応に含まれると考えている。肝障害高度例は手術適応はない。静脈瘤が中部食道に達する症例は、Paraesophago-gastric devascularization を行うべきであり、門脈撮影で左胃静脈拡張例は、必ず左胃静脈切除を十分に行う必要がある。術後腹水例は内科的に抑制できる程度ならば術後問題となることはない。脾機能亢進症状は軽度の症例でも脾摘除を行う必要がある。

Eck 瘻症状群発症例で血管吻合部を血管撮影で検索

表 3. 食道離断術の成績比較 (昭 45.8月)

Walkerの 病型分類	東大第二外科	Walker
肝 外 閉 塞	7.1% 1/14 手術死 0	出血 44% 11/25 手術死 0
肝 内 閉 塞		
good risk	7.7% 2/26 手術死 0	出血 58% 7/12 手術死 0
poor risk	7.1% 2/28 手術死 1	9% 1/11 18% 2/11
desperated	出血 0 手術死 50% 1/2	出血 80% 手術死 4/5
計	7.1% 出血再発 5/70 2.9% 手術死 2/70	出血 40% 19/53 11.2% 6/53

してみると、開存例では Eck 瘻症状群が持続し、閉鎖例では Eck 瘻症状群が消失する傾向を認めた。Eck 瘻症状群高度で7年間持続した症例では、ついには積極的に吻合部を解除し再建を行った症例も経験している。この経験は門脈亢進症の食道静脈瘤破裂例の外科的治療として、血管吻合術を行ったのを手術的に再閉鎖するという点で、一見矛盾があるようであるが、食道離断術が十分に臨床例に応用しようという自信がもてたことから行いえたものである。

質問：鵜飼 卓 (大阪大学 第2外科) 1) Parae-sophago-gastric devascularization を施行された後、食

道静脈瘤の再発はないか。あるとすれば何ヵ月後ぐらいに起こってくるか。

2) 食道離断をしないで paraesophago-gastric devascularization のみを施行することは可能か。

答：杉浦光雄 1) 東大第2外科法を始めて4年になるが、現在まで出血再発は1例もなく、varix 再現例もない。何ヵ月再発しなければ以後大丈夫かということについては不明。しかし、Walker の報告では食道離断術のみの症例で出血再発は大部分が術後1~2年にみられるということから、この辺の期間が一つの目標になると考えられる。

2) 私たちは paraesophago-gastric devascularization のみの経験はない。しかし Egypt の Hassab が paraesophageal devascularization のみの報告を行い、かなり良好な成績を発表している。ただ、この報告では emergency case を含め、手術死亡率がかなり高かったよう

に記憶している。

質問：中村省三（東北大 第1内科） 食道離断術施行前後の肝血流量について、 ^{198}Au コロイドの消失係数でも、調べておられれば、お教えいただきたい。と申すのは、私たちは門脈・肝動脈血流比を最近測定しているが、巨脾性肝硬変症では門脈血流比の低下がみられる。ところが、食道離断術を行った患者について調べたところ、門脈血流比の低下がみられず、食道離断術を行うと、肝内にはいる門脈血流は増加すると考えられたからである。

答：杉浦光雄 食道離断術前後の肝血流量は6例で不変の結果を得た。食道離断直前、直後の門脈撮影で、直後に造影剤の大量が肝内流入したのをみたが、4年後の門脈造影では遠肝性の副血行路がみられ、時期を経るに従い、食道離断術後の肝血行動態も変化するものと考えられる。

6. 肝疾患にみられる異常血流

—D-Galactose-1- ^{14}C 持続注入法による肝内短絡血流および ^{131}I -MAA による肺動静脈短絡血流の測定—

中 村 省 三 解 良 皐 佐々木 宏
武 沢 良 明 中 村 隆*

1) D-Galactose-1- ^{14}C 持続注入法による肝内短絡血流測定

我々は先に肝内短絡血流の測定法として、D-Galactose-1- ^{14}C の急速注入法を考案した。この方法によると、初め発表したガラクトース（化学的測定）法に比べて、きわめて低いガラクトース濃度での測定が可能なので、肝細胞傷害の影響を受けることがなく、肝内短絡血流の測定が可能となったが、D-Galactose-1- ^{14}C の代謝物が肝静脈に出現する前に測定を行わなければならないので、放射能曲線がまだ平坦にならないうちに採血を行い、肝内短絡率を算出した。

しかし、肝内短絡率の測定はなるべく一定したガラク

トース濃度においてなされるのが望ましいので、持続注入法を行うことによって、この点を改善しようと試みた。

方 法：D-Galactose-1- ^{14}C 20 μC 、T-1824 色素 38 mg、患者血清 7 ml を混じたものを、一定速度で 30 秒間に肺動脈内に注入する。そして5~10秒ごとに股動脈血および肝静脈血を採取し、その放射能および色素濃度曲線を描くと、股動脈血曲線は注入後 40 秒前後で、肝静脈血曲線は 60 秒前後で、ほぼ平坦となる。

この時の股動脈血の放射能を C_a 、肝静脈血の放射能を C_h 、股動脈血の T-1824 色素濃度を D_a 、肝静脈血の T-1824 色素濃度を D_h とすると、

$$\text{肝内短絡率} = \frac{C_h/C_a}{D_h/D_a} \times 100$$

として求められる。

*S. Nakamura, K. Kera, K. Sasaki, Y. Takezawa, T. Nakamura: 東北大学 第1内科。

図 1. D-Galactose-1- 14 C 持続注入による肝内短絡血流測定

図 2. D-Galactose-1- 14 C 持続注入による肝内短絡と閉塞肝静脈圧との関係。相関係数は 0.85 で推計学的に有意である ($p < 0.001$)。

成績および考案 その成績はまだ例数が少ないが、図 1 のようである。肝硬変症 7 例の肝内短絡率は 27~53%，平均 36% で、これは慢性肝炎、前硬変、Banti 症候群の 6~29% よりも高値を示している。肝癌（転移性）の 1 例は 27% の肝内短絡率を示した。

この成績を従来の急速注入法の成績と比較すると、持続注入法によって測定した肝内短絡率は急速注入法のそれに比べて、やや低めに算出されているような印象を受けるが、肝硬変症について比較した成績では推計学的に

図 3. 131 I-MAA によって測定した肝疾患患者の肺動静脈短絡率。

有意の差を認めない。しかし持続注入法による測定はまだ例数が十分でないので、さらに例数を増やして検討する必要がある。

なお肝内短絡率と閉塞肝静脈圧との関係をみると、その相関係数は 0.85 で、0.1% 以下の危険率で有意である（図 2）。

このように D-Galactose-1- 14 C の持続注入法によって、肝内短絡率の測定を行うことができるが、比較的一定した血中ガラクトース濃度において肝内短絡率の算出が可能となるので、この点これまでの急速注入法よりもすぐれているものと考えられる。

2) 131 I-MAA による肺動脈短絡血流の測定

肝硬変症において動脈血酸素飽和度の減少がみられることは、かなり前から知られた事実である。その原因の一つとしてあげられているものに肺動静脈短絡がある。これについてはチアノーゼのある肝硬変症例で、肺動静脈短絡が剖検で証明された例が、何例か報告されているが、普通みられる肝硬変症患者に、肺動静脈短絡が存在するか否かについては、必ずしも見解が一致していない。たとえば Fritts らは 85 Kr を用いての測定で、肝硬変症では肺動静脈短絡はほとんど増加していないことを述べ、我々も同様の見解をもっていたが、最近、Dal Palu らは 131 I 粗大凝集アルブミン (131 I-MAA) を鎖骨下静脈内に注入し、肝硬変症症例の半数以上に、頭部の放射能曲線上正常ではみられない放射能の出現をみるところから、肺動静脈短絡の存在を推測している。

それで我々は 131 I-MAA を用い、我々の考案した方法によって、肺動静脈短絡率の定量的測定を試みた。

方 法 鎖骨下静脈内に 131 I-MAA 50 μ c を急速に

注入し、肺動脈血および股動脈血を1秒ごとに採取する。心拍出量算出の場合と同様にして、肺動脈血放射能曲線上に求めた面積を S_p 、股動脈血曲線のそれを S_a とすると、

$$\text{肺動静脈短絡率} = \frac{S_a}{S_p} \times 100$$

として求められる。

成績および考案 図3のように、肝硬変症5例の肺動静脈短絡率は3~6%, 平均5%で、これは慢性肝炎、肝線維化の6~9%, 平均7%と比べて差がない。

なお我々の使用した ^{131}I -MAA をシロネズミの下大静脈内に注入し、屠殺して測定した肺の放射能 L と、注入液の放射能 I から、肺除去率を $L/I \times 100$ として求めると、平均83%であった。

すなわち ^{131}I -MAA の肺毛細管による除去は完全ではなく、肺動静脈短絡率として算出すると、実際より大目の値が得られるものと考えられるが、これで肺動静脈短絡の程度を数量的に知ることができる。

我々の得た成績では、Dal Palu の報告とは違って、肝硬変症でも肺動静脈短絡血流の増加はみられず、Fritts らの ^{85}Kr による成績と一致した。我々はかつて門脈肺吻合血流の測定を行った際、 ^{85}Kr 静注後50秒間の上腕動脈血と肺動脈血の放射能の比を求めたことがあるが、肝硬変症と対照との間に有意の差を認めなかった。それで肺動静脈短絡血流は通常の肝硬変症では増加していないだろうと考えたが、今度の ^{131}I -MAA の成績からも、

同様のことがいえるように思われる。

追加: 飯尾正宏(東大 第2内科) 肝短絡、肝血流量の診断法として、 ^{131}I -MAA および ^{198}Au コロイドなどによる、いわゆる放射性粒子(分布)クリアランス法による測定法が長年にわたって行われてきたが、演者らの指摘されるようにそれぞれ ^{131}I -MAA には毛細管除去率が100%でないこと、 ^{198}Au コロイドの肝除去率の必ずしも高くないことが問題とされている。

この分野の最近の進歩は、しかしながら、これらの欠点を越えた新しい動きを示しており、以下に述べる新しい標識物質の肝循環分野での活用を期待したい。

1) ^{131}I -MAA (15 μ ~50 μ) に代わるもの

Carbonized microsphere, albumin microsphere など完全球形で粒状性のそろったもの(15 $\mu \pm 3 \mu$, 25 $\mu \pm 3 \mu$ など)は毛細管除去率がほぼ100%である。

2) ^{198}Au (10 m μ) に代わるもの

Tc_2Sr , $^{113\text{m}}\text{In}(\text{OH})_3$, TcO_2 コロイド、ことに最近教室で開発中の microaggregate など、粒子サイズが3~5 μ と大きいものは網内系による除去率も90%以上と高い。

以上のような粒子を用いて定量的な肝短絡、肝血流量の測定を行うことが望ましい。

答: 中村省三 ^{131}I -MAA は動物実験の成績で示したように肺除去が不完全である。最近 albumin microspheres を投与しても無害であるという報告が出ているので、使用してみたいと考えている。

7. 肝の病態と肝血流量

— ^{198}Au -コロイド法による肝血流量測定とその臨床的意義—

辻 井 正 松 岡 洋 一 内 藤 雅 敏 田 村 雅 宥
坂 本 隆 史 福 田 真 治 松 森 武 福 原 昌 夫
奥 正 之 森 田 倫 史 松 井 勉 福 井 定 光*

肝循環動態を知ることは肝の病態を把握する上に重要

*T. Tsujii, Y. Matsuoka, M. Naitoh, M. Tamura, T. Sakamoto, S. Fukuda, T. Matsumori, M. Fukuhara, M. Oku, T. Morita, T. Matsui, S. Fukui: 奈良県立医科大学 第1内科。

な意義をもつことはいうまでもない。したがって、従来、肝血流量の測定についても種々の方法が利用され、それぞれの生理的、臨床的意義が明らかにされてきた。これらのうち、放射性金コロイドによる肝血流量の測定は、1951年 Sheppard のイヌを用いた実験により、その実用

図 1. Hepatic blood flow in liver diseases.

化の可能性が示されて以来、すでに 20 年を経過し、この間幾多の知見が集積されているが、最近、金コロイドは肝における除去率が低いことなどの疑点が示され、批判的な意見も出されているが、一方、患者に対して苦痛を与えることなく施行できるという利点もあり、我々もこの放射性金コロイドを用いて肝血流量の体外測定を行ってきたので、今回その結果をまとめ、日常肝疾患の診療面にどのような意義をもつかについて、若干の検討を行ったので報告する。

対象ならびに方法

対象は健常者 12 例、急性肝炎 4 例、慢性肝炎 34 例、肝硬変 31 例、脂肪肝 5 例、閉塞性黄疸 3 例、パンチ氏病 2 例の計 96 例であり、いずれも腹腔鏡、肝生検により診断確定したものである。

肝血流量の測定は ¹⁹⁸Au-コロイド 100~120 μ ci を 1 秒以内に正中静脈より注射し、末梢血液中の放射能減衰曲線と肝臓部の放射能集積曲線を同時に記録した。装置は東芝 RI レノグラム (RDP-105-1) を用い、内径 2 $\times$ 2 cm の特製コリメーターを肝および大腿動脈直上部に置き、東亜電波工業製の記録装置により記録した。全血流量の測定は Evans blue 法によった。なお肝血流量

図 2. Correlation between serum cholinesterase (ChE) activity, alkalinephosphatase (Al-Pase) activity and KL in the chronic hepatitis and liver cirrhosis.

の表現は主として肝における消失定数 KL をもって表現し、種々肝機能、内視鏡所見、肝結合組織増生度 (肝生検材料より得たアザン染色標本についてプランニメーターにより測定)、肝の大きさ、脾腫の有無、臨床的予後などとの関係について検討した。

図 3. Correlation between laparoscopic findings of liver surface, degree of fibrosis and KL in the chronic hepatitis and liver cirrhosis.

成 績

1) 大腿部における消失定数 (Kp) と肝臓部における消失定数 (KL) との相関は $r=0.92$, の明らかな有意相関を示した。

2) 各種肝疾患における肝血流量 (図 1)

i) KL 値については, 健常者平均値 0.164 ± 0.014 , 急性肝炎 0.158 ± 0.021 , 慢性肝炎 0.143 ± 0.026 , 肝硬変 0.086 ± 0.029 , 脂肪肝 0.154 ± 0.016 , 肝悪性腫瘍 0.133 ± 0.030 , 閉塞性黄疸 0.140 ± 0.035 , バンチ氏病 0.138 ± 0.012 であり, 慢性肝炎の約半数, 肝硬変の全例が正常範囲以下に低下し, 肝硬変の約 2/3 は慢性肝炎の下界 (0.10) 以下の低値を示した。

ii) EHBf (cc/min, 1.48 m^2) では, 健常者 733 ± 61 , 急性肝炎 635 ± 115 , 慢性肝炎 596 ± 127 , 肝硬変 392 ± 162 , 脂肪肝 645 ± 113 , 肝悪性腫瘍 514 ± 225 , 閉塞性黄疸 585 ± 76 , バンチ氏病 530 ± 24 であり, KL の場合とはほぼ同様の傾向がみられる。

3) 各種肝機能と KL の相関

i) BSP と KL の相関

慢性肝炎, 肝硬変について BSP と KL の相関をみると, BSP 停滞率の高いものほど KL 低下の強い傾向を認め, とくに BSP 30% 以上の肝硬変では全例が KL 0.08 以下を示した。

ii) コリンエステラーゼ (ChE) 活性と KL の相関 (図 2)

慢性肝炎のうち ChE 活性が正常値にあるものでは, KL も正常範囲を示すものが多く, ChE 活性の低いものでは KL は明らかに低値を示す。肝硬変では ChE 活性値のいかんを問わず KL は低下するが, とくに ChE 0.2-4pH 以下のものは KL 0.10 以下を示した。

iii) アルカリフォスファターゼ (Al-Pase) 活性と KL の相関 (図 2)

肝硬変のうち Al-Pase 活性の高いものはほとんどが KL 0.10 以下の低値を示し, Al-Pase 正常のものとの間に明らかな差を認めた。

iv) 血清蛋白分画と KL の相関

慢性肝炎, 肝硬変ではアルブミンの減少と平行して KL の低下が強くなる傾向がみられ, とくに肝硬変ではその傾向が顕著である。肝硬変のうち γ -グロブリン 30% 以上を示すものは KL の低下も強く, 全例が 0.10 以下を示した。

4) 肝の大きさ, 脾腫の有無と KL の相関

慢性肝炎では肝の大きさに関係なく, KL は 0.20 から 0.10 の間に広く分布し, 一定の傾向はみられない。肝硬変のうち肝腫大期にあるものは KL の低下の程度は少ないが, 肝萎縮を示すものでは, 全例が 0.10 以下を示した。なお脾腫の明らかな肝硬変において KL の

低下がとくに強い傾向をみた。

5) 腹腔鏡所見と KL の関係 (図3)

Lig. teres のうっ血程度と KL の相関については、Lig. teres のうっ血程度の強いものほど KL 低下の程度も強くなる傾向がみられた。

肝表面変化と KL の関係については、慢性肝炎のうち小結節 (small nodular type), 斑紋肝 (flecked type) を示すものは、平滑型 (smooth type), 不平型 (rough type), 陥凹型 (caved type) を示すものに比して KL は明らかに低い。中結節 (medium nodular type), 大結節 (large nodular type) を示す肝硬変では KL はもっとも著明に低下した。

6) 肝結合組織増生度と KL の相関 (図3)

慢性肝炎、肝硬変の肝組織における間質百分率と KL の相関は $r = -0.80$ の逆相関を認め、とくに間質面積が

約 40% 以上を占めるものでは KL 値はいずれも著明な低下を示した。

7) 肝硬変患者の予後と KL の関係

肝硬変患者の KL 測定時より2年以内における臨床的予後について調べた結果、KL 0.10 以上を示した 11 例中3例は改善、8例は不変であり、悪化、死亡例はなく、KL 0.05 から 0.09 の間にある 15 例は改善1例、不変 10 例、悪化4例であり、KL 0.05 以下を示した 5 例では不変1例、悪化2例、死亡2例であった。

結 語

以上より、放射性金コロイド法により測定した KL 値は結合組織増生を伴う肝疾患の病態を比較的良好に反映し、他の検査との関連に立ってこれを眺めるとき、肝疾患の病態把握と予後判定に有用であると考えられる。

8. 肝 循 環 の 研 究

——肝クリアランステストと電磁流量計測定成績との比較について——

西 脇 孝 鈴木 寿夫 後 藤 裕 己 岸 本 建 彦
沢 田 誠 之 秀 村 立 五 山 本 貞 博*

目 的 肝血流量は測定法の差によって異なり、その値が必ずしも一致しないのが通例である。私たちは手術的に、いわば物理的な肝循環の変換を加えた場合の変動の特徴を、電磁流量計法および肝クリアランス法により測定し比較検討してきたが、今回は機能的な肝実質細胞、あるいは Kupffer 星細胞の急性障害状態下の変動を中心に検討した。

方 法 9~18 kg の雑種成犬を用い、まず肝実質障害の目的で四塩化炭素投与群、一方肝網内系ブロックの目的で墨汁投与群を作製した。四塩化炭素は 5 ml/kg を経口投与、墨汁は Pelikan 製 C 11/1431 a を 2.5 ml/kg 点滴静注し、両群とも 48 時間後に静脈麻酔下で開腹、流量計プローブは門脈の本幹と、肝動脈はその分枝を切断した総肝動脈にかけて門脈血流量 (PVF)、肝動脈血流

量 (HAF) を測定し、両者を合算して総肝血流量 (HBF) を求めた。一方クリアランス法では ICG 0.25 mg/kg, ^{198}Au コロイド 30~50 μCi を同時静注し、末梢消失係数 (K) および肝排除率 (ER) を算出した。さらに、これら2群のそれぞれに、1) 40% 肝切除 (Hx40), 2) 70% 肝切除 (Hx70), 3) 肝動脈結紮 (HAL), 4) 門脈下大静脈吻合 (PCA) の4種の肝循環変換手術を追加し、術前および術後1時間の各測定値を検討した。

成 績 まず四塩化炭素および墨汁投与の影響について対照群と比較すると (表1), 四塩化炭素投与群では K (Au), ER (Au) の増加をみたが、ICG 法による K および ER は著減した。一方墨汁投与群では K (Au) が著増したが、K (ICG) ER (ICG) はいずれも低下し、この際の電磁流量計測定結果は四塩化炭素投与群では HAF が 40% 増加し、HBF としては 14% の増加となったが、墨汁投与群では HAF は 87% 増加し、PVF も増量して HBF としては 54% の増加を示した。

*T. Nishiwaki, T. Suzuki, H. Gotoh, T. Kishimoto, M. Sawada, R. Hidemura, S. Yamamoto: 名古屋大学 第2外科。

表 1. Changes of hepatic blood flow in dogs treated with CCl₄ and India ink (% of Control group)

Group	Indicator method				Flowmeter		
	Au ¹⁹⁸		ICG				
	K	ER	K	ER	HBF	PVF	HAF
CCl ₄ 5.0 ml/kg peroral	128	117	70	54	114	107	140
C 11/1431 a (Pelikan)	133	94	59	50	154	145	187

表 2. Changes of hepatic blood flow following surgical procedures in dogs treated with CCl₄ (% of the preoperative value)

Group	Indicator method				Flowmeter		
	Au ¹⁹⁸		ICG				
	K	ER	K	ER	HBF	PVF	HAF
CCl ₄ + Hx40	73	84	72	55	79	85	64
CCl ₄ + Hx70	56	55	70	39	70	75	65
CCl ₄ + HAL	121	113	102	166	79	104	0
CCl ₄ + PCA	72	118	70	478	33	0	123

表 3. Changes of hepatic blood flow following surgical procedures in dogs treated with India ink (% of the preoperative value)

Group	Indicator method				Flowmeter		
	Au ¹⁹⁸		ICG				
	K	ER	K	ER	HBF	PVF	HAF
India ink + Hx40	75	78	61	81	73	79	60
India ink + Hx70	43	52	32	50	62	69	43
India ink + HAL	63	98	74	235	70	93	0
India ink + PCA	60	190	73	319	19	0	63

肝臓の形態変化は、測定された肝循環変化と比較すると、はなはだ強烈であり、この肝の形態、機能および血流量の間の成績不一致は、四塩化炭素、墨汁などによる機能的変化と同時に、形態変化に伴う循環変化の介在を示唆した。

四塩化炭素群に血流変換手術を加えると（表2）、40%肝切除群ではクリアランス法、流量計測定成績とも20~40%減少し、70%肝切除では各測定値の減少は一層強烈となった。肝動脈遮断ではクリアランス法によるK、ERは全般に増加傾向を示し、PVFもよく維持されており、HBFとしては21%の減少をみたにすぎない。

一方門脈血の肝内流入を遮断するPCAでは、Kは明らかな減少をみたが、ERは増加しとくにICG法では著増した。またHAFは23%増加したが、HBFでは67%の減少となった。

墨汁群（表3）は、肝切除による各測定値の段階的減少がみられ、HALではK（Au）、ER（Au）、K（ICG）は減少してER（ICG）のみ著増し、またPVFの維持はよいが、HBFとしては30%の減少となった。PCA群はクリアランス法では四塩化炭素群の成績に類似するが、流量計法ではHAFは四塩化炭素群と異なり37%減少した。

考 案 四塩化炭素群で ICG クリアランスの減少をみたことは、肝実質障害と関連が深い、金コロイドクリアランスが増加したことは、金コロイド投与量が ICG と比較して微量であることのほか、なお Kupffer 細胞の機能保存を示唆する。一方墨汁投与群では、形態的な Kupffer 星細胞の膨化にもかかわらず、流量計による増量が記録され、また微量投与の K(Au) は増加したが、K(ICG), ER(ICG) はともに減少し、ICG の肝 uptake の機構と肝機能あるいは肝血流表現における意義を考慮する上で重要な知見となった。

また外科的肝血流変換手術を行った場合、HAL では

PVF の増減がほとんど認められないにもかかわらず、四塩化炭素群では K(Au), ER(Au), ER(ICG) が、墨汁群でも ER(ICG) が増加して、流量計測定結果と解離を示したが、これは肝動脈遮断後早期における代償能を示唆するものである。

結 論 今回四塩化炭素群、墨汁群およびそれらに血流変換手術を加えて得られた成績は、前回までの無処置犬に量的な血流変換を加えた成績と比べて、かなり特徴的な差異を示し、クリアランス法における使用標品の差と成績の特徴が明瞭となるとともに、流量計による測定成績との解離と意義がより明瞭となった。

9. α_1 -Fetoglobulin によるヘパトームの診断

——とくに組織との関連において——

向 島 達 服 部 信 瀬 戸 輝 一 下 平 克 子
中 山 昇 長谷川 博 北 岡 久 三 田 口 智 也*

緒 言

ヘパトームにおいて、 α_1 -Fetoglobulin が高率に見出されることはすでに報告したところである。従来の報告の多くは、半定量が行われたにすぎず、我々は、単(純)拡散法によって、 α_1 -Fetoglobulin の定量を試みヘパトームにおける量的分布と変動および組織学的検討を加えた。

方法および症例

特異抗血清の作製：ヘパトーム患者腹水より α_1 -Fetoglobulin 分画を抽出し、家兎を免疫し正常人血清にて吸収して得た。特異性は二重拡散法 (Ouchterlony 法) と免疫電気泳動法で特異抗血清であることを確認した。

α_1 -Fetoglobulin の定量：単(純)拡散法による定量法を確立した。この際 α_1 -Fetoglobulin の定量のため、Ouchterlony 法の結果から単位/ml を導入した。これは α_1 -Fetoglobulin の純品が得られるまでの量的指標とした。これによって標準曲線を求め、各検体の沈降輪の大きさより α_1 -Fetoglobulin 量を決定した。(現在、300u/

ml が 1mg/ml に相当することが示されている。)

症例：ヘパトーム 51 例を含む 714 例について α_1 -Fetoglobulin 量とその存在を検討した。ただし肝硬変においては頻回に測定した。

結 果

1) 陽性率と量的分布

714 例中 α_1 -Fetoglobulin 陽性は、ヘパトーム 41 例、転移性肝癌 2 例、胎児性癌 3 例であった。ヘパトームと鑑別すべき肝硬変、肝炎、転移性肝癌 (2 例は除く) は、陰性を示した (表 1)。ヘパトームでは、51 例中 41 例陽性で、そのうち大人のヘパトームは 44 例中 34 例に小児のヘパトームは 7 例中 7 例に陽性であった。一般に小児のほうが高い陽性率を示す傾向であった。その量的分布は、5~15,600 u/ml で 3,000 倍も差のある分布を示し、大人では 5~6,825 u/ml で、小児は 1,050~15,600 u/ml であった (表 2)。その結果小児は一般に高く、他方大人は、かなり広く分布することが判った。この α_1 -Fetoglobulin 量は、患者間では、腫瘍の大きさと平行しなく、むしろ、その組織型の差に基づくと考えられた。だが同一患者では、腫瘍の大きさとかなりの相関を示し、腫瘍の増大とともに α_1 -Fetoglobulin の上昇がみられたし、また化学療法有効例や、外科的切除例において α_1 -

*T. Mukojima, K. Shimodaira, N. Nakayama, T. Taguchi: 国立がんセンター病院 細菌免疫; N. Hattori: 同 内科・臨床検査部; K. Seto: 同 病理; H. Hasegawa, K. Kitaoka: 同 外科。

表 1.

Diagnosis	Cases	Positive cases
Hepatoma adults	44	34
infant	7	7
Cholangioma	3	0
Bile duct ca.	5	0
Metastatic liver ca.	43	2 [#]
Livercirrhosis	60	0
Acute and chronic hepatitis	70	0
Hemangioma and parasite of liver	8	0
Obstructive jaundice	9	0
Other malignant disease	60	0
Embryonal cell ca.	7	3
Gall stone	32	0
Benign disease	24	0
Other	6	0
Normal	317	0
Total	714	46

[#] Metastasis of stomach ca.

Fetoglobulin の著しい減少が示された。とくに小児ヘパトーム切除例 3 例において、 α_1 -Fetoglobulin の著しい減少を認め、その半減期は、3.69 日、5.35 日、6.79 日であり、半減期の長い 2 症例はいずれも再発をみている。それに対して 3.69 日と半減期の短い症例は、手術後 10 ヶ月において再発の徴候はまったく認められなかった。

2) α_1 -Fetoglobulin 量と組織学的検討

α_1 -Fetoglobulin 量と肝シンチグラムの陰影欠損、および手術所見、剖検所見による腫瘍の大きさとはいずれも平行しない。むしろその組織学的差に基づくものと考えられる。経験した 51 例 (剖検 42 例) 中 21 例について、大人では、森、宮地、Edmondson の分類による検討を加えた (表 3)。一方、小児においては、Willis の分類による検討を加え、さらにそれに臓器年齢から、大人に分類したほうがよいと考えられる 8 才の症例は、森、宮地、Edmondson 三者の分類を試みた。その結果表に示すとき結果を得た。その結果、小児においては、Willis の分類の embryonic hepatoma も、mixed hepatoma もいずれも α_1 -Fetoglobulin は陽性でかなり高値を示す。しかし、とくに 10,800 u/ml を示したのは Embryonic hepatoma であった。15,600 u/ml を示した 8 才のヘパトームは、すでに Willis の分類よりは、森、宮地、Edmondson の分類によって I 型、索状、Gr II と

表 2. Hepatoma (Adults) α_1 -Fetoglobulin

Name	serum u/ml	ascites u/ml
S. T.	6825	1650
T. U.		5050
K. H.	4300	
U. K.	2800	
S. O.	2500	
S. T.	1800	
T. M.	1380	
I. B.	1300	
Y. H.	1024	
H. R.	950	
S. G.	900	
O. K.	700	95
S. S.	640	95
T. T.		630
K. T.	387	
O. Y.	320	
M. J.	300	
I. Y.		220
K. M.	185	39
H. A.	180	
T. H.		185
S. N.	150	
T. J.	66.5	
Y. M.	63	14.8
T. T.	63	22.3
M. S.	45.5	0
K. K.	28	
S. S.	22	
S. K.	20.5	
Y. S.	13	5
W. S.	11	
S. R.	9.5	
T. M.	5	
A. H.	5	
T. K.	0	
H. M.	0	
T. H.	0	
K. M.	0	
I. K.	0	
K. S.	0	
T. T.	0	
I. G.	0	0
M. M.	0	
M. S.	0	
Total	34/44	

Hepatoma (Infant)

Name	serum u/ml	ascites u/ml
H. S.	15600	7500
K. A.	14900	
S. Y.	5050	
I. S.	3220	
Y. T.	1950	
O. C.	1276	
O. I.	1050	
Total	7/7	
TOTAL	41/51	

分類された。他方、大人のヘパトームにおいては、高値を示したものは I 型、索状、Gr II の組織像であり、低値を示すもの、または陰性を示すものは、各種組み合わせが考えられるが、腺管状、Gr III、さらに胆汁産生を伴うヘパトーム（巨視的には Green hepatoma）、混合型に認められた。この点は今後例数を重ねて検討したい。

考 案

α_1 -Fetoglobulin の出現頻度は、ヘパトームにおいては、かなり特異的といえる。とくに小児のヘパトームに

表 3. の (1) Hepatoma (infants)

氏 名	年 令	性	α_1 Fetoglobulin	分 類
1. H. S.	8.0	♂	15,600 u/ml	Mori I (中) 索状 (宮地) Gr. II. (Edmondson)
2. K. A.	1.9	♂	10,800 u/ml	Embryonic hepatoma (Willis) (Gr. II)
3. I. S.	0.9	♂	3,220 u/ml	Mixed hepatoblastoma (Willis)
4. Y. T.	1.0	♂	1,850 u/ml	Mixed hepatoblastoma (Willis)
5. O. C.	0.9	♀	1,276 u/ml	Embryonic hepatoma (Willis)
6. O. I.	3.0	♀	1,050 u/ml	Embryonic hepatoma (Willis)

表 3. の (2) Hepatoma (Adults) 陽性例

氏 名	年 令	性	α_1 -Fetoglobulin	森	宮 地	Edmondson
1. S. G.			2,500 u/ml	I	大索状	Gr. II.
2. Y. H.	52	♂	1,024 u/ml	II	(大) 索状	Gr. II.
3. K. T.	52	♂	387 u/ml	I	索状	Gr. II.
4. M. J.	62	♂	300 u/ml	I	(中) 索状 > 腺管状	Gr. II.
5. M. S.	61	♂	115 u/ml	II	索状 > 腺管状	Gr. II.
6. T. M.	65	♀	9 u/ml	I	中索状 > 腺管状	Gr. II. (> III)
7. A. H.	19	♂	5 u/ml	II	腺管状	Gr. III. (Green)

表 3. の (3) Hepatoma (Adults) 陰性例 Cases

氏 名	年 令	性	森	宮 地	Edmondson	Other remarks.
1. T. K.	52	♂	II	成熟腺管状	Gr. II.	Green Hep.
2. K. M.	64	♂	I	未熟巨細胞	Gr. III.	
3. I. K.			II	(中) 索状 > 腺管状	Gr. II.	Green Hep.
4. K. S.	59	♂	II	小～中索状	Gr. III.	Green Hep.
5. H. M.	37	♂	III	索状 + 腺管状	Gr. III.	
6. M. S.	45	♂		混合型		
7. M. M.	54	♀		混合型		
8. T. T.	57	♂	II	(小～中) 索状	Gr. III.	Micro. Ca.
9. N. N.	50	♂		Cholangiocellular Ca (トロトラスト)		

においては高率に証明され、かつ一般的にその蛋白量は多い。大人においては、約 80% 内外の陽性率である。その量的分布は、かなりのばらつきがある。そして α_1 -Fetoglobulin 量の変動は、かなりその臨床経過と相関し、化学療法の奏功、および外科的予後とかなりの関係が示された。とくに α_1 -Fetoglobulin の半減期の短いこと、いい換えるならば、turn over rate が早いことは、肝化学療法剤の効果判定に有用な手段となりえることを示している。

α_1 -Fetoglobulin 量と組織との比較は、きわめて重要な点であるが、現在までの症例で考えられることは、小児と大人とでは、その分類を別にしたほうがよいと考える。この際、小児とは、肝臓組織の臓器年齢を加味して考えるべきで、たとえ 8 才の小児でも組織学的には、むしろ大人のヘパトームと同様に取り扱ってよい場合もあるという配慮が必要であろう。そう考えると、その意味で典型的小児ヘパトームの分類に Willis の分類をとり上げた。経験した症例では、I) Embryonic hepatoma と II) Mixed hepatoblastoma だけであるが、いずれも α_1 -Fetoglobulin 量は、高値になりうる。しかしこれは、測定値としてであって、体重補正、循環血液量の補正をしてみないと、大人と小児の産生の差と考えるには、かなり問題であろう。しかし、Willis いずれの type でも α_1 -Fetoglobulin 陽性であるといえども、その基本には、Embryonic なものを必要とするものと考え。他方大人のヘパトームにおいて、あえて三者の分類を取り上げたのは、それぞれの分類だけでは説明できない例が存在するからであって、三者の分類の関連で考えると、一応我々の症例は了解されるからである。つまり、森 I 型、宮地索状型、Edmondson の Grade II が、きわめて α_1 -Fetoglobulin 量が高値になりうる type である。それにその組織内に宮地の腺管状構造を有したり、また Edmondson Grade III になったりすると低値または陰性になる傾向を有する。さらにここで注目すべきは、胆汁産生ヘパトームにおいては、低値ないしは陰性であることが多い。この事実は、胆汁産生ヘパトームが、4 例中 3 例が陰性であり、陽性の 1 例も 7 u/ml ときわめて低値であることから、重要な所見の一つとして加味されるべきと考える。これは、肝組織の胆汁産生を始める時期が、

発生学的にいかなる時期であり、そのときの α_1 -Fetoglobulin 産生という問題と共通のものがあるように考えられる。今後この方向で考えていきたい。

結 論

- 1) α_1 -Fetoglobulin は、ヘパトームにきわめて特異的で、とくに大人より小児に高率に証明される。
- 2) α_1 -Fetoglobulin の血清中の量的分布は小児で 1,050 ~ 15,600 u/ml であり、大人で 5 ~ 6,825 u/ml であり、大人においてかなりのばらつきがある。
- 3) α_1 -Fetoglobulin は腹水中にも証明できるが、その量は一般に血清より低い、かなりの量にまで達する。
- 4) α_1 -Fetoglobulin 量と組織との関連では、小児では Willis の分類のいかなる type でも産生すると考えられる。大人では、森 I 型、宮地索状型、Edmondson Gr II が、 α_1 -Fetoglobulin 量が高くなりうるし、その内部に腺管状（腺房状）の構造を有すると低値になりうる。
- 5) 大人においては、胆汁産生を伴うヘパトームにおいては陰性か、陽性でも低値であることが多い。

質問：水戸迪郎（北大 第 1 外科）肝細胞癌の異型度と AFP 値の相関に関する知見は、私たちの結果と、ほぼ一致するものであるが、結論の段階で Edmondson の Grade II が高値を示すと発表されたようであるが、これは、私たちの結果とはまったく逆である。Edmondson の分類の定義をどうしているのか、とくに Grade II をどう規定されているか質問する。

答：向島達 我々は、森氏の分類、宮地氏の分類を基本として考えると、きわめて高値を示すものは、森氏の I 型、宮地氏の索状型が多い。しかし、この条件を満たすものなかで、陰性を示すものがある。この場合は、主に、Edmondson の Grade III を示すものが多い。その他の場合は Grade II である点から、Grade III は出ない傾向を示すと考えられる。我々と病理とで、two blind で α_1 -Fetoglobulin とを論じており、ほとんどの場合、病理と我々の結果は一致している。そこで、病理の考え方から、細胞異型度からのみ α_1 -Fetoglobulin 量が求められず、森、宮地、Edmondson の 3 種で分類している。

成績は、組織学的にも、原発性肝細胞癌と診断された26症例中24症例に陽性をみた。陰性の2例は、さらに詳しくその後病理学検索を行ったところ、そのなかの1例は胆管細胞癌に近いものと診断された。これを考慮すると96%の高率を示すことになる。原発性肝細胞癌以外でAFP test 陽性を示したのは肝硬変症例79例中の5例、ならびに卵巣腫瘍症例の1例のみであった。肝硬変症例中、陽性例5例のうち、組織学的検索がなされたのは2例であるが、そのうちの1例では乙型肝炎ととも過形成性結節の像が認められた。また、卵巣腫瘍症例はその組織学的検索にてclear cell carcinomaと診断された。卵巣腫瘍症例における α -Fetoprotein出現の問題は別の機会に発表する予定である。さて、肝硬変症中にAFP test 陽性をみたことは、肝硬変症と原発性肝癌の関係を考えた時に非常に興味あることで、この事実から、早期肝癌診断へのAFP testの意義を検討すべく、動物実験を行った。

II) シロネズミ DAB 肝癌と胎児性蛋白

目的：早期肝癌診断へのAFP testの有用性を検討し、それとともに、癌化の機転と胎児性蛋白合成の機序を究明することを目的とする。

方法ならびに研究材料：

1) シロネズミはWistar系雄性的のもので、体重150~200gのものをを用いた。採血上の便宜のため5群に分けた。

2) 飼料として、米粉850g、食塩4g、サラダオイル1g、Vitamin B₁ 0.5 mg/00, Vitamin B₂ 0.25 mg/00, Vitamin B₆ 0.25 mg/00を混合したものを練り、その全体の0.06%になるように3'-Me-DABを混じったものを用いた。

3) 抗血清の作製、ならびに免疫電気泳動(図1)

抗原として、シロネズミ胎児生食抽出液、胎児血清、羊水、ならびに成育雄シロネズミ血清を用いた。この抗原はFreund's adjuvant (complete)とともに、家兎に免疫した。胎児生食抽出液、胎児血清、羊水にて作られた抗血清は、それぞれプールされた雄成育ラットの血清にて、それぞれ6:1の割合で吸収し、免疫電気泳動上1本のanti embryo specific proteinの存在を確認した。また、3'-Me-DAB肝癌ラット血清の泳動にて、 α -globulin領域に1本の沈降線を得た、これを用いて、3'-Me-DAB投与ラット血清を経日的に検討した。

4) 組織学的検索

3'-Me-DAB投与ラット血清中におけるembryo specific antigenの検索とともに、肝組織変化を経日的に光

Ingestion of 3'-Me-DAB and Embryo-specific antigen

RAT	W	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
G. I	1	-	+	+	+	-	+	D								
	2	-	+	+	-	+	+	D								
	3	-	+	+	-	+	+	D								
	4	-	+	+	+	+	+	D								
	5	-	+	+	+	+	+	D	+	+	+	+	+	+	+	+
G. II	1	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	D				
	2	-	+	+	+	D										
	3	-	-	+	+	+	+	+	D							
	4	-	+	+	+	-	-	+	+	D						
	5	-	-	+	-	+	+	+	D							
	6	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	D			
	7	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
	8	-	+	+	+	+	D									
	9	-	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+	D			
G. III	1	-	-	-	-	+	+	+	+	D						
	2	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	3	-	-	+	+	+	+	D								
	4	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	D	
	5	-	+	-	+	D										
G. IV	1	-	+	D												
	2	-	+	-	D											
	3	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	D
	4	-	-	-	-	+	D									
G. V	1	-	+	-	+	+	+	D								
	2	-	+	-	-	+	-	+	D							
	3	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	D
	4	-	-	-	D											
	5	-	-	D

図2. Hepatic lesion following ingestion of 3'-Me-DAB and Embryo specific antigen

顕ならびに電顕にて検討した。

成績：図 2 に示したごとく、3'-Me-DAB 投与初期より急速に胎児性蛋白の合成が行われて、60% 以上のラットに陽性となる。これは各グループにおける共通の所見であるが、それからの変化は各群ばらつきがある。しかしながら、各群とも共通していることは、ひとたび急激に合成された胎児性特異蛋白も、その後はなんらかの機転にて合成されなくなり、組織学的に肝硬変が認められる時期より、全例に検出されることである。組織学的変化の検討は投与後 1 週目、それから 2 週間隔にて顕ならびに電顕にて観察した。1 週目は、光顕的に正常肝とさほど変わらず、電顕的には粗面小胞体の一部拡大、分節化の所見、また部分的には ribosome の離脱が存在し、滑面小胞体 (SER) は増加の傾向を示し、mitochondria は膜の不整、腫大を示すものがみられた (図 3-1)。胎児特異抗原陰性のシロネズミの第 4 週目の肝組織は、光顕では変性像 (脂肪変性) が著明で、電顕的には SER は増加し、所々 vesicle が compact に集合し network を形成する部分がみられ、一方 RER は減少し mitochondria の周辺に認められる。Free ribosome は数は少ないが RER の周辺に散在する (図 3-2)。4

週目以降はしだいに光顕的に肝線維化の傾向を示し、持続的に embryo specific antigen の陽性となる 8 週目には、光顕的には過形成性結節を伴った乙' 型肝硬変の所見を呈し、電顕的には SER の増生が著明で、mitochondria の変性を認め、所々拡大した RER の内腔に ribosome を含む cytoplasmic fragment が Polyp 状に突出してみられる。10~12 週目の肝癌シロネズミの光顕像は省略するが、電顕的には短く、かつ拡大した segment が散在し、SER の vesicle の小集簇がみられる。free ribosome はほぼ正常に分布し、mitochondria は数は少なく、また小さく、円形ないし楕円形を示し、時に curled cristae をもったものがみられる。Ribosome を含む cytoplasmic fragment の空胞内突出像も時に認められる。核の変化では核膜の不整、核内封入体、核小体の増大等がその変化の主なるものであった。

結論：1) AFP test は原発性肝細胞癌診断に対する特異的診断法である。

2) 3'-Me-DAB 投与シロネズミに関する実験は Stanislawski らの研究がある。彼らは 3 種の胎児特異抗原を検出し、そのうち LA antigen を肝癌特異抗原と述べている。我々は胎児生食抽出液、胎児血清、ならびに羊

水にて検討したが、一つの胎児特異抗原しか検出されず、これは各抗原に共通のものであった。この胎児特異抗原を用い、3'-Me-DAB 投与シロネズミ血清を経日的に調べたところ、図2のごとき成績を得た。投与1週目に急激に陽性となる機転は不明であるが、おそらく 3'-Me-DAB が carcinogenesis のために蛋白合成の情報の乱れを惹起せしめるためではなかろうか。この現象に switch on, switch off theory の導入も非常に興味ある。胎児特異抗原の出現ということで、電顕的には ribosome, SER, RER, mitochondria の変化を主に追求してみたが、変化はあっても、これをもって胎児特異蛋白合成の乱れに結論づけることは困難である。

3) AFP test の早期肝癌診断への応用ということの意味で本実験を行ったわけであるが、ヒト症例の過形成性結節を伴った肝硬変に陽性に出たことも発癌における一過程でないかと考えられる点、ならびに、動物実験の成績と合わせ、早期肝癌診断の可能性はありと結論する。今後は胃癌早期発見のために行われているような集団検診のように広く応用してみる必要は大である。

質問：伊東信行（奈良医大 病理）

1) DAB 肝癌発生初期の変化と Fetoprotein との相関はどうか。

2) Tumor area の大きさと Fetoprotein の発現率との関連はいかにか。

答：沖田極

1) 3'-Me-DAB 投与によって様々の肝変化が認められるのは、報告にあるとおりである。今回の実験でその肝変化の一つ一つに焦点を合わせることなく embryo specific antigen の出現と肝全体の変化を調べた。これは人肝硬変症にて過形成性結節を伴ったものに α -Fetoprotein 陽性をみたためである。

演者らの結果に示した1週目あたりに陽性化する機転は不明であるが、過形成性結節を伴った時点から、持続的に陽性を示すことは早期発見ということからも興味あると思う。

2) 癌結節の大きさと血中濃度の間の相関は今回はみていない。

11. 肝癌の病態ならびに診断所見と Histological Grade の関連性に関する研究

葛 西 洋 一 水 戸 廸 郎 玉 置 明
西 信 三 平 井 秀 松 佐々木 憲 一*

I. 緒 言

我々は、先に肝癌とくに肝細胞癌の組織学的異型度が、予後にも関連性のあることを指摘したが、肝癌の診断法として、もっとも有力な所見を呈する α_1 -Fetoprotein (AFP) と肝動脈造影の所見を組織学的異型度と対比検討した知見を述べる。

II. 肝癌の形態分類と臨床分類

肝癌の形態像は、Eggle の分類が慣用され、塊状型、

多発結節型およびびまん型の3型に分けられるが、我々は、これに肝門部癌を加え、4型に区分するのが適切と考える。

教室の経験 87 例では塊状型、多発結節型、びまん型、肝門型の順に多いが、肝硬変の合併率は、逆の順序で、塊状型はもっとも少なく 15% であった。

一方肝癌の臨床分類は Berman の提唱した5型が慣用され、教室例でも、ほぼこれに準ずる頻度を示すが、これは必ずしも病態や予後と平行するものではない。

III. 肝癌の組織学的異型度

肝癌の大部分を占める肝細胞癌の組織学的異型度に関して、Edmondson は、4型の分類が可能であるとして

*Y. Kasai, M. Mito, A. Tamaki: 北海道大学 第1外科;
S. Nishi, H. Hirai: 同 第1生化学; K. Sasaki: 同 中央
検査部。

表 1. 生存期間と異型度

異型度	生存期間	6 ヶ月未満	6 ヶ月以上
II		1/6	5/6
III~IV		13/20	7/20
Fisher の直接確率計算法 $P=0.9\%$			
		1 年未満	1 年以上
II		3/6	3/6
III~IV		19/20	1/20

$P=2.8\%$

いるが、これは、細胞質の量と好酸性、核の大きさおよび hyperchromatism, 核、細胞質比、腫瘍細胞の密集状態、細胞の機能、組織構造などを基準にする。

I 型は単独には肝癌として存在しないが、II 型は正常よりも核がやや大きく、クロマチンに富み、この両型には胆汁形成がみられる。III 型はよりクロマチンの多い、より大きな核を有するもので、giant cell を含むことが特徴的であるのに対し、IV 型では細胞質がほとんどなく核が大部分を占め、胆汁形成もみられない点などが特徴とされる。

1) 肝細胞癌の異型度と予後

病態と予後の明らかな肝細胞癌 26 例にこれを適用して検討すると、I~II 型は塊状型のみにみられ、入院、開腹時の検索では肝外転移はなく平均生存期間は 11 ヶ月であり、III~IV 型の場合が平均生存期間 5.5 ヶ月であったのに対し、予後は明らかに良好である。

さらに、これらの生存期間と組織異型度との関係を Fisher の直接確率計算法で検討すると、III~IV 型が 6 ヶ月未満に、II 型が 6 ヶ月以上に偏在する確率は 90% 以上である (表 1)。

すなわち、異型度は肝細胞癌の予後に関係するものであり、III~IV 型では高率に肝外転移を認め、生存期間も短い、肝硬変の合併と異型度には関連性がみられない。

2) AFP と異型度

我々の行っている α_1 -Fetoprotein の定量は Mancini の Single Radial-Immuno-Diffusion 法であるが、作製した α f 特異抗血清 0.2~1.0 ml/10 ml, 1% Agarose の Plate に標準精製 α -f-Protein を加えて標準値を定め、次いで、同じ Plate に患者血清を 1 定量 (5 μ l) を加えて、48 時間後に反応帯の直径を測定する方法である。

この方法による肝細胞癌の陽性率は 78% で、転移肝癌 34 例中 1 例に陽性例をみたほか、他臓器癌、肝炎、肝

表 2. Grading of hepatoma Sc. Angiographic pattern

	Direct finding		Indirect finding
	Arterial phase	Capillary phase	variations of intrahepatic A.
G. I~II	Hypervascularity +~++	Demarcated tumor stain	Stretching Sc. Displacement
G. III~VI	Hypervascularity +~++~+++	Clowding tumor stain	Disruption Sc. Occlusion variations in luminal caliber

図 1. AFP 値と Histological Grade

硬変、健康成人など 1,106 例では、すべて陰性であった。

以上の AFP 陽性例の titer を肝細胞癌の異型度に対照して、プロットしてみると、小児肝癌と成人肝癌とは著しい差異がある。すなわち、小児肝癌では AFP 値が 400 μ g/ml 以上であるのに対し、成人肝癌のうち異型度の低いものは、AFP 値がマイナスまたは、100 μ g/ml 以下であり、また異型度の高い III~IV 型の大部分は 100~1000 μ g/ml の範囲内にある。

ここで、異型度 IV 型としてあげたものには、AFP 値にばらつきをみるが、このうち、63 μ g/ml の 1 例は II, III, IV の所見を混在するものであり、また 171 μ g/ml を示した他の 1 例は、II, IV の要素を混在している。

したがって、IV 型の AFP 値が広範囲にわたっている原因の一つは、異型度の低い要素の混在に起因する点も考えられる (図 1)。

今回、AFP 値と組織学的異型度の関係を検索した 22 例中 5 例に AFP 値陰性例をみた。これらは、いずれも II 型に属するもので 1 例 (第 5 例) のみは、わずかな巨細胞の出現をみるものであったが、他の 4 例はすべて I~II 型あるいは II 型に属するものであった。

このように、II 型で AFP 陰性のものは、だいたいに於いて生存期間も長く、臨床的にも良好に経過するが、組織構造は trabecular であった。

これに対して、II 型で AFP 陽性のものは、組織構造も packed または trabecular+packed であった点から、組織構成の差異も AFP の産生に関与する要素の一つと

考えられる。

3) 肝動脈造影所見と異型度

我々はさらに、組織異型度と肝動脈造影所見との関連性の有無について検索を進めたが、肝動脈造影の直接所見と間接所見を、それぞれⅠ～Ⅱ型とⅢ～Ⅳ型群とに分類してみると、両者の著明な差異は間接所見としての主要肝内動脈枝の変化がみられることを知った。

すなわち、Ⅰ～Ⅱ型では肝内動脈枝の伸展および圧排像が特徴的であり、Ⅲ～Ⅳ型では動脈枝の断裂ないし内腔不整像が高率にみられる。これに対して、直接所見の動脈相では、両者の差異はほとんどみられず、毛細管相の Tumor stain 像は、Ⅰ～Ⅱ型では比較的鮮明である

が、Ⅲ～Ⅳ型では不鮮明である。すなわち、肝動脈造影の所見から、肝癌の組織学的異型度を段階的に判別することは困難であるが、概略的な判定は可能であろうと考える(表2)。

結 論

以上、我々は肝癌組織の異型度の設定を形態的病型、AFP および肝動脈造影所見などについて検討し、1)肝細胞癌の組織学的異型度は、臨床病態像に影響する。2)異型度は AFP 値とかなりの相関を有する。3)肝動脈造影は、ある程度まで異型度の判定に有意義であるなどの結果を得た。

12. 実験肝癌に対する門脈枝血流遮断と核酸代謝

竹 前 徹 也 佐 野 博 秋 田 和 己
小 林 巖 林 四 郎*

現在のところ肝癌に対する唯一の根治的療法は、病巣部を含めた広範な肝切除であるが、早期発見が困難であることや、原発性肝癌の場合には肝硬変症の合併率が高いことなどから、切除を断念しなければならない症例が多い。このような切除不能な肝癌の治療上、腫瘍領域の脈管分布が重視され制癌剤の局所注入による治療の面でも応用されているが、脈管分布に立脚した別の治療法として腫瘍領域の血流を遮断し、腫瘍の生育を阻止しようとする試みも行われ、本庄教授らの門脈枝結紮や葛西教授らの肝動脈枝結紮などでも、ある程度の延命効果や自覚症状の改善が得られている。我々は佐野を中心として、家兎肝に Brown-Pearce 腫瘍を移植し、腫瘍領域の門脈枝を室温硬化型シリコンで充填することによって、腫瘍の生育や肝内転移がある程度阻止され、多少の延命効果も認めており、門脈系が肝癌の生育と密接な関係があることをこれまでに報告してきたが、今回は肝動脈枝遮断と門脈枝遮断の違いや、門脈枝遮断の肝癌生育阻止効果の機序を解明する手掛りを得る目的で、同様な実験で主として核酸代謝の面を検討した。

方 法 実験動物としては2～3kgの家兎を用い、家兎の大腿筋肉内に継代移植した Brown-Pearce 腫瘍を肝の右葉辺縁実質内に移植し、1週後に開腹して腫瘍が生着したことを確認し、血流遮断を施した。血流遮断の手法は腫瘍領域の門脈枝または肝動脈枝を肝門部で二重結紮するか、あるいは室温硬化型シリコン(以下 Phycon 6,500 とする)を門脈枝内に注入して充填する方法をとった。充填にあたって前に発表した実験では、門脈枝を結紮し血流を遮断した上で Phycon 6,500 を注入する方法をとったが、今回は臨床応用への可能性を考慮して、門脈枝結紮を施さずに Phycon 6,500 の注入のみを行い、結紮の上、充填した場合に比べて充填範囲が小範囲になるので、仮に小範囲充填と名づけた。実験群は対照群、肝動脈枝結紮群、門脈枝結紮群、小範囲充填群、小範囲充填・MMC 併用群の5群で、これら5群について血流遮断1週後に屠殺し、腫瘍の最大径を計測するとともに肝内転移の有無を調べた。肝動脈枝結紮群を除いた4群については、腫瘍移植部とその他の部について Schmidt-Thannhauser の方法で DNA, RNA を抽出し、核酸への ^{32}P の取り込みを測定して比放射能を求めた。また肝動脈枝結紮群と門脈枝結紮群については、それぞれの群から無作為に選んだ一部の実験例にお

*U. Takemae, H. Sano, K. Akita, I. Kobayashi, S. Hayaishi: 信州大学 第1外科。

表 1. ○…転移なし △…一葉に転移 ●…多様に転移

群	最大腫瘍径	0~10mm	11~20mm	21~30mm	31mm以上
対 照 群		○	○ ○ △ ○ ○ ●	○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △	● ● △ ●
肝 動 脈 枝 結 紮 群		○		○ △	● ●
門 脈 枝 結 紮 群		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○		
門 脈 枝 充 填 群		○ ○ ○ △	○ ○ ○ ○		△
小 範 囲 充 填 群			○ △	○ ○ ○ ● ○ ○ ○ △	△
小範囲充填MMC併用群		○ ○	○ ○ ○ ○ ○ △	○	●

図 1.

図 2.

ける組織像について検討した。

成績 各群における腫瘍の最大径や転移の有無について比較すると、表1のように対照群に比べて門脈枝結紮群や充填群では腫瘍の生育阻止効果は顕著であるが、肝動脈枝結紮群や小範囲充填群では、腫瘍の生育阻止や転移の抑制は得られない。しかし小範囲充填に Mitomycin-C を併用した群では、対照群と比較すると腫瘍径も小さく、腫瘍の生育や転移も抑制される。肝動脈枝結紮例と門脈枝結紮例の肉眼所見と組織像を比較すると、肝動脈枝結紮例では腫瘍は被膜下実質内に広く伸展し、他葉にも粟粒大の小転移巣が認められるが、門脈枝結紮例では腫瘍は小さく、なかには退縮、癥痕化した実験例もあった。組織像についても、肝動脈枝結紮例では腫瘍細胞の変性像は乏しく、核分裂像も認められ、腫瘍細胞の増殖が盛んであるのに対して、門脈枝結紮例では腫瘍細胞は変性や壊死に陥り、それを取り囲んでリンパ球や組織球の浸潤が認められ、一部は肉芽組織で置き換えられていた。次に肝動脈枝結紮群を除いた各群において、

^{32}P の静脈内投与後 24 時間目に、DNA、RNA への取り込みを比較してみると、DNA については図1のように腫瘍移植部の代謝活性は、いずれの血流遮断群でも対照群に比較して低下しているが、その他の部における代謝活性は門脈枝結紮群では対照群と比較して亢進しているが、小範囲充填群や小範囲充填・MMC 併用群では対照群と比べて有意の差がない。また RNA の ^{32}P 比放射能を比較すると、図2のように腫瘍移植部では DNA と同様に、いずれの型の血流遮断群でも対照群と比較して代謝活性は低下しており、その他の部では門脈枝結紮群や小範囲充填・MMC 併用群では対照群と比較して代謝活性は亢進しているが、小範囲充填群と対照群との間に有意の差はない。

結論 家兎肝に移植した Brown-Pearce 腫瘍に関するかぎり、腫瘍領域の門脈枝の血流が十分に遮断された場合には、肝動脈枝遮断よりも腫瘍生育阻止効果が顕著であり、組織像でも明らかに差がある。また核酸代謝の面から眺めた場合に、腫瘍の生育阻止がもっとも顕著

であった門脈枝結紮群において、腫瘍移植部の代謝活性は対照群と比較して低下しており、血流遮断領域における腫瘍細胞の分裂能や蛋白合成能などが低下していると考えられる。Phycon 6,500 による小範囲充填の場合、腫瘍の生育阻止が得られなかった理由を考えると、血流を遮断することなく Phycon 6,500 を注入するため、Phycon 6,500 の注入が不十分となり、門脈枝血流遮断が不確実であるということや、充填に際しての強い注入圧のため、癌細胞が血中に遊去し、転移を助長させ

る危険性も考えなければならない。以上実験肝癌に対する腫瘍生育阻止効果について、主として核酸代謝の面から検討したが、腫瘍の生育や肝内転移が抑制されている門脈枝結紮群においては、代謝活性もそれと平行して変化しているが、小範囲充填群では代謝活性が低下しているにもかかわらず、生育阻止効果がないという事実を考えると、腫瘍生育阻止の機序に関しては、今後別の面からも検討したい。

13. 転移性癌による肝外閉塞性黄疸

岡 崎 伸 生 服 部 信*

癌患者の治療経過中に認められる黄疸は、積極的な検査もちゅうちょされる段階で観察される症例が大部分であるが、一方 shunt operation により黄疸の消失と延命効果の得られる症例も経験される。したがって癌患者に合併した閉塞性黄疸の診療にあつては、閉塞部位の診断のみならず、局所病変、遠隔転移など癌病巣の進展と全身状態を考慮した上で治療方針をたてる必要がある。今回、我々は、剖検例から、肝、胆路および脾を除く上皮性悪性腫瘍で、剖検時に顕性黄疸と肝外胆路の閉塞の認められた症例を選び、これら転移性癌による肝外閉塞性黄疸の臨床像について検討した成績を報告した。

1962～1968 年までに国立がんセンターで剖検された患者総数は 1,840 例であるが、今回対象とした肝、胆路および脾を除く上皮性悪性腫瘍は 1,438 例で、その 6.7%, 97 例に肝外胆路の閉塞が認められた。

原発巣別にみると、胃癌が 70 例で症例の大部分(72.2%)を占めるばかりでなく、胃癌の剖検総数 364 例の 19.2% に当たり、主要な合併症の一つと考えられた。肺癌、乳癌、子宮癌、直腸癌、食道癌、頭頸部癌、結腸癌および膀胱癌の症例にも肝外胆路の閉塞例が認められたが、これらの症例においては、それぞれ剖検例の 5% 以下で、比較的にまれな合併症に属する。

黄疸を初発症状とした症例は胃癌例に 10 例(全例再発)認められたが、しかし肝門部リンパ節転移、局所再

発およびその直接浸潤のみによる閉塞性黄疸例は少なく、胃癌の 5 例、子宮癌の 1 例のみであった。多くの症例が肝転移、肺転移および腹膜面への播種性転移を合併していた。

発黄前後の血液生化学的検査成績の推移をみると、大部分の症例で Alkali Phosphatase 活性の上昇は黄疸の発現にやや先行し、発黄とともに急速な上昇を示した。また LDH 活性は、広範な肝転移の認められた症例に高値であり、発黄後の活性の上昇も著明で、肝転移の認められなかった症例と対照的であった。

閉塞性黄疸の診断は原疾患と生化学的検査成績から比較的容易であるが、閉塞部位の診断さらには手術適応の決定のためにも経皮的胆管造影の応用が有用であると考えられた。とくに黄疸発現前 Alkali Phosphatase 活性の上昇し始めた時点で行うことが必要で、安全である上に成功率も高く、かつ病変部位が狭窄として捕えられ、もっとも病変の解析に役立つ胆管像が得られた。

閉塞性黄疸発症後の予後は、癌病巣の広がり、その程度に関係するが、一般に不良で、たとえば 50% 以上の肝転移、肺転移および腹膜面への播種性転移を合併した症例の発黄後 1 ヶ月以内の死亡率は、それぞれ 75.0%, 64.7% および 60.9% であった。なお大部分の症例で、死亡前に急速な Urea N の上昇が認められた。閉塞性黄疸発症後、頻回に血清電解質および Urea N を測定することは、予後の推測に役立つと考えられた。

*N. Okazaki, N. Hattori: 国立がんセンター病院 内科。

14. 原発性ならびに転移性肝癌に対する 5-FU と MMC の肝動脈内注入化学療法について

三 浦 健 石 田 正 統 杉 浦 光 雄
二 川 俊 二 遠 藤 康 夫*

目 的 と 方 法

切除不能の肝癌 40 例に対して肝動脈にカテーテルを挿入、固定し、5-FU と MMC の局所注入を行った。全身性投与による化学療法では、肝癌に対して効果が期待できないので、肝動脈内に選択的に注入することによって、より大きな抗腫瘍効果を得ようという目的である。カテーテルは Watkins のポータブル持続動脈注入ポンプに接続して 5-FU 250 mg/日 を 3 ヶ月以上持続注入した。

Cytostatic な 5-FU の持続注入で腫瘍細胞の DNA 合成を阻害するとともに、cancerocidal な MMC の one shot 衝撃療法を併用すると効果の発現が促進され、かつ抗腫瘍効果も大きいことを経験したので、原則として 5-FU 250 mg/日 とともに MMC 4~10 mg の衝撃療法を随時併用した。しかし肝硬変を合併した肝癌では、高濃度の薬剤のために早期に chemical hepatitis を起こすので、十分な治療を行うことができなかった。

抗 腫 瘍 効 果

原発性肝癌の患者の血清中に特異的に出現する α_1 -Fetoglobulin は、5-FU や MMC の局所注入を行った例では陰性化することがある。また治療前後の α_1 -Fetoglobulin の変動を倍々希釈の半定量法で調べると、局所注入によって肝臓が縮小するとともに α_1 -Fetoglobulin も量的に減少するが、腫瘍が再び大きくなる時は α_1 -Fetoglobulin も増加することを認めた。 α_1 -Fetoglobulin は、このように原発性肝癌の診断上重要な方法であるとともに、治療効果の判定の上でもきわめて有用な方法であるといえる。

図 1. Primary liver cancer treated with intra-arterial 5-FU-MMC infusion

図 2. Metastatic liver cancer treated with intra-arterial infusion of 5-FU and MMC

治療前と治療後の肝機能を比較すると $Al-P$ や GOT , GPT , LDH は大多数の例で軽快したが、肝硬変を合併した肝癌ではむしろ悪化する例もあった。3 ヶ月以上の十分な治療を行うことのできた症例では、原発性肝癌でも転移性肝癌でも肝機能がよくなるとともに腫瘍も縮小して明らかな抗腫瘍効果を示す例が 70% もあった。

延 命 効 果

原発性肝癌に対する本法の延命効果は図 1 のとおりで、肝硬変を合併しない原発性肝癌 10 例のうち、2 例は早期に死亡したが、残りの 8 例では、腫瘍の縮小や肝機能

*T. Miura, M. Ishida, M. Sugiura, S. Futagawa : 東京大学 第 2 外科 ; Y. Endoh : 同 第 1 内科.

表 1. 5FU と MMC の肝動脈内注入・大動脈内注入化学療法
による肝癌の治療成績

	有 効	無 効	判 定 不 能	1 死 月 内 亡	平 期 均 生 存 間	1 生 年 以 上 存
原発性肝癌 26例						
肝硬変なし 13例	6	3	4	(3)	8.2月	1/13 (44月)
肝硬変あり 13例	4	5	4	(4)	3.4月	2/13 (12.5, 12月)
転移性肝癌 32例						
原発巣切除 17例	9	2	6	(2)	8.5月	5/17 (28, 18, 16)
原発巣非切除 15例	6	1	8	(2)	4.9月	0/15
計 58例	25	11	22	(11)		8/58 14%

の改善を示し、一過性ではあるが、明らかな抗腫瘍効果が認められて、平均 11.6 ヶ月(4~44 ヶ月)生存した。

しかし肝硬変を合併した肝癌 10 例では、効果の認められたものは 2 例のみであった。1 年生存を得たものも 2 例あったが、6 例は十分な量の 5-FU と MMC を投与しないうちに、3 ヶ月以内に死亡した。

昨年報告した乳児の肝臓の malignant angioblastoma の 1 例は 3 ヶ月にわたる 5-FU の肝動脈内注入によって tumor stain がほとんど消失したのを動脈撮影で確認した。すでに 4 年近く経過したが、その後再発も転移もみられず順調に発育を続けており、Collins の危険期もすでに脱しているの、この小児肝癌は化学療法のみで一応完全寛解に達したと考えている。

転移性肝癌に対する効果をみると 20 例中 14 例が明らかな抗腫瘍効果を示した。原発巣の切除してない転移性肝癌では、肝癌のみを治療しても原発巣が進行するために延命効果は少なく、図 2 のように平均生存期間は 5.5 ヶ月で、全例 10 ヶ月以内に死亡した。しかし原発巣さえ切除してあれば、本法によって肝転移を治療すると延命効果を得る例が多く、12 例中 5 例は 1 年以上生存した(最高 28 ヶ月)。

考 案

肝癌の進行度によって Stage 分類 (Ariel) を行くと、腫瘍部分が肝臓の 50% 以上を占める Stage 4 の進行癌が、40 例中 24 例もあった。このような進行癌では 1 ヶ月以内の死亡が多くて 24 例中 7 例もあり、治療効果も少なく、平均生存は 3.7 ヶ月で、ほとんど延命効果を期待できないことが判明したので、Stage 4 の肝癌は適

応から除外すべきものと考えている。

Ariel は Stage 4 はもちろん、Stage 3 (腫瘍部分 / 全肝臓 = 30~50%) の肝癌も局所動脈内注入による化学療法の適応がないといっている。しかし演者らの Stage 3 の肝癌 7 例をみると抗腫瘍効果も大きく (71%), 14.6 ヶ月の平均生存を示しているの、Stage 3 の症例は本法によって積極的に治療すべきものと思われる。

なお、肝動脈にカテーテル挿入不能の症例や、肝臓のほかにも転移を有する 18 例に対しては、腹腔動脈分岐部上方の大動脈にカテーテルを挿入して亜選択的投与を試みたが、抗腫瘍効果が低いにもかかわらず、肝動脈内注入に劣らぬ延命効果を得る例が少なくないことを経験している。

結 論

肝動脈内注入 40 例、大動脈内注入 18 例、合計 58 例に対する 5-FU と MMC の局所動脈内注入化学療法の成績をまとめると表 1 のとおりで、58 例中 8 例が 1 年以上の生存を得ることができた。3 ヶ月以上の治療を行えば症例の 70% 以上において明らかな抗腫瘍効果を得ることができるが、長期の延命効果を得ることはなお困難である。

原発性肝癌で肝硬変を伴うものは効果を期待できない。肝硬変を伴わない肝癌は本法の適応となるが、進行性の末期癌が多かったために満足すべき成績は得られなかった。Ariel の Stage 3 以下の症例に限れば成績はかなり向上すると考えられる。

転移性肝癌も同様であるが、原発巣を切除したあとの肝転移のみを治療する場合には 1 年以上の生存を得るこ

とが多い。今後は適応を選んで本法を活用し、さらに延命効果を図るべく努力したいと考えている。

文献 1) I. M. Ariel et al.: Intraarterial chemotherapy for cancer metastasis to liver, Arch. Surg., **91**: 851, 1965. 2) M. J. Brennan et al.: 5-Fluorouracil treatment of liver metastases by continuous hepatic artery infusion via Courmand catheter, Ann. Surg., **158**: 405, 1963. 3) J. H. Burrows et al.: Infusion of fluorinated pyrimidines into hepatic artery for treatment of metastatic carcinoma of liver, Cancer, **20**: 1886, 1967. 4) B. Clarkson et al.: Effects of continuous hepatic artery infusion of antimetabolites on primary and metastatic cancer of the liver, Cancer, **15**: 472, 1962. 5) T. L. Dao et al.: Fluori-

nated pyrimidines in treatment of breast cancer patients with liver metastases, Cancer Chemother. Rep., **27**: 71, 1963.

6) R. R. Ecker et al.: Cancer chemotherapy for hepatic metastasis by continuous hepatic artery infusion, Cancer Chemother. Rep., **26**: 531, 1962. 7) R. D. Sullivan et al.: Chemotherapy for liver cancer by protracted ambulatory infusion, J. A. M. A., **194**: 481, 1965. 8) E. Watkins, Jr., et al.: Cancer chemotherapy by prolonged arterial infusion, S. G. O., **118**: 1, 1964. 9) 三浦健ほか: 制癌剤の動脈内持続注入療法, 外科診療, **11**: 296, 1969. 10) 三浦健ほか: 抗癌剤の局所動脈内注入療法とその適応—肝癌に対する 5FU の肝動脈内持続注入化学療法について, 日本臨床, **27**: 1578, 1969.

15. 肝癌の早期診断に関する実験的研究 (I)

——イヌにおける Diethylnitrosamine 肝癌発生過程の初期変化について——

平尾和也 松村一隆
榎本泰久 深井泰俊

今川敦史 四宮洋一
日浅義雄 伊東信行*

我々は臨床的に肝癌の初期変化, 早期診断について種々の検討を加えているが, 微少なる早期肝癌を発見する方法はほとんど確立されていない。従来より Diethylnitrosamine を用い, ラット, マウス, ハムスターなどにおける肝癌の発生は, 多くの研究者により報告されているが, それ以外の動物での報告はあまりみられない。我々も従来より DEN, Dimethylnitrosamine, N-Nitrosopiperidine などを用いてラットに肝癌のほか, 食道癌や腎腫瘍を発生せしめ種々検討しているが, 臨床応用とくに外科的操作を目的とした初期肝癌の研究には, これらの動物では不適當であり, より大きな動物での追求が望まれる。そこで我々はイヌを用いて Diethylnitrosamine による肝癌発生の方法を開発し, その初期変化を病理組織学的に解明して, その基礎的な結果をもとに, さらに

臨床的, 血液生化学的ならびに X 線学的に追求することを目的として, Diethylnitrosamine の影響を検索しているが, 今回はその初期における血液生化学的, および病理組織学的変化について報告する。

実験方法は, 動物に雑種オス成犬を用い, 4 群を作成した。Diethylnitrosamine は以下 DEN と略するが, 第 1 群は DEN を正常飲料水に 50 ppm の割合に投与した群 7 匹, 第 2 群は 100 ppm の割合に投与した 8 匹, 第 3 群は 500 ppm の割合に 2 週間投与した後, 12 週まで中止し, 以後再び 100 ppm の割合に投与した 8 匹, 第 4 群は無処置の対照群 3 匹である。

全動物は各週体重測定および血液生化学的検査を行った。第 1 群の各週の体重ならびに血液生化学的検査値は, 体重, 総蛋白, ヘマトクリット, 総コレステロールには著明な変化を認めないが, GOT, GPT, Al-Pase は DEN 投与期間に比例して上昇が認められる (図 1)。

第 2 群の DEN 100 ppm 投与群は, 投与とともに体重

*K. Hirao, K. Matsumura, A. Imagawa, Y. Shinomiya, Y. Enomoto, Y. Fukai: 奈良県立医科大学 第 1 外科; Y. Hiasa, N. Ito: 同 第 1 病理。

図 1. Changes of body weight and biochemical analysis of sera in dogs treated with 50 ppm

図 2. Changes of body weight and biochemical analysis of sera in dogs treated with 100 ppm DEN

図 3. Changes of body weight and biochemical analysis of sera in dogs treated with DEN

減少，食欲不振，消化管出血などかなりの頻度にみられ，総蛋白，ヘマトクリット，総コレステロールは低下する。

一方 GOT, GPT, Al-Pase は著明に上昇する (図 2)。第 3 群は，DEN 500 ppm 投与開始とともに体重は急激に減少し，各検査値ともその変動は著しく，投与を中止すると漸次回復し，再び DEN 投与によりゆるやかな変動を始める (図 3)。

このようにして検索した全動物のうち，体重減少など一般状態が悪化し，回復の認められないものは余儀なく屠殺した。それらの病理学的所見は，第 1 群の 50 ppm 20 週間投与にて屠殺したものでは，著しい体重減少と体重当たりの肝重量比の増加がみられた。第 2 群の DEN 100 ppm 投与群では，それぞれ 6, 7, 8, 12 週にて屠殺した。この群では体重減少著明のもの，また 3～5 l の腹水貯溜を認めたものがあり，体重当たりの肝重量比は減少している。第 3 群の DEN 500 ppm 2 週間投与群では，それぞれ 3, 12 週にて屠殺した。3 週にて屠殺したものは，体重減少と体重当たりの肝重量比は減少しているが，一方 12 週まで観察したものはほとんど回復している。

これらの動物の組織像では，500 ppm DEN を 2 週間投与した後屠殺したものでは，結合組織の増加はあまりみられないが，軽度の充血があり，空胞変性が明瞭である。また Sudan III 染色によりびまん性の脂肪変性

が認められる。DEN 100 ppm 投与群のうち 7 週で屠殺した組織像では，小葉周辺部から小葉内へと浸潤性に発育する細胞浸潤がみられ，また小葉周辺性に結合組織の増生が Van-Gieson 染色により明瞭に認められる。50 ppm DEN を 20 週間投与し屠殺したものの組織像では，結合組織がさらに増加し，偽小葉の形成を認め，胆管の増生が明らかであり，胆管周囲はやや浮腫状を呈している。また褐色色素も散見される。Mallory 染色により，Glysson 氏鞘を中心に膠原線維が増生している。そして明らかな卵円形細胞の浸潤が著明にみられ，正常細胞に比べて明るく大きな細胞が石垣状に詰まったように発育している結節性肥大の像が認められる。しかし，いまだ十分な大きさの結節にまでは発育しておらず，異型細胞を混えている像も認められなく，その他肝癌の発生も認めていない。

以上，我々はイスにおいて DEN を投与し，その初期変化を追求したが，実験 12 週において明らかに卵円形細胞の浸潤，胆管の増生などを認め，また 20 週においては，すでに結節性肥大が認められ，ラットの肝癌発生初期にみられる変化がすでに出現している。ただ DEN によるラット，あるいはマウスなどの肝癌の発生に比べ，イスではさらに長期の観察が必要であり，DEN に対する感受性はラットに比し，イスではより強く，毒性も明瞭に出現するために，ラットより低濃度の DEN をより長期にわたり投与する必要があると考えられる。

16. 肝癌病巣周囲の組織学的変化について

清 永 伍 市 和 田 昭 北 村 次 男 児 島 淳之助
 松 岡 建 造 進 士 義 剛 辻 井 勉 垣 内 義 亨
 関 孝 一 平 尾 寧 章 那 須 征太郎 高江洲 春 八*

肝癌の診断は組織学的方法がもっとも決定的であり、それにいたる課程として腹腔鏡下の目標生検がもっとも有用と考えられる。近年、肝切除法の進歩もあり、早期発見が要請されるが、癌病巣が小さくまた深部にあるほど、目標生検といえども病巣そのものの標本を得ることがむずかしくなる。しかし肝癌病巣周辺には、かなりいろいろの変化があり、肝腫瘍例の生検の経験を重ねるうちに、それらの変化のうちには、原発性肝癌に特異と思えるのがあるのに気づいた。したがって、もし生検でこのような変化のみを得た場合でも、肝癌を強く疑う、さらには診断しうることになるわけで、以下これらの変化につき論じ、さらに過去の生検材料を再検し、その診断的価値を検討したい。

観察材料としては、腹腔鏡および肝生検を行った例で、生検、手術、剖検のいずれかで原発性肝癌を組織学的に証明されたもの、または生検で証明されなかったが、腹腔鏡で悪性結節を認め、かつ臨床所見、諸検査成績、経過より原発性肝癌に違いないと診断したものの、あわせて71例を対象とした。なおその内訳は、大阪大学西川内科の62例、および大阪府立成人病センターの9例である。またこれらのうちさらに剖検または手術標本のあるものは、それらも参照した。

肝癌病巣の周辺には、かなりの範囲にわたり、胆細管様構造物の散在する間質野を認める。一方、肝硬変合併例では、硬変部の間質野に通常の硬変例によくみる胆細管の増生像と同じものを認めるが、肝癌周辺のそれはそれらとは異なって異様な外観を呈することが多く、かなり違った印象を受ける。まずその形であるが、通常の胆細管増生と同じく円形ないし棒状のものもあるが、Xま

たはY字型等に異常の分枝をみるものがあり、特異な所見と思われる(図1)。また多くは管腔を欠き、さらには管腔を囲むような配列すらも欠き、単なる細胞の小集団となり、タマネギ様の外観となることもある(図2)。また少数例ではあるが、不整な管腔形成をみる例もあった。当然ではあるが、このような諸点を問題とするときは、組織標本に人工的ひずみのないことに留意し、その意味で標本周辺部での観察も原則として避けた。

さらに異様な感じを受けるのは、この異常な胆細管様構造物が多数あるときは、比較的そろった間隔で分布し、しかも、それらの周囲の繊維野では炎症細胞、線維芽細胞がほとんどなく、比較的まばらに線維細胞核を認めるのみであることが多いことである(図1, 2)。同一標本の硬変部の間質野では、通常の硬変肝でもしばしばみるごとく、ほとんどの場合、著明な細胞浸潤を伴い、繊維芽細胞も多く、増生した胆細管は任意な分布を示しており、先述の線維野とは明らかな対照を示し、場合によっては両者が相接し、そこに明瞭な境界が認められることもあり、異質なものの感じを受ける。

なお、この異常な胆細管様構造物の上皮細胞は、通常の硬変肝の間質野での増生した胆細管のそれとは異なって、核優勢、核濃染、大小不同の所見をみることがある。

この胆細管様のものの起原であるが、それらが肝癌病巣よりの小突起として連続する像を時々みることがあり、また症例によっては、このような構造物が、ほぼ等しい間隔で線維層を介在しながら多数集まって一つの集塊をなし、さらにその集塊を線維束が取り巻く像をみることがある。また他の例で明らかな肝癌組織が、この胆細管様構造物とよく似たXまたはY字型の集塊をなし、比較的そろった間隔で分布する所見がみられることがある(図3)。これらのことより、この胆細管様構造物は、癌そのものである可能性までも考えられる。しかし、他方では、この異常な胆細管様のものが分布する間質をたどっ

*G. Shimizu, A. Wada, T. Kitamura, J. Kojima, K. Matsuoaka : 大阪府立成人病センター ; Y. Shinji, T. Tsujii, Y. Kakiuchi, K. Seki, S. Hirao, S. Nasu, S. Takaesu : 大阪大学 第2内科。

図 1.

図 3.

図 2.

図 4.

てゆくと、しだいに異常を認めない胆細管の分布する部分に移行する所見もみることがあるので、さらに今後十分に検討を要する問題と思う。そこで 20 例の通常の肝硬変例の肝生検標本を参照し、それらの胆細管と対比した上で、これら胆細管様構造物に関し、次の基準を一応理念的に設定し、今回の症例につき、その基準で検討した。すなわち、Class 5: 悪性にまちがいないし (肝癌例の生検標本のみにみられ、したがって、この像をみれば肝癌組織はなくとも肝癌と診断しうる)、Class 4: 悪性の疑い濃厚 (Class 5 ほどではないが、強く疑ってよい)、Class 3: どちらともいえない、Class 2: 多分良性である (Class 1 としてよいが、多少不安が残る)、Class 1: 良性にまちがいないし (通常の肝硬変生検標本にもみられるものである)、である。以上の基準で、71例の生検標本を再検すると、肝癌組織を有する 48 例 (67.6 %) では、その 23 例の標本中に Class 4, 5 と判定される胆細管様のものであり、Class 3 は 5 例、Class 1, 2 または、そのようなものを標本中に欠くのが 20 例であった。肝癌組織を有しない 23 例 (32.4%) では、それぞれ 7 例、

2 例、14 例であった。したがって生検による診断率は、肝癌組織はないが Class 4, 5 の胆細管様のものを認める 7 例 (9.8%) を加えるとすると、67.6%より 77.4%に向上する。なお今回の症例は、ほとんどが腹腔鏡で悪性と思われる結節を認め、それを目標生検したもので、単なる盲目生検ではないことも考慮すべきことと思う。

肝癌病巣周辺でのその他の所見としては、正常肝実質内で 1～数個の癌細胞を認めることもあり、また癌組織が正常肝実質内の一部に置換されたごとく出現し、時には、それらの境界で癌細胞と正常細胞が索状の配列のまま連続する像もみられる。また正常実質内グラー域の脈管内の転移も認められることがあり (図 4)、これらも生検標本での診断に有用である。

なお、肝癌周辺の肝組織では肝細胞および、その核の大小不同、核濃染を認めることがあり、また肝硬変を伴った数例では、偽小葉の周辺に異常に増生した胆細管様のものが取り巻く所見がみられたが、通常の硬変肝でも似た像がみられるので、それだけで肝癌例に特異なものとはいえない。

質 問：志方俊夫（東大 病理） ヒトの Hepatom 結節の周囲には、ことに肝硬変がある時は、ischemic の変化として肝細胞の退行変生が起こり、これが偽胆管様になることはよくあることである。ただヒトの Hepatom ではこのような細胞が腫瘍細胞であることはあまりない。先生の示されたスライドでは、やはり、これはただの偽胆管であると思うが、先生はこれを本当に腫瘍

と考えられておられるかどうかお伺いしたい。

答：清水伍市（大阪府立成人病センター）この胆細管様構造物が癌であるかどうかという問題は、まだまだ大いに検討すべき点があると思うが、要するに肝癌病巣の周辺にだけ認められる変化であり、したがって臨床で目標生検による診断に際し意味をもつものであることを強調したいと思う。

* * * * *

* * * *