<症例報告>

脾転移により特発性脾破裂をみた肝細胞癌の1例

野田 八嗣 福岡 賢一 宮森 弘年
 田中 延善 加登 康洋 小林 健一
 服部 信* 中西 功夫** 桑島 章***

要 旨：脾転移により特発性脾破裂をみた肝細胞癌の1例を経験したので報告する。症例は、66歳男性で、右背部腫瘍を主訴として当科へ入院した。入院後、HBs 抗原陽性で、血清 AFP 1,483ng/ml と高値を呈し、各種画像診断にて右IX肋骨と脾に転移を有する肝細胞癌と診断した。経過中、誘因なく左季肋下部激痛を訴え、ショック状態となり、貧血と血性腹水が認められた。輸血と止血剤にて、ショック状態の改善をみたが、1カ月後肝不全にて死亡した。剖検では、Edmondson II 型の結節状肝細胞癌が肝両葉にまたがって存在し、非癌部は乙型肝炎硬変であった。肝内門脈には腫瘍塞栓を認め、脾・右IX肋骨・リンパ節に転移を認めた。また、3,500ml の血性腹水を認め、脾転移部位には350g の血腫と破裂の所見を認めた。

索引用語：肝細胞癌（脾転移） 特発性脾破裂

はじめに

外傷の既往なく出現する特発性脾破裂は、マラリア・白血病・悪性リンパ腫・腸チフス・伝染性単核球症・原発性脾腫瘍などでみられることがある¹⁾。しかし、悪性腫瘍の脾転移による特発性脾破裂は、極めて稀である²⁾。

今回著者らは、脾転移により特発性脾破裂をみた肝細胞癌の1例を経験したので報告する。

症 例

症例：66歳、男性、板金工

主訴：右背部腫瘍

家族歴：特記すべきことなし

既往歴：46歳時、肺結核にて左肺上葉切除術を受け、その際輸血後に黄疸を認めている。

現病歴：54歳時、胃潰瘍と肝機能障害にて金沢大学第1内科へ第1回目の入院となった。HBs 抗原陽性であり、肝生検にて慢性活動性肝炎と診断され、その後当科外来に通院していた。肝機能検査成績が長期間安定した状態が続いたため、昭和54年2月26日再度肝生検の日

で当科第2回目の入院となった。肝生検では、肝には明らかな炎症所見を認めず肝線維症と診断され、その後外来通院を中止していた。昭和55年9月中旬より全身倦怠感を認め、さらに同年11月上旬より右背部痛とともに右背部腫瘍に気付いたため同年12月25日に当科第3回目の入院となった。

入院時現症：身長164cm、体重57.5kg、血圧120/80mmHg、脈拍84/分・整であった。意識は清明、皮膚にクモ状血管腫・手掌紅斑はなく、結膜に黄疸・貧血を認めなかった。胸部では、左肩甲部に左肺上葉切除術の手術瘢痕を認め、また右肩甲骨直下にやや突出した直径約8×7cmの腫瘍を触知した。同部位の皮膚に著変を認めず、腫瘍の性状は、平滑で、可能性なく、弾性硬であり、圧痛を認めた。胸部打聴診では異常なく、腹部では肝を右鎖骨中線上2横指触知し、性状は、辺縁やや鈍、表面平滑、弾性硬であり、圧痛は認めなかった。脾・腎は触知せず、腹水も認めなかった。神経学的所見は異常なく、四肢に浮腫は認めなかった。

入院時検査成績 (Table 1)：血沈は1時間値58mmと亢進しており、肝機能検査成績では、GOT 140IU/L、GPT 127IU/L、Al-p 335IU/L、γGTP 301IU/L、ZTT 20.2単位、TTT 14.4単位といずれも高値を呈していた。HBs 抗原、HBe 抗体はともにRIA法にて陽性

* 金沢大学第1内科
 ** 同 第1病棟
 *** 同 核医学科

<受付日57年3月12日>

Fig. 1 Bone scan shows abnormal accumulation of RI in the right IXth rib.

Table 1. Laboratory data on admission

RBC	410×10 ⁴	GOT (IU/L)	140
Hb (%)	80	GPT (IU/L)	127
WBC	4800	Al-P (IU/L)	335
plats.	13×10 ⁴	γ-GTP (IU/L)	301
Ht (%)	39	LDH (IU/L)	373
Urinalysis		Ch. E. (IU/L)	3.54
protein	(-)	ZTT (U)	20.2
glucose	(-)	TTT (U)	14.4
Urobilinogen	(±)	TSP (mg/dl)	7.5
Bilirubin	(-)	Alb. (%)	55.1
OB	(-)	α glob. (%)	4.1
stool OB	(-)	α ₂ glob. (%)	11.5
ESR	58mm/hr	β glob. (%)	10.2
CRP	(-)	γ glob. (%)	18.9
RA	(+)	HBs-Ag (RIA)	(+)
LE test	(-)	HBs-Ab (RIA)	(-)
Na (mEq/L)	138	HBe-Ag (RIA)	(-)
K (mEq/L)	4.3	HBe-Ab (RIA)	(+)
CL (mEq/L)	104	AFP (ng/ml)	1483
Ca (mEq/L)	4.5	ICG (15' %)	12
P (mg/dl)	3.3	BSP (45' %)	5
BU _N (mg/dl)	15	Hepaplastin test (%)	74
Cr (mg/dl)	0.9	Fibrinogen (mg/dl)	275
T. cholesterol (mg/dl)	113		
Triglyceride (mg/dl)	78		

であり、血清 AFP 1,483ng/ml と高値を呈していた。ICG (15') 12%と軽度の遅延を認めるも、BSP (45') 5%と正常範囲内であった。

入院後経過：右背部腫瘍については、昭和55年12月25日の骨スキャンにて、右IX肋骨にアイソトープ (RI) の異常集積を認めた (Fig. 1)。昭和56年1月9日の腹部 CT スキャンでは、右IX肋骨に一致した腫瘍と脾に Space occupying lesion (SOL) を認め (Fig. 2)、肝で

Fig. 2 CT scan shows SOL (↑) in the spleen and tumor (↑↑) at the right IXth rib.

は右葉と左葉にまたがる SOL を認めた (Fig. 3)。同年1月14日の腹腔動脈造影では、動脈相で腹部 CT スキャンで認められた部位に一致して肝に動脈-門脈シャントを伴う hypervascular tumor が描出され、門脈相では肝門部門脈本幹に腫瘍塞栓と思われる所見を認めた。以上より、本症例は、右IX肋骨転移および脾転移を伴う HBs 抗原陽性肝細胞癌と診断した。脾転移については、同年2月10日に施行した脾スキャンで、脾の上方と下方に2つの SOL が明瞭に描出され (Fig. 4)、さらに、同年2月12日に施行した腹部超音波検査では、脾の下方の SOL に、脾被膜に接して血腫もしくは腫瘍の壊死巣と

Fig. 3 CT scan shows SOL (↑) extending over bilateral lobes of the liver

Fig. 5 Ultrasonography shows SOL in the spleen. Subcapsular lesion in the SOL is hypoechoic (↑).

Fig. 4 Spleen scan (^{99m}Tc denatured RBC) shows two SOLs in the spleen. (Left lateral view)

Fig. 6 Cut surface of the liver. Nodulous tumors extending over bilateral lobes of the liver and tumor emboli in the portal vein (↑) are seen.

思われる低エコー領域を認めた (Fig. 5).

その後、同年3月1日何ら誘因なく、突然左季肋下部激痛を訴え、ショック状態となり、RBC 274×10^4 , Hb 65%と急激な貧血を認めた。肝細胞癌の腹腔内破裂と考え、1,600mlの輸血と止血剤を投与したところ血圧130/90mmHgと改善し、翌日の腹水穿刺では、ヘマトクリット13.5%の血性腹水が確認された。以後、血圧は安定していたが、同年3月中旬より黒色便を認め、それ

に伴い意識が徐々に低下し、同年3月31日血中アンモニア値 $400 \mu\text{g/dl}$ 以上となり肝性昏睡にて死亡した。

剖検所見: 3,500mlの血性腹水を認め、肝には、Edmondson II型の結節状肝細胞癌が肝両葉にまたがって存在し、非癌部は乙型肝炎硬変であった (Fig. 6, 7)。肝内門脈には腫瘍塞栓を認め (Fig. 7)、肝細胞癌は右IX肋骨・脾・リンパ節 (門脈周囲、旁脾、肺門) に転移していた。脾には、肉眼的に肝細胞癌の転移による2つの突出部位を認め、下方の突出部位には350gの血腫を伴う脾破裂の所見を認めた (Fig. 8)。この脾破裂部位では、前述した脾被膜外の血腫に加えて脾被膜下にも血

Fig. 7 Histology of the liver tumor shows HCC (Edmondson II) (H.E. $\times 100$).

HCC: Hepatocellular carcinoma

Fig. 8 Rupture and protrusion of the spleen secondary to metastatic carcinoma are seen.

Fig. 9 Cut surface of the spleen. Subcapsular hematoma ($\uparrow$) and spleen metastasis are seen.

腫を認め、脾被膜下血腫のさらに内側に壊死巣を伴った肝細胞癌の脾転移を認めた (Fig. 9)。肺には、肉眼的に転移を認めず、光顕的にも検討しえた切片に腫瘍塞栓を認めなかった。その他、胃粘膜は全体的にびらん性変

化を呈し、また胃前庭部に UL-II の潰瘍を認めた。下部食道に静脈瘤を認めるも、静脈瘤の破裂の所見は認めなかった。

考 察

悪性腫瘍の脾転移の頻度は、悪性腫瘍例の2.4~4.0%と少なく^{3,4)}、また、肝細胞癌の脾転移に限ってみても、森の報告⁵⁾では肝細胞癌105例中脾転移例は5例(4.8%)であり、さらに山口の報告⁶⁾では肝細胞癌225例中には脾転移例はみられず、その頻度は少ないといえる。

したがって、悪性腫瘍の脾転移による特発性脾破裂となると、極めて稀れであり、Rydell らの調査²⁾によれば、1978年までに彼らの報告例を加えて4例報告されているにすぎない。その内わけは、膀胱癌1例⁷⁾、胃癌1例⁸⁾、悪性黒色腫1例⁹⁾、肺癌1例¹⁰⁾であり、肝細胞癌による報告例はみられない。

悪性腫瘍の脾転移の経路については、肝細胞癌も含めて一般に血行性のことが多いとされており^{3,4)}、本症例の場合も、肺には検討しえた範囲では転移を認めなかったものの、同じく血行性と考えられる骨転移¹¹⁾を伴っていたことより、脾転移は血行性である可能性が推測される。

悪性腫瘍の脾転移による特発性脾破裂の機序としては、retrospective に、脾転移巣が脾被膜下に血腫を伴う腫瘍の壊死を生じ、その脾被膜下血腫がその後突然破裂することによるものと推測されている²⁾。この点に関しては、本症例においても、剖検所見で脾破裂部位には、脾被膜下血腫を認め、さらにその内側に壊死を伴った肝細胞癌の脾転移巣を認めたことより、従来より推測されていたと同様の機序により脾破裂が生じたものと考えられる。また、本症例では、脾の超音波検査にて、確認された2つの SOL のうち下方の SOL には、脾被膜に接した部位に血腫もしくは腫瘍の壊死巣と思われる低エコー領域を脾破裂前にすでに認めている。したがって、本症例の特発性脾破裂は、prospective にも、腫瘍の壊死により生じた脾被膜下血腫がのちに突然破裂したことによるものと推測される。

ま と め

脾転移による特発性脾破裂をみた肝細胞癌の1例を経験した。肝細胞癌の腹腔内破裂については、原発巣である肝からのものはしばしば経験されるところであるが、本症例の如く脾転移部位からのものは極めて稀れと考え報告した。

本論文の要旨は、第16回日本肝臓病学会西部会（金沢）に於いて発表した。

文 献

- 1) 木本誠二：現代外科学大系 Vol 39. 中山書店，東京．p. 223—226, 1968
- 2) Rydell B William, Ellis Richard: Spontaneous rupture of the spleen from metastatic carcinoma. JAMA 240: 53—54, 1978
- 3) Warren S, Davis AH: Studies on tumor metastasis V. Am J Cancer 21: 517—533, 1934
- 4) Herbut PA, Gabriel FR: Secondary cancer of the spleen. Arch Pathol 33: 917—921, 1942
- 5) 森 亘：へパトームの転移に関する研究—特に肝硬変症との関係について—。日病会誌 45: 224—236, 1956
- 6) 山口龍介：原発性肝癌の病理形態学的研究—肝細胞癌の転移について—。久留米医学会誌 41: 947—970, 1978
- 7) Goldstein HS: Spontaneous rupture of the spleen secondary to metastatic carcinoma. South Med J 59: 261—267, 1966
- 8) Karakousis CP, Elias EG: Spontaneous rupture of spleen in malignancies. Surgery 76: 674—677, 1974

A case of hepatocellular carcinoma associated with spontaneous rupture of the spleen secondary to metastatic carcinoma

Yatsugi NODA, Kenichi FUKUOKA, Hirotoshi MIYAMORI, Nobuyoshi TANAKA,
Yasuhiro KATO, Kenichi KOBAYASHI, Nobu HATTORI*,
Isao NAKANISHI** and Akira KUWASHIMA***

Spontaneous rupture of the spleen secondary to metastatic carcinoma is exceedingly rare. A case of hepatocellular carcinoma (HCC) associated with spontaneous rupture of the spleen secondary to metastatic carcinoma was reported. A 66-year-old man was admitted to our hospital because of right back tumor. On initial laboratory data the level of S-AFP was 1483 ng/ml and HBs-Ag was positive. Various examinations of medical imagings showed HCC with metastasis to the spleen and the right IXth rib. Suddenly he came to the state of hypovolemic shock without antecedent trauma about two months after admission. Later bloody ascites was found by the puncture. Although the state of hypovolemic shock was improved by the blood transfusion of 1600 ml, he died from hepatic failure about a month after that. Autopsy showed HCC with metastasis to the spleen, the right IXth rib and lymphnodes, and rupture of the spleen from metastatic carcinoma.

* The First Department of Internal Medicine, School of Medicine, Kanazawa University (Kanazawa)

** The First Department of Pathology, School of Medicine, Kanazawa University

*** The Department of Nuclear Medicine, School of Medicine, Kanazawa University