腹水治療の実験的研究

杉浦光雄 山崎善弥*

1. は し が き

腹水症に対する、Na 制限、高蛋白、利尿剤、predonisolone, aldosteron antagonist などの使用による最近の内科的治療の進歩にかかわらず、腹水制圧に多くの日数を要するのみならず、やむなく腹水穿刺をくりかえすこととなり、低蛋白症の増悪をまねき、ついには不幸の転帰を取る例も少なくない。

また外科的処置を目的として私たちが扱う門脈圧亢進症患者で腹水を伴うものは、全身状態の悪いものがあり、これらでは手術後の全経過において著しく不良ことが多い。かかる症例に対して術前なるべく速かに腹水を制圧し全身状態を改善させねばならぬ必要に迫られる。

われわれはこのような難治な腹水症治療のため腹水貯留の諸因を考察し、吸水能の著しい高分子物質 carbowax と人工腎臓の組合わせからなる透析濃縮装置の作製や、carbowax 使用透析濃縮腹水の静注治療法などを考案した。

またとくに血行動態異常に伴うリンパ系の代償作用に注目し、その代償機能を増加させるため、補助リンパ循環とも称すべき体外腹腔一頸静脈路を造設し、micromotor pump や carbowax 透析濃縮装置、脱 Na 用イオン交換樹脂などを挿入して McKee 腹水犬を対象として実験を試み、かなり良好な結果を得た。

また腹腔頸静脈圧差利用による一方交通弁つき腹水誘導管を試作し、腹水犬に対し実験検討中で

あるので、これらをここに報告し、2, 3の考察を付することにする。

2. 水血症犬、浮腫、腹水犬に対する carbowax の応用

われわれは、人工肝臓、Reactor 1 および Reactor 2 としてイオン交換樹脂によるアンモニアの除去、あるいは血液 pH 自動調整装置を製作しすでに発表した¹⁻⁴⁾、同様な試みとして著しい吸水能をもつ高分子物質 carbowax に注目し、水血症、浮腫、腹水などの新しい治療を考案し第8回人工内臓研究会で、内科的に抵抗する浮腫、腹水症に役立つこと⁵⁾を報告した。

a) 吸水能をもつ高分子物質の比較

初めに有望と思われる carbowax (6000, 20 M) P. V. P. (polyvinylpyrrolidone), dextran 等の吸水能をセロハン膜を介する希薄血液や腹水の透析濃縮法で比較検討した結果、carbowax ならびに P. V. P. が最も効果的であることを知った。

さらに犬に 1% carbowax 20 cc 溶液を急速静注してもなんら反応がみられず、皮膚科領域で drainage ointment とさえ称して、広範囲湿潤面、熱傷面などに使用されているという無毒で、値段も安いことから carbowax を適当と考え、carbowax 使用による希釈血液および腹水を in vitro, 種々の条件下において透析濃縮を行ない、血漿蛋白、血球数、ヘマトクリット、腹水蛋白が著明に増加し、電解質および電気泳動法による蛋白分画検査では問題とすべき変化を認めなかつた。

b) carbowax 使用体外循環による水血症犬、腹水犬の実験的治療

われわれは脱血後生理的食塩水負荷による水血症犬や、McKee 腹水犬を対象として、生体実験を試み、前者には carbowax 500 g, 後者には 700 g を 20% ブドウ糖 250~300 cc でペースト状にねり、Coil 型人工腎臓のサランの間にサンドウィッチ状に挟んでまいた透析

* M. Sugiura, Z. Yamazaki : 東京大学医学部木本外科。

脱水装置を、大腿動脈短絡路に挿入して、流量毎分 50~80 cc で約 2 時間回転した。

重量測定で水血症犬は 880 g, McKee 腹水犬は 1,000 g の水分吸収を確かめ、体重、腹囲、循環血漿量測定でも、それに相当する減少を認めたが、血漿蛋白は軽度増加、ヘマトクリットは軽度減少で *in vitro* の実験と異なり、生体および体外循環による種々の因子の関連が考えられた。電解質、pH、電気泳動法による蛋白分画、A/G 比測定では、臨床上問題となる変動をもたらさなかつた。

c) carbowax 使用濃縮腹水の静注療法

体外循環は低流量であつても、全身状態の悪い腹水犬にとっては相当の侵襲であることから、腹水犬より無菌的に穿刺排液した腹水約 2~3 l にフィブリン析出防止のため、ヘパリン 10~20 mg を加え、腹水量の約 1/10; carbowax 200~300 g を分割投入した数本の円周 6 cm の cellophan tube (Visking 製) を煮沸消毒 10 分後、腹水容器に浸し 12~18 時間透析濃縮すると、腹水量は 1/2~1/3、すなわち腹水蛋白は 2~3 倍に増加し、電解質はやや増加した濃縮腹水が得られる。さらにイオン交換樹脂を加味して、IR 120-H 型 100 cc と IR 45-OH 型 100 cc から成るイオン交換樹脂筒を 500 cc/hr で流下させた後、carbowax で透析濃縮すると低 Na 濃縮腹水が得られる (図 1)。

これらの濃縮腹水や低 Na 濃縮腹水をそれぞれ採液した腹水犬に 300~800 cc/hr で静注したところ、血漿蛋白量は明らかに増加し、電解質には著変なくその後の観

図 1. 濃縮腹水の作製

察でも全身状態良好となり、数日後のヘマトクリット、血漿蛋白の測定では静注前より改善がみられ、これを契機に腹水貯留の認められなくなつたものもあつた。静注時特記すべき副作用は認められなかつた (図 2)。

図 2. 自家濃縮腹水輸液による腹水犬の循環血漿量・腹囲・体重の変動

3. 血液—リンパ—腹水循環に関する研究

腹水犬や肝硬変症において胸管リンパ流増加の報告⁶⁾がみられ、われわれも腹水とリンパ系の密接な関連に注目し実験検討した。

a) 腹水犬開腹時所見および肝組織所見

腹水犬開腹時肝実質内に Evans blue を注入すると、速かに著明に拡大した肝門リンパ管が染色され、リンパ流は Cysterna chyli に向かうのが観察される。肝組織所見はうつ血肝の所見が主で、中心静脈、類洞、Disse 腔、被膜下リンパ管の高度の拡張と肝細胞索の萎縮を示している。

b) 逆行性胸管撮影と胸管リンパ流量

早朝脂肪食、後に術式に馴れてから普通食摂取後 3~4 時間経過した正常犬あるいは腹水犬の左頸下部皮切、左静脈角露出、胸管を確認する。この際脂肪摂取した犬

の胸管は牛乳様白色で判定しやすい。径 1~2mm の細い polyethylen tube を静脈切開法に従い、胸管に挿入し、胸管撮影、流量測定に供した。

逆行性胸管撮影は第 1 斜位で、挿入した polyethylene tube から urographin 約 10cc を 20 cc の注射器にて手動で毎分 1 cc の速度で注入直後撮影を行なった。腹水犬は正常犬に比し著明な拡大像が認められた。手術時肉眼所見でも胸管拡大は腹水犬で明白で、このためこの手技は腹水犬は正常犬に比しきわめて容易であった。

麻酔を適当に維持して平静な呼吸下 10 分間胸管リンパを採取し、胸管リンパ流測定および諸検査に供した。腹水犬 3 頭平均 3.4 cc/min, 正常犬 3 頭平均 0.45 cc/min であり、腹水犬は正常犬の約 8 倍に及んでいる。

c) RISA 腹腔注入による腹膜吸収能

教室師田⁷⁾の方法により RISA を腹腔内に注入して腹膜の吸収能を正常犬、腹水犬につき比較検討すると、腹水犬は正常犬の 2 倍に及ぶことを認めた。

これは腹水による腹膜拡張による腹膜吸収面積の拡大によるのかもしれないが、これより少なくとも腹水貯留は腹膜の吸収能低下によるものではないと判定できる。

d) RISA 静注による血液—リンパ—腹水間の count 数の変動

RISA 5~10 μ C 血中注入により血液—リンパ—腹水循環動態を検討すると、内臓血管床から漏出した RISA は胸管を経て血中へ再循環されるが、count 数を RISA 静注直後血中単位体積当りの count 数を 100 とし、百分率で表現すると、注入 3 時間後数%以下が腹水犬の腹水中に検出される。これに比し正常犬であらかじめ腹腔中へ強制的に注入された生理的食塩水とブドウ糖 1.5% の混合液を RISA 静注後 3 時間穿刺して得た液体中には、RISA の count 数を検出しえず、正常犬では血中より腹腔中へ漏出することが否定された。

e) 小 括

以上 a)~d) を小括してみると、腹水をもたらしような腹部血行動態異常に伴い、リンパ系循環がその代償作用を発揮するが、血行動態異常が高度になると、リンパなかならず肝リンパ系が代償不全におちいり、腹腔中にリンパ液が漏出して、腹水貯留をもたらしものと考えられる。

腹水犬で、肝臓を胸腔にもたらしと、胸水犬に変るといふことや、腹水犬の胸管リンパ体外誘導が間接的腹水穿刺となるという報告⁹⁾、また、Allen E. D. Dumond らの臨床的胸管リンパ誘導症例における腹水著減の報

告¹⁰⁾、また最近問題になりつつある肝 Microcirculation の研究の報告¹¹⁾などいずれもリンパ系の肝血行動態異常に対する代償作用と、代償しきれぬ肝リンパ漏出、すなわち腹水貯留の考えをうらづけるものと思われる。

また Hollander¹²⁾ らによる Isotope ; RISA, Na²⁴Cl, Na²⁴I, 皮下組織注入による研究で、RISA は主にリンパ管により注入部より除去され、リンパ流はリンパ浮腫の時減少し、心性および他の浮腫では増加するとの提唱は、全身血行動態異常に伴うリンパ系の代償作用、すなわち血流で運びえぬ代謝物をリンパ系により運搬すると考えられまことに興味深い。

さらに Allen E. D. Dumond¹³⁾ らの閉塞性黄疸における過剰血中ビリルビンは肝リンパ→胸管によつてもたらされるという報告や、Razin¹⁴⁾ らによる脾管閉塞による胸管リンパ流増加とリンパアミラーゼ量増加の報告も、それぞれ排泄障害に伴う肝、脾内蓄積物質の運搬にたずさわるリンパ系の重要役割、換言すれば、閉塞に伴う胆汁流、脾液流障害に伴うリンパ系の代償作用であり、今後リンパ系の生理、病理学的解明は大いに医学に貢献することになるであろう。

4. 腹腔—頭静脈短絡による腹水の実験的治療

第 3 章に述べた血行動態異常に伴うリンパ系循環の代償機能を増加させるため、補助リンパ循環回路とも称すべき腹腔—頭静脈短絡路を造設し、McKee 腹水犬を対象として実験を試みた。

a) 体外腹腔—頭静脈短絡の造設

Mandrin 付腹腔穿刺針で腹水犬下腹部において皮下筋層を斜下方に貫くよう穿刺後 mandrin を抜き、その代りに径 2.5 mm の polyethylen tube に 3~4 カ所 side

Micromotor-pump, Carbowax 腹水濃縮装置挿入

図 3. 腹腔→頭静脈体外短絡路造設

hole をあけたものを挿入後外套管を抜き、polyethylen tube は 15 cm 以上ダグラス窩に向け挿入後タニコ縫合で腹壁に固定した。腹水誘導中 fibrin 凝固を防ぐため、20~30 mg の heparin をあらかじめ腹腔内へ注入した。

注入部は外頸静脈枝を使用し、静脈切開、polyethylen tube を挿入した。この2本のポリエチレン管の間を micromotor pump などの装置を挿入しながら、天然ゴム管や、ビニール管で接続した(図3)。

b) 腹腔→頸静脈体外短絡路 micromotor のみ挿入

この短絡路にまず micromotor のみ挿入、腹水犬 No. 14 に 25~30 cc/min の小流量で2時間回転したところ、その間血圧は軽度増加傾向にあつたが、全身状態良好、腹囲は 68.5 cm より 57.8 cm と約 10 cm 減少、Ht は中等度減少、血漿蛋白はわずかに増加し、血漿電解質は問題とすべき変動を認めなかつた。その後平常通りの食事摂取にかかわらず、5日後の測定で血漿蛋白は明らかに増加し、一般状態の改善がみられた。

この後全身浮腫と低蛋白血症の著明な症例で同様に回転したところ心不全におちいり、術後死亡した失敗例がある。このことからわれわれは以後流量を 10~20 cc/min 以下とし、なるべく小流量に micromotor pump を調整したが、後の2例は図示のごとく術直後はヘマトクリット、血漿蛋白の低下がみられても、以後3~7日後には、いずれも全身状態の改善が認められた。

c) 腹腔→頸静脈短絡路, micromotor, carbowax 透析濃縮装置挿入

心および腎障害の加わつた腹水症には、この短絡路に carbowax 透析濃縮装置の挿入が望ましい。2, b) に述べたごとくこの装置を製作したが、小流量のためか、腹水が通過し難く、carbowax の粘調度を下げるため、サランに塗りつける carbowax は dextran 溶液と carbowax 6000 の等量混合物としてこの難点を解決できた。

そこで micromotor pump と carbowax 透析濃縮装置の両者をこの短絡路に挿入回転した結果、ヘマトクリット、血漿蛋白は術前後の比較では変動が少なく、電解質もほぼ一定で、体重、腹囲とも明らかに減少、回転中増加した循環血漿量も術後30分では術前値に近いことを測定しえた。

透析濃縮装置の術前後の重量測定でも 1.3 kg の増加が認められ、腹水犬の操作前後の体重測定による減少とほとんど一致した。

d) 腹腔→頸静脈短絡路, micromotor pump と脱 Na 用イオン交換樹脂筒挿入(図4)

オルガノ研究所長清水博士のご教示に従い、脱 Na 用で、アミノ酸、蛋白の吸着を最小にしているイオン交換樹脂 IR 124-H 型 150 cc と IR 45-OH 型 150 cc との混合から成る脱 Na 用装置を作製、同様の手技で腹水犬を対象として実験を試みた。

図 4.

その結果は Na, K の低下は明らかに認められ、pH はやや低下気味であり、この装置の効果を実証した。

また術直後低下した血漿蛋白、ヘマトクリットも数日後の測定で改善が認められた。4週間後、腹水穿刺を行なつても腹水を採取し難くなつたものもあるが、これに関しては腹水犬の腹壁の側副血行路の発達のよい例もあり、腹水静注の影響のみとはいきれない(図5)。

図 5. 腹腔→頸静脈体外短絡による McKee 腹水犬の血清蛋白・Ht の変化

e) 腹腔—頸静脈圧差利用腹水右心房誘導

さらにわれわれは McKee 腹水犬の大腿静脈圧、腹腔圧、頸静脈圧を測定して、腹腔と頸静脈圧差は水柱数十 mm より百数十 mm に及ぶことを知った。また 3 l 穿刺排除前後の圧変動をみても、腹腔頸静脈圧差は数十 mm に保たれることを認めた。

そこでこの圧差を利用して腹水を徐々に直接右心房へ流入させる導管いわば人工胸管の試作にとりかかった。これは一方交通排出弁を有する天然ゴム管で、脳水腫治療に使われる ventriculoatrial tube の大型化といつてよく、天然ゴム研究所沖倉氏のご努力により、試作第 2 号で in vitro 水圧と流量の実験で、水柱圧 5 cm で 480 cc/hr, 10 cm で 940 cc/hr, 15 cm で 1,280 cc/hr と実用に供しうるものが得られた (図 6)。

図 6. 人工胸管の構造

この弁構造は円柱軸心があり、その周囲を二重の Slit のある弾性ゴム膜がおおつていて、管腔内圧が外圧より高い時は、Slit が開いて排出口となり、逆に外圧が高い時は、Slit が閉じて外部からの流入は防止される。

f) 人工胸管 (A. T.) の体内植込み

かくして得られた人工胸管 (A. T.) を図 7 のごとく、(腹腔→皮下→頸静脈枝→腕頭静脈)

図 7. 人工胸管植込み法

表 1. 人工胸管 (A. T.) の移植症例 (McKee 腹水犬)

症例	術 前		時				術 後 経 過 要 約
	体重 (kg) 腹囲 (cm)	圧 mm 水柱	大腿 静脈	腹腔	頸静脈	人工胸管 の流速 (cc/mm)	Ht (%) PP (g/dl)
1	16.0 62.5	245	175	55	4.4	30 5.4	3 日後—体重 14.5 kg, 腹囲 53 cm, Ht 25%, PP 5.6 g/dl 1 週後—A T 行方不明 4 週後—試験開腹 A T は腹腔により弁機能良好
2	18.0 76.0	315	215	10	2.5	46 4.3	1 週後—体重 16 kg, 腹囲 61 cm, PP 5.4 g/dl 検査時 A T 抜ける。弁機能良好
3	14.5 69.0	235	180	40	10.5	31 4.8	術後麻酔覚醒せず死亡
4	14.0 61.5	245	210	55	6.0	34 4.1	3 日後—体重 15 kg, 腹囲 65.5 cm, Ht 26.5%, PP 0.0 g/dl 8 日後—腹膜炎にて死亡。弁閉鎖
5	21.0 65.5	221	205	10	3.2	47 5.7	1 日後—体重 15 kg, 腹囲 54 cm 9 日後—A T 抜ける。弁機能良好
6	16.0 70.5	175	140	10	7.2	33 6.0	10 日後—体重 13.5 kg, 腹囲 60 cm 16 日後—事故のため死亡 A T 健存。ただし弁閉鎖

右下腹部で 4, a) に記したごとく挿入, 4 カ所 1~1.5 cm の皮膚小切開で、長いペアンを皮下に通じて、A. T. を皮下に植え込み、頸静脈枝より頸静脈を通じて弁つき先端が V. cava. sup. に達するまで挿入した。

その結果は表示のごとくであり (表 1), 医療用天然ゴ

ムは生体反応が少ないため、周囲に組織反応がみられず、皮膚創哆開部より外部へあるいは腹腔中にずれ落ちる傾向がありその防止のため teflon tape をまきつけた第 3 号型を試作し目下植込み実験中であるが、人工物移植に伴う多くの問題を解決しなければならないと思われる。

実際的には臨床例でも、腹水患者は全身状態悪く手術でも禁忌とされる場合も少なくない。そこでわれわれは腹水穿刺と静注手技だけでよい体外型人工胸管を試作検討を行なっている。

5. 総括ならびに考察

われわれの腹水治療の研究は、人工腎臓と吸水性高分子物質 carbowax の治療応用に始まり、以後腹水貯留の諸因を考察し、とくに血液—リンパ—腹水循環の研究により導かれたリンパ系の重要な役割すなわち血行動態異常に伴うリンパ系循環の代償作用に注目し、補助リンパ循環路；腹腔—頸静脈短絡路造設による腹水治療の研究を行なうに至つたものである。

これらの治療方法は要するに腹腔穿刺すなわち腹腔減圧と、自家腹水または自家濃縮腹水、あるいは低 Na 腹水等を徐々に静脈へ注入することであるが、かくして得られた術後諸検査でみられた全身状態の改善は、腹水貯留の悪循環路をいずれかのところで離断するためと考えられる (図 8)。

図 8. 腹腔→頸静脈短絡造設による腹水悪循環の離断

自家および同種腹水の静注法はすでに 1938 年¹⁵⁾, Davis および White らが血液代用物として Shock の治療に用いた報告があるが、われわれは独自の立場から腹水症に自家腹水の利用を考案したのである。期を同じくしてアメリカにおいて、Kolff¹⁷⁾ および Britton らが、彼らの人工腎臓を利用して、腹水を Ultrafiltration-Dialysis により濃縮し、静脈へ注入して、肝硬変症による腹水の急速治療法と題して報告している。彼らによれば、濃縮腹水静注により一過性の Diuresis, Natriuresis がみられたのみならず、9 例中 8 例に腹水貯留がみられなくなつたと報じ、この予想外の効果は、腹水静注を行なわないで低 Na 人血清アルブミンの静注では得られな

かつたものであり、濃縮腹水中のある物質 Enzyme, Hormone 物質の関与を推定し、検索を行なっている。

また Kaiser¹⁸⁾ らは同時期に腹水穿刺と腹水静注法を臨床例に応用し、Natriuresis, Diuresis, 体重減少、腹水減少がみられたとの好成績を発表している。これらの好成績は血漿量の増加が aldosteron, 抗利尿物質の分泌を抑制し、腎血流量の増加が腎機能を亢進し、水電解質代謝異常が是正されると論じている。

腹水静注法は心腎の良好な機能に期待するところ大であることは、われわれの実験もこれを裏書きしている。したがってこの臨床応用の最適応は腹水穿刺を必要とする難治の肝硬変による腹水で心および腎不全の要素の少ないものとなる。心および腎障害が明白であれば、単なる腹水注入でなく、濃縮装置の併用が望まれる。もちろんこれらの療法は根治療法ではなく、腹水貯留をもたらす基礎疾患に直接効果を期待できないが、全身状態の改善や腹水貯留の悪循環離断により、間接的に軽快をみる事が期待される。

また食道静脈瘤出血防止の血管吻合を要する腹水患者などで、術前全身状態の改善や、急速に腹水を制圧したい時、この手技はきわめて有効であろう。われわれはこれらの手技が安全かつ容易に施行され難治な腹水症に役立つよう、さらに病理学的探求による根治療法確立のため今後も努力を続けるつもりである。

6. 結 語

1. 私たちは一昨年吸水能の著しい carbowax と人工腎の組合わせから成る透析脱水装置が難治な腹水症に有効なことを報告した。
2. Carbowax 使用自家透析濃縮腹水、これにイオン交換樹脂を併用した自家低 Na 濃縮腹水を腹水犬に静注して著効があつた。
3. 腹水犬、肝硬変症に胸管リンパ流増加の報告がみられ、われわれもこれをうらづける結果を得た。これらは血行動態異常に伴うリンパ系の代償作用と考えられた。
4. この代償能増加のため補助リンパ循環路腹腔—頸静脈短絡路造設, micromotor pump や, carbowax 透析濃縮装置, 脱 Na 用イオン交換樹脂筒を挿入。腹水犬を対象として実験を試み、それぞれ効果のあることを実証した。

また腹腔頸静脈圧差利用腹水右心房導入一方交通弁つき天然ゴム管いわば人工胸管を試作実験検討している。

5. 以上の実験で効果のみられたのは、腹水貯留の悪循

環の離断するためと考えられ、難治な腹水症治療のため私たちは今後とも努力を続けるつもりである。

終りにのぞみ、終始ご懇篤なご指導とご校閲を賜った恩師木本誠二教授に深く感謝を捧げます。

また人工胸管試作につきましてはなみなみなならぬご努力を尽くされ、ご協力下さいました天然ゴム研究所沖倉元治氏およびイオン交換樹脂に関し種々ご教示ご協力下さいました日本オルガノ商会オルガノ研究所長清水博氏に心からお礼申し上げます。

また協同研究者としてお教えとご協力をいただいた教室各位に深く感謝いたします。

文 献

- 1) 木本誠二, 杉浦光雄, 坂本啓介, 久保 忠, 永井 元, 角田昭夫, 亀山 容, 阿部秀一, 鈴木 茂, 堀 原一, 三浦健, 小島靖, 小倉正久: 日消会誌, **55**: 581~582, 1958.
- 2) 杉浦光雄, 堀 原一, 三浦健, 小島靖: 外科研究の進歩, **9**: 231~271, 1958. 3) 堀 原一: 総合医学, **18**: 187~189, 1961. 4) 杉浦光雄, 堀 原一, 山崎善弥, 三浦健, 小島 靖, 豊島範夫: 総合医学, **17**: 465~469, 1960. 5) 山崎善弥: 総合医学, **19**: 176, 1962.
- 6) Dumond, A. E. & Mulholland, J. H.: New-Eng. J. Med., **263**: 471~474, 1960. 7) 師田昇: 東医会誌, **67**: 600~630, 1959. 8) 土井淳愛, 池田誠之, 新井豊久, 水谷 雄, 横山泰久, 安藤不二彦, 鈴木不二雄, 六尾勝美, 今村立五, 平野 始, 大輪次郎, 石黒満雄, 山本貞博: 日消会誌, **59**: 105~106, 1962. 9) Freeman, S.: M. Clin. North America., 109~124, 1953. 10) Dumond, A. E. D. & Mulholland, J. H.: Ann. of Surg., **156**: 668~677, 1962. 11) 加藤咲一, 土屋雅春: 第 27 回日本循環器学会, 1963 年 4 月 3 日報告. 12) Hollander, W., Reilly, P. & Burrows, B. A.: J. Clin. Invest., **40**: 222~233, 1961. 13) Dumond, A. E., Doubilet, H., Witle, C. L. & Mulholland, J. H.: Ann. Surg., **153**: 774~780, 1961. 14) Razin, E., Feldman, M. G. & Dreiling, D. A.: J. S. R., **11**: 320~331, 1962. 15) Davis, H. A. & Blalock, J. F. Jr.: J. Clin. Invest., **18**: 219~224, 1939. 16) Molina, R. D., Santos, H. A. & Alimurung, M. M.: Am. J. M. Sc., **213**: 435~440, 1947. 17) Britton, R. C.: Arch. Surg., **83**: 364~369, 1961. 18) Kaiser, G. C., Lempke, R. E., King, R. D. & King, H.: Arch. Surg., **85**: 763~771, 1962. 19) Patek, A. J. Jr., Mankin, H., Colcher, H., Lowell, A. & Earle O. P. Jr.: J. Clin. Invest., **27**: 135~144, 1958. 20) Cain, J. C., Grindlay, J. H., Bollman, J. L., Flock, E. V. & Mann, F. C.: S. G. O., **85**: 558~563, 1947. 21) Bagenstoss, A. H. & James, C. C.: New Eng. J. Med., **256**: 531~535, 1957. 22) Gordon, M. E.: Am. J. Gastroenterology, **33**: 15~37, 1960. 23) 城後昭彦: 日消会誌, **56**: 1~12, 1959. 24) 吉利和, 前田貞亮: 日本臨床, **17**: 1121~1127, 1959. 25) Yoffey, J. M. & Courtice, F. C.: Lymphatics, lymph and lymphoid tissue. Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 1956. 26) Kohn, J.: Nature, **183**: 1055, 1959. 27) Calmon, C. & Kressmann, T. R. E.: Ion Exchangers in Organic and Biochemistry Interscience Publ., Inc. 1957. 28) 清水博: イオン交換樹脂, 共立出版, 1953.

*

*

*