practical use in dental clinic. In result, we confirm that there is not an obstacle to utilize NEVA METER in general dental clinic.

P-14. 当科における2000～2001年の新来患者の臨床統計学的観察

○国領 真也・嶋村 知記・岩永賢二郎・廣田百合子・富永 和宏・福田 仁一
九歯大・口外1

九州歯科大学附属病院第1口腔外科の地域的な役割, 患者の動向, 疾患内容の実態を把握することを目的に2000～2001年における新来患者の初診時のデータをもとに観察を行った。

観察対象は, 2000年1月1日から2001年12月31日までに当科を受診した新来患者で, 2000年は2,643名, 2001年は2,307名, 計4,950名であった。

観察は, 月別, 年齢, 性, 紹介経路, 臨床診断名にて行った。

新来患者は, 春期・夏期休暇にあたる月に多く, 年齢では, 20歳代が, 最も多く次いで10歳代であった。市外・県外と様々な地域から来院し, 他医療機関からの紹介患者が67.3%を占め, 当科が2次医療機関として機能しているものと思われた。新来患者は疾患別では, 歯の疾患が最も多く, 45.0%を占めており, 次いで顎関節疾患, 炎症性疾患と続いた。

Clinical statistical study of new patients at our clinic from 2000 to 2001

Shinya Kokuryo, Tomoki Shimamura, Kenjiro Iwanaga, Yuriko Hirota, Kazuhiro Tominaga, Jinichi Fukuda (First Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kyushu Dental College)

Clinical statistical studies were performed on new 4950 patients who visited the First Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kyushu Dental College Hospital, from January 1, 2000 to December 31, 2001.

Observations were performed and documented according to month, age, sex, route of referral and clinical diagnosis.

March had the highest number of new patients. There were many woman representing all age groups. For clinical diagnosis, there were noted tooth related disease (45.0%), inflammation (10.2%) TMJ disease (11.6%), a cyst (5.2%), malformation and transformation (4.4%), an injury (3.6%), salivary gland disease (3.2%), benign tumor (3.0%), disease of mucosa (2.7%), disease of nerve (1.4%) and malignant tumor (1.2%) of the patients.