intraoral gothic arch tracer and then a bite record of centric relation and three of eccentric records such as protrusion, right and left laterotrusions were taken.

This method is very useful because it is easy hand skill for dentists and is able to make a chair time and a visiting frequency of patients short.

5. 九州歯科大学附属病院第1義歯科における高齢患者の動向 — 2年間の調査報告

○尾座本まゆみ・楨原 絵理・鱒見 進一・有田 正博・松木 貴彦・中村 恵子
九歯大・補綴1

近年、高齢化社会への関心が高くなっている。そこで我々は高齢患者の受診が多い第1義歯科の新患を対象に調査を行っている。2002年4月から2003年3月までの受診患者については、第63回九州歯科学会総会で発表した。今回も同様に、2003年4月から2004年3月までに当科を新患として受診した患者を対象に、追調査を行った。対象患者数は389名で、そのうち65歳以上の高齢患者は146名で、全体数の37.8%であった。2002年度(36.1%)と比較すると、高齢患者の占める率がわずかに増加していた。これらの患者について、各々の地域、全身疾患の有無や種類、紹介元、当科での処置内容などについて詳細に調査を行った。

Survey of the elder patients in The First Department of Prosthetic Dentistry –A report of two years
Mayumi Ozamoto, Eri Makihara, Shin-ichi Masumi, Masahiro Arita, Takahiko Matsuki and Keiko Nakamura (First Department of Prosthetic Dentistry, Kyushu Dental College)

We have been surveying the new out-patients who visited our clinic in Kyushu Dental College Hospital and we reported the results about the elderly patients who visited from April, 2002 to March, 2003. We also surveyed from April, 2003 to March, 2004. A total of 389 patients participated in this study. The elderly patients over 65 years old were 146 (37.8%) and we discussed about their detail such as residential area, systemic disease and treatment in our clinic.

6. 予後を考慮した可撤性補綴物 — PRP システム—の分類

呉 文元¹・鱒見 進一¹・三宅 茂樹²
¹九歯大・補綴1, ²広島市

我々は1987年より conical telescope を利用した可撤性補綴物の臨床を開始し、数多くの症例に応用してきた。症例を重ねていくうちに、オーバーデンチャーやパーシャルデンチャーのみならず、本来固定性補綴物の適用であるブリッジやクラウンに対してもその可能性を試みてきた。これらの長期予後について検討した結果、固定性補綴物よりも優れた点が多く認められたため、我々は conical telescope をベースとしたこれら一連の補綴物に対し、Preventive Removable Prosthesis (PRP) システムという名称を付け、さらにこれらの分類を試みた。今回は、PRP システムの分類を紹介するとともに、代表的な症例について報告する。

Classification of preventive removable prosthesis (PRP) system

Wen-Yuen¹, Shin-ichi Masumi¹ and Shigeki Miyake² (¹First Department of Prosthetic Dentistry, Kyushu Dental College and ²Hiroshima City)

We started clinical application of removable prosthesis with conical telescope in 1987. Since then, we have been applying not only over denture and partial denture cases but also bridge and crown cases. We evaluated their longitudinal prognosis and found that these prosthesis had lots of advantages compared with conventional fixed crown and bridges. Therefore, we named these prosthesis series as preventive removable prosthesis (PRP) and tried to classify this system. In this report, we introduce the classification of our PRP system and representative cases.