P-8. 基幹病院としての在り方に関する調査・研究 — 一般臨床歯科医師が九州歯科大学附属病院に求めるもの —

○中村 修一・河野 博之・松延 彰友・久保田浩三・富永 和宏・庄野 庸雄
牧 憲司・椎葉 俊司・小野堅太郎・岡部 幸子・森本 泰宏

九歯大・同窓会

近隣施設の医療従事者が本大学附属病院に抱く希望や問題点、更に本学附属病院に対するニーズを把握すること、近隣の開業歯科医（本学同窓生）322人を対象にアンケート調査を行った。回収されたアンケート用紙は128枚であった。対象者の89%は1年間に1度は学術講演会に出席されていた。一方、本学教官が講師を務めたものはその半数であった。対象者の95%は1年間に対応困難な難症例に遭遇していた。その疾患の多数は口腔外科関連疾患であった。難症例を紹介する病院として本学附属病院が67%と多く、その理由は技術の信頼と先生と懇意関係であるが多数を示した。基幹病院としての意義を明確化するには、口腔外科を中心とした各診療科の充実と学術貢献を通じたパーソナルコミュニケーションの確立が重要である。

Significance of Kyushu Dental College Hospital as the key hospital among neighborhood dental offices

Shuichi Nakamura, Hiroyuki Kawano, Akitomo Matsunobu, Kouzo Kubota, Kazuhiro Tominaga, Yasuo Shono, Kenji Maki, Shunji Shiba, Kentaro Ono, Sachiko Okabe and Yasuhiro Morimoto (Dousoukai, Kyushu Dental College)

The purpose of this study was to elucidate the significance and problems of Kyushu Dental College Hospital as a key hospital for neighborhood dental offices. We sent out questionnaires to 322 dentists in neighboring dental offices. Within 2 weeks, we received the questionnaires by mail, and analyzed them. A total of 128 questionnaires were returned (response rate, 40%). Of the respondents, 89% had attended dental-related lectures within the previous year. A total of 95% of respondents took on at least one patient a year for whom they could not carry out the care alone. The majority of these patients received care related to oral surgery, and 67% of these patients were transported to Kyushu Dental College Hospital. The major reason for choosing Kyushu Dental College Hospital was that the dentists working there had good skills and also had personal communication with the referring dentists. Systematic improvement and skill preparedness in all departments, and in particular, oral surgery, and establishment of personal communication between our hospital's dentists and dentists in neighborhood dental offices should lead to success for our hospital and for neighborhood dental offices.

P-9. 歯肉退縮における審美的遊離移植術の効果

○牧野 正敬・田代 芳之・久保田浩三・横田 誠

九歯大・保存2

本研究の目的は、歯肉退縮における結合組織移植術が審美性の回復にどれほど有用性があるか、また歯肉退縮の評価法の問題点などを検討することである。過去九州歯科大学附属病院歯周病科を受診し歯肉退縮と診断され結合組織移植術を行なった11症例についてMillerによる分類別に、術前と術後のアタッチメントレベルの変化をもとに歯肉退縮の回復について検討した。その結果、Millerの分類Class IがClass IIより歯肉退縮の改善率が悪く、その理由として露出根面の幅、曲率、隣接歯肉や歯槽骨の頬舌的厚さなどの条件が悪かったことが考えられた。ひいては垂直的因子を重視したMillerの分類では、術後の結果を表しきれないことが示唆された。

Effect of aesthetic free gingival graft on gingival recession

Masahiro Makino, Yoshiyuki Tashiro, Kohzoh Kubota and Makoto Yokota (Department of Periodontology and Endodontology, Kyushu Dental College)

We examined connective tissue graft on gingival recession and examining the problem of the appraisal method of gingival recession. According to the classification of Miller, 11 cases were diagnosed as gingival recession, and the connective tissue graft was performed, and recovery of gingival recession was considered based on attachment level. As a result, class I showed worse in the rate of