ハブ蛇毒中に含まれる耐熱性毒性物質について

小此木 丘・星 昭二・本間 学・須藤謙三郎・飯塚久義・佐藤 信

群馬大学医学部第1病理学教室 (主任 川合貞郎 教授)

緒 論

ハブ毒蛇咬傷の局所病変は、激しい出血を伴う急性の筋壊死である^{1,2,3,4)}。この原因について、吾々は従来、ハブ毒中に含まれる易熱性の蛋白分解酵素の毒作用が、その一因であろうと考えて、実験的にもその病理像を明らかにしてきたが^{5,6)}、ハブ毒中には、その他にも耐熱性の毒性物質があって、これがやはり局所病変、特に筋融解を起す重要な一因子であることを実験的に確認することができた。

ハブ粗毒の病変と異って、加熱ハブ毒の局所病変は、出血が全く認められないため、それによる激しい筋壊死も、組織学的検索によつてのみ証明し得たものである。

実験Ⅰ マウス大腿筋肉内注射による加熱ハブ毒及びハブ粗毒の局所病変の比較について

実験材料及び実験方法

実験動物は、体重18~20gの雑系マウス。

ハブ毒は、奄美大島名瀬市ハブ研究所にて1960,7. *Trimeresurus flavoviridis* より採毒、凍結乾燥にて保存せるものを、実験前、各使用乾燥量につき0.1mlの生理的食塩水に溶解して用いた。加熱ハブ毒は、夫々の生食水稀釈溶液ごとに、100℃で10分間加熱したものである。

毒の注射部位は、マウスの左側大腿筋肉内で、各経過時間後において、エーテル麻酔で屠殺、肉眼所見を観察した後、10倍フォルマリン液固定、パラフィン切片、ヘマトキシリン・エオジン染色によつて、出血及び筋融解の有無を検索した。実験Ⅰのaでは、3時間後の病変につき、実験Ⅰのbは、参考のため、耐熱性物質の致死作用を検索した。

実験成績

a. 粗毒及び加熱ハブ毒注射3時間後のマウス局所病変の比較について。

粗毒及び加熱ハブ毒病変の最も大きな差異は、注射局所の出血の有無である。

図表1 粗毒及び加熱ハブ毒マウス大腿筋肉内注射3時間後の局所病変の比較 冊~+筋融解 ●出血

	160r	80r	40r	20r	10r	5r	2.5r	1.2r
粗 毒	冊●	冊●	冊●	冊●	+	+	+	+
加熱毒	冊	冊	冊	+	+	+	+	+

図表1に示したように、粗毒注射各例は、注射3時間後既に肉眼的に明らかな出血があり、160r~40r迄は、注射側大腿の大半にわたつて、水腫—出血により、暗赤色を呈する。20r以下では、大豆大以下に出血部は限局している。

これに反して、加熱ハブ毒各例は、40r以上の注射例で、水腫性の腫脹が目立つのみで、全例に出血は全く認められない。組織学的にも出血は殆んど見られない。しかしながら、筋融解は40r以上の注射例では極めて著明で、注射部位に広汎な筋線維の断裂及び融解壊死が認められる。間質は一般に水腫性であるが、好中球等の細胞反応は殆んど認められない。組織学的筋融解像は、注射量に応じて減少するが、5r迄認められた。

粗毒注射各例は、組織学的にも出血は明らかで、2.5r注射例までに見られる。出血以外、筋融解壊死の存在は、加熱毒と平行して、5r迄明らかであった。

b. 粗毒及び加熱ハブ毒筋肉内注射によるマウスの致死について。

図表Ⅱに示すように、マウスの大腿筋肉内注射による加熱ハブ毒の致死作用は極めて弱い。対照ハブ粗毒は、500r乾燥量注射5例が、1時間40分から4時間までに、すべてが、激しい局所病変を示しながら斃死したが、加熱ハブ毒注

射例は、500 γ 、1mg、2mg迄の実験例で、すべて全例とも、1週間以上生存した。

図表2 ハブ粗毒及び加熱ハブ毒マウス
大腿筋肉内注射による致死作用
の比較 ●死亡 ○生存

No. 1	粗 毒	500 γ	●	1時間40分
2	〃		●	2時間20分
3	〃		●	3時間
4	〃		●	3時間
5	〃		●	4時間
6	加熱毒	500 γ	○	1週以上
7	〃		○	〃
8	〃		○	〃
9	〃		○	〃
10	〃		○	〃
11	加熱毒	1 mg	○	〃
12	〃		○	〃
13	〃		○	〃
14	加熱毒	2 mg	○	〃
15	〃		○	〃
16	〃		○	〃

実験Ⅱ 加熱ハブ毒のモルモット大腿筋肉内注射による局所病変の時間的逐移について。

実験材料及び実験方法

使用した実験動物は体重300g前後の雄性モルモット。ハブ毒は、実験Ⅰで用いたものを、1mg乾燥量/0.1ml生食水の割合で溶解し、100°C10分間加熱後、沈澱を除去してその上清を、モルモット大腿筋肉内に注射。30分、60分、3時間、6時間、12時間、24時間、30時間、36時間、2日、3日、5日、7日後に夫々延髄穿刺で屠殺。毒注射部位を剔出、10倍フォルマリン及びLevi氏液で固定、パラフィン切片又は凍結切片によってヘマトキシリン・エオジン染色、マロリー染色、ハイデンハイン鉄ヘマトキシリン染色、P.A.S.反応、SudanⅢ染色等を行なった。猶一部の例では、石川氏法によるコハク酸脱水素酵素の証明を行なった。

実験成績

30分～60分後の局所病変：肉眼的には、軽度の水腫が認められるのみで、出血はない。組

織学的には、ヘマトキシリン・エオジン染色では、筋線維の疎開があり、間質の小血管周囲に浮腫が著明である(写真1)。

筋線維の核は、この時期には正常で、筋原線維の走行の乱れは殆んどない。Levi氏液固定のハイデンハイン鉄ヘマトキシリン染色によると、横紋筋線維のI帯部の巾の拡大と、Q帯部の狭少化があって、横紋はむしろ明瞭に見える。筋原線維におけるミトコンドリアは、可染性を減じて淡染膨化し、筋原線維間に一列にならんでいる。この時期では、脂肪滴は殆んど見られないが、SudanⅢ染色では、筋線維は一般に、やや橙黄色調を呈する。コハク酸脱水素酵素反応は、1時間例ですでに陰性である。出血は全く認められない。

3時間、6時間～12時間後の局所病変：肉眼的には水腫と腫脹が明らかである。大腿筋注射部位は乳白色調を示し、筋線維束も溷濁している。軟化は軽度、出血はない。組織学的には、3時間例で既に筋線維の融解壊死が明らかで、病変の中心部では、筋線維は大小の断片に断裂又は融解、核は消失、横紋も認められない(写真3)。病変の比較的軽いものでは、線維内の筋原線維が疎となり、すだれ様のすきまを生じて、線維全体の膨化を伴っている。

筋線維内における脂肪滴は、3時間例ではまだ中等大顆粒状にそろって、筋原線維の走行に一致して配列するものが見られるが(写真2)、病変の著しい部では、大小の脂肪滴が雑然と出現して、筋原線維も全く破壊されている。かかる変化は6～12時間ではより広汎かつ高度である。

間質の水腫は極めて著明。断裂した筋線維の間には、エオジンで淡染した絮状微細顆粒状の蛋白性物質を伴うところもある。6時間例からは、これに好中球の広範囲にわたる滲出が伴われて、12時間例では特に著しく、蚕喰状に破壊された筋線維をとりまいて集合する部も見られた(写真4)。

病変部では、筋線維のミトコンドリアは全く

消失, コハク酸脱水素酵素も全く認められない。

24時間～30時間後の局所病変：筋線維の融解断裂は高度で、その形態はくずれて、大小の塊に崩壊している。間質には好中球の瀰漫性の滲出が目立つ。間質にはなお水腫が著明であるが12時間例より濃縮してエオジンの染色性は増加している。

24時間例まで、変性筋には大小の脂肪滴が見られたが、30時間例以降、筋線維脂肪化は認められない。

36時間、48時間、72時間、5日、7日までの局所病変：36時間～48時間後までは、まだ無反応の筋壊死巣が残っている。変性筋線維間の好中球は、30時間に比して激減して(写真5,6)、内外筋鞘に集っている。間質の毛細管には、内皮細胞の活性化があり、その周辺では、線維芽細胞が増殖してくるが、特に48時間例では、断裂した個々の筋線維間にもこのようにして増殖した細胞の侵入が目立っている。

72時間例では、変性壊死に陥入った筋線維のところどころに、石灰の沈着が起り、また変性筋をとりかこんだ線維芽細胞の増殖はいよいよ明らかである。

5日後には、線維芽細胞の広汎な増殖に加えて、変性筋周囲に組織球及び異物巨細胞がとりまいて、筋変性物質は縮小し(写真7)、7日後では変性筋は殆んどが消失、広くおきかえられた線維化巣内に異物巨細胞だけが、とり残されている(写真8)。

線維化巣に接する筋線維の核には、著しい腫

図表Ⅱ 加熱ハブ毒モルモット大腿筋肉内注射による局所病変の時間的逐移

	筋融解	水腫	好中球	線維芽細胞
30分～60分	—	卅	—	—
3時～12時	卅～卅	卅	＋～卅	—
24時～30時	卅	卅○	卅	—
36時～72時	卅	＋～—	＋～—	＋～卅
5日～7日	—	—	—	卅R

〔註〕 ○水腫の濃縮 R異物巨細胞

大又は増加が見られる部もあった。

以上記載した病変の逐移を表示すると、図表Ⅲの通りである。

実験Ⅲ 抗ハブ血清及び二、三の薬剤による加熱毒作用の中和について

実験材料及び実験方法

実験動物は体重15～18gの雑系マウス。

使用したハブ毒は、実験Ⅰ及びⅡと同様のもの。この1mgから32γに至る倍量希釈液(0.1ml生食水溶液)の加熱100°C10分に対し、血清又は薬剤溶液0.1mlを、室温で1時間、試験管内で中和、マウス大腿筋肉内に注射した。マウスは、24時間後エーテル麻酔で屠殺、大腿部筋層を横断面全般にわたり組織標本にて検索、筋融解の広さ程度を観察した。

抗ハブ血清は、東京大学伝染病研究所、試験製造室の精製乾燥血清 Lot.7で供与された沢井芳男主任に感謝する。

使用前、15mlの蒸留水で溶解、さらに等量の生食水で希釈したものの夫々0.1mlを用いた。原液の0.1mlの抗致死及び抗壊死価は、0.1ml対毒300γ中和である⁷⁾。

薬剤として使用したものは：Disodium Monocalcium Ethylenediamine Tetraacetate (E.D.T.A.-Ca 2mg/0.1ml生食水、第一化学)、α-Thiolactoylglycine-Na(α-Thiola, 参天製薬、0.1mg/0.1ml生食水) Co-carboxylase (Metabolase, 武田薬品、0.5mg/0.1ml生食水)である。これ等の薬剤は、ハブ毒の解毒作用の強いもので、用いた薬用量は、粗毒100γによる出血性病変を試験管内で中和する量である。

実験成績

対照の無処置加熱ハブ毒注射例24時間後の所見は、1mg及び500γ注射例で、明らかに腫脹とともに注射部位に白色濁濁が肉眼的にも認められた(図表Ⅲ)。250γ例以下、32γ例に至る迄、すべて組織学的に広汎な筋融解がある。大腿筋横断面における病変部は、筋束の1/2以上に及んでいる(図表Ⅲ)(写真9)。

抗ハブ血清の効果は極めて明らかで、250γ以下の加熱毒の筋融解作用は、殆んど完全に試験管内で中和された(図表一)。

500r例でも、病変部は、外筋鞘に接する筋束外側の1/3以下の範囲で、筋変性も不規則な断裂を示すのみ、高度な融解壊死は免れている。(図表十)(写真13, 14)。

Ca-EDTA 2mgは、32rの加熱毒作用を完全に中和、125r, 62rの例の病変を軽減した(写真10)。

α -Thiola 100rは32rの組毒病変を軽減したが(写真11)、62r以上の例では、殆んど無効であった。

Metabolase 500rは、125r, 62r迄の病変を強く抑制し、32r例では殆んど完全に病変を中和した(写真12)。

図表Ⅳ 血清及び2～3の薬剤による加熱ハブ毒作用の抑制

	1mg	500r	250r	125r	62r	32r
加熱ハブ毒無処置	卅	卅	卅	卅	卅	卅
抗血清 2倍稀釈 0.1ml	卅	+	—	—	—	—
Ca-EDTA 2mg	卅	卅	卅	+	+	—
α -Thiola 100r	卅	卅	卅	卅	卅	±
Metabolase 500r	卅	卅	卅	+	+	—

- 卅 肉眼的に病変が明瞭
- 卅 組織学的に病変著明
- +
-

総括並びに考察

多くの蛇毒の成分の中に、耐熱性の酵素が含まれることは古くから知られている。しかしこれが、注射局所に筋融解を起すことについては、従来全く記載されていなかった。吾々もまた、現在迄、共同研究者とともに、ハブ毒中に含まれる有害物質についての、生物学的、病理学的の意義を検討して来たにも拘らず、加熱ハブ毒が、このような局所病変を示すことについて、気がついたのは、本実験が始めてであった。加熱ハブ毒は、その注射局所に於いて、殆んど肉眼的に著変を示さず、また、その致死作用が極めて弱かったために、局所病変についての組織学的検討が等閑視されたわけである。

実験Ⅰに示したように、加熱ハブ毒のマウス筋融解作用は、組毒5r乾燥量内においてもなお

認められ、組毒の最小筋融解量とはほぼ一致していた。

しかしながら、一方、実験Ⅱでは、1mg乾燥量の加熱毒による筋融解は、組毒に比して遙かに遅延して起り、治癒も早く、病巣の広がり及び強さも組毒ほどの激烈さを欠いている。加熱毒注射後、30分～60分、筋線維の融解に先行して、ミトコンドリアの消失があり、3時間後に始めて、明瞭な筋融解が現われる。組毒注射では、既に従来記載したように²⁾、1mg乾燥量では、同様の時間内では、既に完全な局所の出血壊死が進行して、組織学的的、筋線維挫滅は、極めて激しく、それまでの病変の逐移を想像することは困難である。この量の組毒病変は、12～24時間後では一層高度で、皮下の出血水腫は下腹部に迄及び、局所は暗赤色、泥状軟化悪臭を発するのが常である。

従って、加熱ハブ毒作用は、組毒の極めて微量中にも毒作用を残すとはいえ、大量の加熱毒の病変は、組毒に比して遙かに軽いものと言わねばならない。

加熱ハブ毒中には、局所病変として出血等を惹起する易熱性の物質(蛋白分解酵素、出血因子等^{5,6,8,9)})を欠いていることはいうまでもない。従って、様々な毒作用の綜合作用と比して、単独な物質の病変が弱いことは想像に難くない。

ハブ毒中に含まれる耐熱性の毒性物質の一つとしては、Phospholipase Aが考えられる。前野、三橋等¹⁰⁾は、加熱ハブ毒を硫酸分画、CMセルローズによるカラムクロマトグラフィー、デンブンを支持体とする分域電気泳動法によって、卵黄レシチン添加、ウサギ血球の溶血を示標としたPhospholipase Aを精製した。吾々もまた、この材料が、溶血活性の強さと比例して、微量でマウス筋注による筋融解を起すことを確認した¹⁰⁾。ゆえにハブ毒中のPhospholipase Aも、局所筋融解の一因と言いうると思われる。Phospholipase Aの筋線維ミトコンドリアに対する傷害が、筋融解に先行して、病変の進

行を促すことは充分に考えられることである。ただし、粗毒病変中の役割については、更に慎重に検討中である。化学的に分画された物質の毒作用を考慮する場合には、常に、粗毒に於ける含有量、他の物質との共同作用、病変のおこり方、等々粗毒病変の激しさと比較しながら研究されねばならない。粗毒病変を対照とする場合にも、咬傷時における生の毒より、更に稀釈された蛋白濃度を用いていることも注意すべきであろう。(生の毒は1ml当り約300mg乾燥量で、従って生毒0.1mlは30mg乾燥量に当る)。

次に実験Ⅲで示されたように、加熱毒に対する抗ハブ血清の試験管内中和力は極めて満足すべきものと考えられる。またハブ毒中に含まれる蛋白分解酵素に対し、解毒作用をもつ^{11,12,13)} E.D.T.A-Ca塩もまた、実験条件下では加熱毒作用を抑制する。粗毒に対する優れた中和作用をもつ Co-carboxylase も期待通りの成績を示した。SH化合物の一つである α -Thiola は、粗毒の出血作用に対する試験管内中和量では、加熱毒病変を中和し得ず、更に大量が必要であると思われる。これ等の薬剤については、薬用量の範囲内で、毒との中和量、薬剤の毒性等を顧慮しながら、その効果は更に検討中であり、詳細は別報に譲る¹⁴⁾。しかし、これ等薬剤と加熱毒の結合から、「構造の知られた化学物質との中和作用」を示標として、ハブ毒の毒作用検索の一つの手がかりが得られるかも知れない。吾々は予想もしなかった薬剤例えば Vit. B₁ や¹⁵⁾ Co-carboxylase が、ハブ毒と親和性が強いことに驚いている。

結 論

1) ハブ毒中には、100°Cで10分間加熱してもなお、局所に筋融解を起す物質が含まれている。

2) 加熱ハブ毒をモルモットの筋肉内に注射すると、筋融解に先行して、ミトコンドリアの消失が起る。

3) 粗毒病変に比して、出血を伴わぬ点の特

徴的である。筋融解も粗毒に比して遙かに時間的におくれておこり、治癒は早い。また致死作用は極めて弱い。

4) 加熱毒の毒作用は、抗ハブ血清で中和され、E.D.T.A-Ca溶液、Co-carboxylase, α -Thiolactoylglycine-Na等で抑制される。

文 献

- 1) 山口和夫：北関東医学，8：145，1958。
- 2) Okonogi, T., S. Hoshi, M. Homma, K. Sasamoto, K. Aoki, S. Mitsuhashi, H. Maeno and Y. Sawai : Jap. J. Microb., 2: 499, 1959.
- 3) Okonogi, T., S. Hoshi, M. Homma and H. Iizuka : Gunma J. Med. Sci., 10: 48, 1961.
- 4) Kawaji, K. : Acta Path. Jap., 8: 681, 1958, (Supple.)
- 5) Maeno, H., M. Morimura, S. Mitsuhashi, Y. Sawai and T. Okonogi : Jap. J. Microb., 3: 277, 1959.
- 6) Okonogi, T., S. Hoshi, M. Homma, S. Mitsuhashi, H. Maeno and Y. Sawai : Jap. J. Microb., 4: 189, 1960.
- 7) 牧野正顕：日新医学，47：120，1960。
- 8) 前野弘夫，三橋進：日本熱帯医学会九州支部大会，1962。
- 9) Ohsaka, H., H. Ikezawa, H. Kondo, S. Kondo and N. Uchida : British J. Exper. Path., 16: 478, 1960.
- 10) 前野弘夫，三橋進，小此木丘，星昭二，本間学：第14回日本細菌学会関東支部例会，1961。
- 11) 大原三男：北関東医学，9：179，1959。
- 12) Sawai, Y., M. Makino, S. Miyasaki, Y. Kawamura, S. Mitsuhashi and T. Okonogi : Jap. J. Exp. Med., 31: 267, 1961.
- 13) Maeno, H., S. Mitsuhashi, Y. Sawai and T. Okonogi : Jap. J. Microb., 3: 131, 1959.
- 14) 小此木丘，星昭二，本間学，須藤謙三郎：第35回日本細菌学会総会，1962。
- 15) 小此木丘，星昭二，本間学，須藤謙三郎，北関東医学，11：397，1961。

LOCAL PATHOLOGICAL CHANGES FOLLOWING INJECTION
OF HEAT-STABLE SUBSTANCES IN THE HABU-SNAKE
(TRIMERESURUS FLAVOVIRIDIS) VENOM

Takashi Okonogi, Shoji Hoshi, Manabu Homma, Kenzaburo Suto,
Hisayoshi Iizuka and Makoto Sato

The 1st Department of Pathology, School of Medicine,
Gunma University, Maebashi

An injection of Habu-snake venom, heated for 10 minutes at 100°C., caused myolysis at the site, histologically. But different from crude venom action, no hemorrhagic changes were recognized. At first, disappearance of mitochondria in the muscular fibers was seen, and then muscular splitting and lysis followed.

While the myolytic changes caused by crude venom began immediately after the injection, the beginning of the changes were delayed when the heated material were used.

Anti-Habu-serum neutralised the toxicity of the heated venom, and also, E.D.T.A.-Ca, Co-carboxylase and α -Thiolactoylglicine-Na repressed the toxicity in vitro.

- 写真1. 加熱ハブ毒1mg筋肉内注射1時間後の局所病変(モルモット)。間質の水腫による筋線維の疎開。但し筋壊死はない。H.-E.染色。
- 写真2. 加熱ハブ毒1mg筋肉内注射3時間後の局所病変(モルモット)。ミトコンドリアは消失, 筋原線維間の脂肪滴出現。Levi氏液固定, Heidenhein鉄ヘマトキシリン染色。
- 写真3. 加熱ハブ毒1mg筋肉内注射3時間後の局所病変(モルモット)。筋線維内の水腫による筋原線維の疎開及び筋線維の新裂融解。H.-E.染色。
- 写真4. 加熱ハブ毒1mg筋肉内注射2時間後の局所病変(モルモット)。激しい筋線維の融解壊死と, 間質の好中球浸潤。H.-E.染色。

- 写真5. 加熱ハブ毒1mg筋肉内注射36時間後の局所病変(モルモット). 筋線維の融解壊死は猶残っているが, 間質の好中球滲出が減少し所々に線維芽細胞が増殖しはじめている. H.-E.染色.
- 写真6. 同上. 強拡大. 間質の線維芽細胞の増殖. H.-E.染色.
- 写真7. 加熱ハブ毒1mg筋肉内注射5日後の局所病変(モルモット). 壊死に陥入った筋線維には石灰の沈着があり, これに接して組織球性細胞の増殖がある. 間質の線維化は極めて著明. H.-E.染色.
- 写真8. 加熱ハブ毒1mg筋肉内注射7日後の局所病変(モルモット). 線維化の著しい組織内に, 筋線維の壊死性物質を貪喰した多核巨細胞が残っている. H.-E.染色.

- 写真9. 加熱ハブ毒64r 筋肉内注射24時間後の局所病変(マウス). 激しい筋融解と好中球の滲出及び水腫. H.-E.染色.
- 写真10. 加熱ハブ毒125r+E.D.T.A. 2mg試験管内中和例. 筋肉内注射24時間後の局所病変(マウス). 筋壊死は, 外筋鞘に接する小部分に止まる. H.-E.染色.
- 写真11. 加熱ハブ毒32r+ α -Thiola 100r試験管内中和例. 筋肉内注射24時間後の局所病変(マウス). 筋壊死の範囲は狭い. H.E.染色.
- 写真12. 加熱ハブ毒32r+Metabolase 500r 試験管内中和例. 筋肉内注射24時間後の局所病変(マウス). 筋融解は殆んどない. 外筋鞘の一部に細胞浸潤あるのみ. H.-E.染色.
- 写真13. 加熱ハブ毒500r+抗血清0.1ml試験管内中和例. 筋肉内注射24時間後の局所病変(マウス). 一部に筋変性が見られるが, 壊死の像は軽度. H.-E.染色.
- 写真14. 同上. 強拡大. 変性筋線維も原形を窺いうるものが多い. H.-E.染色.