酢酸フェニル水銀の体内分布と排泄 に関する実験的研究

小川栄一, 鈴木史郎, 都築 博*, 川尻睦子*, 鬼頭寛和

群馬大学医学部薬理学教室

(主任: 柴田勝博 教授)

*群馬大学医学部アイソトープ研究室

(主任: 小川栄一 助教授)

(昭和48年10月5日受付)

緒 言

酢酸フェニル水銀は、広く産業界に使用されてきた水銀化合物である。紙パルプ工業で大量使用された¹⁾こともあり、農薬として、種子の消毒や稲のイモチ病の防除に莫大な量が使用され²⁾、また医薬品³⁾として、抗真菌剤、殺精子剤などに応用されてきた。しかしながらその毒性は、Cotter⁴⁾の主として実験室勤務者の中毒症例の報告や太田原ら⁵⁾の農業製造作業者の中毒事故などで知られ、特に農作物への散布は、多くの急性、慢性中毒を惹起し社会問題となり、現在では中止されている。しかもなお農業中毒は世界的に発生し、フェニル水銀による中毒の報告⁶⁾もみられる。

酢酸フェニル水銀は、アルキル水銀のように脳内移行が少ないため、中枢神経系の傷害は問題にならないものと考えられてきたが、実験的に水銀中毒解毒剤とされるBALを併用すると脳内移行が増大するという報告⁷⁾は、条件によっては中枢神経系への傷害も起こりうることを示している。また Ramel⁹⁾¹⁰⁾のタマネギの根の有糸細胞分裂に対する影響の実験では、アルキル水銀と同程度のC-mitosis作用があることが証明されている。このことは、残留農薬の遺伝的影響など、今後の研究課題として残されている問題である。

われわれは、各種水銀化合物の生体内動態を追究し、薬物によるその体外排除について系統的研究^{11)~13)}を続けてきた。今回は、酢酸フェニル水銀について放射性水銀標識化合物 (²⁰³Hg-PMA) をトレーサーとする実験を行なった。

実験方法

実験動物には成熟雄性 ddN 系マウスを用い、一匹づつ代謝籠に入れ、オリエンタル固型飼料と水道水で飼育した。²⁰³Hg-PAM のトレーサー量をマウスの皮下、腹腔内または経口的に投与し、直後から1日1回経目的に、全身放射能を測定し、また毎日の排泄物の放射能を測定した。経時的に動物を殺し、各臓器内の放射能も測定した。全身および排泄物の放射能測定には、whole-body animal counter を用い、諸臓器内の放射能測定には Well 型シンチレーションカウンターを使用した。その他の実験条件については、成績のところ記す。

実験成績

1. 体内貯留: ²⁰³Hg-PMA 1 μ Ci/0.1ml を皮下、腹腔内および経口投与した各群のマウスの全身放射能

図 1

を経日的に3日間測定した。体内放射能貯留減衰曲線は、図1に示す如く、24時間値では、皮下>腹腔>経口投与の順であるが、2、3日後では、皮下、腹腔投与の間に差はなく、経口投与群がこれらよりやや少ない。このことは、経口投与により吸収がかなり良いことを示しているものと思う。

2. 排泄：図2に示す如く、腹腔内投与24時間は、尿中ふん中ほぼ同量であるが、その後ふん中に多く排泄される。経口投与の場合は、いずれもふん中に多く

図 2

排泄される。

3. 体内分布：腹腔内投与後1時間ですでに腎に一番多く集まり、4時間が最高である。1時間値では、以下脾、血液、肝、脾、脳の順で、24時間以降は、腎>肝>その他の順になる（図3）。

図 3

細胞下分布：Schneider¹⁴⁾の方法により細胞下の分布をしらべた。腹腔内投与後24時間における腎および肝の細胞下分布を図4に示す。いずれも、上清分画に多い。

図 4

Table 1. Effects of various compounds on whole-body retention of ²⁰³Hg-PMA

Compounds	Dosis	No. of mice	whole-body retention			
			1	2	3	(Days)
Control		25	(58.2%)	(39.3%)	(28.3%)	
			100	100	100	
BAL	1 mg x 3, s.c.	5	109	85*	67*	
GSH	10 mg x 3, s.c.	5	101	96	97	
L-Cy SH.Gly	5 mg x 3, s.c.	5	115	118*	127*	
L-Cy SH	5 mg x 3, s.c.	5	108	110	113	
DL-Pen.	1 mg x 3, s.c.	5	99	99	101	
2-MPG	5 mg x 3, s.c.	5	99	95	90	
MAA	3 mg x 3, s.c.	5	106	113	120	
EDTA	1 mg x 3, s.c.	5	123*	129*	136*	
Rongalite	1 mg x 3, s.c.	5	100	102	103	
Furosemide	1 mg x 3, s.c.	5	111	112	113	
ZnSO ₄	0.5 mg x 3, s.c.	5	102	117	129*	

* : P < 0.05

Table 2. Effects of various compounds on the distribution of ²⁰³Hg-PMA

Compounds tested	Dosis	No. of mice	Distribution of ²⁰³ Hg-PMA					
			Kidney	Liver	Pancreas	Spleen	Brain	Blood
Control		25	(15.1)	(4.6)	(1.2)	(0.78)	(0.16)	(0.37)
			100	100	100	100	100	100
BAL	1 mg x 3, s.c.	5	32*	78	44*	56*	476*	48*
GSH	10 mg x 3, s.c.	5	114	101	106	78	83	102
L-Cy SH.Gly	5 mg x 3, s.c.	5	156*	114	130*	94	105	91
L-Cy SH	5 mg x 3, s.c.	5	109	110	94	72	82	92
DL-Pen.	1 mg x 3, s.c.	5	98	122	67	78	76	88
2-MPG	5 mg x 3, s.c.	5	73	113	54*	65*	80	78
MAA	3 mg x 3, s.c.	5	99	125	107	91	193*	121
EDTA	1 mg x 3, s.c.	5	132*	154*	105	113	136*	122
Rongalite	1 mg x 3, s.c.	5	127	85	126	108	90	122
Furosemide	1 mg x 3, s.c.	5	106	87	134*	119	118	128
ZnSO ₄	0.5 mg x 3, s.c.	5	136*	112	128	79	80	72

() : 72-hour value after ²⁰³Hg-PMA i.p. administration, %/g.

* : P < 0.05

4. 薬物投与の影響： ^{203}Hg -PMA $1\ \mu\text{Ci}/0.1\text{ml}$, 腹腔内または経口的に投与し、直後から1日1回3日間各種薬物を投与した場合の、経日的体内貯留の変化、ならびに3日後の体内分布は、表1～4に示す如くである。いずれの実験でも、 ^{203}Hg 体内貯留減少をきたした薬物は BAL のみである。L-CySH・Gly, EDTA, ZnSO_4 では逆に貯留増加をきたした。腹腔内投与の場合、BAL 投与により、腎、肝、脾、脾、血液中の放射能は有意に減少したが、脳では逆に有意の増加を示した。2-Mercapto-propionyl glycine (2-MPG) では、脾および脾の放射能が減少した。

L-CySH・Gly 投与で脾が、Mercaptoacetic acid では脳が、EDTA では腎、肝、脳が、Furosemide では脾が、また ZnSO_4 では腎が、それぞれ放射能の有意な増加がみられた。経口投与の実験では、BAL 投与により腎、肝、脾、脾、血液の放射能は減少したが、脳のそれは逆に増加した。2-MPG では、腎の放射能が有意に減少した。

5. 絶食の影響：図5に示す如く、 ^{203}Hg -PMA を腹腔内投与後24時間絶食すると、ふん中の放射能は減少し、体内貯留増加をきたすが、食飼を与えると、正常近くに漸次恢復する。

Table 3. Effects of SH compounds on whole-body retention of ^{203}Hg -PMA

Compounds	No. of mice	Whole-body retention			
		1	2	3	(Days)
Control	5	(52.7%) 100	(34.2%) 100	(23.7%) 100	
BAL 1 mg x 3, s.c.	5	106	73*	41*	
2-MPG 5 mg x 3, s.c.	5	95	93	97	
GSH 10 mg x 3, s.c.	5	95	92	94	

* : $P < 0.05$

^{203}Hg -PMA was given orally.

Table 4. Effects of SH compounds on the distribution of ^{203}Hg -PMA

Compounds tested	No. of mice	Distribution of ^{203}Hg -PMA					
		Kidney	Liver	Pancreas	Spleen	Brain	Blood
Control	5	(13.7) 100	(5.2) 100	(0.49) 100	(0.62) 100	(0.17) 100	(0.32) 100
BAL 1 mg x 3, s.c.	5	32*	71*	74*	67*	338*	53*
2-MPG 5 mg x 3, s.c.	5	59*	117	129	105	115	94
GSH 10 mg x 3, s.c.	5	98	91	123	111	111	110

() : 72-hour value after ^{203}Hg -PMA p.o. administration, %/g.

* : $P < 0.05$

図 5

考 察

水銀化合物の生体内分布、排泄は、無機水銀、有機水銀（アリル水銀、アルキル水銀など）の化合物のちがいにより、それぞれ異なることが知られている^{15)~17)}。²⁰³Hg-PMA の吸収を既報^{11)~13), 18) 19)} の他の水銀化合物のそれと比較すると、塩化メチル水銀とエチル水銀が一番吸収がよく、昇汞、フェニル水銀がそれについで。体内貯留では、メチル水銀が一番長く体内に貯留し、ついでエチル水銀、さらに昇汞、フェニル水銀の順であり、水銀利尿剤はもっとも早く排泄された。体内分布では、一般にアルキル水銀は血液、肝に長く蓄積されるとされているが、われわれの実験^{11) 12)} では、ラットとマウスでその分布が異なり、ラットでは一般に知られている様に血液中に長くとどまるが、マウスでは、腎に始めから多く分布することがわかった。フェニル水銀は、マウスで、始めから腎に多く集まり、無機水銀のパターンと似ている。

細胞下の分布について、丹羽口ら²⁰⁾ は、ラットで²⁰³Hg-PMA 経口投与後24~96時間の肝、腎の分布をしらべ、いずれも上清分画に多いことを報告している。われわれのマウスにおける腹腔内投与後24時間の成績でも、肝、腎ともに上清に多く分布することを知った。なおこの成績は、²⁰³HgCl₂ で行なった実験成績とほぼ同様であった。

フェニル水銀の排泄については多くの報告があり、その主経路は、ふん中と尿中で、一般にはふん中に多く排泄されるとされている。われわれの成績も同様であった。

フェニル水銀化合物の中毒の治療または薬物による体外排除の研究について、いくつかの報告がある。石

井²¹⁾ はマウスについて ²⁰³Hg-PMA の排除実験で、Lipoic acid, Dihydrolipoic acid および BAL に排泄増加作用のあることを報告している。緒方ら²²⁾ は無機水銀および有機水銀（主としてフェニル水銀）取扱作業者について、2-MPG と D-Penicillamine が水銀の尿中排泄増加を示したと報告している。後藤ら²³⁾ はフェニル水銀投与ラットの発育阻害をメチオニン添加食が軽減することを報告している。また Swensson ら²⁴⁾ はラットの急性フェニル水銀中毒で、BAL が著明な延命効果があり、Rongalite, thiocetic acid も有効であると述べ、なおいずれも脳内水銀量の増加を指摘している。前にも述べた如く、Berlin ら^{7) 8)} は、マウスで、BAL 投与により脳内水銀量の増加することを報告し、フェニル水銀中毒の治療に、BAL は禁忌であると述べている。

われわれの実験でも ²⁰³Hg-PMA の体外排除を促進させるものは、BAL のみであるが、この場合、脳内水銀濃度の増加がみられるので、完全にフェニル水銀を排除する薬物はみつかっていない。今後の研究が望まれる。

²⁰³Hg-PMA を投与後24時間絶食すると、²⁰³Hg のふん中への排泄は抑制され、体内貯留をきたし、食餌を与えると正常に近づく。このことは、他の水銀化合物¹³⁾ ばかりでなく多くの金属^{25) 26)} について、一般にみられる現象である。

総 括

成熟雄性 ddM 系マウスに ²⁰³Hg-PMA のトレーサー量を投与し、各種実験条件下の体内貯留、排泄および体内分布をしらべた結果を得た。

(1) 体内貯留：²⁰³Hg-PMA 皮下、腹腔内、および経口投与した場合の体内貯留は、24 時間値では、皮下>腹腔内>経口投与の順であるが、2、3 日後では、皮下、腹腔内投与の間に差はなく、経口投与の場合が、これらよりやや少ない。

(2) 排泄：腹腔内投与24時間後、尿中およびふん中ほぼ同程度であるが、以後ふん中に多くなる。経口投与の場合は、いずれもふん中に多く排泄される。

(3) 体内分布：腹腔内投与1時間で、すでに腎に一番多く集まり、4時間が最高である。1時間値では、

以下脾, 血液, 肝, 脾, 脳の順であるが, 24時間以降は腎>肝>その他の順になる。細胞下分布: 腹腔内投与24時間における腎および肝の細胞下分布は, いずれも上清分画に多い。

(4) 薬物投与の影響: ^{203}Mg -PMA を腹腔内または経口的に投与し, 直後から1日1回3日間各種薬物を投与した場合, ^{203}Hg 体内貯留減少をきたした薬物は, BAL のみである。EDTA, L-CySH・Gly, ZnSO_4 投与群は逆に貯留増加をきたした。腹腔内投与実験で, BAL 投与により, 腎, 肝, 脾, 脾, 血液中の ^{203}Hg 濃度は有意に減少したが, 脳では逆に有意の増加を示した。2-MPG 投与では, 脾および脾の ^{203}Hg 濃度が減少した。L-CySH・Gly 投与で脾, EDTA で腎, 肝および脳, Mercaptoacetic acid で腎, Furosemide で脾, また ZnSO_4 で腎の, それぞれ ^{203}Hg 濃度が有意に増加した。経口投与実験では, BAL により, 腎, 肝, 脾, 脾, 血液の ^{203}Hg 濃度が減少したが, 脳のそれは逆に増加した。2-MPG では, 腎の ^{203}Hg 濃度が有意に減少した。

(5) 絶食の影響: ^{203}Hg -PMA 腹腔内投与後24時間絶食すると, ふん中の排泄が減少し, 体内貯留が増加するが, 食餌を与えると, 正常近くに回復した。

文 献

- Johnels, A. G., Westermark, T., Berg, W., Persson, P. I. and Sjöstrand, B.: *Acta Oecol. Scand.*, 18: 323, 1967
- 福永一夫: 科学35: 668, 1965.
- 浮田忠之進: 科学36: 254, 1966.
- Cotter, L. H.: *Occup. Med.*, 4: 305, 1947
- 太田原一祥, 緒方正名, 井上武夫, 菅原澄, 岡崎雅治, 齒染尾正幸, 小林喬二, 三島四郎, 佐藤和人, 横山衛, 進藤貞義, 人見硬: 岡山医学会誌70: 4089, 1958.
- Haq, I. U.: *Br. Med. J.*, 1: 1579, 1963
- Berlin, M. and Ullberg, S.: *Arch. Environ. Health*, 6: 602, 1963.
- Berlin, M. and Rylander, R.: *J. P. E. T.*, 146: 236, 1964
- Ramel, C.: *Hereditas*, 57: 445, 1967
- Ramel, C.: *Hereditas*, 61: 208, 1969
- 小川栄一, 鈴木史郎, 都築博, 戸部満寿夫, 小林和雄, 北条正躬: 災害医学15: 222, 1972.
- 小川栄一, 鈴木史郎, 都築博, 戸部満寿夫, 小林和雄, 北条正躬: 災害医学15: 371, 1972.
- 小川栄一, 鈴木史郎, 都築博, 川尻睦子, 鬼頭寛和: 北関東医学23: 55, 1973.
- Schneider, W.C.: in *Biochemist's Handbook* (Ed. c. Long), P. 810, E & F. N. Spon, London, 1961.
- 鈴木継美, 深山智代, 勝沼晴雄: 日新医学, 48: 716, 1961.
- 浦久保五郎, 城戸靖雅, 長谷川明: 衛生化学, 13: 290, 1967.
- 武田寧: 衛生化学, 14: 177, 1968.
- 小川栄一, 鈴木史郎, 都築博, 川尻睦子: 日薬理誌69: 271p, 1973.
- 小川栄一, 鈴木史郎, 星昭二: 日薬理誌, 58: 96 §, 1962.
- 丹羽口徹吉, 大塚信子: 科学警察研報告, 21: 265, 1968.
- 石井俊文: 産業医学1: 162, 1959.
- 緒方正名, 江口嘉之助, 木南富吉, 太田康幸: 岡山医学会誌, 80: 297, 1968.
- 後藤たへ, 藤野正子: 栄養と食糧, 22: 73, 1969.
- Swensson, A. and Ulfvarson, U.: *Int. Arch. f. Gewerbepathol. u. Gewerbehyg.*, 24: 12, 1967
- 小川栄一, 鈴木史郎, 町田純一, 福田龍三, 林浩, 堀川謹三: 北関東医学, 9: 1104, 1959.
- 柴田勝博, 小川栄一, 花岡功, 戸部満寿夫, 鈴木史郎, 林浩, 戸部龍夫, 平原明, 武者清: 第3回日本アイソトープ会議報文集, 日本原子力産業会議, p. 836, 1960.

STUDIES ON THE DISTRIBUTION AND EXCRETION OF PHENYLMERCURY ACETATE

EIICHI OGAWA, SHIRO SUZUKI, HIROSHI TSUZUKI*,
MUTSUKO KAWAJIRI* AND HIROKAZU KITO

Department of Pharmacology, School of Medicine,
Gunma University, Maebashi, Japan
(Director: Prof. K. Shibata)

Radioisotope Laboratory, School of Medicine,
Gunma University, Maebashi, Japan
(Director: assoc. Prof. E. Ogawa)

^{203}Hg -phenylmercury acetate (^{203}Hg -PMA) was given to mice, and its retention, excretion and distribution were investigated. Furthermore various drugs were examined for ^{203}Hg -expelling effect.

1. Retention: the retention after the s.c., i.p. and p.o. administration were daily explored. The biological half-life was short, about 1 – 2 days in all cases.

2. Excretion: The daily excretion was usually high in feces and low in urine.

3. Distribution: The radioactivity after i.p. administration was highest in the kidney already at 1 hour, and attained the peak at 4 hours. At 1 hour, next in order were the pancreas, blood, liver, spleen, brain successively. At 24 hours, the liver exceeded pancreas.

The subcellular distribution of ^{203}Hg -PMA in the liver and kidney 24 hours after i.p. administration was greater in the supernatant fraction in both organs than the other fractions.

4. Effects of administration of various drugs: In 3 day experiments on the whole-body retention of ^{203}Hg -PMA was decreased by BAL only. L-CySH·Gly., EDTA, ZnSO_4 were often found to increase ^{203}Hg retention. BAL decreased ^{203}Hg activity among the kidney, liver, pancreas, spleen, blood, but it significantly increase only the cerebral concentration of ^{203}Hg . 2-Mercaptopropionyl glycine decreased ^{203}Hg concentration in the pancreas and spleen in the experiment after i.p. administration of ^{203}Hg -PMA, and in the kidney in experiment after oral administration of ^{203}Hg -PMA.

5. Effect of starvation: The fecal excretion of ^{203}Hg was decreased and the retention of it was increased by the starvation, and they were recovered by feeding.