悪性腫瘍治療における放射線療法の寄与

2. 手術との併用療法

新 部 英 男, 伊 藤 潤, 早 川 和 重
中 野 隆 史, 杉 山 紀 夫, 山 中 巳喜男
野 崎 美和子, 杉 浦 正 名, 高 橋 満 弘
須 藤 久 男, 池 田 一, 岡 崎 篤
前 原 康 延, 高 橋 育, 永 井 輝 夫

群馬大学医学部放射線医学教室 (主任: 永井輝夫教授)

(昭和59年2月29日 受付)

I はじめに

手術療法に放射線療法を組合せた治療法は、両治療法の時間的關係から術前照射、術中照射、術後照射の3療法に大別でき、それぞれに照射の目的は異にしている¹⁾²⁾。さらに、手術療法と放射線療法の部位的關係から異部位、同部位とに区別でき、これもまた目的を異にする。ともに局所療法である手術療法と放射線療法を組合せる治療を行う利点は、第1には、確実性は高いが治療範囲が制限される手術療法の欠点を、確実性においては劣っても治療範囲の十分にとれる放射線療法が補うことにある。第2には、照射による細胞障害が確率的に生ずるために、腫瘤が大きくなると放射線療法のみでは根治性が低下するので、腫瘤の減量を手術的に図ることにある。第3には、放射線療法を施行する際に問題となる正常組織障害を軽減するために、経皮的外部照射に含まれる臓器、組織を照射野から外して十分な線量が腫瘍組織に与えられるように手術を施行することである。これらのほかにも利点はあげうるが、いたずらに2つの治療法を組合せることは、明らかに侵襲の加算を生じ利益どころか損失にすら連なることがある。

ここに、群馬大学病院放射線科で手術と併用されて放射線療法が施行された代表的疾患の治療成績を提示するとともに、手術との併用療法の問題点について言及する。

II 研究対象および調査方法

研究対象とした疾患は、乳癌、睾丸腫瘍、脳腫瘍(神経膠芽腫)、軟部腫瘍、食道癌とした。

1 乳癌術後照射 昭和46年1月から56年12月までの間に術後照射を施行した199症例について昭和58年6月に予後調査を施行した。

照射法は⁶⁰Co γ 線遠隔治療装置を用いて、旁胸骨、鎖骨上、下窩リンパ節に対して3 Gy 週3回総計51 Gy 照射を原則とした。

2 睾丸腫瘍術後照射 昭和41年1月から56年10月までの間に術後照射を施行した89症例について昭和56年10月に予後調査を施行した。照射法はライナック10 MV X線を用いて、精上皮腫症例には患側骨盤、後腹膜リンパ節に対して36~40 Gy、さらに、一部の症例については縦隔、鎖骨上リンパ節に対して30 Gy 照射を行った。精上皮腫以外の腫瘍には横隔膜以下のリンパ節に50 Gy を目標に照射した。

3 神経膠芽腫術後照射 昭和44年1月から56年12月の間に、可及的に腫瘍を摘除後に、全脳あるいは腫瘍部に対して術後照射を施行した61症例について、昭和58年6月に追跡調査を施行した。照射線量は40~60 Gy と時期によって差異があった。最近では全脳に2 Gy づつ20回照射後、腫瘍部に対して5 Gy づつ4ないし6回の追加照射を施行している。なお5 Gy 照射群には前橋赤十字病院の症例を含め16症例であった。

4 軟部腫瘍の照射 昭和36年から57年10月ま

での間に術後照射32症例, 開創照射4症例を含み照射療法を施行した68症例について, 照射の初期効果ならびに予後について昭和58年2月に調査を施行した。照射線量, 分割法は組織型, 腫瘤の大きさなどによって異なるので TDF (Time, Dose, Fractionation Factor) で表示した。治療装置は, 昭和44年までの症例は ^{60}Co γ 線遠隔治療装置であったが, それ以後はライナック電子線が主として用いられた。

5 食道癌の照射 昭和34年1月から昭和56年12月までに手術と併用して放射線療法が施行された83症例について昭和58年2月に追跡調査を施行した。手術, 照射併用療法の内訳は, 術前照射52, 術後照射11, 術前・術後照射20症例であった。照射法は, 昭和44年までの症例は主として ^{60}Co γ 線で逆Y字3門照射で1回線量3 Gy づつ総線量70 Gy が多かった。昭和45年以降はライナック10 MV X線で前後対向2門で2 Gy づつ総線量60~70 Gy の照射であった。なお一部症例には偏心軸5門照射³⁾を行った。

III 結 果

1 乳癌術後照射

乳癌患者を術後に照射するかどうかは主として外科医の判断によるので, 外科施設での症例選択の有無によって治療成績は異なることになる。全症例の5年累積生存率は60%であったが, 図1に示すごとく, 症例選択の有無で明らかな差異が認められた。これは両群間の病期に差異のあることを示唆するものであった。そこで, 術前の TNM 分類にしたがった病期分類別の累積生存率をみたのが図2である。5年生存率はI・II期では共に70%台であったが,

図1 乳癌術後照射成績 (群大放1971.1.~1981.12)

図2 乳癌の病期別術後放射線治療成績

図3 n因子別の乳癌術後照射成績
(群大放1971.1~1981.12)

III期45%, IV期0%であった。I期とII期の成績が逆転しているのは注目すべきことであった。これも外科医による症例選択の影響と考えられたので, 術後のリンパ節転移 (n 因子) の程度による生存率を比較したのが図3である。n が大きくなるにつれて5年累積生存率が低下するのがわかった。

2 睾丸腫瘍術後照射

睾丸腫瘍の予後は, 組織型によって最も大きく影響される。純粋精上皮腫とその他の胚芽細胞腫とにわけて累積生存率をみたのが図4である。純粋精上皮腫の59例は胃潰瘍からの出血で死亡した1例を除き全例が生きている。これに対して非精上皮腫の5年累積生存率は36%にすぎなかった。

3 神経膠芽腫の術後照射

神経膠芽腫は可能な限り手術的に腫瘍摘除を施行してから, 照射をしているにもかかわらず, 従来からの単純分割照射法での長期生存例はほとんど得られなかった。これに対して, 1回5 Gy づつの大線量

図4 睾丸腫瘍の放射線治療成績

図5 神経膠芽腫の放射線治療成績

による追加照射を試みた TDF 90以上の症例では3年生存ではあるが32%になった(図5)。

4 軟部腫瘍の照射効果

軟部腫瘍は、種々の組織型から成る総称名であり組織型によって照射効果に差異があるので、組織型別の予後を示したのが表1である。腫瘍死した症例の大部分は照射後1～2年に生じていた。

分割照射法別・組織型別に初期の照射効果をみたのが表2である。脂肪肉腫ならびに横紋筋肉腫の照射効果は良好であった。また、開創照射や大小線量組合せ照射は、症例を厳選していることもあって、良好な成績であった。

照射後の局所再発には、照射野内と照射野に隣接する部位に生ずる場合とがあるが、これを、放射線

図6 食道癌の手術と放射線併用療法の成績

表1 軟部腫瘍：予後

組 織 型	0年～	1年～	2年～	3年～	4年～	5年～ (不明)
脂 肪 肉 腫	●●○○	●●●●	○○ ○			●○○○
悪性線維性組織球腫	●●●●	●	○○ ○			
横 紋 筋 肉 腫	●●●●	●●	○			●○ (2)
線 維 肉 腫	●●		●○			○○○○
血 管 肉 腫	●●●					○○ (1)
悪性神経鞘腫	●		●○			○
平 滑 筋 肉 腫		●	●			○○
滑 膜 肉 腫						●○
そ の 他		●●		●		

●腫瘍死 ○生存

表2 軟部腫瘍：初期照射効果

組 織 型	単純分割照射				開創 照射	大小線 量組合 せ照射
	TDF					
	<49	50~79	80~115	115<		
脂 肪 肉 腫	○	○○	○○○○○			
横 紋 筋 肉 腫	○○	○○○○	○○○○○			
線 維 肉 腫		●	●●		○○	
悪性線維性組織球腫		●	●○○○○	○	⊗	
血 管 肉 腫			●○○			
悪性神経鞘腫					○	⊗○
平 滑 筋 肉 腫			●			
滑 膜 肉 腫		○				
そ の 他	○	○	●○○			○

照射効果：○良好 ●不良 ⊗不明 (再発・転移を含む)

表3 局所再発(1)——照射野内再発——

組 織 型	放射線単独				術 後 照 射			
	TDF				TDF			
	<49	50~79	80~115	115~	<49	50~79	80~115	115<
脂 肪 肉 腫	○	○	○○○○○			○○	○○○○○	
横 紋 筋 肉 腫	○○	●○○○	○○○○○				○○○	
線 維 肉 腫					○		○	
悪性線維性組織球腫			○○○○	○			○○○○	
血 管 肉 腫			●○			●○○	○○	
悪性神経鞘腫							●	
平 滑 筋 肉 腫					○		●○	
滑 膜 肉 腫								
そ の 他	○	○	●○○				●○○	

○再発なし ●再発あり

単独群と術後照射群とにわけて比較したのが, 表3, 4である。照射野内への再発は組織型を問わず少ないことがわかった。また, 放射線単独群と術後照射群との間には大きな差異はなかった。

5 食道癌の手術放射線併用療法

食道癌の根治手術可能な範囲は, 腫瘍径の長さが10 cm 以下が1つの条件とされている。そこで, 腫瘍径の長さを5 cm 以下と5.1 cm 以上10 cm 以下の2群にわけて, 累積生存率を比較した。その結果は図6に示すごとくで, 5年生存率は14%と20%で差異は認められなかった。また5年相対生存率でも

全体で20%にとどまった。

IV 総括ならびに考察

手術療法と放射線療法を併用することは, 腫瘍組織を根絶させる可能性を高めるが, 正常組織への侵襲も加算されるので必ずしも利益になるとは限らない。侵襲を単独療法と同程度に抑えるためには, 手術も放射線療法も控え目にする必要がある。この代表的な組合せ療法が, 乳癌と睪丸腫瘍の治療である。すなわち, 原発巣は手術を主体とし, 所属リンパ節は放射線療法が分担するものである。手術

表4 局所再発(2)——照射野隣接部再発——

組 織 型	放射線単独				術 後 照 射			
	TDF				TDF			
	<49	50~79	80~115	115~	<49	50~80	80~115	115<
脂 肪 肉 腫	○	○	●●○○○		●○	●●○○○		
横 紋 筋 肉 腫	○○	●○○○	●○○○			●○○		
線 維 肉 腫					○	○		
悪性線維性組織球腫			●○○○	○		○○○○		
血 管 肉 腫			○○		○○○	●○		
悪性神経鞘腫						○		
平 滑 筋 肉 腫					○	○○		
滑 膜 肉 腫								
そ の 他	○	○	○○○			●○○		

○再発なし ●再発あり

療法と放射線療法が同部位を治療する場合には、侵襲の加算ばかりでなく、手術が先行すると腫瘍組織内の血流が不良となり、酸素効果で照射効果が30%まで低下することがある⁴⁾。逆に照射が先行すると、急性の組織反応のために手術を困難にすることがある⁵⁾⁶⁾。このため術後照射の場合には、血流を阻害しないで腫瘍容積を減量するよう配慮し、術前照射の場合には、照射後の組織反応が手術の妨げとならぬように線量と照射から手術までの期間を適正に決めることが必要となる。この点、術中照射⁷⁾は症例の適応を決めることが難かしいが、併用による損失を比較的軽くすることができる。

以下、疾患別の併用療法の問題点と放射線療法の価値について、個々の疾患について検討することにする。

1 乳 癌

乳癌の術後照射は、放射線療法の中で最も頻度の高い治療法として古くから施行されてきたが、最近の10年は急激な減少傾向を示している⁸⁾。この理由は第1に、術後照射を施行しても局所の再発率は低下するが、遠隔転移の頻度さらには予後には影響がなく、むしろ、不良となるとするものである。第2の理由として、乳癌は腺癌であっても放射線感受性は高く⁹⁾、容易に腫瘍を根絶できること¹⁰⁾から、局所再発をみながら照射療法を施行してもよいとするものである。術後照射群で予後が不良とする報告は少なからずあるが、その理由として照射による免疫能

の低下をあげている。われわれの経験では、照射効果が優れ一般状態も良好な症例の免疫能は増進することはあっても低下することはなく、照射効果が不良で一般状態の悪化した症例の免疫能は低下しているのが常であり、狭い範囲の局所照射が全身的な免疫能を低下させる可能性は極めて低いものと考えている¹¹⁾。また新部らは¹²⁾、実験的にも部分的照射では、獲得した抗腫瘍効果が失われないことを実証している。しかし、術後照射群の予後が手術群の予後に比して悪いのは一般的事実である¹³⁾(図7)。このことは、当科の成績でも一端を示したごとく、術後照射を施行した症例は、外科医の選択が、放射線療法群に不利に働いている可能性が高い。

図7 手術と放射線療法の有無による病期別5年生存率

図8 手術と放射線療法の有無による
III期症例の手術術式別5年生存率

図9 非定型乳房切断術と放射線療法の
有無による病期別5年生存率

乳癌研究会のアンケート調査をみても、術前病期分類で予後と比較すると、手術単独群が明らかに併用群の成績より優っている¹¹⁾。しかし、術後のt・n・m分類での病期別成績をみると術後照射群の成績が逆に優っている。これをさらに手術術式別にみると、小規模手術で病期が進行するにつれて、術後照射が手術単独療法に優る成績が得られている(図8, 9)。これらのことから、術後照射は決して不要なものではなく、手術で腫瘍が残存した場合は言うまでもなく、予防的照射としても適応を選んで施行すべき価値はあるものと考えられる。ただし、拡大根治手術施行症例や、no症例の予防照射は不要であろう。近年、欧米で試みられている乳房保存的手術後の照射療法⁸⁾なども、本邦でも試みられる機会は増す可能性がある。なお、前述のごとく、術後照射をせずに再発を待ってから照射しても十分との考え方

は、再発症例を治療した経験¹⁰⁾からすると、2 cm以下の腫瘍であれば133例全例が軽快しており、少なくとも胸壁再発は問題ないが、局所再発は同時に他部位への転移の源となる可能性もあり、術後に照射しておくのがよりよいものと考えている。当科で治療した再発症例の再発部位をみると、術前照射を施行した群には、照射野内のリンパ節再発は1例もなかったことから(図10)、術前照射は施行すべきと考えられる。

図10 乳癌術後照射の有無と腫瘍の再発部位
(群大放1971.1~1981.12)

2 睾丸腫瘍

精上皮腫の放射線感受性は極めて高く、巨大な腫瘍であっても40 Gyの照射で消失する¹⁴⁾。さらに放射線治療にとって幸いなことには、腫瘍の進展がリンパ節を順次に侵す傾向が強く、系統的にリンパ節を照射すれば、治癒可能なことである、したがって、原発した睾丸を含めて転移巣を照射すれば、容易に治癒するわけであるが、今日の精上皮腫の治療の原則は、高位除睾丸後に病側の腸骨リンパ節ならびに大動脈周囲リンパ節、さらには縦隔リンパ節、鎖骨上窩リンパ節と放射線療法を行うものである。睾丸の摘除術が絶対に必要である理由は、除睾丸なしでは正確な組織診が不可能なことで、睾丸を含めて照射療法を施行すると、健側睾丸の被曝が大となり生殖機能の保持が困難となるからである。

近年、臨床的に広く採用されている組織分類は、標本内に占める広い面積の組織所見を呈する組織型をもって、その腫瘍の組織診断名としている¹⁵⁾が、睾丸腫瘍に関しては、99%精上皮腫であってもわずかに胎児性腫瘍や絨毛上皮腫などの他の成分が混在すると、精上皮腫の性格よりも他の性格が顕著に出現し、一般には極めて予後不良となる¹⁴⁾¹⁶⁾。このために、摘出睾丸の詳細な検索が必要なのである。当科

の治療成績でも精上皮腫は1例も腫瘍死はなく、59例の中には全腹部を腫瘍に占拠された症例など進行症例も含まれていたが、照射療法で軽快している。なお総線量としては40 Gy 照射したものが多いが、再発例を1例も経験していないので、最近の症例は36 Gy に下げている。放射線障害は高橋¹⁴⁾がすでに報告したごとく致死的なものはない。

精上皮腫以外の腫瘍の予後は一般に不良である。照射効果は決して不良ではなく、精上皮腫に比して治癒線量が10 Gy 程度高いにすぎないが、血行転移が多いため放射線主体の治療では根治させるのは困難である。この腫瘍に罹患した患者にとっての朗報は、白金製剤である cis-platin が特効的に効果を発揮することが知られたことである¹⁶⁾。なお、20歳未満の患者とくに幼小児の予後は良好である¹⁴⁾。

睪丸腫瘍治療上の今後の課題としては、正確な組織診をいかにするか、hCG、AFP、CEA などの腫瘍マーカーの検出が、組織診断の補助的役割を担える段階にきた¹⁷⁾が、組織診との対応はどうするのか、腫瘍マーカーからの診断で非精上皮腫の可能性が高いと判断された症例の治療はどうするのか、有力な化学療法剤が出現したので、これを基本的治療にどう組入れるかなどなどである。いずれにしても、精上皮腫の治療法は、高位除睪術後の放射線療法として、確固たる地位が築かれていると考えてよいであろう。

3 神経膠芽腫

頭蓋外への転移は例外的に生ずる疾患であるから、手術にとっても放射線にとっても最も良い適応となつてしかるべきであるが、現実の治療成績は期待を裏切ることおびたしい。

神経膠芽腫の放射線治療としては、BAR 療法、中性子捕獲療法、速中性子線療法など種々の特殊な治療法の開拓が試みられてはいるが、決定的なものはいまだない。一般的な治療法としては、可能な限り手術で腫瘍を摘出し、残存腫瘍に照射療法を施行することである。当科の症例もすべて外科的処置がなされてから、照射療法を施行したものであるが、1回5 Gy の大線量照射を施行する前の症例では腫瘍の消失が認められたものはなかった¹⁸⁾。しかし一般には、術後照射を施行した症例には、長期生存例が得られなくとも手術単独症例に比して延命効果は多少なりとも認められるとされている¹⁹⁾。

全脳照射後に照射線量を1回5 Gy として追加照

射を施行してからは、いまだ期間が短いので3年生存しか得られていないが、32%と明らかな延命効果が認められている。また懸念された後障害も現在のところ認める程のものではなく²⁰⁾²¹⁾、今後さらに症例を重ねる価値のある方法と考えている。

4 軟部腫瘍

軟部腫瘍は一般に放射線感受性が低いものとされているが、脂肪肉腫や胎児性横紋筋肉腫は決して放射線低感受性腫瘍ではない²²⁾。照射効果が誤認されてきたのは、脂肪肉腫では高分化型腫瘍の放射線反応性が遅く、また、一般に良性疾患のため手術のみで軽快することによるであろうし、横紋筋肉腫では、成人型横紋筋肉腫は放射線感受性が低く、また、良性型であるためこれまた局所再発はあっても手術療法のみでコントロールできることなどによるためと考えられる。

ここに提示した当科の資料で明らかなごとく、良性型を除いた脂肪肉腫、横紋筋肉腫の感受性は低くなく、50 Gy 程度の照射で制御可能であった。また、線維肉腫、平滑筋肉腫など放射線感受性の低い腫瘍でも、空間的線量分布を工夫したり、開創照射や大、小線量の組合せ照射²³⁾など分割照射法を工夫することで腫瘍を制御することができた。

軟部腫瘍をとりまく最近の問題点としては、悪性線維性組織球腫と診断される症例が増加してきたことと、その放射線感受性はどの程度かということがある。当科においては、昭和52年以降12例を数えており、この期間内では最も多い軟部腫瘍である。これは、最近悪性線維性組織球腫が増加してきたというよりも、かつては横紋筋肉腫や脂肪肉腫に分類されていた症例が含まれているためと考えている。照射効果をみると、組織球系の細胞の多い腫瘍の照射効果は良好であるが、線維細胞系の細胞の多い腫瘍の照射効果は劣る印象をもっている²⁴⁾。いずれにせよ、50 Gy 程度の照射で効果は期待できる。

軟部腫瘍とくに脂肪肉腫の照射効果は良好であるので、無理に根治的手術を施行するよりも、減量手術にとどめ放射線療法を施行するのの一法と考えられる。電子線療法の普及によって最も恩恵をうけているのが軟部腫瘍といえるのではないだろうか。

5 食道癌

食道癌は漿膜が存在しないために周囲臓器へ浸潤し易いばかりでなく、粘膜下織にそって上下方向に進展する傾向も強く、内視鏡やX線写真で認められ

る範囲よりもさらに広範に進展してる可能性が高い。このため、切除範囲を狭める目的で術前照射を施行したり、また逆に切除の不可能であった部位を照射する術後照射をしたり、ときには術前・術後照射を施行したりしている。当科の場合には、術前照射を主体として、症例によっては術前・術後照射を施行している。

治療成績は、5年相対生存率で20%と、全国集計²⁵⁾による23%とほぼ類似の成績であった。この数字は放射線単独療法の26%²⁶⁾²⁷⁾に比して優るものではなかった。むしろ、腫瘍径5 cm以下の腫瘍では42%であり、放射線単独療法が優っていた。このことは、放射線療法から手術療法あるいは手術療法から放射線療法への移行の間隔を、手術侵襲が大なるために適正に保てぬことが一因と考えられた。

食道癌は、手術にせよ放射線療法にせよ単独療法では治癒させるのは困難であるが、複数の治療法を単に重ねても利益があがるわけではなく、単独療法も含めて適応の選択をすべきである。現時点で、放射線療法を評価する立場から見解をのべるならば、腫瘍径5 cm以下の腫瘍は放射線単独療法がよく、5 cmから10 cmまでの腫瘍には術前照射後の手術療法あるいは手術療法後の術後照射がよいと考えられる。10 cm以上の腫瘍は根治性はまず考慮の外と言わざるを得ない。

V む す び

悪性腫瘍の根治的療法として手術療法との併用による放射線療法の意義について、乳癌、睾丸腫瘍、神経膠芽腫、軟部腫瘍、食道癌を対象として検討した。その結果、以下のごとき結果を得た。

1 乳癌の術後予防照射は、進行期症例や小手術症例で効果が期待できる。5年累積生存率は、noと $n_1\alpha$ は約90%と良好であったが、 $n_1\beta$ は54%、 n_2 以上では34%と低下した。

2 睾丸腫瘍のうち純粹の精上皮腫の5年累積生存率は98%と高値であり、併用療法の価値は高かった。非精上皮腫の治療における放射線療法の寄与に関しては、化学療法との関連で今後の検討課題である。

3 神経膠芽腫は従来から手術後の残存腫瘍に対して通常の術後照射を施行し、わずかながら延命効果が認められていたが、1回5 Gyでの大線量による追加照射によって、長期生存の可能性がひらけた。

4 軟部腫瘍は、照射効果が劣るものと誤解されているきらいがあったが、組織型によっては決して照射効果は不良でなく、脂肪肉腫、胎児性横紋筋肉腫では積極的に減量手術後の放射線療法を施行すべきと考えられた。

5 食道癌は、5 cm以下の腫瘍では放射線単独療法が、手術、放射線併用療法よりも優れており、基本的には放射線療法あるいは手術療法の単独療法がよりよいと考えられた。5 cm以上、10 cm未満の腫瘍には併用効果が期待できた。

なお、本研究費の一部は、文部省科学研究費の援助による。

文 献

- 1) Moss, W.T.: Combinations of radiotherapy and surgery. *Radiation Oncology*, 4th ed., Mosby, St. Louis, 1979, pp, 319.
- 2) 新部英男: 局所療法としての放射線療法と外科療法. 臨床腫瘍学, 講談社, 東京, 1981, 50頁.
- 3) 羽鳥 昇, 新部英男他: 内側遮へい対向4門照射法による食道癌の治療, 北関東医., 25: 179-184, 1975.
- 4) Gray, L.H.: Radiobiologic basis of oxygen as a modifying factor in radiation therapy. *AJR*, 85: 805, 1961.
- 5) 新部英男: 放射線治療の立場からみた組織診の重要性と問題点3. 宿主ならび間質反応について. 臨放., 22: 1155-1156, 1977.
- 6) 新部英男: 放射線病理. 現代産婦人科学大系13巻G, 中山書店, 東京, 1972, 225-240頁.
- 7) 松田 晋, 阿部光幸他: 腹部癌に対する術中照射療法の臨床経験., 2: 271-278, 1967.
- 8) Vaeth, J.M.: Historical aspects of tylectomy and radiation therapy in the treatment of cancer of the breast. *Front. Radiat. Ther. Onc.*, 17: 1-10, 1983.
- 9) 金田浩一, 大川智彦, 小川伸一郎, 津屋 旭: 手術不能乳癌, 再発乳癌の放射線治療. 臨放., 20: 1079-1091, 1975.
- 10) 伊藤一郎, 宮石和夫, 岡崎 篤, 前原康延, 杉山純夫, 新部英男: 局所再発乳癌の電子線治療. 日癌治., 16: 15-20, 1981.
- 11) 新部英男: 乳癌. 総合臨床, 32: 1590-1594,

- 1983.
- 12) Niibe, H., Tobe, T. & Koike, N.: Effect of ionizing radiation on tumor immunity. *Nipp. Act. Radiol.*, 28: 160-168, 1968.
- 13) 乳癌研究会: 乳癌研究会アンケート調査集, 1981, 120 頁.
- 14) 高橋 育, 岡崎 篤, 井上登美夫, 三橋紀夫, 中島哲夫, 宮石和夫, 原 富夫, 新部英男: 辜丸腫瘍, 特に Seminoma の放射線治療について. *日本医放会誌*, 39: 1344-1350, 1979.
- 15) 新部英男: 放射線治療における組織診の重要性と問題点. *臨床腫瘍学*, 講談社, 東京, 1981, 18頁.
- 16) 吉田 修, 山内民男, 添田朝樹: Cisplatinum. *最新医学*, 36: 1968, 1981.
- 17) 野崎美和子, 三橋紀夫, 前原康延, 中野 隆, 新部英男: 上大静脈症候群で発症した前縦隔原発の Yolk Sac Tumor の 1 例. *癌の臨床*, 29: 143-146, 1983.
- 18) Tamura, M., Kawafuchi, J. & Ishida, Y.: Clinicopathological study of brain tumor radiotherapy. *Neurol. Med. Chir.*, 21: 27-37, 1981.
- 19) Onoyama, Y., Abe, M., Yabumoto, E., Sakamoto, T., Nishidai, T. & Suyama, S.: Radiation therapy in the treatment of glioblastoma. *AJR*, 126: 481-492, 1976.
- 20) 田村 勝, 井上 洋, 山崎弘道, 川淵純一, 新部英男: 大脳 glioblastoma に対する 500 rad, 週 2 回法照射療法の有効性について. *Neurol. Med. Chir. (Tokyo)*, 23: 192-197, 1983.
- 21) 早川和重, 前原康延, 岡崎 篤, 宮石和夫, 原富夫, 平岡成恭, 新部英男: 神経膠芽腫瘍に対する 1 回 5 Gy 週 2 回照射法による治療. *日本医放会誌*: 印刷中.
- 22) 伊藤 潤, 三橋紀夫, 岡崎 篤, 池田 一, 加藤正臣, 新部英男: 脂肪肉腫の放射線治療. *日本医放会誌*, 40: 445-452, 1980.
- 23) 戸部龍夫, 新部英男他: 放射線治療の生物学的考察. *日本医放会誌*, 28: 690-713, 1968.
- 24) 伊藤 潤, 新部英男他: 悪性繊維性組織球腫の照射効果に関する臨床的研究. *日癌治*, 19: 549-555, 1984.
- 25) 食道疾患研究会: 食道癌の予後. *癌の臨床*, 2: 539-542, 1981.
- 26) 新部英男他: 悪性腫瘍の治療における放射線療法の寄与 1. 放射線単独療法. *北関東医*, 34: 1984. (本紙).
- 27) 中野 隆, 伊藤 潤, 伊藤一郎, 山中已喜男, 須藤久男, 三橋紀夫, 新部英男: 食道癌の放射線治療. *日本医放会誌*, 投稿中.

THE CONTRIBUTION OF RADIOTHERAPY TO THE TREATMENT OF THE MALIGNANT TUMORS

2. COMBINATION OF RADIOTHERAPY AND SURGERY

HIDEO NIIBE, JUN ITOH, KAZUSHIGE HAYAKAWA,
TAKASHI NAKANO, SUMIO SUGIYAMA, MIKIO YAMANAKA,
MIWAKO NOZAKI, MASANA MATSUURA, MITSUHIRO TAKAHASHI,
HISAO SUTO, HAZIME IKEDA, ATSUSHI OKAZAKI,
YASUNOBU MAEHARA, IKU TAKAHASHI, TERUO NAGAI.

Department of Radiology,
Gunma University School of Medicine,
Maebashi, Japan. (Director : Prof. Teruo Nagai)

Application of radiotherapy combined with operation in the treatment of malignant tumors were studied in the patients with the breast cancer, testicular tumor, glioblastoma, soft tissue tumor and esophageal cancer. The results were as follows :

1) The prophylactic post-operative radiotherapy was considered to be effective for the patients with the breast cancer of progression stages and those treated by minor surgery. The 5-year cumulative survival rate was 93% in n0, 88% in n1 α , 56% in n1 β and 42% in n2.

2) The patients with pure-seminoma have been treated by post-operative radiotherapy. The 5-year cumulative survival for those patients was 98% in accordance with anticipation, but for the patients with non-seminoma was only 36%. Further study of therapeutic regimen including chemotherapy for this type of tumor is required.

3) The patients with glioblastoma treated by radiotherapy at the rate of 5Gy twice a week as boost therapy following operation were compared with those irradiated at the conventional daily dose. The 3-year cumulative survival rate of the high dose group was better than the conventional dose group.

4) The soft tissue tumors have been misunderstood for the radioresistant tumor. Some of them, liposarcoma and embryonal rhabdomyosarcoma, were radiosensitive rather than radioresistant. Then, those tumors should have been treated by radiotherapy following reduction surgery.

5) Esophageal cancer of 5cm or smaller in diameters was considered to be treated by radiation or operation alone. Combined therapy of radiation and surgery seems to be most suited for the tumor of 5cm to 10cm.

Key words : Radiotherapy, Breast cancer, Testicular tumor, Glioblastoma, Soft tissue tumor.