再出血時内視鏡的止血不可能にて手術施行した Dieulafoy 潰瘍の1症例

横 田 徹,¹⁾ 荻 原 裕 之,¹⁾ 大和田 進,¹⁾
藤 井 孝 尚,²⁾ 宮 本 幸 男,¹⁾ 斉 藤 昭 三,²⁾
石 井 英 昭,³⁾ 城 下 尚,³⁾ 泉 雄 勝,¹⁾

¹⁾群馬大学第2外科（主任教授：泉雄 勝）

²⁾国立沼田病院

³⁾群馬大学中検病理

（昭和63年10月19日 受付）

はじめに

1898年の Dieulafoy の記載^{1,2)}以来, Dieulafoy 潰瘍と診断された症例は特に近年, その概念が広く認識されるようになり, 報告例が増加している³⁾.

今回我々は, 噴門直下に発生し再出血をきたした Dieulafoy 潰瘍に内視鏡的止血が不可能にて手術施行し, 止血し得た症例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する.

症 例

症例：49歳, 男性, 公務員.

主訴：吐血

家族歴：父親が胃癌で死亡.

既往歴：特記すべき事なし.

現病歴：従来, 全く無症状であったが, 昭和63年1月29日昼食摂取中に突然200ml 程の吐血をし, ショック状態となる. 内科に緊急入院となり, 直ちに緊急内視鏡を施行し, 体上部に小潰瘍を認め, その底部に血管の露出があり, それに対してトロンビン, エタノール注入をおこなった. その後出血はおさまっていたが, 3日後, 再出血し内視鏡的止血不可能なため外科転科となる. 術前出血量は約1500mlであった.

入院時現症：身長は165cm, 体重は47.5kg で栄養はやや不良, 顔面は蒼白で血圧110/70, 脈拍105/分, 眼瞼結膜は貧血状で眼球結膜には黄疸はなかった. 胸部所見には異常を認めなかった.

表1 入院時検査所見

WBC	: 13900/mm ³
RBC	: 294×10 ⁴ /mm ³
Hb	: 9.1g/dl
Hct	: 28.5%
Plt	: 21.7×10 ⁴ /mm ³
TP	: 7.2g/dl
Alb	: 4.0g/dl
GOT	: 25IU/l
GPT	: 39IU/l
LDH	: 274IU/l
TB	: 0.4mg/dl

図1 初回出血時の内視鏡写真——拍動性の出血が認められる.

図2 エタノール注入止血後の内視鏡写真——出血は認められない。

図3 再出血時の内視鏡写真——初回と同様の出血が認められる。

図4 切除胃標本——径10mm×8mmの小潰瘍と径2mmの露出血管を認める。

腹部所見は平坦，軟で圧痛なく，肝を右季肋下に1横指触知するも硬度軟，表面平滑，辺縁鋭であった。腫瘍は触知せず，腹水もなかった。

入院時検査所見：＜表1＞のごとく軽度の貧血を認める以外，生化学データに異常は認められなかった。

内視鏡所見：初回出血時は＜図1＞のごとく噴門

下小弯側に小潰瘍を認め，その底部の露出血管より拍動性の出血が認められた。

内視鏡下エタノール注入止血後，翌日の内視鏡写真は，＜図2＞のごとくであり，出血は認められず露出血管はパーペル状になっていた。

再出血時の内視鏡写真は＜図3＞で，初回同様に小潰瘍があり，露出血管より拍動性の出血が認めら

図5 切除胃標本切り出し切片——露出血管が明瞭に認められる。

れた。

再出血時、再度内視鏡下エタノール注入を試みるに止血不可能であったため Dieulafoy 潰瘍の診断のもとに緊急手術を施行した。

手術時開腹所見は、肝脾に異常なく、胃、小腸、大腸は内部の凝血塊が透視された。手術は、血管造影等を用いて胃内他部位の詳細な検索ができなかった事、出血源が複数か否かが不明であった事、潰瘍が噴門付近に存在したという事、また Dieulafoy 潰瘍の生成の本質を考慮した上で胃全摘術を施行、再建は径25mmのEEAを用い食道空腸吻合を行い、 ρ -Roux-Y 吻合を行った。

切除標本肉眼所見：切除胃標本では＜図4＞のごとく噴門下小弯側前壁寄りに単発の径10mm×8mmの小潰瘍とその底部に径2mmの露出血管を認めた。潰瘍周囲の粘膜には発赤や腫脹等の急性炎症の所見は軽度であった。＜図5＞はその切り出し切片で、露出血管が明瞭に認められた。

病理組織学的所見：弱拡大は＜図6＞のごとくで、出血源はU1-IIの潰瘍であり、その底部には凝血塊の付着を認め、その直下の粘膜下層には異常に太い動脈を認めた。動脈の強拡大像は＜図7＞のごとくで、内膜は著明に肥厚し、白血球やリンパ球等の炎症細胞の浸潤が見られ、血管内腔には血栓形成が認められ急性炎症の像を呈していた。しかし、microaneurysm や arteriolitis の所見はなかった。

術後経過：その後再出血は認められず、元気に退院し、社会復帰している。

図6 同病理組織所見（×40）——粘膜下層に異常に太い血管が認められる。

図7 同病理組織所見 (×100) ——内膜の急性炎症所見が認められる。

考 察

1897年の Dieulafoy の報告^{1,2)}以来, Dieulafoy 潰瘍と思われる症例は,我が国の報告だけで200例を超えている³⁾。しかしながらその特徴としての粘膜下の異常血管の重要性は認識されているものの,この異常血管の本態については,先天性な走行異常や拡張⁴⁾から微小動脈瘤⁵⁾,動静脈奇形⁶⁾,小動脈炎,動脈硬化等の説があり,未だ不明である。さらに,この異常血管と潰瘍性病変や出血の発生との関係についても,粘膜の圧排菲薄化による compression ulcer の破綻⁹⁾,異常血管により挙上された粘膜の機械的損傷⁷⁾,偶然発生⁸⁾,異常血管の壁の変性破綻が胃に穿孔¹¹⁾等の様々な説があり定説を見ていない。

本症例では,その病理所見より Dieulafoy 潰瘍が,その粘膜下における血管病変が主体であり潰瘍は2次の病変ではないかと考えられた。

Dieulafoy 潰瘍の大きさに関してもさまざまな説があるが,過去の症例より,潰瘍の大きさは10mm以下,露出血管の太さは1mm以上であるものが多い。本症例も10×8mmの大きさの小潰瘍であった。

また, Dieulafoy 潰瘍の出血に対する保存療法には,内視鏡下エタノール注入,高張 Na-エピネフリン液注入,クリップ結紮,レーザー凝固等が試みられていて初回出血に対しては好成績を収めているが,再出血をきたしやすい。

Dieulafoy 潰瘍の外科手術に関して,全摘術¹²⁾の他に亜全摘術,広範囲切除術¹³⁾,楔状切開術¹³⁾縫合結紮術¹⁴⁾と様々な術式が行われている。しかし,この疾患の治療上の最大の問題は再発(再出血)という事であり,術前に血管造影等の詳細な胃の粘膜下血管の検索ができれば⁹⁾,楔状切開術や縫合結紮術でも可能と思われる^{7,10)}。つまり病態を考慮した出血治療法の選択が重要であり,今後は,血管造影法を用いた embolization なども考えられる。

お わ り に

再出血時内視鏡的止血不可能にて手術施行した Dieulafoy 潰瘍の1男性例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告した。

文 献

- 1) Dieulafoy, G.: Exulceratio simplex. L' intervention chirurgicale dans les hémátéses foudroyantes consécutives á l'exulcération simple de l'estomac. Bull de L'Acad de Méd., 39: 49-84, 1898.
- 2) 島津久明: Dieulafoy 潰瘍. 臨床外科, 39: 1736-1737, 1984.
- 3) 並木正義: Dieulafoy 潰瘍の概念と病態をめぐって. 胃と腸, 22: 1109-1112, 1987.
- 4) Goldman, R.L.: Submucosal arterial

- malformation ("aneurysm") of the stomach with fatal hemorrhage. *Gastroenterology*, 46 : 589-594, 1964.
- 5) Gallard, T.: Miliary aneurysms of the stomach giving cause to fatal hematemesis. *Bull. Soc. Med. Hop. Paris* 1 : 84-91, 1884.
  - 6) MacMortensen, N.J., Mountford, R.A., Davies, J.D., et al : Dieulafoy's disease : a distinctive arteriovenous malformation causing massive gastroduodenal hemorrhage. *Br. J. Surg.*, 70 : 76-78, 1983.
  - 7) Streicher, H.J., : Massive gastrointestinal bleeding due to solitary simple gastric erosion (of Dieulafoy). *Germ Med. Mth.*, 11 : 448-452, 1966.
  - 8) Voth, D.: Zur Pathogenese ungewöhnlicher, arterieller Magenblutungen. *Med. Welt.*, 19 : 1095-1097, 1962.
  - 9) Gough, M.H.: Submucosal arterial malformation of the stomach as the probable cause of recurrent severe hematemesis in a 16-year old girl. *Br. J. Surg.*, 64 : 522-524, 1977.
  - 10) 平尾雅紀, 畠山広巳, 石後岡正弘, 他 : 臨床からみた Dieulafoy 潰瘍. *胃と腸*, 22 : 1143-1151, 1987.
  - 11) Juler, G.L., Labitzke, H.G., Lamb, R., et al : The pathogenesis of Dieulafoy's gastric erosion. *Am J Gastroenterol*, 79 : 195, 1984.
  - 12) 狩野 敦, 山岡 豊, 佐藤邦夫, 他 : 大量出血をきたした微小胃粘膜欠損 Gallard-Dieulafoy 潰瘍の1例. *Gastroenterological Endoscopy*, 24 : 1406-1411, 1982.
  - 13) 池田 耕, 石田照佳, 立石春雄, 他 : Exulceratio simplex (Dieulafoy) の4例と過去14年間の本邦報告例の文献的考察. *胃と腸*, 20 : 999-1005, 1985.
  - 14) 片野光男, 藤井善男, 武藤征朗 : Exulceratio simplex (Dieulafoy) の1例. *日臨外会誌*, 40 : 163, 1981.

**DIEULAFOY'S ULCER NECESSITATING GASTRECTOMY DUE TO
UNSUCCESSFUL ENDOSCOPIC HEMOSTASIS,
—A CASE REPORT—**

**TOHRU YOKOTA, HIROYUKI OGIWARA, SUSUMU OHWADA,
TAKANAO FUJII**, YUKIO MIYAMOTO, SHOUZOU SAITO**,
HIDEAKI ISHII*, HISASHI JOHSHITA*, MASARU IZUO.**

Second Department of Surgery, Gunma University

School of Medicine, Maebashi, Japan.

(Director: Prof. Masaru Izuo)

* Pathological Department of Central Examination, Gunma

University School of Medicine, Maebashi, Japan.

** The National Numata Hospital, Gunma, Japan.

Since the original report by Dieulafoy, there have been over 200 cases of Dieulafoy's ulcer reported in Japan.

Now we report a case of Dieulafoy's ulcer that necessitated gastrectomy due to unsuccessful endoscopic hemostasis.

A 49-year-old man was admitted to the National Numata Hospital because of sudden hematemesis during having lunch. Successful endoscopic hemostasis was performed by 95% ethanol injection. Three days later, rebleeding occurred, for which endoscopic hemostasis was unsuccessful. Then he got an emergency operation totalgastrectomy and ρ -Roux-en-Y reconstruction.

The resected specimen showed an ulcer measuring 10×8 mm with an exposed vessel measuring 2 mm in diameter. Microscopic examination disclosed an abnormally thick vessel in the submucosal layer, which had an inflammatory intima without microaneurysm or arteriolitis.