肺結核症における気管支造影とその形態学的及び 病理組織学的研究*

第 1 編 空洞性肺結核症

手 塚 毅**

国立中野療養所 (所長, 春木秀次郎)

緒 言

気管支造影法は1901年仏 Lafay によりリビヨドールが作られ, 1922年仏 Sicard, Forstier が採用し, その成績の優秀性を発表してより一般に普及せられるようになった。本邦では熊野御堂¹⁾, 堀田²⁾, 村上³⁾等により大正15年来発表されている。近時胸部外科の進歩により肺疾患の病理, 造影剤の研究及び造影法の改良により気管支造影法は臨床的に広く応用されるようになった。気管支造影法は病巣の位置診断上, 気管支鏡と共に診断, 術前検査上欠くことの出来ぬ検査法となり殊に結核外科療法に於いてその結核性気管支炎の合併がその手術を左右することによつて一層とりあげられるようになった。

現在までに気管支造影法に関して多くの報告が見られるが, その造影に関しての報告は, 欧米に於いて Métras⁴⁾, Stutz⁵⁾, Buckles⁶⁾, Fischer⁷⁾, Anacker⁸⁾, Eöhm⁹⁾, Serisi¹⁰⁾, Chadourne¹¹⁾, Raymond¹²⁾, Paul¹³⁾, Schaw¹⁴⁾, Dörner¹⁵⁾, Magnin¹⁶⁾, Wernli-Hässig¹⁷⁾, Huzly¹⁸⁾, 本邦に於いては, 佐藤¹⁹⁾, 道鉢²⁰⁾, 吉村²¹⁾, 長沢²²⁾, 栗田口²³⁾, 斎藤²⁴⁾, 内藤²⁵⁾, 石井²⁶⁾, 塩沢²⁷⁾, 石川²⁸⁾, 河合²⁹⁾, 梅北³⁰⁾, 武田³¹⁾ 等により種々の観点より報告されている

が, その数は比較的少い。

造影による肺区域の決定, 気管支の拡張, 狭窄, 中絶像等の診断は容易であるが, その肺病巣, 気管支病変の質的診断は困難とされている。病巣と誘導気管支とが密接な関係を有することより誘導気管支のレ線形態学的所見による診断については Huzly¹⁸⁾, Fischer⁷⁾, Stutz⁵⁾, Métras⁴⁾, 本邦では中村³²⁾, 後藤³³⁾, 石川²⁸⁾, 伊藤³⁴⁾, 橋本³⁵⁾, 神津³⁶⁾, 越後貫³⁷⁾, 河合²⁹⁾, 栗田口³³⁾, 吉田³⁸⁾ により詳しく報告されており, 病理学的には Ameuille³⁹⁾, Staub⁴⁰⁾, Lisa⁴¹⁾, Jones⁴²⁾, Kaufmann⁴³⁾, Galy⁴⁴⁾, 岡⁴⁵⁾, 二宮⁴⁶⁾, 岩崎⁴⁷⁾等の報告がある。一方越後貫³⁷⁾, 伊藤³⁴⁾, 河合²⁹⁾, Fischer⁷⁾, Surtz⁵⁾等は気管支のレリーフ像より, Juhl⁴⁸⁾, Zystöck⁴⁹⁾, Blaha⁵⁰⁾, Bernau⁵¹⁾, 渡部⁵²⁾等は断層写真より誘導気管支の像について詳細に検討している。又気管支病変の殊にその線維化については Masshoff⁵³⁾, 石原⁵⁴⁾等の病理組織学的研究が見られる。

然しこれらの主とするところは病巣と誘導気管支に関するものが大部分である。しかもその病巣は主病巣であり, その病変別によつて気管支との関連を記しているものもあるが, 現在まで摘出肺全体を対象として, そのすべての肺病巣のみならず, 肋膜病変も併せて, その全気管支系病変との相互関係を追求記載したものがない

* BRONCHOGRAPHIE, MORPHOLOGIC AND HISTO-PATHOLOGIC STUDIES OF BRONCHUS IN PULMONARY TUBERCULOSIS.

(1) CAVERNOUS PULMONARY TUBERCULOSIS

** Takeshi Tezuka : National Nakano Sanatorium, Tokyo.

い、即ち誘導気管支が最も多くの気管支病変を有する事は幾多の報告が見られるが、然し気管支結核は又誘導気管支以外の気管支にも存在することも知られている。

従つて主病巣以外の多くの娘病巣と気管支病変との関聯、又主病巣に連なる数本の誘導気管支についてもその病巣への開口部のみならず末梢より切除断端までを追求し、気管支造影所見と比較検討しつつ切除肺の全気管支系について病変の広さ、性質及び発生頻度がどの程度に云い得るかについては検討されていない。

この点に関し著者は術前近く気管支造影を行い、肺結核症の摘出肺10例（内本態性気管支拡張症1例）をあますところなくツエロイジン、一部パラフィン連続切片を作成し、その病理組織学的所見とその造影所見、手術時所見、気管支鏡所見、臨床諸検査と切除肺を比較検討し、肺病巣の質的診断とそれに関連せる気管支の形態学的、病理組織学的所見について知見を得たので報告する。

研究 方 法

昭和28年より現在までメトラ氏ゾンデ法による気管支造影を施行せるもの約900例（主として三村技官担当）中、主として肺病変が一葉以上にわたるもので、これらは各肺葉にわたり、又種々の病型を含む様に、且術前、術後に気管支造影を施行せるものの摘出肺10例（右上葉3例、右中及び下葉1例、右全摘1例、左上葉1例、左下葉1例、左S₁₊₂及びS₃1例、左S₉1例、気管支拡張症S₄及びS₆1例）を選んだ。これら症例は気管支造影写真（縦、横、立体）、普通写真、一部高圧、拡大写真及び断層写真、一部造影断層写真を術前近く施行した。

造影方法は主としてメトラ氏ゾンデの方法を用い、咽喉頭反射の強いものは一部声門下法を用いた。使用した造影剤はスルファミン懸濁モリヨドール又は油性ウロコリンである。

気管支造影所見上狭窄性変形と拡張性変形に分ち、前者を狭窄（部分的内径狭小）、中絶、全般的狭小（1乃至数枝にわたる内径狭小）とし、後者を拡張（部分的内径拡張一円柱状、念珠状、嚢状、葡萄状）、中絶（凸型、平滑型、凹型）、全般的拡張（1乃至数枝にわたる

内径拡張）に分ち、又正常内径の中絶（凸型、平滑型、凹型）と数枝の集まつた集束状等とに分類した。

切除材料は原形に近くふくらまし固定、面状切を加え、一部はソフテックス撮影を行う。肉眼的に観察しスケッチを行つた後、切除肺のすべてをツエロイジンの連続切片（50～60μ）に作り、部分的にはパラフィン連続切片を作成した。染色はヘマトキシリンーエオジン染色を行い、パラフィン切片はその外マロニー、弾力線維、鍍銀染色を行つた。標本は3～4倍の投影拡大にスケッチし、これらを漸次重積、拡大された肺原形に復元し、組織学的清影図を作成した。これに各標本を鏡見し、その所見を記入した。

これら標本鏡見上気管支の変化をその主とする病変を以て気管支炎をB、気管支周囲炎をP、気管支線維化をF、結核性潰瘍をG、乾酪性気管支炎をC、気管支拡張をE、気管支狭窄をSの記号を以て表し、それ等を合併した時には記号を併記した。以下本文、図表中上記の記号を以てその所見を表わした。この分類中気管支炎と云うのは細胞浸潤、滲出性変化、粗鬆化を主体とする病変である。又拡張、狭窄は軽度の線維化を伴うことがあり、これらは線維化、癒痕短縮という過程が考えられる。然し線維化はすぐに拡張、狭窄と結びつけることは出来ない。著者は気管支筋層の断裂、萎縮を以て拡張とし、気管支壁の肥厚（細胞浸潤、浮腫、筋層の肥大）等を以て狭窄とした。

又症例の図表中気管支を内側より外側に向つてa, b, cの順に分枝を記号し、同時に大文字は区域枝で第3分枝を、以下小文字とし、小文字は第4分枝を、Iは第5分枝、IIは第6分枝、IIIは第7分枝以下の気管支分枝として分類記号した。

本篇全症例の考察を術前のレ線像より（普通写真に断層写真をも参考とした）岡氏病型で分類し、空洞と病巣の拡がりより空洞性肺結核症と非空洞性肺結核症とに分ち、第1篇は空洞性肺結核症に就いて考察した。即ち岡氏病型分類によるⅣA型2例（左S₁₊₂及びS₃切除、右上葉切除）Ⅶ型3例（右中、下葉切除、左上葉切除、右肺全摘）である。以下症例に就いて述べる。

症 例

症例 1. 増○ 26才 男 ⅣAa型

表1の如く、発熱、咳嗽、喀痰の増加、胸痛を以て発病し、昭和29年1月レ線左上肺野に病巣を発見された。この時は少々滲出性の病巣が見られた。同年3月

表 1

年月	29	1	2	3	...	7	9	10	11	12	30	1	2	4	5	6
T.B菌	+	(+)	+	(-)			+	(#)	(#)	+	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
X所見																
及																
経過																
S.M.																
PAS																
VC																
体重																
(身長)																

断層写真で空洞を認めた。同年2月より7月まで化学療法剤ストレプトマイシン（以下SMとす）40g, PAS 1200g使用, 29年9月入所, 入所時より術前までSM 15g, PAS500g, 計SM55g, PAS1700gを使用した。レ線上周囲浸潤は消失し病巣の範囲は縮小, 岡氏病型ⅣAa: 型を呈していた。

29年11月左上葉 S_{1+2} 及び S 区域切除手術を施行した。

普通写真一写真1の如くⅣAa: 型を呈し空洞像が見られ, 主病巣は S_{1+2} 区域にあり, 巣門結合像は明らかで肺尖に肋膜の肥厚像が見られた。断層写真—8cmに内径 3.0×1.8 cmの空洞像があり, それに通ずる誘導気管支像が見られ, 渡部氏2型に属していた。

気管支造影所見: 立体造影写真並びに図解は写真2の如く, 1) 気管支は一般に上方に引上げられ, 肺尖枝は円後方に偏位している。2) B_{1+2a} 枝は内側第4分枝に太く, 第5分枝には上方枝の内側より外側にかけ狭窄中絶像次に稍々拡張凸形中絶像で空洞に連る如く, 次に広く拡張した凹形中絶像が見られ, 中間部の枝には第5分枝に狭窄中絶像が見られ, 又下方枝には気管枝レリーフ像が鋸歯状を呈して見られる。3) B_{1+2b} 枝は内上方第4分枝は太く, 第5分枝には狭窄中絶像が見られ, 中間枝には第5分枝に拡張凸形中絶像が見られ, 又下方枝の第5分枝には側下方に彎曲する像が見られる。4) B_{1+2c} 枝は第5分枝で側下方に彎曲像を呈し, 5) B_3 の枝は他枝に比較し一般に細い像が見られた。

気管支鏡所見—異常所見は見られなかった。

切除時所見—肋膜の癒着の状態は肺尖 S_{1+2a} の部分に殊に強く且肥厚し, 全体に薄い線維性の癒着が認められた。

切除肺の組織学的積影図: この標本の全体像は図1の如く, 個々の区域に分けて見ると S_{1+2a} 区域の分野では図2の如くである。図中▲印は誘導気管支を、〃印は無気肺硬化を示す。ここでの主なる病巣は前方（細線）に 1.8×1.5 cmの大きな被包乾酪巣があり, 中間部（中太線）には大被包乾酪巣の集まりで 3.0×1.8 cmの大きさの病巣があり, 一部には崩壊し始めた像を呈している。後方（太線）には 3.2×2.0 cmの大きな病巣が見られ, 融解した空洞を呈している。この空洞は壁

図 1

図 2 1+2a

が厚く乾酪物質が附着し傍側無気肺の強い病巣である。これら主病巣の外に小被包乾酪巣が周囲に数多く散在して見られる。又後方の病巣には淋巴球結節の新

表

2

分枝 区域	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ
1 + 2 a	A (S, B) A (S)	$\odot a(E, F)$ $a(S, F)$ $\odot b(E, P)$ $b(E, F)$ $b(E)$ $b(S)$ $b(S, F)$	$\left\{ \begin{array}{l} a-b'(S) \\ \odot a-b'(B) \\ \odot a-c'(P) \end{array} \right\}$ $\left\{ \begin{array}{l} b-a'(E, P, F) \\ \bullet b-b'(E, P, F) \\ \odot \bullet b-c'(F) \end{array} \right\}$ $C(E)$ $C(S)$	$\odot a-a'(S) - \left\{ \begin{array}{l} a-a'-b''(E) \\ a-a'-b''(S) \\ a-b'-b''(S, B) \\ a-b'-c''(S, B) \\ a-b'-c''(B) - a-b'-c''-a'''(B) \end{array} \right.$ $\odot \bullet a-b'-e''(S, B)$ $a-c'-b''(B)$ $b-c'-b''(B)$ $b-d'-c''(S)$ $c-a'(B) - \left\{ \begin{array}{l} c-a'a''(B, P) \\ c-a'b''(S, F) \end{array} \right.$ $\left\{ \begin{array}{l} c-b'-a''-a'''(S, F) \\ c-b'-a''-a'''(E) \\ c-b'-a''-a'''(E) \\ c-b'-a''-a'''(E) \\ c-b'-a''-a'''(E) \\ c-b'-a''-b'''(F, S) \\ c-b'-b''-c'''(S) \\ c-b'-b''-c'''(F) \\ c-b'-b''-d'''(E) \end{array} \right.$	
1 + 2 b	B (E, B) B (E)	$\odot \bullet a(S, B)$ $b(S)$ $\odot b(E)$ $\odot b(E)$ $\odot c(E)$	$\left\{ \begin{array}{l} \bullet \blacktriangle a-b'-d''(B, P) \\ \bullet \blacksquare b-b'-c''(C) \\ b-b'-c''(S) - \left\{ \begin{array}{l} \bullet \blacktriangle b-b'-c''-a'''(B) \\ b-b'-c''-b'''(E) \\ b-b'-d''-c'''(E) \end{array} \right. \\ b-b'-d''(B, E) \end{array} \right.$ $\odot b-b'(E) -$ $\odot c-c''(E)$		
1 + 2 c			$\left\{ \begin{array}{l} \bullet \bullet a-a'-b''(B) \\ a-b'-b''(E, F, B) \\ a-b'-c''(E) \end{array} \right.$ $a-c'(S)$ $b(E)$ $b(S)$		
3		$a(E)$ $a(E)$ $a(S)$ $b(E, B)$ $c(E, B)$	$\left\{ \begin{array}{l} a-a'(S, P, B) \\ a-b'-a''(S, B) \\ a-b'-c''(E, B) \end{array} \right.$ $b-b'-a''(S, B)$ $\left\{ \begin{array}{l} c-a'(E) \\ c-b'(E) \end{array} \right.$		

注 $\odot$ 気管支造影所見部位 $\bullet \blacktriangle$ 被包乾酪巣 誘導気管枝
 $\bullet$ 空洞誘導気管枝 $\bullet \blacksquare$ 小被包乾酪巣 誘導気管枝

生が存し（写真3）肋膜の肥厚は強く脂肪を帯びている。

この気管支の病変は図2、表2に示す如く、前方病巣には a-b'枝、中間部病巣には a-c'枝、一部 b-c'枝 c-a'枝が関与し、後方病巣には b-a'枝、b-b'枝が主として関係している。主病巣への誘導気管支の主なるものは a の分枝であり、第5分枝以下の末梢枝には a-a'枝に3ヶ処、a-b'枝に7ヶ処、誘導気管支でない a-c'枝に2ヶ処、全体で12ヶ処（B1, P1, S3, S, B3,

E1）に気管支病変が見られた。中樞側の a 第5分枝には2ヶ処（EF1, S, F1）に病変が見られた。即ち a 枝は14ヶ処の病変が存在していた。次に b 枝ではこれも空洞への誘導気管枝を含み、第5分枝以下に5ヶ処（B1, S1, F1, E, P, F2）、第4分枝には5ヶ処（EP1, EF1, SF1, E1, S1）に病変が見られ、全体で b 枝は10ヶ処の気管支病変が存在していた。c 枝では内側の一部（c-a', c-b'枝）は主病巣への誘導気管枝となっている。ここには第5分枝以下に15ヶ処（B1, S4, E5,

B.P1, S.F3, F1) の病変が見られ、c-b'枝には気管枝の蛇行とE, Sの像が交互に存在していた。第4分枝には2ヶ処(E1, S1)の病変が見られ、c枝全体には17ヶ処に病変が存在していた。肺病変の少ない区域のc-c'枝には気管枝病変が見られなかった。一方区域枝である幹の第3分枝にも2ヶ処(S1, S.B1)の病変が見られた。即ちB_{1+2a}枝では第5分枝以下の末梢に32ヶ処、中枢側の第3, 第4分枝に11ヶ処、合計43ヶ処(B6, P1, F2, S11, E8, E.P1, E.F2, E.P.F3, S.B4, S.F4, B.P1)に気管枝病変が見られた。その気管枝病変別ではB11, P6, F11, S19, E14ヶ処となる。病巣に接続する部分の気管枝にはS7, B4, P3, F4の病変が見られた。

S_{1+2b}区域は図3の如く、この病巣は前方(細線)

図 3 1 + 2 b

に小被包乾酪巣の散在が見られ、又中間部(中太線)では固い乾酪物質をもつ病巣の集団があつて全体で2.2×3.0cmの大きさがあり、この部分の小病巣では被膜の発達是比较的よいが大きな病巣ではあまりよくなく、この大きな病巣を中心として星棒状に小病巣が散在している。後方(太線)の病巣は大部分増殖性の像を呈している。即ち乾酪物質は固く部分的に炭粉沈着が見られ、その被膜には所謂淋巴球の集団が見られた。一部では崩壊、融解の病巣も見られ、又周囲の一部には傍側肺気腫が見られた。肋膜は肥厚著しく脂肪組織が附着していた。

この部分の前方病巣には諸枝の末梢気管枝が関係し、中間部病巣にはb枝の大部分が関与し後方病巣にはa枝の一部、b枝の一部が関与している。この主病巣に関係するb枝の変化は図3、表2の如く、第5分枝以下の末梢枝に7ヶ処(C1, B1, B.E1, E3, S1), 又中枢の第4分枝に3ヶ処(S1, E2)の病変が見られた。

a枝の一枝はS_{1+2a}区域の病巣へ入るのが見られた。a枝の気管枝病変は第5分枝以下に1ヶ処(B.P), 第4分枝に1ヶ処(S.B)見られた。c枝は小病巣に關与している為第4, 第5分枝にEの像が見られたのみである。中枢側の第3分枝には2ヶ処(E1, B.E1)に病変が見られた。即ちB_{1+2b}枝には全体で14ヶ処(C1, B1, B.E1, B.P1, E7, S2, S.B1), 気管支病変別ではB4, P1, E8, S3ヶ処の病変を呈していた。亦病巣に接続する部分にはこの中C1, B1, E1, B.P1ヶ処の病変が見られた。

S_{1+1c}及びS₂区域の病巣は大部分小被包乾酪巣の集団又は散布でS_{1+2c}の病巣の誘導気管枝と思われる(a枝)部位に1ヶ処、第5分枝に2ヶ処、肺病変のない部分に分枝している第6分枝に2ヶ処、中枢側のb枝に2ヶ処、全体でS_{1+2c}枝には7ヶ処(B1, E, S2, E.F.B1)の病変が見られた。又S区域には明らかな誘導気管枝は見られず、ここに分布するB a枝の第5分枝以下に4ヶ処、3b枝に1ヶ処、3c枝に2ヶ処、中枢側の枝に5ヶ処、B_{1+2c}枝全体で12ヶ処(E4, E.B4, S1, S.B2, S.P.B1)に気管枝病変が見られた。(主たる気管枝病変を写真4, 5, 6, 7に示す)。

以上この症例は全体的に病巣が大きく、空洞化している部分には気管支病変も多く、又区域枝(A, B枝)の方まで病変が進展していた。然し単なる小被包乾酪の散在している様な部分でもB_{1+2c}枝のa枝を除き第4分枝まで気管枝病変が見られた。又病巣別に空洞、被包乾酪巣、小被包乾酪巣と分け、その誘導気管枝に就いて見たが明らかな病変の質的変化は見られなかった。この肺全体に散在する細葉性結節性病巣は約200ヶの多きを数えた。又幹の区域枝には大きな淋巴腺腫脹が2ヶ見られた。

この症例の気管支造影所見と気管支病変とを比較すると(表2中◎印は造影所見と切除肺所見部位の適応部である)、1) 造影上気管枝が一般に上方に引上げられ肺尖枝が円後方に偏位していたが、これはS_{1+2a}区域の強い傍側無気肺を伴った硬化性空洞及びS_{1+2b}区域に散在する硬化性被包乾酪巣の為、及びその癒着肥厚した肋膜の収縮機転で偏位しているものと思われる。2) B_{1+2a}枝の内上方枝(a)には、その狭窄中絶像はa-a'枝に一致しており、この部分には組織学的にも狭窄を示し、尚その末梢には2ヶ処(E, S)に病変が見られた。拡張凸形中絶像はa-b'枝に一致し、そこには狭窄と気管支炎が見られ、尚末梢に5ヶ処(S, B3, B2)の病変が見られた。広く拡張した凹形中絶像

はa-c'枝に一致し、気管支周囲炎が見られ、その末梢には1ヶ処(B)の病変が見られた。中間枝(b)の狭窄中絶像はb-c'枝に一致し、気管支の線維化像が見られ、尚末梢に2ヶ処(B, S)の病変が見られた。下方枝(c)のレリーフ像が鋸歯状を呈しているのはc-b'枝に一致し(表中~~~~で示す)、組織学的に気管支が蛇行し拡張、狭窄の像が交互に存する為に見られた(写真5)。幹の太い部分は拡張像に一致する所も見られ、線維化の像が見られたが、尚その他に多くの気管支変化が存在していた。3) B_{1+2b}枝では内上方枝(a)の第4分枝の太い部分にはそれに相当する組織学的所見が見られず、第5分枝の狭窄中絶像には狭窄、気管支炎が見られ、尚末梢には1ヶ処(B, P)の病変が見られた。中間枝(b)の第4分枝には組織学的にも拡張像が見られた。拡張中絶像は組織学的に拡張像が見られ、尚末梢には6ヶ処(B₁, C₁, E₂, S₁, B, E₁)の病変が見られた。側下方枝(c)は1)に述べた機転によつて上方に引かれ彎曲せるものと思われる。4) B_{1+2c}枝は前記と同様に彎曲しているものと思われる。尚末梢には3ヶ処(B₁, E₁, E, F, B₁)の病変が見られた。5) B₃枝は造影上一般に細く見られたが、組織学的にその所見はなく、a枝に4ヶ処(E, B₂, S, B₁, S, P, B₁) b枝に1ヶ処(S, B)の気管支病変が見られた。

気管支造影上所見の見られない正常と思われる部分に於ける気管支病変は造影上所見の見られるものより遙かに多く見られた(105ヶ処中73ヶ処)。空洞及び大病巣では同一区域の数本の誘導気管支となつていた。又空洞には他区域枝より誘導気管支が入つてゆくのが見られる所もあつた。普通写真上 S_{1+2a} 区域の病巣は撮影されているが、S_{1+2b} 区域にある大被包乾酪巣群は現われていなかった。然し化学療法前のレ線上病巣範囲内には肺病変が見出されていた。巣門結合像はその所属病巣の誘導気管支で気管支病変が多へ見られた。断層写真上 S_{1+2a} 区域の空洞像はより明らかであるが S_{1+2b} 区域に見られる病巣は普通写真と同様明らかでなかつた。又洞門開口部は渡部氏2型を呈していたが、組織学的にそこには狭窄と気管支炎とが見られた。結核菌は術前胃液陽性であり、肺病変の尚軟化崩壊過程の像を裏づけていた。気管支鏡所見では気管支病変が見られなかつたが、B_{1+2a}, B_{1+2b} 枝の区域枝である第3分枝に気管支病変が見られていた。

症例2. 増○ 24才 ♀ IV A₃₁ 型

患者は昭和27年4月集検で右上肺野に病巣を発見さ

れた。主病巣はS₂区域にある如く2×2cmの大きさの薄い円形病巣で岡氏病型IV Bb₁型を呈していた。PAS 1200gを服用し普通勤務していたが、昭和28年10月その病巣は悪化拡大し、ここでSM35g, PAS1200gを使用した。29年1月風邪引きより喘息様発作を伴うようになった。同年5月断層写真で内径2.3×3.2cmの大きさの空洞を発見され同年6月入所した。

菌は塗抹GⅦ号、入所時より術前までSM35g, PAS 1200g使用、空洞は漸次縮少し、普通写真上1.5×1.8cm、断層上1.8×2.3cmの大きさで見られた。巣門結合像は明らかで、又断層上誘導気管支は渡部氏3型を呈していた。即ち術前レ線上岡氏病型分類のIV Aa₁型を呈していた。合計SM70g, PAS3600g使用して29年10月右上葉切除手術を施行した。術前気腹10回施行、肺活量3400ccm、左右別肺活量右1760ccm、左1800ccm、分時酸素消費量148cc、140ccであつた。結核菌は術前3ヶ月まで陽性であり、体重は43kgであつた。

気管支造影所見：立体写真及び図解は写真8の如し。1) 喘息性の為か気管支は一般に細く、且上葉3分枝は本幹よりやや離れて存し、又気腹の為にB枝は上方に偏在している。2) B a枝内側第5分枝には凸形中絶像が、亦外側第5分枝には狭窄中絶像が見られ、後者は空洞へ通ずる如く見られる。3) B b枝の前方第4分枝の位置で直接空洞へ注入する像が見られた。

気管支鏡所見：なんら異常は見られなかつた。

切除時所見：肺尖部に索状癒着4ヶ処が見られた他肋膜癒着は見られなかつた。

切除肺の組織学的積影図：図4の如し。S₂区域には

図 4

比較的良好に被包された雀卵大の中心部の崩壊した空洞が見られ、又直接誘導気管支が開いている像が見られた。この部位の周囲には小転移の病巣が多数見られた。詳細に検討してみると空洞は比較的良好に被包された濃縮空洞で誘導気管支開口部に一致して乾酪物質の崩壊が見られた。その部分の肉芽形成はかなり著明に見られたが、尚乾酪物質はかなり厚く附着していた。誘導気管支は粘膜下細胞浸潤の見られる慢性気管支炎像を呈していた。S₂区域にある肋膜の一部は主病巣に一致して肺内に入りこむようになって見られ、且気管支に原因を求められる如くその部分は無気肺状を呈して見られた。S₂及びS₃区域の病巣は被包乾酪巣の散布で非常によく被包されているが一部には被膜は薄く又被膜周囲に細胞浸潤がかなり見られるものもあつた。

これら病巣の一部には崩壊像の見られるものもあつた。

これらの気管支病変は図4の如く、S₁区域には病巣も少く1a枝の末稍5分枝以下に5ヶ処 (E1, E.P1, S2, C1) の気管支病変が見られた。1b枝では末稍に1ヶ処 (P) の病変が見られた。主病巣のS₂区域の枝はその気管支病変最も多く、殊に空洞への誘導気管支であるB2bの中間枝 (b') には変化が著明であつた。即ち第5分枝以下に10ヶ処 (B2, C1, B.C1, S.F1, E1, E.B1, E.P1, E.F1) の気管支病変が見られた。B2a枝の外側枝 (c') は上記の空洞への誘導気管支となり、内側枝 (a') は被包乾酪巣群へ通じ、中間枝 (b') にはリンパ腺が穿孔していた。

この枝では第5分枝以下に8ヶ処 (C3, B1, S3, S.C1) の病変が見られ、共にB2a, B2b枝の第4分枝に2ヶ処 (F, P) の病変が見られた。又B2a, B2b及びB1a枝の枝には狭窄像が多く、この中には病巣による圧迫性気管支狭窄像が見られた。即ちこれらは上記のS₂区域に相当する無気肺像の原因として求められると考えられる。S₂区域には小被包乾酪巣の散布が見られ、3c枝には気管支病変の散布を思わせる像が見られた。第5分枝以下には3a枝に2ヶ処 (S2), 3b枝1ヶ処 (E), 3c枝1ヶ処 (C) の気管支病変が見られ、幹の第4分枝には狭窄性で3ヶ処 (B1, F1, P1) に病変が見られた。

ソフトックス写真—病巣は明らかに見られ、且誘導気管支2b枝が空洞へ連絡する像が見られた。

以上気管支造影所見と気管支病変とを比較すると、1) 造影上全般に気管支は細く見えるが、組織学的にはそれ程狭小でなく喘息性咳嗽の為と思われる。又造

影上3区域枝は本幹より離れて存しているが組織学的には原形の如くならずこの関係は明らかでなかつた。2) B2a枝の凸形中絶像はリンパ腺穿孔による中絶像で、乾酪性気管支炎が見られた(写真9)。又狭窄中絶像を呈している誘導気管支と考えられた枝は組織学的に明らかに誘導気管支で、乾酪性気管支炎が著明で内腔の狭窄が見られ、両者は造影所見と略々一致していた。尚末稍には6ヶ処 (C2, B1, S3) に病変が見られた。3) B2bの中間枝 (b') は直接空洞に通じていたが、乾酪性気管支炎像はなく、比較的变化の少ない気管支炎像が見られ、造影上空洞内へ流入する所見が容易に得られたものと思われる(写真10)。尚第4分枝以下の末稍には9ヶ処 (B1, C1, B.C1, S1, S.F1, E1, E.B1, E.P1, E.F1) に気管支病変が見られ、且B2a, 2b枝の第4分枝にも病変が見られ、組織学的に広汎に小病巣が存在していた所見も程度度うなづけるものと思われる。

気管支造影上所見の現われない部分にも組織学的に尚気管支病変が多く(39ヶ処中27ヶ処)、S₂, S₃区域の枝には気管支病変も少く、従つて肺病変も少なかつたが、B1a, B3c枝には乾酪性気管支炎が見られ、B3枝の幹の方にも相当の変化が見られた事は注意を要するところである。B2a, 2b枝、一部Ba枝の狭窄像はそのS₂区域に相当する末稍肺の無気肺像の原因として考えられてもよいであろう。空洞並びに大病巣には同一区域枝よりの誘導気管支が数本入っているのが見られた。

普通写真上S₂b区域の空洞像は明らかに見られるがS₂a区域に存在する被包乾酪巣群は現われていなかった。然し増悪時のレ線上の病巣範囲に知られていた。果門結合像は誘導気管支で病変も多く見られた。断層写真上にも上記同様S₂aの病巣は認められず、誘導気管支と思われる部分は渡部氏3型を呈し、組織学的には気管支炎像が見られた。結核菌は術前3ヶ月まで陽性であつたが、尚かなりの滲出性病変が存在していた。気管支鏡所見上異常を認められなかつたが、B2a, 2b, B3枝の幹には気管支病変が見られた。

症例3. 飯○ 男 36才 VII型

表3に示す如く、昭和22年咯血を以て発病、自宅療養と出勤をくり返し乍ら漸次悪化、27年3月右中肺野に空洞(3.0×1.5cm)を発見され、4月よりSM40g, PAS1000g使用、28年1月横隔膜神経圧挫手術後2ヶ年気腹が続けられた。

咯痰中結核菌塗抹陽性であり、計SM60g, PAS2200g

表 3

年月	22	27	28	29	29	30	30
	4	3 4 5 6	1 2 3	8	3	8 9 10 11 12	1 2
T.B菌		トV		バ(+)	バ(+)	バ(-) Ⅷ Ⅵ	バ(-)
X所見 及 経過	発病 (咯血)	右 肺 萎縮 型	右 肺 萎縮 型	Tomato 6cm	入所 (咯血)	右下葉入口見えない 気管支鏡下に 血痰多し	中下葉切除 退所
S.M.		40g	10g			50g	50g
PAS						1800g	1800g
気腹			気腹→			2ヶ年後切除	
肺活量						1400(-66%)	1400
体重 (身長)				48(161)	49		48

使用し、30年2月右中、下葉切除術を施行した。

普通写真は写真11の如く、下部に帯状無気肺像が著明であり、断層写真にても同様の所見が見られた。気管支造影断層写真にはB8枝が空洞(1.5×2.0cm)への誘導気管枝として認められ、開口部は渡部氏3型を呈していた。気管支鏡所見は咳嗽発作が強く出来なかった。

気管支造影所見：写真12の如く、1) 気管支は一般に大きなぎざぎざのレリーフ像を呈した念珠状拡張が見られ、殊にB9、B10枝に著明である。2) B8枝の誘導気管枝像は第6分枝で凸形中絶像を呈していた。

切除時所見：肋膜の癒着は上葉全般に瀰漫性に拡がり、鬆粗性であるが、殊に前下部及び横膈膜肋膜洞即ち中、下葉の一部では癒着性癒着を呈していた。横膈膜面の中間部は鬆粗性の癒着が見られた。中、下葉の肺は挙上された横膈膜の上に殆んど無気肺状に平たく戴っている格好であつた。

切除肺の病理組織学的積影図：図5の如く、肺の虚脱による縮小に拘らず各切離面全体に拡張された気管

図 5

支が見られ、壁の充血、線維化が著明で気管支は逆に大きくなって見られる(写真13)。又これに伴う動静脈が単位面積に比して数多く見られた。これらの変化は肺実質が気腹により全体の容積の減少を来し、一方肺動脈の肥大に伴う気管支の充血が強く、気管支炎の像が出てきたものによると考えられる。主病巣のS8区域のB8b枝に所属する空洞は、空洞壁が厚く肥厚し、内面に厚い乾酪層が附着し、一部は内面に向つて崩壊し、その部分には滲出像が見られたが、空洞の側

側は肋膜に達し、その部の肋膜は厚い肝臓体を形成していた。空洞後半部の乾酪物質はやや濃縮していた。B8a枝に所属する空洞も略々同様な性質を有していた。気管支病変は表4の如く、8a枝には第5分枝以下に2ヶ処(E.B1, S.C1)、8b枝では第5分枝以下に6ヶ処(E.C4, E.B2) 幹枝の第3、4分枝に乾酪性気管支炎が2ヶ処に見られた。空洞の誘導気管支(8b枝)は急性の乾酪性気管支炎が強く、粘膜下細胞浸潤、浮腫、上皮の剝離、構造の改築を来している(写真14)。S9区域の9a枝に所属する病巣は結核腫様であり、9b枝にはあまり病巣が見られなかった。この気管支病変は表中の如く、末梢に9a枝には1ヶ処(C)、9b枝に2ヶ処(C)の気管支病変が見られた(写真15)。S10区域の10a、10b枝に属する病巣はやや濃縮した壁の厚い空洞が見られ、10c枝に属する病巣は小被包乾酪巣群が見られた。S10区域の気管支では10a枝の第5分枝以下に8ヶ処(G1, E.C4, E.B3, S.C1)、10b枝に3ヶ処(E.C3) 10c枝に3ヶ処(E.C1, E.B1, S1)の気管支病変が見られた。又第4分枝には全体で5ヶ処(C)に病変が見られた。S6区域の病巣は小被包乾酪病巣が大部分であり、6a枝の末梢に1ヶ処(C)、6c枝に4ヶ処(E.C2, E.B1, S.C1)の病変が見られた。S7区域では小被包乾酪巣も少く、従つて気管支病変は全般的な拡張が見られるのみであつた。中葉での病巣は小被包乾酪巣の散在が見られるが、気管枝には4b、5a枝の第5分枝に乾酪性気管支炎が見られた。

以上の如く気管支病変は線維化を伴つた拡張像が著明で、その他には乾酪性気管支炎が最も多く見られた(C27, B7, S4, G1)。

気管支造影所見と気管支病変と比較してみると、1) 気管支の拡張像は組織学的にも一致している。レリーフ像の念珠状拡張は咳嗽反射の強い為及び気管支壁の

表 4

分枝		Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ
区域	枝					
E	4	4 b (C)				
	5	5 a (C)				
	6	<div>●■ 6 a (C)</div> <div>6 c (C)</div> <div>6 c (C)</div> <div>6 c (C)</div>				
	7					
	8	8 元 (c)	8 b (c)	<div>● 8 a (B)</div> <div>● 8 b (C)</div>	<div>● 8 b(B.B)</div> <div>⊙● 8 b(C.C)</div>	● 8 b (C)
	9	9 b (C) ●▲ 9 a (C)				
	10	9 b (C)				
S	6	10 a (B)				
	8	10 a (C)				
	10	10 b (C)				
		10 c (B)				

線維化肥厚によるものと思われる。2) B8枝の誘導気管支の凸形中絶像は表中●印で、ここには組織学的に拡張と乾酪性気管支炎像が見られた。

造影上の気管支所見では、拡張像は組織学的にも一致して見られたが、他の質的要素は明らかでなく、造影上に現われない所見が多かつた(拡張像を除き39ヶ処中38ヶ処)。普通写真上空洞像は明らかでないが、組織学的には空洞も多く、その他の病変もかなり多く見られた。带状無気肺像は組織学的にも一致して見られた。断層上空洞は一個は明らかであるが、他は上記の普通写真所見と同様であつた。造影断層上誘導気管支像が明らかであり、渡部氏3型を呈した部分には組織学的に乾酪性気管支炎が見られた。結核菌は術前まで塗抹陽性であり、肺病変の尚滲出性病変に一致していた。気管支鏡は咳嗽の為出来なかつたが、組織学的には下葉B8区域枝に乾酪性気管支炎が見られていた。

症例4. 林○ 27才 ♂ VII型

患者は昭和27年2月咯血し、レ線上左上肺野に広い浸出像を発見され、又右肺尖野にも散在性の病巣が認められて入院した。ここでSM60g, PAS2100g, ヒドラジット(INAH)1ヶ月、ティビイワン(TB₁)2ヶ月間服用した。断層写真上空洞が認められていたが退院し、仕事の都合上普通勤務していた。28年7月再度咯血し、レ線上空洞の拡大が認められ、同年10月入所した。

入所時より化学療法SM35g, PAS1200g使用し、術前気腹4回施行した。合計SM95g, PAS3300g, INAH6g, TB₁8gを使用して29年2月左上葉切除術を施行した。肺活量3400ccm, 体重62kgであつた。

普通写真上病型はⅦ型に分類され、空洞は経過断層写真上種々の大きさに変化していた。即ち27年3月内径1.5×2.0cm(外径3.5×1.5cm), 28年3月1.0×1.0cm(清浄化され壁薄く), 同年7月2.8×2.5cm(3.5×3.5cm), 同年12月2.0×1.5cm(3.0×2.5cm)であつた。又断層上見られた誘導気管支開口部は渡部氏2型を呈していた。結核菌は入所時GⅦ号で、術前2ヶ月まで陽性であつた。気管支鏡所見は異常を認めず、左右別肺活量は右1990ccm, 左1000ccm, 酸素消費量は210cc, 169cc, 左右別菌培養検査では左側菌陽性であつた。

気管支造影所見: 写真16の如く、1) B₁₊₂枝は一般に上方に引上げられている。2) B_{1+2a}枝の内側第5分枝には平滑中絶像2ヶ処、外側枝には狭窄中絶像が見られる。3) B_{1+2b}枝の上方第5分枝には平滑中絶像、同じく下方枝の上方に向く枝にはM型中絶像、水平像には平滑中絶像が見られる。4) 一般に幹の方は拡張像が見られた。

切除所見: 肺尖S_{1+2a}, b区域は強固に癒着し、肋膜の肥厚は強く、上、下葉間には線維性癒着が見られた。

切除肺の病理組織学的積影図: 図6の如し。S_{1+2a}区

図 6

域にはいくつかの小被包乾酪巣が見られ、後方にある大きな病巣は崩壊し空洞を形成していた。この空洞には B_{1+2a} のb枝が入り、ここには狭窄及び乾酪性気管支炎が見られた。この B_{1+2a} 枝全体には末梢及び中枢側にわたり線維化の傾向が大で拡張像を帯びている(10ヶ処)。これを除き8ヶ処(S_4 , B_1 , P_1 , C_2)に気管支病変が見られた。 S_{1+2b} 区域には隋円形の病巣($20 \times 10\text{cm}$)で周囲は無気肺状を呈し、内腔($7 \times 8\text{cm}$)に崩壊を示す空洞が見られ、この空洞壁には不規則な亀裂の入った乾酪物質がかなり厚く見られ、まだ軟化してから間もないものと考えられる空洞であった。病巣被膜は炭粉沈着を伴う乾酪物質と境の明らかな線維性被膜からなっている。この病巣肺門側は複雑な凹凸を示す厚い細胞浸潤の層を有する肉芽組織が見られ気管支が開いていた。又この病巣周囲には小散布巣が数個附随して放射状の収縮が見られた。これに属する気管枝は S_{1+2b} 枝の多くが空洞の誘導気管枝として通じており、b枝の第4分枝の位置で直接空洞へ入る誘導気管枝を形成しており、全般に気管枝の炎症が強く、空洞開口部分には気管枝拡張強く漸次空洞に達し、その部の気管枝は空洞の性格を有し類上皮細胞を含む所謂結核性肉芽の層が厚くなっている(写真18)。又中枢のa', b'枝の第4分枝には線維化が強く一部に閉塞像が見られ、病巣周囲の無気肺像の原因と考えられる(写真17)。 B_{1+2b} 枝全体では拡張、線維化像を除き23ヶ処(C_{12} , P_6 , S_3 , B_2)に気管枝病変が見られた。 S_{1+2C} , S_3 , S_4 , S_5 区域に見られる病巣は小被包乾酪巣の散在で、ここには気管枝の特異な変化が見ら

れず、幹、末梢共に粘膜は略々正常で、且壁の線維化が著明で拡張像を呈している。殊に B_4 , B_5 枝は気管枝拡張が著明に見られた。

ソフトックス写真上空洞への誘導気管枝として B_{1+2a} , b枝の一部の枝が明らかに見られた。

気管支造影所見と気管支病変を比較すると、1) B_{1+2a} , b枝が共に上方に偏在するのは気腹の機転と硬化性病巣の存在並びに肋膜の癒着肥厚及びその収縮機転によつて起つたものと思われる。2) B_{1+2a} 枝の内側枝(a'枝)の平滑中絶像は乾酪性気管支炎によるものと思われ、外側枝(b'枝)の狭窄中絶像は該枝が空洞への誘導気管枝であり、組織学的に乾酪性気管支炎が見られたことによる。4) 一般にこれら幹側の拡張像は組織学的に気管壁の線維化拡張により惹起されたものと考えられる。

造影上所見の見られない部分の気管枝病変は造影所見よりも多く(拡張像を除き31ヶ処中25ヶ処)、病巣の少い部分にはそれに伴い気管枝病変が少なかった。空洞には同一区域枝の数本が誘導気管枝として入っているのが見られた。普通写真上空洞像は不明で散布巣が見られていたが、組織学的には空洞、被包乾酪巣が数多く見られた。然しこれらは化学療法前のレ線上の病巣範囲に見られたものであつた。巢門結合像はその誘導気管枝で、該部に多くの気管枝病変が見られた。断屑写真上空洞及び散布巣は比較的良好一致して見られ、誘導気管枝は渡部氏2型で、組織学的には乾酪性気管支炎が見られた。結核菌は術前2ヶ月まで陽性で、病巣は尚崩壊過程にある状態が見られた。気管支鏡所見上異常を認められぬが組織学的に気管枝の線維化、拡張、狭窄像が見られた。左右別培養の左側結核菌陽性は病変の存在と進行性を表示するものであつた。

症例5. 伊○ 女 28才 VII型

患者は昭和24年5月左湿性肋膜炎をおこし、同年7月右上肺野に浸潤性病巣が発見された。ここでSM20g使用、同年8月より25年11月まで右気胸を行った。27年7月同側に広汎なシェーブを生じSM40g, PAS 1800gを使用した。30年5月右中肺に空洞が認められINAH54g使用した。31年3月より入所までSM26g, INAH5g, PAS900g使用したが、結核菌は尚陽性であつた。

31年6月入所、引き続きSM, INAH, PAS併用を行い、結核菌は漸次少なくなり培養陽性の程度となつた。この際耐性検査(SM, INAH, PAS)で菌の抵

抗性は認められなかった。合計SM145g, INAH80g, PAS5200g使用し、シェーブ病変は消失して、32年2月右肺摘出術を施行した。術前肺活量2300ccm, 体重50kgであった。

普通写真上, 大きな病巣はなく小病巣が散在し, 肋膜の肥厚像と横隔膜の挙上, 一部に病巣と癒着ある如く突出像が見られ, 心臓及び縦隔は右側偏位の像が見られた。病型はⅦ型に属している。断層写真上中肺野に空洞(1.5×2.0cm)が見られ, 横隔膜面の強い癒着像が見られた。気管支鏡上, 右上葉枝の変形が見られ, 各区域枝口の区別が出来なかった。左右別肺活量右385ccm, 左1705ccm, 分時酸素消費量0, 110ccであった。

気管支造影所見: 写真19の如し。1) 右上葉枝にはB₁枝に拡張中絶像が見られ, B₂枝と共に拡張集束状を呈しており, その多くは円柱状拡張である。B₃枝もその集束中に存するも略々正常に見られる。2) 中葉枝, 下葉B₆枝は皆集束し, 乱れた像を呈している。3) B₈枝の一枝は太く, 円い中絶像を呈している。4) B₁₀枝には一部囊状の拡張像あり, B₉, B₁₀枝共に念珠状の拡張像が多く見られた。

切除時所見: 病巣はS₂, S₃, S₄に散布巣が見られ, S₈区域には大きな病巣をふれた。癒着は肺尖に強くS₆区域と上記病巣に線維性癒着が見られ, 横隔膜面には殊に強度の癒着が見られた。

切除肺の病理組織学的積影図: 右肺の全体図は図7

図 7

の如し。上葉, 中葉には小被包乾酪巣群の散在が見られ, 下葉S₈区域にはB_{8a}枝に所属する空洞(1.5×2.2cm)が見られた。又S₉区域のB_{9a}枝に所属して空洞(1.0×1.2cm)が見られ, その他には小被包乾酪巣の

散在が見られた。

上葉の積影図は図8の如し。上葉全体は著明な収縮

像が見られ, 肺実質は全体に線維化が強く, 気管枝も同様に線維化が強かつた。比較的細胞浸潤の少い囊腫状の気管枝拡張が所々に見られ, 又この様な末梢の拡張性気管枝にはその中樞に狭窄像が見られた(写真20)。

上葉の肺病巣は少く一部に気管枝拡張の部分で小病巣に開いている像が見られた。

中葉には特異的気管枝変化は見られなかった。

下葉には病巣並びに肺実質の線維化が多く, 病巣間には多少肺気腫状の部分も見られた。S₃区域の前方病巣には変化が少く, 気管枝には拡張が見られ, 粘膜下の浮腫が目立っていたが一般に急性炎症像は少く古い気管支炎の像が見られた。即ち粘膜下の弾力線維が引張られ, うすくなつており, 上皮には殆んど変化は見られなかった。中間部病巣では空洞が著明となり, 壁の厚い空洞が見られ気管支上皮は一部欠損し, 従つて気管支は薄くなっている像が見られた。後方病巣は空洞(1.5×2.2cm)が見られ, 厚い壊死層と肉芽層を有し, 被膜は完全に線維化しており, 気管枝は拡張性で細い部分まで拡張していた。誘導気管枝開口部には処々に乾酪性気管支炎が見られた(写真21)。S₉区域のB_{9a}枝には空洞(1.0×1.2cm)が見られ, この誘導気管枝の上皮は略々正常であり, 気管支拡張性空洞であつた。S₉, S₁₀区域は拡張の著明な区域であり, これの積影図は図9に示す如くである。気管支拡張の部分は肺間質の線維化による索引性拡張であり, 細胞浸潤を伴っていた。又狭窄の場合はこの間質は浮腫, 細胞浸潤が見られ, 気管支圧迫があり逆の関係となつているが, 或いは慢性炎症性の変化による狭窄像が見られ

図 9

た。気管支は一般に拡張が見られ、これには線維化が著明であり、ない場合には気管支に細胞浸潤、筋の断裂又は細胞浸潤による組織軟化が見られた。部分的には気管支の変化は軽いか、或いは殆んど見られなかつた。病巣に接して部分的に乾酪性気管支炎も一部に見られた。

造影剤注入（鉛丹）ソフテックス写真—上葉枝の拡張像B 8, B 9枝の誘導気管支が著明であり、一部に空洞内へ注入された像が見られ、又B10枝の拡張像も見られた。

気管支造影所見と対比すると、1) 上葉枝B1, B 2枝, 下葉枝B 8, B 9, B10枝に見られる拡張像（円柱、嚢状、念珠状）は肺実質の線維化、それに伴う気管支線維化による拡張像であり、その中枢側には狭窄を見る場合、時に拡張の見られる場合もあった。又一部中絶像は造影剤の入らなかつた為である。2) 上葉枝の全部及び中葉枝、B 6, B 8枝の集束像は気胸による偏位、癒着、肋膜の肥厚による組合せでおこつたものと思われる。3) B8枝の太い円形中絶像は組織学的に拡張と誘導気管支となつて、そこに乾酪性気管支炎が見られた。4) B10枝の拡張像は1) に述べたる如くで、その他の気管支変化には線維化の他、変化は少なかつた。

気管支造影上に現われない病変はこの場合少いが、その質的变化には種々の病変が見られた。これらの変化は気胸後に気胸によつた変化、肋膜の変化とて気管支走行、内腔の変化を二次的におこし、そこに気管支の線維化、拡張像が著明になつたものと思われる。普通写真上では空洞は明らかでなく、その他の病巣位置は略々一致して見られたが、組織学的には尚多くの空

洞、他病変が見られた。肋膜の変化、縦隔洞、心臓偏位は気胸後の肋膜変化、癒着によるものと思われる。断層写真上一個の大空洞だけ見られ、誘導気管支は明らかでないが、組織学的に乾酪性気管支炎が見られた。結核菌塗抹陰性、胃液培養陽性で、組織学的に尚病変の崩壊過程の見られるのに一致していた。気管支鏡に見られた上葉枝口の変化は気胸後における変化及び気管枝の線維化による変化であろうかと思われる。

小 括

気管支造影所見は勿論よく造影されたものにより判断せねばならない。

1) 気管支造影上所見：ⅣAa1型の第1症例中、気管支の偏位は硬化性病巣の位置と、肋膜の肥厚、癒着による収縮機転によるものであり、拡張、狭窄、中絶像は形態的には多く一致して見られたが、組織学的には種々の気管支病変が見られた。気管支レリーフ像の鋸歯状を呈した部分には気管枝の蛇行と、拡張、狭窄像の交互に存在する為であつた。第2症例には気管支の異常分岐が見られ、全般的気管支の細い像は喘息性の為と思われる。又ここに認められる種々の中絶像はその部位に乾酪性気管支炎を呈する場合が多かつた。一部に気管支淋巴腺穿孔による中絶像も見られた。空洞内に注入された誘導気管支が造影上見られたのは該部の気管支変化が比較的少なかつた為と思われる。Ⅶ型の第3症例では気腹による肺全体の容積縮少と肺底部の無気肺像が著明に見られ、気管支は一般に虚脱による肺実質の狭小に伴い、気管枝壁は肥大、線維化による拡張が見られ、造影上念珠状拡張が見られた。空洞への誘導気管枝で中絶像を呈していたものは組織学的にそこには乾酪性気管支炎が見られた。第4症例では造影上気管支偏位及び瀰漫性気管支拡張が見られたが、前者は第1症例と同様の機転により、後者は第3症例の如き気管枝の線維化によつて惹起されたものと思われる。又造影上の異常所見は形態的には一致し、該部に乾酪性気管支炎が見られた。第5症例では気管支の集束像が見られた。この変化は気胸による機転と気胸後の肋膜肥厚

及び癒着に関係するものと思われる。

又組織学的に肺実質の線維化に伴い気管支の線維化も著明となり、それによつて造影上気管支の拡張像（円柱，嚢状，念珠状）が見られた。又誘導気管支の中絶像は乾酪性気管支炎によるものと思われる。以上造影上拡張像は形態的には多くは一致している。狭窄像も同様で、且つ病巣と関係ある時は乾酪性等の高度の気管支病変が比較的多く見られた。

2) 気管支造影上に現われない気管支病変：ⅣA型の第1，2症例で144ヶ所中100ヶ所であり，Ⅶ型の第3，4症例では気管支の線維化，拡張を除き70ヶ所中63ヶ所であつた。即ち造影上所見の現われない部分にも尚相当の範囲に気管支病変が存在していた。

3) 病型と気管支病変：ⅣAa1型の2症例では全体に144ヶ所（E40，S37，B29，F16，P13，C9）の気管支病変が見られ，拡張，狭窄像を除くと第1症例には気管支炎が，第2症例には乾酪性気管支炎が多く見られ，且造影上病巣の見られぬ部分にも存在していた。Ⅶ型では3症例共に気管支壁の線維化が強く，それに伴つて拡張像が見られた。これを除き第3，4症例全体に70ヶ所（G1，C41，S11，B10，P7）の病変が見られた。3症例共に病巣，気管支には滲出像が強く，気管支には従つて乾酪性気管支炎が多く見られた。第3症例は気腹，第5症例は気胸による変化が見られ，第4症例はその中枢側に狭窄があつて，末梢性無気肺像が見られた。第5症例には又同様に，著明な拡張像が見られ，その中枢側に狭窄が多く見られ，一部には気管支拡張性空洞が認められた。これら症例の気管支病変の範囲は化学療法前又は増悪時のレ線上の病巣範囲に相当して見られた。

4) 誘導気管支について：造影上一部に見られたが，空洞並びに大病巣では多くは組織学的に数本の誘導気管支が見られており，同一区域の同一枝又は他の枝より入り，時に他区域枝より入る場合も見られた（第1症例）。これら誘導気管支は多くは乾酪性気管支炎，気管支炎の

病変が見られ，造影が空洞に入る第2症例ではその開口部の気管支炎が比較的かるいために造影剤の注入を見たものと思われる。

第5症例では気管支拡張性空洞を呈した部分も見られた。

5) 普通写真上：術前レ線上空洞の明らかでないものもあつたが，巢門結合像は組織学的にも誘導気管支で且気管支病変が最も多く見られた。又術前レ線上，化学療法後病影の消失が見られるが，組織学的には尚大病巣が存し，殊にⅣAa1型では相当大きな病巣が見られた。これら肺病変は化学療法前のレ線上の病巣範囲にあつて且，それに伴つて気管支病変の散布が見られた。

6) 断層写真上：肺病巣の空洞像は明かにされることが多く，又誘導気管支像も見られ，渡部氏2，3型を呈した部分には乾酪性気管支炎，気管支炎が見られた。造影断層写真は誘導気管支像をつかむによい方法だと思われた。断層上，普通写真同様撮されぬ病巣が数多く見られた。

7) 化学療法との関係：5症例は皆断続的使用例である。第1症例（SM55g，PAS1700g），第2症例（SM70g，PAS3600g），第3症例（SM60g，PAS2200g），第4症例（SM95g，INAH6g，Tb18g，PAS3300g），第5症例（SM145g，INAH80g，PAS5200g）であり，各症例間の化学療法使用による特異的变化の差は明らかでなかつた。

8) その他：結核菌は各症例共に術前若しくは数ヶ月前まで陽性であり，組織学的に尚滲出像の多い病変が見られたことに一致している。気管支鏡所見上では各症例共に病変が認められなかつたが，組織学的には気管支病変が見られることが多かつた。第5症例における上葉枝口の判別が出来なかつたのは，気胸による偏位と組織学的に気管支の線維化が強かつたものと思われる。手術後の造影所見では，上葉切除の場合には中葉，下葉殊にS₆区域の枝がよく延びている像が見られた。

結 語

切除肺のツエロイジン、一部パラフィンによる連続切片の組織学的所見と気管支造影上の所見及び普通、断層、写真、喀痰中結核菌、気管支鏡ソフトックス写真等とを比較検討し、岡氏病型の空洞性結核のⅣA型、Ⅶ型計5例について次の如き結果を得た。

即ち各病型、各症例によつても異なるが、これらの変化は肺病巣の新旧、拡がりの広さ、性質（成立機転）、臨床経過によつて、且化学療法の種類、方法、期間、使用時期等によつて気管支病変の異なるは勿論であるが、総じて見られる変化は、

1) 気管支造影上の変化は組織学的所見に比べると、拡張、狭窄、中絶像等が著明でない場合は明らかでないが、その所属する気管枝末梢に肺病巣がある場合には、該部に気管支病変が認められた。2) 組織学上の気管支病変はその所属する肺実質の病変を伴う場合は著明であり、殊に開放性空洞の場合にはその傾向が強いが、然し気管支造影上の変化では証明出来ない場合も多い。3) 気管支造影上、気管支の変化のない場合でも、その所属する肺実質に小被包乾酪巣しか認められない場合、或いは病巣がなんら存在しない場合でも、肺病巣の拡がりが広

い場合には組織学的に気管支病変が認められ、且全気管支病変の3/4がこれに相当していた。

4) この関係はかなり太い幹の部分においても云えた。5) 造影上の所見から質的診断はある程度云えるが、著者の検索したⅣA型では拡張、狭窄が稍々多く、気管支炎、周囲炎、乾酪性気管支炎の順で、他型と比較し気管支の線維化は弱く、拡張像は中等度に見られた。これに対しⅦ型では気管支の線維化、拡張像が強度であり、次に乾酪性気管支炎、気管支炎、周囲炎等比較的高度の変化が著明であつた。6) 誘導気管支の多くは空洞、大病巣では同一区域より数本認められ、一部には他区域枝より入るのが見られた。7) 気管支の偏位は硬化性病巣の収縮機転が、肋膜の癒着及び肥厚と共に大きな要素を占め、又虚脱療法（気腹、気胸）による特異的变化も認められた。

以上気管支造影上、所見のある場合は少くともその2倍以上の気管支病変がかくれていると云える。従つて断層写真、結核菌の有無、気管支鏡所見等は肺病巣並びに気管支病変の推移を知る上に大切である。殊に化学療法前の肺病巣の範囲に相当して広汎に気管支病変が認められることは臨床上最も必要なことであり注意せねばならない事である。

（文献は第2篇にゆずる）

写 真 1

写 真 2

写真3 淋 巴 組 織 の 増 生

写真4 気管支炎による気管支断裂を伴う拡張像

写真5 気管支炎を伴っている気管支の蛇行、拡張及び狭窄の交互の存在

写真6 気管支粘膜の乱れと気管支周囲炎症及び線維増生

写真7 乾酪性気管支炎

写真 8

写真9 リンパ腺穿孔部位

写真10 気管支及び気管支周囲炎

写真 11
(V → D)
(D → V)

写真 12

写真13 気管支の線維化

写真14 空洞開口部と乾酪性気管支炎

写真15 乾酪性気管炎

写真 16

写真17 気管支線維化を伴う気管支閉塞像

写真18 乾酪性気管支炎

写 真 19

写真20 中枢狭窄による末梢部拡張

写真21 誘導気管支開口部附近の上
皮の変化と乾酪性気管支炎