左 親株 (M株), 右 変異株 (K株)
写真 1 *Alcaligenes faecalis* var. *myxogenes*
10C3 のグルコース, 酵母エキス, 炭酸カ
ルシウム培養液に 4 日間培養

サクシノグルカンとカードラン

原 田 篤 也*

1. サクシノグルカンの発見

著者らは石油資源を微生物で活用して有用な化合物を得る目的で研究し、10%のエチレングリコールを唯一の炭素源として生育しうる細菌 10C3 菌株を分離し¹⁾、この菌が乳酸やコハク酸のような有機酸を唯一の炭素源とした培地で生育すると培養液が著しく粘稠になることを観察した。さらにエチレングリコールや種々な糖類を唯一の炭素源とした場合においても培養中の pH を調節させることによって培養液が粘稠になることがわかり、この本体は酸性の多糖類であることがわかった。構成糖の大部分はグルコースであることを認めたが、一般の多くの酸性多糖類が構成成分としてウロン酸を含むのに対してウロン酸を認めることができなかった。そこで酸加水分解物のエーテル抽出物を調べることにしたが、抽出物から容易に結晶物質が得られ、このものがコハク酸特有の味を呈した。このようにしてコハク酸を含む新しい多糖類を見出した²⁾。そしてサクシノグルカン(succinoglucan)と命名した。

2. サクシノグルカンの生産³⁾

このサクシノグルカンを生産する 10C3 菌株は菌体の

周囲に 1, 2 本の鞭毛をもち、酵母汁などの培地では培養によって著しくアルカリ性にするなどから、*Alcaligenes faecalis* に類似のものとみなし、さらに粘質物を多量に生産する意味でその変種として *Alcaligenes faecalis* var. *myxogenes* と命名した。この多糖類はシュクロース、グルコース、キシロース、ガラクトース、セロビオース、マルトース、フラクトース、マンノース、ラムノースなどから、シュクロースで最も高くこの順序で収量よくつくられる。培地としては糖を 4%用いるときには酵母エキス 0.5%と炭酸カルシウム 1%とを加え水道水を用い pH を 7.2 前後にすればよい。グルコース、シュクロースなどからは約 40% の収率である。なお培養中の pH を適当に調節さえすれば、無機の塩類のみからなる糖培地からでも収率よく多糖類は生産される。

代用血漿としてのデキストランが *Leuconostoc mesenteroides* という細菌によって、その菌のつくるデキストランシュクラゼの作用によりシュクロースから生産されるが、他の糖類からは全く生産されない。グルコースをはじめ種々な糖類からサクシノグルカンができるのにはデキストラン生産の場合と異なり、多糖類生成のために数多くの酵素が関与している。グルコースの多糖類へのインコーポレーションの 1 例を示すと第 1 図のごとくなる。これは、一種のグルコサイド結合からのみ

* Tokuya HARADA 大阪大学教授・農博
Succinoglucan and Curdlan

ATP, adenosine triphosphate; ADP, adenosine diphosphate; G, glucose; G-6-P, glucose-6-phosphate; G-1-P, glucose-1-phosphate; UTP, uridine triphosphate; UDP, uridine diphosphate; UDPG, uridine diphosphate D-glucose; PP, pyrophosphate

第1図 グルコースの多糖類へのインコーポレーションの例

第2図 サクシノグルカンと菌体の生成の経過

多糖類のことを考えてのことであるので、コハク酸を含んでいたり2種以上のグルコサイド結合が含まれていればもっと複雑になる。また種々な糖類がグルコースからなる多糖類に変化するためには、それらの糖類がまずグルコースにならなければならないので、糖の種々な転移に関する酵素をも生成されなければならない。

よい培養条件ではグルコースからおよそ乾燥菌体の約5倍 100ml 中約2gの多糖類をつくりうる。多糖類は水によく溶け粘稠なため、培養液は2%にもなると流動性がなくなり、かたまりになる。これを遠心分離して菌体を除くためには約10倍にうすめ1万回転30分の処理を要する。その上澄液に約2倍量のメタノールあるいはアセトンを加えれば寒天状の沈殿物が得られる。上澄液にセチルトリメチルアンモニウムブロマイドあるいは塩化アルミニウムを加えて沈殿させてもよいが、これらの物質を取り除くに手間がかかる。この多糖類の生成の経過を第2図に示す。菌体の生成は1日でほぼ最高に達するのに多糖類は少しおくらせて生成し始め、6日間の培養で最高に達する。炭酸カルシウムは生成してき

第3図 H型、Na型、Ca型サクシノグルカンの赤外吸収スペクトル

第1表 サクシノグルカン 10C3の構造と性質

構成分, 性質	炭素源	
	グルコース	エチレングリコール
グルコース (%)	77.3	70.0
ガラクトース (%)	6.7	5.6
マンノース (%)	1.9	5.0
全糖 (%)	85.9	80.6
コハク酸 (%)	10.6	10.1
コハク酸対グルコース (モル)	0.21	0.22
対全ヘキソース (モル)	0.19	0.19
灰分, H型 (%)	0.6	0.4
Ca型 (%)	3.5	3.3
元素分析	C, 43.36; H, 4.99	C, 44.07; H, 5.62
比旋光度 $[\alpha]_D^{20}$	-15°	-14°
比粘度 (Ca型 1%, 30°C)	2,480	196

た酸性多糖類を中和することになるので、多糖類のカルシウム塩が生成する。

3. サクシノグルカンの構造⁴⁾

グルコースとエチレングリコールとをそれぞれ炭素源とした培地から生成した多糖類の性質を第1表に示す。いずれの培地からほぼ同じような多糖類が生成されるが、粘性の点においては両者の間に著しい差がみられる。コハク酸はいずれの場合も乾燥物の約10%含まれ、糖全体に対してのモル比率では約0.20を示し、ヘキソース約5個に対し1個の割合である。コハク酸は二塩基性酸であり、その一つのカルボキシル基が遊離でもう一つのカルボキシル基が糖のヒドロキシ基とエステル結合をなしているものらしい、赤外吸収スペクトルを第3図に示すが、 $1,730\sim 1,740\text{ cm}^{-1}$ の吸収はエステル結合の存在、 $1,660\sim 1,720\text{ cm}^{-1}$ の吸収は遊離のカルボキシル基の存在、 $1,580\sim 1,620\text{ cm}^{-1}$ の吸収はカルボキシル基のアニオンの存在を示す。 890 cm^{-1} の吸収は β -グルコサイド結合の存在を示す。

さて有機酸を含んだ多糖類としては *Xanthomonas* の菌株⁵⁾ および *Klebsiella rhiinoseleromatis* の菌株⁶⁾ の多糖類また寒天⁷⁾ がビルビン酸を構成分として含むこと、*Penicillium luteum* の多糖類である luteic acid⁸⁾

がマロン酸 1 モル，グルコース 2 モルの割合からなることが知られている。コハク酸をふくむ多糖類は私どもの多糖類以外には知られていない。

4. サクシノグルカンの粘性⁹⁾

粘性は Cannon Fenske Viscometer を用いて測定された。この多糖類の粘性の特徴は(1)H型，Ca 型は植物の多糖類で高い粘性を示すグアガムなどとほとんど同じ程度の高い粘性を示すのに対し，Na 型はほとんど粘性を示さないこと(第4図)，(2)Ca 型のものでは食塩，塩化カルシウムなどの塩類が存在していてもほとんどその粘性に変化が認められないこと，(3)特に興味のある点は粘性測定時の温度をあげていくと，Ca 型のものでは 65.5°C で急に粘性がなくなること(第5図)，(4)また Ca 型は pH 3.5 から pH 10 ぐらいまではほとんど粘性に変化が認められないこと。このように

第4図 サクシノグルカンのH型，Na 型，Ca 型，の粘度と濃度との関係

第5図 サクシノグルカン (Ca 型) の粘度に対する測定温度の影響

Ca 型のものでは無機塩類の添加，pH の変化により粘性に変化が認められないことは食品への添加物として考える場合たいへん都合のよい性質である。

5. カードランの発見

著者らは 30l のジャーフェメンター 4 基を使用してサクシノグルカンの大量培養実験の試みを 1965 年の春に始めた。ところが奇妙なことに 4 日間ほど培養をつづけても全く培養液の粘度が高くならず，サクシノグルカンはわずかしかな生産されてこなかった。一方，加えたグルコースは大部分消費されていた。そこでグルコースからの生産物を調べてみた。かつて著者はある微生物の培地を加熱した後冷して寒天のようにかたまるといった現象をみていた。この場合，残念なことに菌を純粋分離することができず再現することができなかったが，こんな経験を思い出して培養液を加熱してみた。するとおもしろいことに培養液がそのままかたまってしまった。

このようにして加熱するとかたまると多糖類カードラン (curdian) が見出された¹⁰⁾。数年前発酵研の長谷川武治氏らと共同で著者らは酵母の生産する多糖類の研究を始めていたが，その当時心に浮んだことがコンニャクや寒天に近い性状をもつ微生物多糖類を見出すことであった。しかし，単なる夢と考えていた。カードランが見つかった現在，著者らはさらに微生物の種々なひめられた能力をさがし求めるべく努力している。

6. カードランの生産^{11),12)}

このような現象の説明として著者は次のごとく考えた。サクシノグルカンをつくる *Alcaligenes faecalis* var. *myxogenes* 10C3 の菌が変異を起こしジャーフェメンターの培養中その変異株が生育し，その変異株がサクシノグルカンをつくる能力がなくなっていて，そのかわりにカードランをつくるものと考えた。そして保存菌株の中からカードランをつくる変異株を純粋に分離することに成功した。サクシノグルカンをつくる親株とカードランをつくる変異株とはグルコースを含んだ培地で

親株 (M株)

変異株 (K株)

写真 2 *Alcaligenes faecalis* var. *myxogenes* 10C3 のグルコース，酵母エキス，寒天培地に 4 日間培養コロニー

第6図 カードランとタンパク質の生成の経過

コロニーをつくらせると容易に識別できる。糖のない培地では多糖類ができないため識別は困難である。

この変異株Kをグルコース5%、酵母エキス0.75%の培地で培養すると100ml中約2.5gのカードランと約280mgの乾燥菌体をつくる。グルコースに対し約45%の収率である。グルコース、マンノース、シュクロース、マルトース、キシロースなどから多量に生産されることはサクシノグルカンの生産の場合と同様である。この多糖類の生成の経過を第6図に示す。サクシノグルカンの生成の場合とよくにている。培地に添加する有機窒素源としては酵母エキスがすぐれているが、培養中のpHを適当に調節すれば無機塩類と糖のみの培地からでも収率良く生産される。

カードランは不溶性の多糖類であるので培養中には菌体の周囲をとりまいた形で存在している。したがって、培養液を放置しておくで徐々に沈殿してくる。軽く遠心分離すれば容易に沈殿物が得られる。さらに菌体からカードランを分離するには、この沈殿物に0.5Nのカセイソーダを加え、ホモジナイズすればアルカリに溶けてくる。このアルカリ溶液を遠心分離して菌体を除いた後、アルカリを中和すると水を含んだ多糖類が浮遊してくる。これを遠心分離して集めアセトンで脱水乾燥すればよい。

7. カードランの構造¹³⁾

カードランはグルコースのみを構成糖としている。旋光度は $[\alpha]_D^{32} + 18^\circ$ (0.1N NaOH), 赤外吸収スペクトルでは(第7図) 890cm^{-1} に吸収をもちそのグルコサイド結合は β 結合であることを示している。これを過ヨウ素酸酸化した場合過ヨウ素酸消費量は0.04M/Mで、ギ酸生成量は0.03M/Mで糖の結合のすべてが大部分が β -1, 3結合であることを示す。さらにこれをメチル化法で調べると、2, 4, 6-トリメチルグルコースが約97%得られ、ごく少量の2, 4-ジメチルグルコースと痕跡の2, 3, 4, 6-テトラメチルグルコースが得られた。これらの結果は過ヨウ素酸酸化の結果をよく説明し

第7図 カードランのゲル強度と濃度との関係 (90°C 10分加熱処理)

うる。しかしもし他の結合があるとすれば β -1, 6-グルコサイド結合で分岐した側鎖がごくわずかに存在する可能も否定できない。さらに化学的な糖の重合度の測定法すなわちナトリウムボロハイドライドで還元した後過ヨウ素酸で酸化して還元性の末端基から生成したホルムアルデヒドを定量する方法により糖の重合度は約135あるものと推定された。

β -1, 3のグルコサイド結合を大部分あるいはすべてとする多糖類には鞭毛虫類である *Euglena gracilis*⁴⁾と *Peranema trichophorum*¹⁵⁾からの paramylon と *Poriracocos* の pachyman¹⁶⁾ とが知られている。パラミロンはユーグレナの細胞中の顆粒として昔から知られており、デンプンやグリコーゲンと異なる貯蔵多糖類として考えられていたものである。パキマンは菌核の成分の大部分を占める多糖類で菌核は粉末にして茯苓とよばれ、漢方薬(利尿剤)として用いられているものである。 β -1, 3のグルコサイド結合を大部分としてウロン酸を少量含む多糖類としてはカロース (Callose)¹⁷⁾が知られている。このものは高等植物の根毛、花粉管、導管などにふくまれていて特殊な役割をなす多糖類と考えられている。

ある種の豆科植物である *phaseolus aureus* の菌によってのセルロースの生合成の研究中、 β -1, 4のグルコサイド結合をつくる酵素は見出されないで、uridine diphospho glucose から β -1, 3のグルコサイド結合から成る多糖類をつくる酵素が見出された¹⁸⁾。この酵素はキャベツ、パセリ、ハウレンソウ、カボチャなどにも分布しているようで、この酵素が広く分布していることは、これに関連して β -1, 3のグルコサイド結合を含む多糖類がかなり広く分布していることを思わせる。 β -

1, 3 と β -1, 6 のグルコサイド結合をとともに含んだ多糖類としてはコンブなどに含まれる laminarin を始め酵母の細胞壁の多糖類、菌核菌の多糖類である sclerotan, ケイ藻類のつくる chrysolamariar (leucosin) などが知られている。 β -1, 3 と β -1, 4 のグルコサイド結合をとともに含む多糖類としてはカラス麦や大麦の多糖類が知られている。セルロースが β -1, 4 のグルコサイド結合のみからなり、その構造からして繊維状を示す性質がでるので、 β -1, 3 のグルコサイド結合からのみなる多糖類が水には不溶性で加熱すると凝固する性質を発現するものと考えている。

8. カードランの粘弾性¹⁹⁾

カードランは加熱すると凝固するので、凝固するという意味からこの名がつけられた。その凝固性はきわめて特徴がある。以下示すゲル強度は、飯尾電気のカードメーター M301A を用いてゲルの破壊強度として測定した値である。いまカードランの2%の水懸濁液をボターのホモジエナイザーでよく均一化し、水を吸わせ、混濁した液をつくる。これをセロハン膜の袋に入れ、この袋を水の入ったビーカー中に入れ徐々に加熱して行くと約 54°C になったところで、白濁していた液が急に澄明になり、それと同時に凝固する。寒天の場合には水懸濁液を加熱すると溶けてきて、これを 32~39°C に冷やすと凝固するのであるが、カードランの場合には加熱するとその温度でいきなり固まってしまう。このように多糖類としては全く珍しい性質を示す。卵の白味のアルブミンタンパク質を思い出していただきたい。しかしその固り方は卵の白味と寒天と異なり、もっと弾力性がある。固まった状態のものを手でおさえて曲げても、手の力をゆるめるともとの状態の形にもどる。寒天や卵の白味であればくずれてしまう。

次に種々な濃度のものを 90°C で 10 分間加熱して冷やしてからカードメーターでそのゲル強度を測ると第7図のごとくなる。このゲル強度の強さは寒天の同じ濃度

第8図 カードランのゲル強度に対する加熱温度の影響 (10 分加熱, カードラン3%)

の固まったもののゲル強度よりさらに高い。濃度 4.5% ゲル強度約 2,500 の値は多くのカマボコのゲル強度に相当する。第8図は種々な温度で 10 分間加熱したものの冷して後のゲル強度をみたものであるが、54°C から 60°C まで加熱温度の上昇に伴いゲル強度は上がり、60°C から 77°C の間ではゲル強度に変化はなく、その温度を越えるとまた温度の上昇に伴いゲル強度が増大している。今 70°C で 5 分間加熱したものと 4 時間加熱したものとそのゲル強度を比較すると、その差はなく、70°C 4 時間加熱したのも 90°C で 5 分間加熱したもののゲル強度よりはるかに劣る。

さきに述べたようにパキマンは β -1, 3 のグルコサイド結合のみから成る多糖類として報告されているので、カードランが加熱凝固するのであれば、パキマンも加熱凝固するものと考えられる。そこで茯苓からパキマンを分離し加熱凝固の試験を行なってみた (三崎, 斎藤, 原田, 未発表)。その結果パキマンでは 2% 濃度の場合全く固まらない。5% になるとある程度固まるが、ゲル強度も低く、手で押すとくずれてしまう。しかし加熱によって凝固する傾向はみられる。パキマンとカードランの微細な構造を比較しながら、目下調べているが、過ヨウ素酸化でパキマンの方が過ヨウ素酸をよけい消費する結果が得られている。パキマンが β -1, 3 結合以外の結合をもっているのかあるいはグルコースの重合度がカードランより低いのかいづれかによるのであろう。この相違が加熱凝固性に影響してくるものと考えられる。加熱凝固に対する pH の影響を調べ、pH 2.5~10 の間ではゲル強度の相違は認められなかった。また種々な無機塩

写真3 2%のカードラン水懸濁液を 90°C 10 分加熱処理して凝固したゲル

類のなかでホウ酸塩のみがゲル強度を高めた。

ゲルの生成に水素結合が関与するかどうかをみるため水素結合を破壊する試薬として知られている尿素のゲル生成に対する影響を調べてみた。ゲルの生成開始温度は尿素の濃度を高めるにしたがい低下し、7 M 濃度ですでに 35°C でゲルが生成したが、そのゲルの強度は弱く、8 M では全くゲルを生成しない。ゲルの生成開始温度のところである種のあるいはすべての水素結合が破壊され、ついで他のタイプの水素結合がつくれ水和も起こり、ゲルが生成するものと考えられる。水和は温度の上昇によって増大するものであろう。

いったん加熱して固ったゲルにただちにアセトンを加え、脱水乾燥し粉末にしたものは、無処理のカードランと異なり、懸濁液にして加熱しても凝固しない。この粉末と無処理のカードラン粉末とをX線ディフラクトメーターで回折図をみると、加熱凝固したものでは2θ 6.4の付近に明らかなピークがみられた。一方加熱凝固したものをいったんアルカリで溶かし、しかる後中和して沈殿をとり乾燥したものは、もとのカードランと同様加熱すれば凝固する。またX線回折図も無処理のカードランと同一であった。このことからして懸濁液を加熱すると、もとのものと異なった分子の配列をなすこと、化学的な変化はおそらく起こっていないものと思われた。

9. サクシノグルカン生成親株とカードラン生成変異株

著者らは親株よりカードランの生成変異株を偶然に見出すことができたのであるが、その変異株はサクシノグルカンができなくなりカードランができるようになったのであれば、カードランはサクシノグルカンからコハク酸のとれた多糖類であるものと予想される。ところが現在の研究段階でサクシノグルカンはβ-1, 3のグルコサイド結合以外に他のグルコサイド結合をかなり多量含んでいることが過ヨウ素酸酸化の結果などからわかってきた(三崎, 伊藤, 原田, 未発表)。それではある多糖類ができなくなり、その多糖類とは構造の上でかなり異なった多糖類ができるような変異株が生ずるということはどう説明されるべきことなのであろうか。

まず第1にサクシノグルカンをつくる親株がはたしてカードランをつくらないものであろうか。そこで培養液を遠心分離して沈殿したものの中にカードランが存在していないかどうか調べてみたが、結局 100ml 中 200 mg 程度、サクシノグルカン生成量の 1/6 程度カードランを生成していることがわかった(三崎, 斎藤, 原田, 未発表)。したがって変異を起こすことにより、サクシノグルカンができなくなるとともに、その消失したサクシノグルカンの量と同じぐらいの量のカードランができてきて、全体としてカードランの生産量が非常に増大す

ることがわかった。このような変異の遺伝生化学的な機構については目下ニトロソグアニジンのような変異誘導剤を処理したりして分離した種々な変異株を用いて研究しつつある。カードランをつくる変異株Kと同様な変異株もこの処理によって分離されてきている(雨村, 三崎, 原田, 未発表)。

培養して菌体量がほぼ最高に達した 24 時間のところで遠心分離して菌体を集め、これをよく洗いグルコースの溶液に懸濁させしんとすると、親株ではサクシノグルカンと少量のカードラン、変異株Kではカードランのみを生成する²⁰⁾。サクシノグルカンの生成には pH 7.0, カードランの生成には pH 6.0 がほぼ最適である。これら多糖類がグルコースなどからどのようにして生合成されるかについては目下研究中である。

10. む す び

セルロースは植物のつくる多糖類として古くから知られ、セルロース生成能は植物の特性となっているが、*Acetobacter xylinum* という細菌はグルコースからセルロースをつくる能力をもっている。このように微生物の中には植物のつくる多糖類と同じあるいは類似のものをつくるものが今後さらに見出されてくることであろう。硫酸エステルを含む多糖類をつくる微生物を分離する試みもなされているが、まだ分離されていない。しかし微生物には植物や動物にも見出されていない変わった多糖類をつくるものも数多く見出されてきており、今後さらに珍しい微生物多糖類が見出されてくることであろう。その中にはすぐれた粘弾的な性質をもつ多糖類も見出され、食品の添加剤その他に使用されるものもでてくることが期待されるし、一方生物のつくったものには合成品とちがった生理的活性をもつ特徴がみられることが多いので、微生物多糖類の中から抗腫瘍性など薬剤としての役割をもつものも生れてくることであろう。微生物が多糖類をつくる原料としては現在のところ安い炭水化物資源、糖蜜、デンプン、グルコースなどが考えられる。原料の 50% の収率で得ることは比較的容易であろう。炭水化物資源よりさらに安い石油資源を使用する考えもあるが、現在ではまだ収率は悪い。

今後微生物学、微生物生理学、生化学、遺伝学、有機化学、物理化学、食品学、薬学、医学こういった学問全般にわたり、総合的に研究されていくことによって多糖類発酵は一段と発展していくことであろう。

文 献

- 1) 原田篤也, 吉村 正: 醸工, 42, 615 (1964)
- 2) T. Harada, T. Yoshimura: *Biochim. Biophys. Acta*, 83, 374 (1964)
- 3) T. Harada, T. Yoshimura, H. Hidaka, A.

- Koreeda: *Agr. Biol. Chem.*, **29**, 757 (1965)
- 4) T. Harada: *Arch. Biochem. Biophys.*, **112**, 37 (1965)
 - 5) A. Misaki, S. Kirkwood, J. V. Scaletti, F. Smith: *Can. J. Chem.*, **40**, 2204 (1962)
 - 6) R. W. Wheat, C. Dorsch, G. Godoy: *J. Bact.*, **89**, 539 (1965)
 - 7) S. Hirase: *Bull. Chem. Soc. Japan*, **30**, 68 (1957)
 - 8) H. Raistrick, M. I. Rintoul: *Trans. Roy. Soc. (London) Ser. B* **220**, 255 (1931)
 - 9) T. Harada, T. Yoshimura: *Agr. Biol. Chem.*, **29**, 1027 (1965)
 - 10) T. Harada, M. Masada, K. Fujimori, I. Maeda: *Agr. Biol. Chem.*, **30**, 196 (1966)
 - 11) 原田篤也, 正田万都江, 日高秀昌, 高田正生: 醸工, **44**, 20 (1966)
 - 12) T. Harada, K. Fujimori, S. Hirose, M. Masada: *Agr. Biol. Chem.*, **30**, 764 (1966)
 - 13) T. Harada, A. Misaki, H. Saito: *Arch. Biochem. Biophys.*, in press.
 - 14) A. E. Clark, B. A. Stone: *Biochim. Biophys. Acta*, **44**, 161 (1960)
 - 15) W. L. Cunningham, D. J. Manners, J. F. Rhley: *Biochem. J.*, **82**, 12 (1962)
 - 16) S. A. Warsi, W. J. Whelan: *Chem. Ind.*, 1573 (1957)
 - 17) G. O. Aspinall, G. Kessler: *Chem. Ind.*, 1296 (1957)
 - 18) D. S. Feingold, E. F. Neufeld, W. Z. Hassid: *J. Biol. Chem.*, **233**, 783 (1958)
 - 19) I. Maeda, H. Saito, M. Masada, A. Misaki, T. Harada: *J. Agr. Biol. Chem.*, in press
 - 20) 原田篤也, 藤盛 健, 正田万都江: 醸工, **45**, 145 (1967)

会誌「高分子」への投稿歓迎

会誌「高分子」の内容について下記の欄が設けてございますが、広く会員諸君から、すべての欄への投稿を受けることになっております。大いにご投稿くださいますようお願いいたします。なお、掲載の選定は編集委員会におまかせねがいます。

素 描: 高分子を中心に広く 科学技術あるいは学界、業界に関する時局的な問題や抱負を適宜とりあげて論じていただく。

展 望: 高分子の化学および物理ならびに工業の領域において一課題について広い立場でやさしく専門外の方々にもわかるように解説していただく(参考論文は引用しなくてもよい)。

講 座: 高分子の化学および物理ならびに工業に関する専門的な講義。

総 説: 最近の高分子の化学および物理ならびに工業の領域において、一課題について総括的な解説をしていただく。首題に関係する最近の論文はできるだけ参考論文として引用していただく。

高分子教室: 高分子の化学および物理ならびに工業を工業高校卒業程度の方々にもわかるように解説した高分子入門講座。

Poly Mood: 高分子科学を高分子の分野の人々だけでなく、異なった分野の人々の目をも通して、総括的かつダイナミックなタッチで書いていただく。

人物評伝: 高分子の発展に活躍された人について書いていただく。

私の歩んだ道: どういうことをやったかを中心に苦心談、経験談など書いていただく。あるいは、その

研究者の一連の仕事を書いていただくのもよい。

研究から生産まで: 高分子の新製品の創出や、それに伴うプロセスや装置の開発に際して、その企画または、研究からはじまって生産に至るまでの苦心談、経験談、問題点の処理などについて、写真などを入れて書いていただく。

紙 上 討 論: ある一つのテーマに関するその分野の第一線の研究者または技術者の討論。

私 の 仮 説: スペキュレーションを含むある問題に対する自由な提案。

会 社 訪 問: 研究室訪問など。

問題点シリーズ: 大学における科学教育、会社における技術者育成、研究の自由とその限界、特許、給与、研究者の流出、アブストラクト、奨学金、研究サービス他。

わが師・わが友: 研究の、企業の、内外を問わず。

大きな夢、小さな夢: 研究や企業の将来に対する夢や希望を思うぞんぶん書いていただく。

会 員 の 窓: 会員相互の建設的な意見の交換、紹介記事、経験談、誌上討論、物資交換等々

求 人・求 職: (要領は本号の929ページをごらん下さい)

学界うちと: 関連学協会などの催しものについて速報する。

▶お問合せは編集部あてに 東京都中央区銀座東 5-2-4 本州ビル4階 電話 東京 (03) 543-3771 (代表)