遺伝子の化学合成は可能か

遺伝子を化学的な言葉で定義すれば、特定の遺伝情報をもった高分子デオキシリボ核酸 (DNA) ということになる。遺伝情報は DNA を構成している 4 種の塩基、アデニン、グアニン、シトシン、チミンの配列順序で決定されるので、遺伝子の化学合成とは、意のままに 4 種の塩基をつなぎあわせ、少なくとも遺伝情報発現のために十分な長さ、すなわち 200 個から 600 個の単量体がつながった高分子物質を合成するという、純合成化学的な問題に還元することができる。モデル実験として、100 個ぐらいの単量体からなる DNA 合成が、すでにウィスコンシン大学のコロナ教授のもとで行なわれ、着々と成果をあげているが、まだ化学合成した DNA が遺伝子としての活性をもつかどうか実験できるまでには至っていない。しかし、近い将来においては遺伝子の合成は可能であろうし、また合成 DNA が医学への応用という面で限らない可能性も持っていること、さらにそれを達成するには、どのような難点を解決しなければならないかを論じた。

西 村 暹*

1. はじめに

遺伝子の化学合成は可能か？この答えはなかなかむずかしい。たとえば、遠い将来においてはもちろん可能であるに違いないし、現在の時点で考えるなら、その答えは、

遺伝子とか、化学合成という言葉の意味によってイエスともノーともいえる。

それはさておき、まずこのような質問がとび出してくる背景について考えてみることにしよう。

過去 10 年間にわたる分子生物学、分子遺伝学の急

第 1 図 核酸の化学構造

* Susumu NISHIMURA 国立がんセンター研究所 (東京都中央区築地 5-1) 生物部長・理博
Chemical Synthesis of Gene

速な発展によって、遺伝子の本体がデオキシリボ核酸 (DNA) であるということは、もはや誰もがうたがいを持たないまでに確立されてきた。ところで遺伝子とは、生物の遺伝的性質をつかさどる本体という意味だが、これをもっと生化学的に表現すれば、遺伝子とは、生物の特異性を規制しているところのタンパク質のアミノ酸配列を決定している要因ということになる。

DNA とはプリン、ピリミジン塩基として総称される 4 種のヌクレオチド (デオキシアデニル酸、デオキシグアニル酸、デオキシチミジル酸、デオキシシチジル酸) の重合した高分子物質で (第 1 図)、分子量は数千万から数億にも達する。DNA の分子構造は第 1 図に示すように、リン酸によって橋かけした重合物であるが、細胞内では二つの DNA 分子鎖が第 2 図のように 2 重らせん構造 (double helix) を形成している。2 重らせんをつくるには、分子間に水素結合が形成されて、A が T、G が C と対をつくる。これがワトソン-クリックの DNA モデルであるが、この発見によってワトソンとクリックは 1962 年にノーベル医学生理学賞を受けていることでもわかるように、これは生物の遺伝や増殖のからくりを分子的レベルで理解するための重要な鍵だったのである。たとえば、生物が分裂増殖するとき遺伝形質が子に伝わるのは第 3 図に示すごとく、A-T、G-C のペアが保たれながら、DNA が分裂合成されるからである。

さて DNA 分子の三つの塩基配列 (トリプレットという) が、一つのアミノ酸を決めているのであるが、そのメカニズムを略図にしたのが第 4 図で、まず 2 重鎖 DNA の片側の塩基配列がリボ核酸 (RNA) へと、RNA ポリメラーゼと呼ぶ RNA 合成酵素によって写しとられる。RNA も DNA のように高分子核酸であるが、ただ

チミン (T) の代わりにウラシル (U) という塩基が入り、また DNA のデオキシリボースがリボースという 5 炭糖で置き変えたものである (第 1 図)、この DNA を鋳型としてつくられた RNA の塩基配列は、DNA の片側の分子の塩基配列に対応していて、すなわち DNA の遺伝情報 (コード) を伝達するメッセンジャーの役割を果たしているので、メッセンジャー RNA (mRNA) という。mRNA は次にリボゾームと呼ぶ細胞顆粒 (細胞質

第 3 図 DNA の生合成

DNAの2重鎖
(ダブルヘリックス)

第 2 図 二重鎖 DNA の構造

西村 通氏 昭和 30 年東京大学理学部化学科卒業、昭和 35 年(財)がん研究所研究官、昭和 36~40 年アメリカオークリッジ国立原子力研究所生物部およびウィスコンシン州立大学酵素研究所に留学、昭和 43 年国立がんセンター研究所ウイルス部室長、昭和 43 年同所生物部部長となり現在に至る。

第 4 図 タンパク質合成のメカニズム

UUU } Phe UUC } UUA } Leu UUG }	UCU } Ser UCC } UCA } UCG }	UAU } Tyr UAC } UAA Ochre UAG Amber	UGU } Cys UGC } UGA Opal UGG Try
CUU } Leu CUC } CUA } CUG }	CCU } Pro CCC } CCA } CCG }	CAU } His CAC } CAA Gln CAG }	CGU } Arg CGC } CGA } CGG }
AUU } Heu AUC } AUA } AUG (C.I.) } Ile	ACU } Thr ACC } ACA } ACG }	AAU } Asn AAC } AAA Lys AAG }	AGU } Ser AGC } AGA } AGG Are
GUU } Val GUC } GUA } GUG (C.I.) }	GCU } Ala GCC } GCA } GCG }	GAU } Asp GAC } GAA Glu GAG }	GGU } Gly GGC } GGA } GGG }

アミノ酸の省略記号は次の通り Ala アラニン, Arg アルギニン, Asn アスパラギン, Asp アスパラギン酸, Cys シスチン, Glu グルタミン酸, Gln グルタミン, Gly グリシン, His ヒスチジン, Ileu イソロイシン, Leu ロイシン, Lys リジン, Met メチオニン, Phe フェニルアラニン, Pro プロリン, Ser セリン, Thr トロネオン, Try トリプトファン, Tyr チロシン, Val バリン

Ochre, Amber, Opal は読み終りに使われるコードでそれらに対応するアミノ酸はない。

C.I. とは crain initiation の略で、そのコードは特に読み始めにつかわれる。

第 5 図 アミノ酸のコードの配列

に存在し、タンパク質と RNA から成る分子量約 600 万の複合体)の表面に付着し、これにアミノ酸を末端につけた転移 RNA (tRNA) が mRNA のトリプレット、すなわちコードに従って配列しながら、アミノ酸どうしでペプチド結合が生成し、ここにタンパク質が合成されることになる。ところでトリプレットの種類は合計 64

組あるが(塩基の種類が 4 種あるので、 $3^4=64$ となる)実際にどの塩基配列がどのアミノ酸に相当するかも、現在ではニーレンバーグ博士や、コラナ博士らの研究によって第 5 図のごとく明らかになっている。

2.

さて以上の前置きからも明らかに、ある特定のタンパク質の合成をつかさどる遺伝子の化学合成の問題は、せんじつめれば、思うがままに、特定の塩基配列をもった DNA の化学合成が可能かどうかという問題に帰決する。ところで 3 個の塩基が 1 個のアミノ酸を決めているわけであるから、1 個のタンパク質分子に対応する DNA となると、最低ヌクレオチド数が 300 程度の DNA を合成しなければならないことになる。

(タンパク質のアミノ酸残基は、分子量の小さいもので 100 ぐらい。したがって $100 \times 3 = 300$)。さらに遺伝子 DNA の合成が他の高分子物質の合成と異なる点は、遺伝子 DNA の合成においては、合成 DNA の塩基配列が一つとして間違っていないといけないことである。なぜなら、1 個の塩基の入れ方を間違えたとしても、それを含んだトリプレットは他のアミノ酸に対応するコードとなってしまう、合成 DNA をもとにしてつくられたタンパク質は、天然のものとは違ったアミノ酸配列をもつことになり、不活性になってしまって本来の機能を果せない。すなわち、もし DNA の合成反応をヌクレオチドを 1 個ずつ、順々につなげてゆく方式で行なうと仮定すると、1 段階の反応を少なくとも 999/1000 以上の確率で行なわないと、満足な DNA はできないことになる。ところが、おそらくどんな有機合成反応も、このような高い精度はもっているとは考えられない。それでは別法として、1 段階の反応後、目的の物質を純粋に取り出してから次の反応に用いるとすると、今度は反応収量が非常に良くないといけな。たとえば 95% という高収率だとしても、それを 300 工程くり返し行なえば、最後の収率は 0.95 の 300 乗、すなわち $1/2 \times 10^{-7}$ になってしまう。要するに純有機合成化学的には遺伝子の合成は、現在の技術をもってしては不可能だといえる。

ところで現在遺伝子 DNA の全合成に意欲的に取り組んでいる唯一の人物は、ウィスコンシン大学のコラナ (H. Gobind Khorana) 教授である。かれはそれではどのよ

うなアプローチの方法をとったかという点、有機化学的
合成反応と酵素を用いる生化学的方法の併用を試みた。
すなわち基本骨格である短い鎖のオリゴデオキシヌクレ
オチドは、有機化学的に合成するが、それらを互につな
ぎ合わせて大きくしたり、1本鎖のDNAを2重鎖にする
ところは、大腸菌より取り出したDNAリガーゼとか
DNAポリメラーゼという酵素の助けを借りるのである。

コラナ教授はまずモデルとして、酵母のアラニン転移
核酸に対応するDNAの合成を試みた(アラニン転移
核酸はヌクレオチド鎖76から成るリボ核酸で、その塩
基配列は1964年ホーリ博士によって決定された。転移
核酸はタンパク合成の中間体として、遺伝情報解読に重
要な役割を果たしており、しかも転移核酸もタンパク質の
場合と同じくDNAを鋳型として合成されることがわか
っている)。

2-1. 短いDNA(オリゴデオキシヌクレオチド)の 化学合成

コラナ教授は核酸の化学の基礎を築いたトッド教授
(Sir Alexander Todd)の弟子で、すでに1950年代の中
ごろから核酸の有機化学合成に関する基礎研究を初めて
いた。ヌクレオチドを結合させるためには、ヌクレオチ
ドのリン酸基を活性化しなければならないが、そのため
にdicyclohexylcarbodiimide, triisopropylbenzenesul-
fonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride(第6図)
のような縮合剤を開発した。また縮合反応中プリン、ピ
リミジン環のアミノ基などを保護し、不必要な反応を起

第6図 ヌクレオチドの結合に用いる縮合剤

第7図 オリゴヌクレオチドの stepwise
synthesis

Bz = Benzoyl, MMTr = Monomethoxytrityl

第8図 block condensation によるオリゴヌ
クレオチドの合成

こらないようにし、しかも反応後温和な条件ではずれる
ような保護基も開発した。

オリゴヌクレオチドの合成法は大別して1個ずつヌク
レオチドをつなげてゆく、stepwise synthesis(第7図)
とオリゴヌクレオチドどうしを結合する block conden-
sation(第8図)とがある。これらの方法を駆使するこ
とによって最高20個の塩基から成るオリゴヌクレオチ
ドが合成された。このように書くと、いかにも合成が簡
単のように見えるが、実際には一つの反応ごとに反応条
件を詳しく検討したり、また反応生成物中から目的物を
取り出すには、カラムクロマトグラフィーのような時間
のかかる方法を用いなければならず、操作は非常に手間
のかかるむずかしい仕事である。

2-2. オリゴヌクレオチド同志の酵素による結合

つぎはこのようにして合成されたオリゴヌクレオチ
ドをつなぎ合わせるわけであるが、それには、たとえば第

第9図 DNA リガーゼによるオリゴヌクレオチ
ド間の結合

第 10 図 DNA ポリメラーゼによる二重鎖 DNA の合成^{*1}

第 11 図 高分子 DNA 合成の模式図

9 図に示すようにアラニン 転移核酸の 21 番目から 50 番目の塩基に対応する 2 種のオリゴヌクレオチドを混ぜて加熱除冷してやると、互にワトソン-クリックの塩基対を形成して、一部 2 重鎖をつくるようになる。これにさらに、ノナヌクレオチドと DNA リガーゼという酵素を作用させると、2 重鎖となって固定化された 31 番目と 30 番目、41 番目と 40 番目のヌクレオチド間のリン酸結合が生成する。あるいは DNA ポリメラーゼという DNA 合成酵素を低温で反応させると第 10 図に示すように 1 重鎖の部分だけ補修が行なわれて完全な 2 重鎖となる。理論的には第 11 図に模式的に示したように DNA リガーゼの反応をくり返し用い、最後に DNA ポリメラーゼを用いれば、どんな長い DNA も合成可能である。実際に、すでにコロナ教授の研究室では、アラニン転移核酸に対応する DNA の合成はほぼ完結している。

以上述べたように、コロナ教授はアラニン転移核酸の遺伝子の合成をモデル実験として、技術の開発を行ない、高分子 DNA 合成が理論的、技術的に可能であることを示したが、かれは現在同様な方法を用いることによって、大腸菌のチロシン転移核酸の変異種に相当する DNA の

^{*1} GTP, ATP, TTP, CTP, はそれぞれのデオキシヌクレオチドのトリリン酸、たとえば GTP の構造式は

DNA ポリメラーゼ基質となって、ピロリン酸を放出しヌクレオチド間の結合が生成する。

合成に取り組んでいる。遺伝子の合成というからには、ただそれができたというだけでは無意味で、それが細胞内に入って遺伝子としての機能を果たしたことを確かめなければ、遺伝子を化学合成したことを実験的に証明したことにはならない。

ところが遺伝学的なトリックを利用すれば、すなわち遺伝的に変異した合成 DNA を細胞に加えて、細胞に変異が起こったかどうかをみれば、たとえ仮に 100 万個の細胞のうち 1 個に遺伝的変異が起こったとしてもそれを容易に検出することができるからである。

3. 遺伝子合成上の将来の問題点

さてコロナ教授の研究によって、遺伝子合成に関する基礎的問題は解決したとしても、これを実際問題への応用という面から検討すると、いくつかの問題点が残っている。それを列挙すると以下ようになる。

3-1. 合成化学上の問題

高分子 DNA の合成が理論的に可能であっても、それを発展させて、転移核酸の遺伝子よりさらに複雑なものを合成するには、おそらくもっと簡便、高収率な反応を開発する必要がある。現在の方法では、1 個ヌクレオチドをつなげるたびに、カラムクロマトグラフィーのような方法で生成物を分離精製しなければならない、それに少なくとも 1 週間はかかる。ここまでやれたのはコロナ教授のような卓越した指導者の下に、十数人の優秀な研究者が集ったからではあるが、それでも限界があり、おそらく今後は別の合成法、たとえばタンパク質の有機合成で用いられているような固相合成のような方法の適用が必要になってくるのであろう。また研究組織の上でも、小さな研究室単位の研究でなく、合成反応の機械化、コンピューターを取り入れたような、化学工学的方法をとらなければならないと考えられる。

3-2. 遺伝子 DNA の先端と末端の構造

実際に細胞内に存在する遺伝子 DNA の分子量は数百万から数十億で、たとえば大腸菌の場合には、大腸菌 1 匹あたり 1 分子の DNA が存在し、それが大腸菌の中に存在している何千というタンパク質に対応する構造遺伝子を全部持っている。すなわち、1 本の DNA 分子が遺伝子として機能を発現するためには、ある一定箇所まで遺伝情報の読み取りが始まり、また読み取りが終ることが、くり返し起こらなければならない。遺伝情報の読み始めと、読み終りの機構については、最近著しく研究が進歩したがそれでも実際に DNA 分子のその付近の塩基配列がどうなっているかは明らかでない。したがってかりに、タンパク質、または転移核酸の構造遺伝子そのものは合成できたとしても、それだけでは、細胞内で遺伝子としての機能を発現できないかも知れない。この点に関して最近発見されたおもしろい事実は、RNA ウイルス

の1種である Q β RNA の塩基配列である。Q β RNA は約3,500のヌクレオチドから成っているが、そのうちの初めの約 1/10、すなわち 300 ヌクレオチドは全く構造遺伝子として使われていないということがわかった。このことは遺伝情報の読み始めには、もっと複雑な機構があることを示唆しているのである。

3.3. 天然 DNA の塩基配列の不確定

さきに述べたように、20種のアミノ酸に対応する遺伝情報は決ったが、だからといってタンパク質のアミノ酸配列に対応して DNA 塩基配列を一義的に決めることはできない。なぜなら、アミノ酸に対応して一つ以上の遺伝情報が存在するので((第5図)、これをコードの degeneracy という。たとえばロイシンに対しては6種のコード、UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUGがある)実際にはそのうちのどれであるかは、残念ながらわからない。これを明らかにするためには、ある特定のタンパク質に対応する DNA を細胞から純粋に取り出して、その塩基配列を決めなければならない。このような実験は現在では非常にむずかしい。

4. 遺伝子の化学合成の将来における展望

これまで述べてきたように遺伝子 DNA の化学合成に

は、まだ未解決の問題点がいくつかあって、前途多難であるが、しかし着々と進行しており、問題点もやがて順次解決して、おそらく数年のうちには、最初の歴史的実験は達成されると考えられる。その実験の最大の目的は、単に生命の純化学的合成というような、センセーショナルな表現で示されるだけのこともかもしれないが、それは、その成果を医学へ応用するという重要な研究課題への出発点となるのである。たとえば DNA ポリメラーゼの発見でノーベル賞を授与されたコンバーグ博士もいっているように、かりに今後の研究によってインシュリンタンパク質の遺伝子の塩基配列がわかり、それを化学的に合成できたとすると、これを糖尿病患者(インシュリンを合成する遺伝子に欠陥があって、そのためインシュリンが欠乏して病気となる)に投与して^{*}、病気を治療するということにこれまで治療が不可能と考えられた、幾多の遺伝病の治療、いいかえるなら生命の改造ということが夢物語りとしてでなく考えられるようになるのである。

^{*}2 事実オークリッジの国立原子力研究所・生物部の スターンフィールド・ロジャース博士は、Shope papilloma ウイルス(それは人には無害だが、ウサギに感染してガンを誘発すると同時に、アルギニン分解する酵素、アルギナーゼをつくるようになる)を実験室で扱っている人たちの血中のアルギニン含量が非常に低いことを報告している。このことは、ウイルスが人間に感染して、そのさい、アルギナーゼの遺伝子を持ち込み、それが人体中で遺伝情報を発現してアルギナーゼを合成したことを意味する。

求人・求職欄利用規定

(求人・求職リストは本号
906 ページにあります。)

1. 掲載の申込

求人・求職欄掲載申込書(ハガキで下記あて請求のこと)に所定事項記入のうえ、掲載手数料、掲載原稿を添えて、下記あて書留便で郵送すること(申込の受理通知は出状しない)。

郵便番号 104 東京都中央区銀座 5-12-8 (本州ビル)
高分子学会 求人・求職係

2. 掲載

掲載申込締切は毎月20日とし、翌々月の1日に発行される会誌「高分子」の求人・求職欄に掲載される。

求人には P、求職には J で始まる一連整理番号を1件ごとに付けて掲載する。ただし、求職者の掲載回数は3回とする。なお引続き掲載希望者は改めて申し込まれたい。

3. 掲載手数料

3-1. 求人欄の利用掲載手数料は第1表のとおりとする。

a) 200 字(、や、も字として数える)を越える場合は、広告ページに掲載し、求人欄には、100 字まで(無料)の概要を紹介し、本記事の掲載ページを明示する。

b) 求人欄利用者で匿名を希望する場合は、掲載 1 回につき

第1表 求人欄掲載手数料 (円/回)

	正会員	維持会員		賛助会員		会員外	匿名 手数料
		2回/年 まで	3回/年 以上	2回/年 まで	3回/年 以上		
50 字まで	1,000	0	700	700	900	1,500	2,000 円 照会1件 につき 500円
100 字まで	2,000	1,000	1,400	1,400	1,800	3,000	
200 字まで	4,000	2,000	2,800	2,800	3,600	6,000	
200 字以上	1/2ページ/1回	12,600		16,200		18,000	—
	1 ページ/1回	25,200		32,400		36,000	

2,000円、照会1件につき500円の手数料を別に追加される。

c) 営利を目的としない団体・機関の利用掲載手数料は、50 字まで無料とする。50 字以上は第1表による。

3-2. 求職欄の利用掲載料は、第2表のとおりとする。ただし70 字以上は取り扱わない。

第2表 求職欄掲載手数料 (円/回)

	会 員	会 員 外
50 字まで	0	1,500
70 字まで	500	2,000

4. 原稿の書き方

4-1. 25 字の横書き B5 判原稿用紙に書き、余白に必ず連絡先、氏名を記人のこと。

4-2. 求人原稿は、求人側の必要事項を明確に記すこと。特に制限はない。

4-3. 求職原稿は、求職の希望、専攻、経験年数、学位、年齢、など、実例に沿って必要と思われることを明確に記すこと。

5. 応募・照会

5-1. 求人に対する応募は、会誌「高分子」に掲載された求人 P ナンバーを記して直接求人側に連絡すること。ただし求人側が匿名の場合は、本会の求人・求職係に照会のこと。

5-2. 求職に対する照会は、J ナンバーを記し、本会求人・求職係あて書面で照会すること。他の方法による照会は受け付けない。

6. その他

6-1. 求人(匿名の場合)求職の機密は厳重に保持する。

6-2. 本会は求人・求職については一切保証の責任を負わない。