高分子制癌剤

羽 室 淳 爾*

1. はじめに

癌の治療法としては、早期発見を基盤とした外科的手術と放射線療法が中心をなしており、制癌剤を用いる化学療法は、多大の努力にもかかわらずまだ十分といえる段階には達していない。最近、ブレオマイシン、サイクロシチジン、フトフラールなど、興味ある制癌剤が開発されて来たものなお十分というにはほど遠いと考えられる。癌には多くの種類があり、発生部位も多岐に渡り、また、転移の問題を伴い、薬物による根治的治療を考える際に大きな困難が生じる。発癌、担癌のいずれについても十分解明されていない現在、癌治療についての将来への展望を行なうことは筆者の到底なしうる所ではないが、本稿においては、高分子性の制癌剤について、できる限り、可能性を中心として論じて行きたい。前記理由にて化学的説明において、いささかなりのあいまいな点が残るとしてもお許しいただきたい。

2. ポリカチオンの制癌作用

癌細胞膜は正常細胞膜に比較して陰性荷電が大であるとの証明実験が多く知られている^{1)~4)}。癌の細胞膜と生物学的現象との関係は、癌の生化学的研究における支柱の一つである。癌細胞において、細胞表面の粘性低下、細胞運動と分裂の接触抑制能力の消失、細胞の自己、非自己識別能力の消失、細胞間の電氣的またはイオン輸送の交流機能の消失など、多くの細胞社会学的異常が認識されている⁵⁾。陰性荷電の増加は、

これらの異常の一つの理由であると考えられるもので、細胞の悪性化と zeta 電位の増加の相関性は癌細胞に特異的に作用する薬物の開発について、ポリカチオンの有用性を示唆するものである。ポリカチオンには実際に *in vivo*, *in vitro* の実験において制癌性の認められているものがある。その一つはポリアミンであり、ポリアミノ酸である。例えば T. Richardson ら⁶⁾は 1959 年、重合度 240 のポリリジンの TA3 及び Ehrlich 腹水型腫瘍に対する効果を、*in vivo* における延命効果として観察し、この理由をポリリジンの細胞表面への結合、結合部分の収縮、細胞質よりの負荷電の露出、細胞凝集に基づく細胞分裂阻害としている。H. Moroson ら⁷⁾は、ポリエチレンイミン、ポリプロピレンイミン、ポリビニルアミン、ポリビニルピリジン-N-オキシドなどのポリカチオンに同様の効果を報告し、ポリカチオンの有する陽性荷電密度の大なるものの方が、小なるものより、より効果が大きいとしている。この作用機構として、彼らは、ポリカチオンによる癌細胞表面の陰性荷電の直接中和作用と、ポリカチオンによる非特異的な、細網内皮系の機能亢進作用の双方の共同機構を提出している。また、多糖類を骨格構造とするポリカチオンとして、ジエチルアミノエチルデキストラン (DEAE-d) の制癌性も塚越ら⁸⁾により報告されており、癌細胞に対する直接効果のみならず生体の免疫機能を非特異的に亢進する作用も伴うものではないかと考えられている。ポリカチオンであっても、キトザンは、L 1210 細胞 (白血病) を凝集させるものの、*in vivo* においては、延命効果は示さず、ポリカチオンの化学構造と生物活性の関係を、明確にすることは難しい。当分野において、若干異なったアプローチの一つとして、Woodman ら⁹⁾により述べられた、ポリカチオン担体と、いわゆる低分子制癌剤

* Junji HAMURO 味の素 (株) 中央研究所 (化学研究部 210 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1) 工博 Anticancer Agents with High Molecular Weights

(アルキル化剤、IUDR など) とでコンプレックスを形成し、陰性荷電に富む癌細胞膜に制癌剤をより高濃度に運搬しようという考えがあることを付記する。いずれにしても、このように癌細胞膜の荷電を考えたつ、ポリカチオンによる、electrostatic cytotoxic effect (静電的効果に基づく毒性) を利用しようという考えは、実用化には、距離があり、ポリカチオンの毒性及びアナフィラキシー ショックなどの副作用の問題もあり、有機化学者、生化学者の共同での基礎的研究のいっそうの発展が期待される。

3. ポリアニオンの制癌作用

ポリアニオンには数多くの生物活性が知られており、抗菌性、抗ウィルス性の報告も多い。制癌作用を示すポリアニオンも実験腫瘍を用いる系については数多く報告されているが、本稿においては、その一端を述べるに留める。担癌生体において血液の過凝固性及びフィブリノーゲンの増量現象のみられることは古くから知られている事実である。すなわち担癌生体において、凝固能は促進し、線溶能は低下するという凝固-線溶系におけるバランスの乱れがみられ、このことが癌の増殖、転移に関係していると考えられる。癌の転移は、癌細胞の遊離、移動、着床、増殖、転移巣形成の各段階を経て、成立する。ヘパリンは抗凝固剤として頻繁に用いられているものであるが、このものの癌転移に対する効果については、抑制効果も、促進効果も報告されており、詳細はなお不明である^{9),10)}。これに対して、可移植性腫瘍細胞の静注による肺への転移には、同じく抗凝固剤であるプラスミンが抑制効果を示すことが知られている¹¹⁾。山本らは、ヘパリン、デキストラン硫酸エステル、プラスミンなどが癌細胞の粘着性を低下させ、癌塊からの癌細胞の遊離を容易にし、癌細胞の脈管内への侵入数を増加させるが、他面において、癌細胞の粘着性の低下は、着床を抑制する作用につながるとしている¹²⁾。この方面の研究は、木村、仁井谷らによりさらに進められ、既知の低分子制癌剤の癌塊中への侵入を容易にするために、担癌生体の線溶活性上昇を目指して、リポプロテイン リパーゼ活性化剤であり、リソゾーム ラビライザー (リソゾーム膜を不安定化して、リソゾーム中の各種の酵素を遊離する物質) である、デキストラン硫酸エステルやウロキナーゼが癌化学療法の一環として、併用療法

として活発に検討されている^{13),14)}。

ポリアニオンと制癌性の関係で今一つ見落してはならない分野として、ポリアニオンのインターフェロン (生体固有のウイルス抵抗性を有するタンパク質または糖タンパク質) 誘導能と制癌性の分野がある。生体には解毒作用、抗原抗体反応から生理的反応まで多くの防御機構が進化の過程で備わってきており、生体固有のインターフェロンはこうした防御機構をになう一つのタンパク質であると思なうことができる。インターフェロン誘起物質としては多くのものが知られているが、ポリアニオンが大きな位置を占めていることは否めない。2重ラセンの RNA、ポリアクリル酸、酸化デンプン、Poly I:C (シチジル酸とイノシン酸の共重合体)、エンドトキシン、スタトロン、ピラン (ジビニルエーテルと無水マイレン酸の共重合体) など、多くのものが知られている¹⁵⁾。こうしたインターフェロン誘起剤は当初抗ウイルス剤としての開発を目指していたものであるが、H.B. Levy, T.C. Merigan らは¹⁶⁾、制癌剤としての開発を続けており、生体の複雑な防御機能の解明とともにいっそうの発展が待たれる。ポリアニオンの分野においても、塩基性低分子制癌剤とのコンプレックス形成及び、生体固有の生物活性を有する低分子物質 (例えばホルモン、ペプチドなど) との相互作用に基づく新情報の発現や、体液性及び細胞性のタンパク質 (特に抗体類似機能を有するもの) との相互作用に基づく新機能の発現は、今後、多に検討の余地のある分野と考えられる。

4. 多糖類の制癌作用^{17)~24)}

古くより、日本の民間伝承には、ある種のキノコが癌に有効であるとの話が伝わっている。筆者らは、多くのキノコ子実体を熱水抽出し、マウス-可移植性腫瘍の系で制癌性の存在を確認した。食用キノコの内から、日本人に最も親しまれているシイタケを選び、その制癌活性本体の検討を行なったところ、シイタケ中には、Lentinan, LC-11, LC-12, LC-13, EC-11, EC-14 の6種の多糖体が含有されており、内前2者に強い制癌活性が認められた。Lentinan は、水難溶性で β (1 $\rightarrow$ 3) グルコシド結合を主鎖とし、 β (1 $\rightarrow$ 6) グルコシド結合を幾分含有する構造を有し、LC-11 は β (1 $\rightarrow$ 4) 及び β (1 $\rightarrow$ 6) グルコシド結合を有する多糖類であることが判明した。Lentinan は、癌細胞と *in vitro* で接触させても、増殖抑制は全く示さず、また、その可移植性にも影響を及ぼさないものである。Lentinan の分子量は光散乱法で約 100 万と決定された。多糖の平面構造と制癌性の相関を調べるために、キノコの一つ、茯苓より得られる Pachyman

羽室淳爾氏 昭和17年京都市に生まれる。昭和43年京都大学工学部大学院修了。脂肪族多環化合物へのラジカル置換反応及び、3級アミノオキシドのマイゼンハイマー転位の反応機構の研究。43年より味の素(株)中央研究所に入社。43年より国立癌センター化学療法部にて制癌性多糖の研究。現在、多糖類を中心とする高分子の生化学的研究に従事。趣味は旅行、読書、弓道

の活性を調べたところ、全く制癌性を示さなかった。Pachyman は主鎖を β (1 $\rightarrow$ 3) グルコシド結合とする多糖体であるといわれていたが、著者らの同位体を用いる構造決定法では、分子量 34 万で、主鎖中に 1 個の β (1 $\rightarrow$ 6) グルコシド結合を、側鎖として、7 $\sim$ 8 個の β (1 $\rightarrow$ 6) グルコシド結合の存在することが判明した。著者らは、Pachyman 中に存在する β (1 $\rightarrow$ 6) 結合を切断し、linear な β (1 $\rightarrow$ 3) グルカン、Pachymaran を誘導し、その制癌活性を調べたところ、Lentinan 同様に強い制癌性を示すことが判明した。このように制癌性を示す多糖体が不活性な多糖原料より合成されたことは、多糖体が制癌性を示すことの直接的証明である。と同時に微量の β (1 $\rightarrow$ 6) グルコシド結合の存在が制癌性に大きく影響するという事実は、活性と構造の相関を考えるに際し、多糖体の高次構造が重要な役割を果たしているのではないかと考えられる。Lentinan や Pachymaran の物理化学的挙動を、混合溶媒系や、塩類溶液中における旋光度、粘度で調べたり、NMR による解析を行なったところ、これらの多糖体には、確かに高次構造の存在することが判明し、また、等重量の尿素と Lentinan や Pachymaran を投与すると活性の全く消失することが判明した。しかし β (1 $\rightarrow$ 3) グルコシド結合を主鎖とし、 β (1 $\rightarrow$ 6) グルコシド結合を分岐として、非常に多く含有する制癌性多糖体であるスクレログルカンには、この尿素による失活現象は全く観察されなかった。一方、著者らは、非制癌性多糖体の平面構造を全く変化させることなく、制癌性多糖体に変換する試みにより、制癌性多糖体の活性発現における高次構造の重要性を直接的に証明した。すなわち、非制癌性の Pachyman を 3 M 以上の尿素水溶液とともに処理し、精製回収した Pachyman (U-Pachyman と呼ぶ) に、N の入っていないことを確認した後に、制癌性を調べたところ、Lentinan, Pachymaran 同様に、強い制癌性を示すことが判明した。このことは多糖類の高次構造が制癌性発現に、重要な役割を果たす場合もあることを示唆している。特に、会合、ミセル、疎水結合の問題が重要であり、生体内での作用点（まだ不明であるが）にて、情報伝達を行なうに当って、構造適合性が要求され、多糖分子の flexibility が問題となるものと思われる。

制癌性を示す多糖としては、他にも構造の異なるものが多く知られているが、平面構造のみで、構造と活性の相関を論じることがむずかしいと思われる。最近、著者は、制癌性多糖体が、血清タンパク質の規則的高次構造 (α -ヘリックスまたは、 β -構造) の含量を増加させ、この傾向は、制癌性に対応していることを

報告したが、同時に、癌細胞は、血清タンパク質の規則的高次構造の含量を低下させることも判明し、あわせて考えると、担癌状態における免疫機能の低下と、制癌性多糖体によるその修復という path を思いうかべることができる。従来知られている制癌剤の多くは、いわゆる、細胞毒といえるものであり、増殖の盛んな細胞程、傷害を受けやすいという大きな欠陥を有する。すなわち、従来の制癌剤は、骨髄細胞、リンパ細胞、生殖細胞などに少なからぬ傷害を与える。著者らの目指すところは、細胞毒に基づかず、生体固有の防御機構（必ずしも免疫機構のみではない）を、天然高分子物質を用いて、亢進させ、かくして、亢進せられた防御機構により癌を治癒に至らしめようとするものである。従って、生体固有の抵抗因子（体液性であれ細胞性であれ）の介在が必須であり、制癌性多糖体にみられるように、多く与えるとかえって効かないという dose response など、従来の薬物にはあまり知られていなかった問題が生ずることもあり、こうした分野での医学の進歩とともに、生体内反応に対する高分子化学者の鋭い解析が望まれる。制癌性多糖体を実際に癌患者に用いるには今後多くの困難を解決していく必要があるが、真に安全な制癌剤の開発を目指して著者らは、ホルモンとの関係、細胞性免疫との関係、多くの生体固有の抵抗因子（いずれも高分子性であるが、例えば、マクロファージ遊走阻止因子、白血球遊走因子、リンパ球幼若化因子）との関係を研究して行く必要を感じている²⁵⁾。この分野に入る研究としては、他にカワラタケより得られる糖タンパク質複合体があり、現在臨床検討されているが、詳細は割愛させていただく。また、こうした制癌性多糖体の非特異的生体抵抗力増強作用を保持させたまま、リン酸基、硫酸基などを導入して、ポリアニオン性を持たせて、癌細胞に対する直接作用をあわせ持たせようとする研究の流れのあることも付記しておく。

5. 菌体細胞壁成分の制癌性

高分子性の制癌剤はすでに述べてきたように癌細胞に直接細胞毒として作用するものは少ない。最近、癌の免疫療法が再び見直されるようになり、腫瘍などの細胞成分を単独またはアジュバンドとともに用いて免疫を行なう active immunotherapy や抗血清、感作リンパ球を用いる passive immunotherapy 及び非特異的な生体の抵抗性増強を図る non-specific immunotherapy が種々検討されてきている。これらの方法はすこぶる生物的手法であって、高分子化学の領域とは一見無縁にも見えるが、活性成分はいずれも複雑な高分子性成分であるので本稿で簡単にふれる。

細菌細胞壁は糖脂質を中心として多くの生体高分子より構築されているものであるが最近、BCG 及びコリネバクテリウム・パルブムの生菌及びその菌体成分について実験腫瘍及びがんへの応用に大きな進歩がみられている。他にも癌の免疫療法に用いられているものとしては、サルモネラ属菌、シゲラ属菌、大腸菌、セラチア属菌、百日咳菌、ブルセラ属菌、スタフィロコッカス属菌、ストレプトコッカス属菌などがある。酵母細胞壁より得られる多糖体 Zymosan もこの分野に入るものであろう。これらの作用機作については、免疫にかかわる T-細胞（胸腺由来）及び B-細胞（骨髄細胞由来）への働きかけ及びマクロファージの活性化作用において、相互に少しずつ異なっているようであるが詳細は今後の研究に待ちたい。BCG は生菌が主として用いられるが発熱、アナフィラキシー・ショック（高分子物質などの注射で免疫後、再び同物質を注射した時ショック症状をおこすこと）などの副作用を避けるためにも菌体の有効成分の分画、精製が活発に行なわれている²⁶⁾。メタノール不溶性画分の非特異的な感染防御能刺激、細胞性免疫反応の刺激、Cord factor と呼ばれる trehalose-6, 6'-di-mycolate 構造の糖脂質のアジュバント作用、細胞壁の骨格構造をなす ミコール酸 アラビノガラクトン-ムコペプチド複合体のアジュバント活性、非特異的な感染防御作用、及びこのものを油滴の形にした時に示す抗腫瘍性はよく知られている。また Wax D より分画されたペプチドグリコリピドや除タンパク質、脱脂した細胞壁にリゾチームを作用させて得られる水溶性のアジュバントなども知られている。一方、フランスでは B. Halpern²⁷⁾を中心としてコリネバクテリウム・パルブムの制癌性が動物及び人間のレベルで活発になされ、作用機作の解明とともに広く癌治療に応用されようとしている。こうした細菌の細胞壁成分の制癌作用の研究は基本的に動物の進化の過程と微生物感染の問題にも深く関わりがあると思われる。微生物の人間に対する役割の認識とともに、有機化学、高分子化学者の参加を待って、初めて真に安全な実用に耐え得る制癌剤開発の方向に向かうものであると思われる。

6. 高分子制癌剤の方向

一般的な高分子医薬品の概念で説明される制癌剤についてもなお検討の余地は多分にあると思われるが、高分子性制癌剤は、代謝阻害、代謝拮抗、アルキル化剤としての方向を目指すことには、その高分子性のゆえに困難が伴わない新しい免疫療法の方向を検討することが賢明であると思われる。次に主たる方向を列挙してみることにする。i) 生体の非特異的な免疫能の増強と

して、すでに述べた多糖体、糖脂質、糖タンパク質及び種々の複合高分子の開発と既知制癌剤との併用療法ならびにその人間への適用手法の開拓。ii) 癌細胞において消失している Contact inhibition（細胞増殖の接触阻止現象）を回復する天然高分子物質のスクリーニング。iii) 発癌を抑制するタンパク質分解酵素阻害剤としてのペプチド性物質の開発。iv) 癌細胞凝集剤やレクチンなどのスクリーニングと癌治療への適用法の開拓。V) 癌の転移防止剤としてのタンパク質分解酵素阻害剤の適用。

いずれにしても癌制圧までには、まだまだ多くの基礎的な研究が必要であり、免疫療法についても単に薬物を投与するのみで治療することには限界があるようにも思われる。高分子化学としてのアプローチとして、すでに述べたこと以外にも、水系における高分子-低分子、高分子-高分子の反応の地道な解析を基盤においた界面反応、酵素類似機能を有する高分子化合物の研究なども忘れてはならない。現今の社会情勢にがんがみて、細胞毒としての薬物よりも、人間が生体の防御機構の一貫として有する炎症反応と免疫反応にかかわる薬物を研究していくことが癌制圧の正道とも考えられ、この分野での高分子化合物の役割はすこぶる大であるといえる。合成高分子化学と天然高分子化学の成果が密接にかかわって、安全かつ独創的な新制癌剤の開発されることを切に祈る次第である。

文 献

- 1) E. J. Ambrose ら : *Nature*, **177**, 576 (1956)
- 2) J. H. B. Lowick ら : *J. Roy. Microb. Sci.*, **80**, 47 (1961)
- 3) J. A. Forrester ら : *Nature*, **196**, 1068 (1962)
- 4) J. A. Forrester ら : *Nature*, **201**, 945 (1964)
- 5) T. Richardson ら : *Proc. Soc. Exp. Biol. Med.*, **101**, 382 (1959)
- 6) H. Moroson : *Cancer Res.*, **31**, 373 (1971)
- 7) 塚越 茂ら : 第 32 回日本癌学会総会記事, 223 (1973)
- 8) Woodman ら : *Cancer Res.*, **28**, 2007 (1968)
- 9) B. Fisher ら : *Surgery*, **50**, 395 (1961)
- 10) B. Fisher ら : *Cancer Res.*, **27**, 421 (1967)
- 11) H. I. Peterson : *Acta Chir. Scand. Suppl.*, **394** (1968)
- 12) 山本政勝 : 最新医学, **26**, 365 (1971)
- 13) H. Niitani ら : *Gann*, **57**, 193 (1966)
- 14) A. Suzuki ら : *Gann*, **57**, 185 (1966)
- 15) 長野泰一 : ウィルス抑制因子, 朝倉書店 (1969)
- 16) H. B. Levy ら : *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, **173**,

- 640 (1970)
- 17) 千原具郎ら：最新医学，**25**，1043 (1970)
- 18) 羽室淳爾ら：Chem-Biol. Interactions, **3**, 69 (1971)
- 19) 前田幸子ら：Immunopotential, Excepta Medica, Elsevier, 259 (1973)
- 20) 羽室淳爾ら：Nature, **245**, 741 (1973)
- 21) 千原具郎ら：Nature, **222**, 687 (1969)
- 22) 羽室淳爾ら：Cancer Res., **30**, 2776 (1970)
- 23) 千原具郎ら：Nature, **225**, 943 (1970)
- 24) 羽室淳爾ら：Nature, **237**, 486 (1971)
- 25) この様な因子の説明は H. S. Lawrence ら：Mediators of Cellular Immunity, Academic Press, N.Y. (1969) に詳しい。
- 26) 山村雄一ら：日本臨床, **32**, 542 (1974)
- 27) B. Halpern ら：Immunopotential, Excepta Medica, Elsevier, 217 (1973)

*講演要旨集頒布案内

第 14 回可能性講座

《高分子のアセスメント》開催日
1月22日 1,000円

第 7 回反応工学討論会

《高粘度液の適化に伴う工学的諸問題》開催日 2月1日 600円

1974年高分子機械材料ゼミナール

《高分子の機械部品への応用上の問題点》開催日 2月13~15日 1,200円

第 16 回可能性講座

《高分子による水処理》開催日
3月5,6日 1,000円

第 4 回高分子崩壊利用シンポジウム

開催日 3月15日 500円

第 17 回高分子可能性講座

《海外の高分子科学技術の動向》開催日 3月29日 1,000円

ミクロシンポジウム 74/1

《NMRの新しい研究方法》開催日 4月15日 1,000円

高分子情報シンポジウム

《文献や情報をいかに整理し活用するか》開催日 4月22日 500円

第 18 回高分子可能性講座

《天然高分子と合成高分子との接点》開催日 5月14, 15日 1,000円

第 23 回高分子学会年次大会

開催日 6月4~7日 3,800円

第 7 回反応工学講演会

《高分子工業の安全防災》開催日 6月6日 1,000円

第 19 回静電気研究発表会

開催日 6月17, 18日 1,500円

第 19 回高分子可能性講座

《新材料としての塗料・高分子》開催日 7月3, 4日 1,000円

高分子学会講演会 74/2

《炭酸ガスの化学的利用》開催日 7月25日 500円

*頒価に送料を含みます

連絡先 [104] 東京都中央区銀座
5-12-8 高分子学会 各行事係
電話 (03) 543-7857