分子設計への応用

安川 民男 Tamio Yasukawa, 東京農工大学工学部

電算機支援設計 CAD は広い分野で今後の発展が期待されている最重要技術の一つとみなされている。特に航空機・船舶や建築・反応器などの構造体や電子回路などの設計では CAD の高度利用が最適設計に不可欠となっている。これに対して、分子設計の分野では QSAR (後述) など少数の例外を除いて CAD はまだ実用段階からほど遠い状態にある。これは前者の分野では流体力学や材料力学などの基礎理論をもとにした現象方程式が広い適用性をもつため予測や事前評価が十分な精度で行なえるのに対し、分子科学の分野では分子の構造と物性や反応性との間の関係についての基礎理論が少数の特定分野を除きまだ十分な精度や適用性をもつに至っておらず、予測や評価に利用できないためといえる。

いま注目する性質 $p_1, p_2, \dots$ が分子構造の特徴を示す変数 $x_1, x_2, \dots$ の関数として

$$p_i = f_i(x_1, x_2, \dots) \quad (1)$$

と表現できるとする。数学的には分子設計は $\{p_i\}$ の関数として与えられる評価関数 $E(p_1, p_2, \dots)$ が所定の値域にあるような $\{x_i\}$ の組を見いだすことであるが、上述のように分子科学の分野では、その前提となる f_i についての情報が一般に不十分であり、これをどのようにして求めるかが最大の課題となっている。 f_i を近似的に求めるのに種々の手法が試みられているが、ここではそれらを便宜的に、i) 解析的方法、ii) 統計的推測、iii) 人工知能の利用、に大別しそれぞれの現状と分子設計への適用の試みを概観してみよう。

1. 解析的方法

通常の条件下の分子の構造や物性は原理的には量子力学や量子統計論のわく内にある。また近年、*ab initio* 法などについての効率的な計算プログラムが発表され、スーパーコンピュータの実用化と相伴って

かなり大きな分子についても量子力学計算が行なわれるようになってきた。合成不可能な不安定化合物の構造や性質を量子力学計算で検討するのも興味ある例といえる。

しかし一般的に言えば分子設計の対象になるような複雑な化合物について、妥当な計算量で必要な精度の計算ができる段階にはなく、解析的方法としては古典力学を基礎とした分子力学や分子動力学が中心となる。

1-1. 分子力学

分子力学 MM では分子の内部エネルギー E を近似的に、化学結合の結合長の変化による E_b 、結合角の変化による E_θ 、内部回転角の変化による E_ϕ 、Van der Waals 相互作用 E_v および静電相互作用 E_q の和として表現する。

$$E = E_b + E_\theta + E_\phi + E_v + E_q \quad (2)$$

低分子有機化合物のコンホメーション解析に広く用いられている Allinger の MM 2¹⁾ では MM I の基本型

$$E_b = \sum 1/2 k_b (b - b_0)^2$$

$$E_\theta = \sum 1/2 k_\theta (\theta - \theta_0)^2$$

$$E_\phi = \sum [1/2 \cdot k_{\phi 1} (1 + \cos \phi) + 1/2 \cdot k_{\phi 2} (1 - \cos 2\phi) + 1/2 k_{\phi 3} (1 + 3\phi)]$$

$$E_v = \sum c [\exp(-\alpha/r) - \beta/r^6]$$

$$E_q = \sum \sum [\mu_i \mu_j / r^3 - 3(\mu_i \cdot r)(\mu_j \cdot r) / r^5] \quad (3)$$

に非調和項や伸縮-変角の交叉項 $k_{b\theta}$ など高次の補正

安川民男 東京農工大学工学部材料システム工学科 (184 小金井市中町 2-24) 教授・工博昭和 36 年東大理学部化学科卒、41 年東大大学院工学系工業化学専攻博士課程修了、41 年東大工学部助手、43 年東北大学水研助教授、59 年より現職。人工知能の応用に興味がある。＜趣味＞民芸、能楽鑑賞

項がつけ加えられている。この計算法の精度は高く飽和化合物の真空中や非極性溶媒中での構造や生成熱については実測値以上の信頼性があるとされている。

ここでは静電相互作用を双極子-双極子相互作用として取り扱っているが、タンパク質や核酸への適用を主目的として開発された ECEPP²⁾ や AMBER³⁾ などでは各原子上に電荷が分布しているとする単極子近似を用い、非結合原子間相互作用をたとえば

$$E_{\text{nonbonded}} = \sum [A_{ij}/r_{ij}^{12} - B_{ij}/r_{ij}^6 + q_i q_j / \epsilon r_{ij}] \quad (4)$$

で表示し、各原子上の電荷 q_i を CNDO や *ab initio* 法で計算している。また水素結合を別に (12, 10) 型のポテンシャルや角度依存性を導入して取り扱う例もある。ローン・ペアなどのある原子では静電相互作用の重心は必ずしも原子核の位置と一致しないことから、仮想的相互作用中心を追加する例もあり、特に水分子についてはその重要性から種々のモデル⁴⁾ が提案されている。

分子力学は直観的イメージを与えてくれ、また対象分野によっては比較的少ない労力で定量的結果が得られることから種々の領域で利用されるようになってきている。高分子物性の研究に利用された例として、結晶弾性率やその光学的・電気的性質の解析⁵⁾ をあげることができる。近年、高結晶性高分子材料の開発研究が盛んに行なわれているが、その極限強度は分子力学的考察から十分な精度で予測可能であるので⁶⁾、この分野の分子設計の有力な手段となるであろう。高分子の融点やガラス転移温度の分子論的予測の試みもいろいろあるが、十分な成果は得られていない。

分子力学研究者の関心は主に生体関連現象に向けられているといえる。生体反応にみられる高選択性は「鍵と鍵穴モデル」に示されるように形状の相補の一致が重要な役割を果たしていて、Shape analysis に分子力学が有用な手段となっている⁷⁾。

低分子では (2) 式で与えられる内部エネルギーが極小値をとるコンホメーションの出現確率が最も大きいと考えてよいが、分子が大きくなるとエントロピー項の寄与が無視できなくなる。Hagler ら⁸⁾ は 6 量体程度のオリゴペプチドでも分子内振動によるエントロピー項がコンホメーション決定の支配因子となっていることを示した。

BPTI はアミノ酸残基 58 個よりなる小型タンパク質であることから、種々の方法による理論的研究の対

図 1 内部回転角のみを可変とする近似で計算した BPTI の基準振動数分布 (縦軸は 5 cm⁻¹ 当たりの振数の個数)⁹⁾。

象として好んで用いられている。郷ら⁹⁾ は結合長および結合角が一定であるとの近似で自然形 BPTI の基準振動解析を行なった。得られた 241 の基準振動の分布を図 1 に示す。この結果から評価した分子内振動エントロピーは乾燥試料についての実測全エントロピーの 1/2 に達し特に 50 cm⁻¹ 以下の振動の寄与率が大きいことが示された。各残基の C α 原子の熱振動振幅の計算値分布は実測分布とかなりよく一致し、ここでも低波数領域の振動の寄与が大きい。

酵素の活性はそのコンホメーションと密接に関係し、エントロピー項が重要な役割を果たしていることから、その計算法が種々提出されている¹⁰⁾。

シクロデキストリンやクリプタンドなどの巨大環状化合物は特異的な選択性や触媒作用を示すため、人工酵素やイオノファアの観点から多角的に研究されている。Lifson ら¹¹⁾ はイオノファア設計の指導原理として i) イオンを取り込むに十分な大きさの空洞がある ii) その内壁に適当な電荷をもつ極性基がある対称性をもって配列し iii) 外側は疎水性を示し iv) 分子全体としてある程度の柔軟性をもつこと、をあげている。

Kollman ら¹²⁾ はアニソールスフェランドとアルカリ金属イオンの錯形成定数を計算し、新しい高選択性化合物の設計を行なった (後にその予想の正当性が合成で確認された)。

1-2. 分子動力学

古典力学の近似の範囲内で分子の動的性質を扱うのを分子動力学 MD と呼ぶ。(3) 式で与えられるような力場の内での運動方程式を時間幅を 10⁻¹⁵ 秒程度にとって逐次的に解いていく。計算量を減らすために

— 凍結なし (NC), ---- 結合長凍結 (LC), 結合角凍結 (LAC), - · - · - 結合長・結合角凍結 (LAC). 横軸の α , β は 2 次構造分布.

図 2 BPTI の内部自由度の凍結が各残基の C_{α} 炭素の熱振動振幅に及ぼす影響 (縦軸, 25 ps 当たりの振幅の平均二乗根)¹³⁾

結合の伸縮や変角の自由度を無視し、時間幅を大きくとる近似がしばしば用いられるが、Karplus ら¹³⁾ は BPTI についてこれらの近似の妥当性を検討し、伸縮・変角をとともに凍結した LAC モデルの妥当性に疑問があることを示した (図 2)。

計算の時間幅を小さくとる必要があるため MD 法だけでは長時間についての現象を解析することが困難なことから、モンテカルロ法によりあらかじめ大局的な状態を把握しておき遷移状態での軌跡などクリティカルな部分を MD 法で追跡する方法が有効であり¹⁴⁾、これは酵素への基質の取り込み過程の解明などにも有用である。

1-3. コンピュータ・グラフィックス

近年、ベクトル・スキャン、ラスタースキャンなどの画像処理技術の進歩により、分子構造をディスプレイ上に表示し、拡大・縮小・回転などの操作が容易にリアルタイムでできるようになってきた。特に生体関連反応では鍵と鍵穴モデルにみられるように形状の相補性や官能性の空間分布が分子設計に重要な指針となることから、ホスト・ゲストの適合性を画面上での分子の移動・回転・重ね合わせなどの操作を利用して検討することが有力な研究手段となっており、さらに対話的に構造を動かすと同時にその配置でのエネルギーを表示するプログラムも発表されている¹⁵⁾。タンパク質の高次構造の予測にも対話型画像表示が有用である。

基準振動や低分子と酵素、核酸などとの相互作用の

分子動力学計算の結果を動画として表示するのも現象の直観的理解に役立つ。

2. 統計的推測

分子構造の特徴を示す変数 $\{x_i\}$ と所定の物性との間の関係 (1) 式を厳密な形で得ることは理論的裏付けなしにはできないが、実測データのあてはめという形で実験式を求め、これを予測に利用することは広く行なわれている。この際、関数形 f_i を直接求めるよりも、ある化合物を基準にとりそれとの差 $p_i - p_{i0}$ を (1) 式の展開式

$$p_i - p_{i0} = \sum (\partial f_i / \partial x_j) \cdot \delta x_j + \sum \sum (\partial^2 f_i / \partial x_j \partial x_k) \delta x_j \delta x_k + \dots$$

の形で表現しその展開係数 $\partial f_i / \partial x_j$ などを統計的に求めるほうが容易であり、この際説明変数 $\{x_j\}$ をうまく選べば広い適用範囲をもつことができる。薬物の分子設計における Hansch-Fujita 法はその

例であり、さらにこれ以外の多変量解析法を利用したものも含めて、定量的構造活性相関 QSAR と呼ばれている。

このような推測法は薬物以外にも広く適用することができ、たとえば高分子膜の分子構造と透過性やイオン交換能との間の関係の解析や予測に利用されている¹⁶⁾。

近年、遺伝子工学などの進歩により任意のアミノ酸配列をもつポリペプチド鎖の合成が可能になっているが、その活性が高次構造と密接に関係することから、高次構造予測が重要な課題となっている。しかし、これを解析の方法だけで解くのは現段階では大きな困難がある。

ポリペプチド鎖の 2 次構造の統計的手法による予測の研究は Robson, Lim, Scheraga, 長野, ほか多数あるが、簡便なわりに予測精度の高い Chou-Fasman 法¹⁷⁾が好んで用いられていてコンピュータ・プログラムも発表されている。これは各アミノ酸残基を α -ヘリックスおよび β -シートの形成能の強弱でそれぞれ 6 段階に分類し (表 1), また β -ターン構造のとりやすさも指数化しておく。いま特定構造形成能の強い残基が、ある個数以上近接して存在すれば、そこを核として構造が形成され、形成能が低い集団に出会うまで成長をつづけるとする。

Chou-Fasman 法は情報統計論に基づいた Robson 法などに比べれば、より直観的・経験的ということができ、このようなアプローチを高度化しようとするれば

表 1 Chou-Fasman パラメータ¹⁷⁾

(a)	EAL	HMQWVF	KI	DTSRC	NY	PG
(b)	H _α	h _α	I _α	i _α	b _α	B _α
(a)	MVI	CYFQLTW	A	RGD	KSHNP	E
(b)	H _β	h _β	I _β	i _β	b _β	B _β

(a) アミノ酸の一文字記号

(b) H_{α(β)}, 強い α(β) 形成能; h_{α(β)}, 中程度の α(β) 形成能; I_{α(β)}, 弱い α(β) 形成能; i_{α(β)}, α(β) 中正; b_{α(β)}, 弱い α(β) 破壊能; B_{α(β)}, 強い α(β) 破壊能

(b) の帰属はデータがふえるにつれ改訂されている。

人工知能の利用の分野に入ることになるであろう。

3. 人工知能

電算機が実用段階に入った初期の頃から人工知能への応用が試みられ、1969 年には第 1 回の国際会議が開かれている。分子科学の分野でもすでにその頃から表題に artificial intelligence という語を含む論文が散見される。

人工知能を実用的意味のある問題の解決に利用しようとする試みのうち、広く一般の関心を引いたものに「エキスパート システム」¹⁸⁾ がある。医療診断システムの MYCIN やこれを分子構造決定用に改造した DENDRAL がその例であるが、その中心部分はプロダクション・システムと呼ばれる IE...THEN...という形に整理された論理的判断の AND/OR 木構造をとっている。このシステムは「規則主導型演繹システム」と性格付けることができ、ある程度まで完備した知識体系を具体的問題の解決に適用するものといえる。

これに対して新しい知識の獲得を電算機支援の下で行なおうとする試みがあるが、このためには帰納的推論の能力が必要で、より困難な課題とされている。しかし、「仮説検定」の方式により個別的な知見をより普遍的妥当性をもつものへと転換させることが可能であり、この方針に沿った、機能性データベースを基本とした分子設計のための基礎的知識獲得システムの開発が試みられている¹⁹⁾。

人工知能の高度な利用分野の一つに機械翻訳がある。ある水準以上の翻訳を行なおうとすると、単純な文法に従った単語の書き替えだけでなく、多義語の処理や意味理解など、広範囲の知識を背景にした文脈の把握が必要となってくる¹⁸⁾。

タンパク質の高次構造の予測も翻訳とみなすことができる。所定のアミノ酸残基の配列が一文字記号で

～MWAICPY～

で与えられたとすると、Chou-Fasman 法で書き替えれば

→～h_αh_αH_αI_αi_αB_αb_α→～ααααcccc～

のように二段階の翻訳が行なわれることになるが、この書き替えは文脈依存性を示している。2 次構造から 3 次構造の予測を行なうには、この問題に関して蓄積されている広範囲の知見²⁰⁾を援用することが必要であり、知識の獲得と効果的運用のためのシステム開発は興味あるテーマといえよう。

文 献

- 1) N.L. Allinger : *J. Am. Chem. Soc.*, **99**, 8127 (1977)
- 2) L.G. Dunfield, A.W. Burgess, H.A. Scheraga : *J. Phys. Chem.*, **82**, 2609 (1978)
- 3) S.J. Weiner, P.A. Kollman, D.A. Case, U.C. Singh, C. Ghio, G. Alagona, S. Profeta, Jr., P. Weiner : *J. Am. Chem. Soc.*, **106**, 765 (1984)
- 4) W.L. Jorgensen : *J. Chem. Phys.*, **77**, 4156 (1982) の引用文献参照
- 5) K. Tashiro, M. Kobayashi, H. Tadokoro, E. Fukuda : *Macromolecules*, **13**, 691 (1980) およびその引用文献
- 6) 伊藤泰輔 : 高分子加工, **32**, 540 (1983)
- 7) J.A. Vida, M. Gordon (Eds.) : *Conformationally Directed Drug Design*, ACS Symp. Ser., 251 (1984)
- 8) A.T. Hagler, P.S. Stern, R. Sharon, J.M. Becker, F. Naider : *J. Am. Chem. Soc.*, **101**, 6842 (1979)
- 9) N. Gō, T. Noguti, T. Nishikawa : *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **80**, 3696 (1983)
- 10) M. Karplus, J.N. Kushick : *Macromolecules*, **14**, 325 (1981)
- 11) S. Lifson, C.E. Felder, A. Shanzer : *J. Am. Chem. Soc.*, **105**, 3866 (1983)
- 12) P.A. Kollman, G. Wipff, U.C. Singh : *J. Am. Chem. Soc.*, **107**, 2212 (1985)
- 13) W.F. van Gunsteren, M. Karplus : *Macromolecules*, **15**, 1528 (1982)
- 14) J.A. McCammon, M. Karplus : *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **76**, 3585 (1979)
- 15) N. Pattabiraman, M. Levitt, T.E. Ferrin, R. Langridge : *J. Mol. Graphics*, **2**, 59 (1984)
- 16) 共立化学ライブラリー 13 : 膜の機能, 共立出版 (1977)
- 17) P.Y. Chou, G.D. Fasman : *Biochemistry*, **13**, 211, 222 (1974)
- 18) 田中幸吉編 : 知識工学, 朝倉書店 (1984)
- 19) 安川民男 : *Molecular Design*, **6**, No. 1, 2 (1985)
- 20) 例えば C. Chothia : *Ann. Rev. Biochem.*, **53**, 537 (1984) 参照