Kohlrausch-Williams-Watts (KWW)

減衰関数

Stretched Exponential と呼ばれ、 $\phi(t) = C \exp[-(t/\tau)^\beta]$ の形を有する緩和関数である。ここで、 C は $\phi(0)$ 、 τ は平均緩和時間、 $\beta (< 1)$ は緩和過程を特徴づける指数である。一般に、実験で得られた非指数関数の減衰曲線を解析するのに多重指数関数の重ね合せ (和) がよく用いられる。この考え方は、緩和子 (relaxor) が独

立した局所環境に存在し、互いに独立に平衡状態へ緩和していく仮定に基づいている。KWW の物理的な意味は、異なった緩和子が緩和しながら、互いに影響を及ぼし合うことによって、新たな遅い緩和過程が生成されることである。この特徴により、液体のガラス転移現象、蛋白質の構造緩和などの協同現象のダイナミクスに広く用いられている。その普遍性については現在論議中である。

[792 頁] Tran-Cong Qui

Cahn-Hilliard (C-H) 方程式

合金における相分離動力

学を記述するために J. W. Cahn と J. E. Hilliard によって定式化された方程式である。これは拡散方程式の一種であるが、異なる二成分が共存するため、拡散係数や濃度の時間発展は混合系の自由エネルギーに強く依存する。この自由エネルギーは均一混合を表わす成分と、混合系の局所的な不均一性に由来する成分との和である。濃度の高次項の寄与を無視して (相分離の初期に対応)、線形安定解析を行うと、異なった

波長をもったさまざまな濃度ゆらぎの内、最も不安定なモードに関する情報が得られる。C-H 方程式の予測は、非常に大きな波長を有する濃度ゆらぎも不安定になり、長時間になると混合系が完全に相に分かれて相平衡に到達することである。しかし、C-H 方程式に可逆の化学反応を導入すると、相分離の自己秩序化と共に自然停止が計算機実験で観測され、パターン形成の分野で話題になっている。

[793 頁] Tran-Cong Qui

ポリワーズ

三重項増感剤

ベンゾフェノンが光を吸収すると励起三重項を

経由して三重項 ($^3S^*$) 状態に移る。この状態で適当な基質 (A) (例えばナフタレン) と出会うとエネルギー移動して基質の三重項 ($^3A^*$) を生成することができる。このような働きをするベンゾフェノンを三重項増感剤という。具体的にはベンゾフェノンのりん光はナフタレンによって消光され、ナフタレンのりん光が見られるようになる。 $^3S^* + A \rightarrow S + ^3A^*$ 三重項増感剤から基質へのエ

ネルギー移動の速度はこの反応が発熱過程 [$E_T(^3S^*) > E_T(^3A^*)$] で 21 kJ/mol 程度以上の差があれば、エネルギー移動は溶液中では拡散律速速度で進行する。ここで E_T は三重項励起エネルギーを示す。この過程が吸熱過程 [$E_T(^3S^*) < E_T(^3A^*)$] ならばその速度は低下する。 $E_T(^3S^*) = E_T(^3A^*)$ のときには、エネルギー移動速度は拡散速度の 1/2 になる。

[788 頁] 角岡 正弘

励起正イオン

放射線照射によって分子がイオン化された直後に生成した正イオン

は余剰のエネルギーを持っており、振動状態や回転状態も含めた電子状態の異なる多くの励起正イオンが存在する。正イオンの電子遷移が励起されている状態は寿命が非常に短い。振動状態や回転状態だけが励起されている正イオンの寿命は凝縮相では短い気相、特に低圧では緩和時間が遅いのでかなり長い。励起正イオンの分解などの反応は基底状態の正イオンとは異なっている。凝

縮相でも励起正イオンからの反応が非常に効率よく起こるような系では、励起正イオンからの反応が重要になる。また、基底状態の正イオンを生成させた後、レーザー励起で選択的にあるエネルギー状態の励起正イオンを生成することも行われている。これらの励起正イオンからの発光寿命、励起正イオンと基底状態の正イオンとの異性化反応との違いなども調べられている。

[784 頁] 田川 精一