生理活性糖鎖分子の発見 と化学合成

Discovery and Chemical Synthesis of Biologically Active Glyco-molecules

瓜生 敏之 東京大学生産技術研究所
Toshiyuki URYU

糖鎖高分子合成の面白さを高分子研究者に知らせたのは、アメリカの Schuerch (シャースと発音) の開環重合によるデキストラン合成である。立体特異性重合がまだ盛りであった 1965 年にスタートしたこの研究は、1983 年頃の Schuerch の退官後も、立体規則性多糖の合成として東大のわれわれや名古屋大の住友 宏、岡田鈺彦、小林一清のグループなどで精力的に展開されてきた。糖と糖をグリコシド結合で繋いでいく天然多糖の合成は、セルロース(1,4- β -グルカン)の合成を目指して多くの有機高分子化学者によって行われた。しかし、合成できたのはデキストラン(1,6- α -グルカン)だけである。私たちは 10 種類位の新規多糖を得たが、いずれも人工的多糖である。

1983~1985 年にかけて発表された Albersheim のオリゴサッカリンに関する研究成果は、糖鎖研究者が長年追求していた糖鎖の積極的な生体反応への関与を明確に示し、同学の研究者を驚かせた。極微量(マイクログラム)の生理活性糖鎖分子の構造が生化学者によって解析され、それを Lindberg はミリグラムオーダーで合成し、実証した。

同時期頃からワシントン大学の箱守仙一郎や Johns-Hopkins 大学の Y. C. Lee のがん細胞表面糖鎖や認識糖鎖の発見と構造決定が活発に発表されるようになり、オリゴ糖鎖のもつ興味深さ、研究ターゲット性が世界中に伝播した。本来医学研究者であり糖鎖生化学者である箱守は、細胞を遺伝子工学的に操作するなど最新の研究技術を駆使して、シグナルの細胞膜通過に関与する糖鎖の役割などの独自の

研究展開を行っている。私は定期的に Biological Abstracts で氏の予想もできない研究成果を追っかけている。Lee の研究は、特に複合糖鎖における認識機能に及ぼす糖鎖構造(分枝構造など)の影響を、化学的手段で実証している。

生体系では、糖鎖は例えば、糖タンパク質のような高分子として存在する。タンパク質が主要機能性を保持し、糖鎖の役割はよくてサブ機能か、あるいは単なる保護物質くらいしか考えられていなかった。それは糖鎖が何をしているか明確でなくまた生体内のオリゴ糖鎖の合成が厄介だからである。比較的新しく見つかったシアル酸(九炭糖)も化学的取り扱いが容易にできるようになって、糖鎖の非還元末端によく付いていることが分かり、機能の解析も行われるようになった。今では、糖鎖の研究に大切な脱離基と保護基の研究が進んで、ターゲットさえあれば 16 糖までの生体オリゴ糖鎖は合成できるようになった(Pozsgay, JACS, 1995)。

最近、本分野が活気づいているのは、いくつかの興味ある糖鎖分子が作られ、実用化が図られるようになったからであろう。私達の硫酸化多糖・オリゴ糖エイズ薬、戸倉清一・重政好弘のキチン・キトサン創傷治療薬、小林一清・赤池敏宏の肝細胞培養用糖鎖担持高分子の研究が注目を浴び、そしていくつかの糖鎖分子や糖担持高分子が産業界で開発された。これらは、広い研究展開の可能性を持っていることを皆が感じている。このように、15 年位前から本格的に始まった糖鎖分子の研究が活発化し、世の中に準主役くらいで躍り出ようとしている。

東京大学生産技術研究所(106 東京都港区六本木 7-22-1)教授、工博

〈略歴〉1961 年東京大学工学部卒、1966 年大学院工学系博士課程修了。同年東京大学工学部助手、講師、助教授を経て 1983 年東京大学生産技術研究所教授。専門は高分子材料化学。趣味: ゴルフ