第四回口腔病學會講演要旨抄

Über die sogenannte „Wurzelbehandlung“ Erfahrungen und Grundsätze.

(Autoreferat)

Von

Prof. Dr. W. Dieck.

Unter dem Ausdruck „Wurzelbehandlung“ versteht man im Allgemeinen die Behandlung eines Zahnes mit nekrotischer, speciell mit gangraenös zerfallener Pulpa. Man hat also gleichzeitig die Vorstellung von Infektion und Sepsis in Pulpakammer und Wurzelkanälen mit den möglichen Folgewirkungen auf das periapikale Gewebe der Wurzelhaut und des Knochens.

Es ist aber gebräuchlich, den gleichen Ausdruck auch für die Weiterbehandlung eines Zahnes anzuwenden, dessen kranke oder gesunde Pulpa künstlich devitalisiert worden ist. In diesem Falle können wir gewöhnlich mit Sterilität in der Tiefe der Wurzelkanäle und mit gesundem Zustande der periapikalen Region rechnen.

Die klinischen Verhältnisse sind also in beiden Fällen grundverschieden, und die leitenden Gesichtspunkte für die Behandlung müssen deshalb ebenso verschieden sein. In dem einen Falle handelt es sich in erster Linie um therapeutische Bekämpfung der vorhandenen Infektion und Sepsis im Zahne und etwa über die Wurzelspitze hinaus, in dem anderen Falle handelt es sich um die prophylaktische Verhütung der Infektion des periapikalen Gewebes von der Wurzelspitze her.

Dieses wesentlichen Unterschiedes müssen wir uns stets bewußt bleiben. Nach meiner Meinung wäre es in hohem Maaße nützlich, wenn diese Unterscheidung auch durch eine verschiedene Wortbezeichnung zum Ausdruck käme.

Die Behandlung der Pulpagangraen mit Einschluss periapikaler Infektion könnte man

„therapeutische Wurzelkanalbehandlung“

nennen, die Nachbehandlung des Zahnes nach Abtötung der Pulpa im Gegensatz dazu

„*prophylaktische Wurzelkanalbehandlung*“.

Wenn die Ausfüllung der Wurzelkanäle in beiden Fällen nach den selben Gesichtspunkten und mit dem selben Materiale geschieht, so ist das von untergeordneter Bedeutung und könnte verglichen werden mit dem gleichartigen Verbands für eine vorbehandelte infiziert gewesene und für eine aseptische Wunde. Nur wäre die Wurzelfüllung gewissermaßen ein Dauerverband.

Für die vorgeschlagene Unterscheidung spricht noch, daß unter dem Begriffe „*prophylaktische Wurzelkanalbehandlung*“ auch diejenigen Maßnahmen (partielle Amputation der Wurzelpulpa oder Imprägnierung von nicht exstirpierbaren Pulpastümpfen) zu verstehen wären, welche für die Behandlung der totalen Pulpagangraen nicht in Frage kommen.

Ferner spricht dafür, daß manche therapeutische Maßnahmen, welche für Behandlung von Zähnen mit Pulpagangraen indiciert sind (etwa die Anwendung intensiv wirkender Antiseptica) für die Behandlung nicht infizierter Wurzelkanäle geradezu contraindiziert sein können.

Natürlich gibt es auch Uebergänge von einem pathologischen Zustande der Pulpa zu einem intensiv und extensiv gesteigerten, wie beispielsweise die Pulpo-Periodontitis, welche auch für die Behandlung eine Sonderstellung einnehmen.

Einzelheiten über den rein technischen Teil der Wurzelkanalbehandlung können in diesem Referate natürlich nicht dargestellt werden. Nur die leitenden Grundsätze lassen sich andeuten.

Grundsatz:

In jedem Falle sollten vor der Behandlung durch Röntgenaufnahme die anatomischen Verhältnisse der Wurzeln und der Wurzelkanäle, sowie der Zustand des periapikalen Gewebes festgestellt und nach der Ausfüllung der Wurzelkanäle eine Kontrollaufnahme gemacht werden.

Grundsatz:

Die Abtötung einer gesunden Pulpa ist nur in Ausnahmefällen zu rechtfertigen. Im besondern gilt dieses für die Vorbereitung eines Zahnes zu prothetischen Zwecken (Goldkrone, Brückenpfeiler und Ähnliches).

Grundsatz:

Für die Abtötung der Pulpa ist unter den verschiedenen Methoden diejenige auszuwählen, welche für den vorliegenden Fall als die zweck-

mäßigste und für die Nachbehandlung als die prophylaktisch zuverlässigste erscheint.

Bei Anwendung von Arsen sollte die Möglichkeit der Schädigung der periapikalen Region niemals vergessen und ihre Vermeidung mit allen Mitteln angestrebt werden.

Grundsatz :

Die Exstirpation der abgetöteten Pulpa muß als eine der subtilsten und schwierigsten Operationen am Zahne angesehen werden. Sie erfordert grösste Gewissenhaftigkeit und Vorsicht, wenn die Asepsis im Wurzelkanale erhalten und das periapikale Gewebe nicht mechanisch oder durch chemische Mittel geschädigt werden soll.

Isolierung des Zahnes durch Cofferdam, bestes Instrumentarium und steriler Zustand desselben sowie strenge Asepsis auf dem ganzen Behandlungswege bis zur Wurzelspitze sind die natürlichen Forderungen.

Anzustreben ist die Exstirpation der Wurzelpulpa in toto und Beendigung der Operation mit Einschluss der Wurzelfüllung in einer Sitzung.

Mehrfach wiederholte Einlagen in den Wurzelkanal unter Anwendung konzentrierter Antiseptica sind zu vermeiden. In Fällen, wo die vollständige Exstirpierung der Wurzelpulpa technisch nicht erreichbar ist, kommt natürlich die Belassung eines Rückstandes in der apikalen Region in Frage. Dann ist allerdings die Herstellung nachhaltiger Asepsis eine zwingende Forderung.

Grundsatz :

Bei Empfindlichkeit in der Tiefe des Wurzelkanals ist durch Röntgenbild des Zahnes mit eingeführter Nadel festzustellen, ob diese Empfindlichkeit von einem noch lebenden Reste der Wurzelpulpa herrührt, oder von der Durchführung der Nadel durch die Wurzelspitze.

Grundsatz :

Für die mechanische Behandlung von Wurzelkanälen mit gangraenös zerfallener Pulpa sollte immer vorausgesetzt werden, daß der putride Inhalt derselben sich in dem ungünstigsten Zustande des breiig-flüssigen Zerfalles befindet. Die Technik der Leerung und Reinigung der Wurzelkanäle sollte sich nach dieser Voraussetzung richten, damit eine mechanische Durchpressung von Kanalinhalt durch das for. apicale vermieden wird.

Durch millimeterweises Vorgehen mit gutsaugender Watte auf dünnster Nadel oder mit Papierspitzen soll allmählich der flüssige Bestandteil des Kanalinhalt abgezogen werden. Dann erst Entfernung etwaiger geballter oder flockig zusammenhängender Gewebsreste mittels feinsten Donaldson-

Nadeln und gründliche Sterilisierung.

Gegen oberflächliche Absaugung und eintägigen Einschluss eines geeigneten Antisepticums vor der Weiterbehandlung ist kein besonderer Einwand zu erheben.

Je nach Wahl der Behandlungsmethode, so z. B. bei Anwendung von Kalium-Natrium, kann das technische Vorgehen eine gewisse Änderung erfahren.

Grundsätzliche Auffassung bezüglich der Behandlung pulpatoter Zähne mit chronischen apikalen Herden :

Die Erfahrung lehrt, daß solche Herde in der überwiegenden Zahl der Fälle durch Extraktion des Zahnes zur Ausheilung kommen und keiner speziellen Behandlung mehr bedürfen. Von besonders gearteten Fällen soll hier abgesehen werden. Die Ausheilung erfolgt, weil die Ursache beseitigt ist, welche in der Dauerwirkung von Infektions- und septischen Stoffen im Wurzelkanale bestanden hatte.

Gelingt es uns, diese Ursache mit Erhaltung des Zahnes ebenso restlos zu beseitigen, wie es durch die Entfernung des Zahnes geschieht, so kann man auch den gleichen Erfolg erwarten. Viele Beweise zeigen, daß dieser Erfolg durchaus möglich ist, wenn nicht unüberwindliche Schwierigkeiten vorliegen, in der ganzen Region der Wurzelspitze Asepsis zu schaffen und dauernd zu erhalten.

Die Verfeinerung unserer Behandlungsmethoden wird den Erfolg dieser Art steigern. Die Notwendigkeit chirurgischer Maßnahmen in der konservierenden Zahnheilkunde kann damit wohl verringert, aber natürlich niemals entbehrlich gemacht werden.

Was in diesem Referate an Einzelheiten nicht gesagt werden konnte, das müssen der Vortrag und die Lichtbilder ergänzen.

所謂「根管治療」ニ就テ 經驗竝ニ原則

ウィルヘルム・ディク

「根管治療」トイフ言葉ハ一般ニ壞死シタ齒髓, 殊ニ壞疽性ニ崩壞シタ齒髓ヲ有スル齒牙ノ治療ヲ意味シテ居ル。故ニ吾人ハ髓腔及ビ根管内ニ於ケル感染及ビ腐敗, 延テハ根端周圍ノ齒根膜竝ニ骨組織ニ波及シ得ル續發作用ヲ同時ニ念頭ニ浮ベル。

然シ又病的或ハ健康ナ齒髓ヲ人爲的ニ失活サセタ齒牙ノ其後ノ處置ノ意味ニモ「根管治療」トイフ言葉ヲ用ヒル習慣ニナツテ居ル。此場合ニハ通常根管深部ハ無菌狀態デアリ, 根端周圍部ハ健康狀態デアルト考ヘテヨイ。