臨牀及ビ實驗

上顎骨ノ骨髓性小圓形細胞肉腫ノ齒髓内 増殖ノ一例ニ就テ

Ein Fall von dem in der Zahnpulpa infiltrierenden
myelogenen Rundzellensarkom des Oberkiefers.

Von. T. Sera u. I. Ono.

兵庫縣立神戸病院病理科 部長中院孝圓博士)

兵庫縣立神戸病院齒科 世 良 利 治

小 野 巖

[内 容 抄 録]

口腔内ニ發生セシ肉腫就中顎骨肉腫ニ關スル 治驗竝ニ 病理組織學の研究ニ至リテハ少シトセザルモ顎骨肉腫ノ齒髓内ニ蔓延増殖セルヲ報告セシモノ 甚タ稀ナリ。偶々余等ハ當院齒科ニ於テ顎骨肉腫ノ手術後得タル齒牙ノ齒髓内ニ著シク顯著ニ肉腫ノ増殖セルヲ認メタリ。

目 次

第一章 緒 論

第二章 實驗症例

第一節 臨牀の所見

第二節 組織學の所見

第一項 軟組織

第二項 齒牙組織

第三章 總括及ビ考按

第四章 結 論

第一章 緒 論

口腔ハ内外兩胚葉ヨリ成ル種々ノ組織ヲ有シ纖維腫、脂肪腫、粘液腫、淋巴腫、骨腫、軟骨腫、血管腫、混合腫等種々ノ良性腫瘍ハ勿論癌腫ノ發生モ亦比較的屢々ナリ。

然レドモ肉腫ノ發生ハ比較的稀ナレドモ、顎骨肉腫ハ軟組織ノモノニ比シ比較的屢々アリテ Perthes ノ統計ニ據レバ126例ノ報告アリテ15歳乃至20歳ノ青年期ニ好發ス。Gusltsch ハ1858年—1878年ノ20年間ニ於ケルウヰーン市ノ三大病院ノ腫瘍患者總數14630例中532例ノ顎骨肉腫アリト報告セリ。

而シテ顎骨肉腫ニハ骨膜性肉腫ト骨髓性肉腫トノ二種アリテ、前者ハ比較的の良性ニシテ表層性ニ、膨脹性ニ増殖シ、浸潤性増殖ヲ通常營マザルモ、後者ハ發育、増殖盛ニシテ、之ニ伴ヒ顎骨皮質ヲ破壊穿孔シ、周圍軟組織内ニ浸潤増殖シ其壞死ヲ招クコト稀ナラズ、殊ニ上顎骨後方ニ發生セルモノハ最も危險ニシテ、翼狀口蓋溝ニ沿ヒテ増殖シ、眼窩ノ内側又ハ外側ニ侵入スルコト多シ。但、轉移ヲ作ルコトハ稀レナレ共

Partsch ハ其腦轉移ヲ來セシ2例ヲ報告セリ。

斯クノ如ク、顎骨肉腫ハ必ズシモ甚ダ危險ナリトハ認メ難キモ、齒牙ニ轉移増殖スルモノハ極メテ稀ニシテ、殊ニ顎骨肉腫特ニ骨髓性肉腫ハ、増殖旺盛ニシテ骨組織ヲ破壊シ、周圍組織内ニ侵入スルコト多キニ拘ラズ、齒髓内ニ浸潤増殖ヲ來スコトハ極メテ稀ニシテ、從來斯クノ如キ症例ノ報告セラレタルモノ殆ドナシ。唯僅カニ Wassermann ノ其齒髓内ヘノ特發性轉移ニ就テノ報告アレドモ、Grüner ハ臨牀上ノ見地ヨリ之ヲ否定セリ。其他 Henke u. Lubarsch ノ病理學書中ニハ之ヲ深部齒根膜ノ結締組織層ヨリ侵入シタルモノトナルベシト報告セリ。園田氏ハ家兎ノ頸動脈内ニ家兎ノ肉腫乳劑ヲ注入移殖シ、齒髓内ニ轉移、増殖ヲ來サシメ、コノ問題ニ關シテ Henke u. Lubarsch ト同意見ヲ發表セリ。即チ同氏ハ齒髓内轉移ハ下顎ニ多ク切齒ト臼齒ヲ比較スルニ臼齒ニ多キヲ觀タリ、而テ其腫瘍ノ發育ハ最初齒齦粘膜下組織、齒根膜、齒槽突起、骨髓等個々ニ發生スルモ、増殖強度トナルニ及ビ遂ニ融合シ、隣接齒牙及其周圍組織ヲモ侵蝕スルニ至ルト、且發生率ヲ見ルニ齒髓ニ特發スルコト極メテ稀有ニシテ齒齦、齒槽骨ニ來ルコト頗ル多カリシト述ブ。

斯クノ如ク顎骨肉腫ノ齒髓内轉移若シハ浸潤増殖ハ極メテ稀有ナルモノナルガ、余等ハ幸ニシテ左側上顎骨ニ發育増殖セシ肉腫ニ相遇シ、顯微鏡の検査ノ結果其齒髓内増殖ヲ伴ヘルコトヲ確認シ得タル一例ヲ實驗セリ。依ツテ余等ハ之ニ就キテ充分ナル研究ヲ遂ゲ、茲ニ之ヲ報告シ、此方面ノ研究ノ不足ヲ補遺セントス。

第二章 實驗症例

第一節 臨牀の所見

患者 〇〇〇 二十二歳 男子 會社員

家族歴 父ハ夙ニ腦溢血ニテ逝去シタルモ、母ハ健在、二弟一妹アリ、何レモ特記スベキ事項ナク、殊ニ惡性腫瘍ニ對スル素因の關係ナシト。

既往病歴 幼時ハ極メテ健康ニシテ特記スベキ事ナシ。昭和3年某病院ニ於テ耳鼻科ノ診ヲ乞ヒシタニ上顎竇蓄膿症ノ手術ヲ受クベシトノ注意ヲ促サレタルモ、別ニ何等ノ苦痛ナカリシタメ放任ス。

齒牙ニ關シテハ昭和6年4月齶蝕症ノタメ左側下顎第二大臼齒ヲ某齒科醫院ニテ拔去セシモ、其他ノ齒牙ハ異常ナク、齒痛ヲ覺エタルコトナカリシト。

現病歴 昭和6年4月上旬ヨリ左側下眼窩部ヨリ同側鼻唇溝部並ニ下口唇ニ於テ不快ナル知覺麻痺ヲ來シ、時日ノ經過ニ從ヒテ該部ニ不快ナル壓迫感ヲ訴フルニ至リ、更ニ該側齒牙殊ニ上顎大白齒部ニ鈍痛ヲ覺エ、挺出感ヲ訴ヘタリ。同時ニ同側外頰部

殊ニ上顎部ニ於テ腫脹感ヲ抱クニ至リ、知覺異常頓ニ加ハリタルヲ以テ大病院齒科ヲ訪レタリ。

現症 體格榮養共ニ中等度ニシテ、顔貌ヲ檢スルニ殆ド常態ナルモ、左側上顎部殊ニ上顎骨體ニ相當スル部ニ於テ瀰蔓性ニ膨隆腫起シ、皮膚ニハ肉眼の變化ヲ認メズ。腫脹ノ限界ハ不明瞭ナレ共、略々上界ハ下眼窩孔部、下界ハ鼻唇溝部ニ達セルガ如ク見ユ。該腫瘤ノ表面ハ平滑、壓迫スルモ劇シキ疼痛ナク、硬度韌ナリ。

視力ハ何等異常ヲ認メラズ。鼻腔殊ニ左側鼻腔ハ腫脹組織ノ爲狹窄ヲ來シ、呼吸困難ヲ訴フ。

口腔内ノ清掃狀態比較長、舌及ビ口腔粘膜ハ正常ナルモ、左側口蓋部附近ノ粘膜及右側下顎智齒部ニ於テ稍々腫脹シ、暗赤色ヲ呈シ、左側上顎第一大臼齒及第二大臼齒部ニ於テ齒牙微カニ動搖シ、齒齦發赤ス。

齒列ハ帶圓形ニシテ左側下顎第二大臼齒拔齒窩部ノ齦頰移行部ニ相當シ瘻孔ノ痕跡ヲ觀ル。各齒牙ヲ「キャメロン」電氣診斷器ヲ以テ檢セシニ右側上下顎齒牙ハ正常ナルモ左側上下顎齒ニ於テ異常アルヲ認メタリ。左側下顎中切齒及側切齒ハ僅カニ反應アルモ左側下顎犬齒ヨリ同側第三大白齒ニ至ル齒牙ハ全ク反應ナク、左側上顎中切齒及側切齒ハ僅カニ反應ヲ覺ユルモ同側犬齒ヨリ第三大白齒ニ至ル齒牙ハ全ク無反應ナリキ。尙ホ切齒孔部ヲ中心トシテ其周圍約1 厘平方ノ範圍ニ互リ全ク無知覺ノ領域アルヲ認メタリ。

レントゲン線寫眞像ヲ檢スルニ、左側上顎第二大臼齒部ヨリ後方ニ互リ暗影ヲ認メ、骨質著シク粗且吸收セラレアルヲ知ル。

下顎ニ於テハ左側第二大臼齒部ノ骨質粗糙トナリ、僅カニ暗影ヲ見ルノミ、埋狀齒ヲ認メズ。

試驗穿刺ヲ試ミシニ實質性ニシテ極少量ノ血性漿液ヲ採集シ得タルノミナリキ。

ワッセルマン反應ハ陰性。

手術 以上ノ診査ニ依リ、恐ラク上下顎ニ偏側性ニ現ハレシ實質性腫瘍ナラントノ診斷ノ下ニ5月4日手術ヲ行フ。前準備トシテハ通法ノ如ク、絶對の消毒ニヨリ1時間前ニ「トロンボゲン」ノ内服ヲ命ジ30分前ニ「チバルギン」ノ注射ヲ行ヒ局所ノ消毒後バルチュ氏法ニヨリ手術ヲ執行セリ。

下顎

下顎ニ於テハ「5」「6」ヲ拔去シ、「5」ノ齒頸部及「7」（既ニ拔去セル窩）部ノ齒頸部ニ相當スル部位ヨリ齒軸ニ平行ニ直切開ヲナシ、齒齦瓣ノ剝離ヲ行ヘルニ、比較的多量

ノ出血ヲ來セリ。齒槽骨ハ著シク吸收セラレ寒天様ノ灰白色ノ組織ヲ充實ス。通法ノ如ク可成完全ニ搔爬ヲ行ヒタルニ、其深サ實ニ下齒槽管ニ達セルヲ認メタリ。出血多ク、骨質極メテ粗ニシテ、病變ノ進行性ナルヲ推知シ得タリ。

上顎

前同様前準備ノ後 4—8 ノ拔去ヲ試ミタルニ、齒槽壁殆ド吸收サレ、下顎ニ於ケルト同様ノ寒天様灰白黃色ノ組織充滿シ、搔爬ト同時ニ出血著シ。此組織ハ其底上顎竇内ニ充チ、消息子ニテ檢セシニ眼窩底マデ侵襲シ居ルヲ知り得タリ。更ニ該部ノ搔爬ヲ試ミタル後、「リバノールガーゼ」ノ「タンボナーデ」ヲナセシコト通法ノ如シ。

經過 爾後創腔ヲ「リバノール」ノ洗滌後「リバノールガーゼ」ノ交換、鉛糖水ノ濕布、硼酸水ノ含嗽及1週2回ノX線深部療法ヲ併用セリ。其後經過可良ノ如ク見エシモ、2週後ニ上顎ニ於テハ「ボリーブ」狀再増殖ヲ來セル組織ガ創腔及鼻腔内ニ侵入シ來レルヲ認ムルニ至レリ。更ニ數日ノ後右側上顎大白齒部齒齦ニ於テモ、左側上顎齒齦腫脹ト類似ノ症狀ヲ來シ、稍々壓迫感ヲ訴フルニ至レリ。左側眼球ハ稍々挺出シ、瞳孔反應著シク減弱シ、手術後3週間ニシテ右側鼻腔ニモ左側同様ノ「ボリーブ」狀ヲ認メ、咽喉ニ於テモ同様ノ増殖ヲ來シ、呼吸困難ヲ訴ヘ、全身症狀著シク惡化シ、幾許モナクシテ遂ニ黃泉ノ客トナリタリ。

第二節 組織學の所見

材料ハ同患者ノ左側上顎ヨリ拔出セシ 4 5 6 7 8 及 5 及ビ手術ノ際ニ搔抓セシ組織片竝ニ再發組織片等ニシテ、手術後直チニ10%ノ中性「フォルマリン」液ニ固定シ、3日後ニ齒牙ハ通法ノ如ク10%硝酸脫灰ヲ試ミ、後軟組織ト同様「ツェロイデン」切片トシ、特ニ軟組織片ニハ「パラフィン」法ヲモ併用シ、後「ヘマトキシリン、エオジン」複染色及ビ「ワンギーソン」法ヲ行ヒタリ。

鏡下所見

第一項 軟組織

手術時ニ上顎ヨリ摘出セシモノヲ鏡檢スルニ略々同形同大ノ小圓形細胞ノミヨリ成リ、核ハ比較的大ニシテ「クロマチン」ニ富ミ、「ヘマトキシリン」ニ著シク好染ス。所々ニ不規則ナル核分割像ヲ認ム。間質結締織ハ少キモ細胞間ニ纖細ナル纖維ヲ分歧ス。血管ハ著シク擴張シ、周圍組織内ニ、所々ニ不定形ノ黃褐色色素顆粒ノ沈著アリ。該色素ハ鐵反應陽性ニシテ、「ヘモヂデリン」ナルコトヲ認メタリ。一部分ニ於テハ腫瘍細胞ハ浸潤性ニ筋纖維間ニ侵入、増殖シ、各筋纖維ハ強ク壓迫セラレテ萎縮シ、且變性或ハ壞死ニ陥ル。即、腫瘍組織ノ發育増殖ノ明ニ進行性、破壊性ナルヲ認メタリ。

下顎ヨリ摘出セシモノ、所見モ亦前者ト殆ド同一ニシテ、筋纖維間ニ強烈ナル浸潤性増殖ヲ來セリ。

齒齦及齒根膜

腫瘍細胞ハ粘膜下組織ニモ浸潤性ニ増殖シ、血管ノ充盈、擴張セルヲ觀ル。深部ニ向ツテハ環狀靱帶、齒槽中隔及ビ齒根膜ヲモ同様ニ侵セリ。

齒槽骨及ビ白堊質間ニ於テハ腫瘍細胞ハシャペー氏纖維間ニ浸潤増殖シ、齒槽骨及ビ白堊質壁自己ニ於テハ所々ニハウシップ氏窩ノ形成ヲ觀ル。〔8部ニ於テハ其浸潤最も旺盛ニシテ齒根膜ノ破壊ヲ來シ、齒齦粘膜下ニ増殖ヲ呈セルヲ觀ル。

齒根部側壁及ビ齒槽中隔ノ吸收ラセル、狀ヲ觀ルニ、所謂破齒細胞及ビ破骨細胞ノ如キ巨大細胞ノ出現ヲ觀ズシテ、ハウシップ氏窩ハ完全ニ腫瘍細胞ノミニヨリ充タサレ、蠶蝕性ノ吸收ヲ來セリ。

第二項 齒 牙

上顎

第一小白齒ニ於テ齒髓ハ一體ニ單純性萎縮ニ陥リ、「エオデン」ニ好染シ、造齒細胞ハ縮小シ、髓角部齒髓ハ網様萎縮ヲ來シ、網羅ノ性状顯著トナル。中央部齒髓ニ於テ血管ハ著シク擴張ス。

根管內齒髓ハ其邊緣部ニ於テノミ網様萎縮ヲ來シ、血管及ビ神經束ノ走行ヲ明ニ認メ得。而シテ齒根端部ニ於テハ血管神經束間ニ上記腫瘍細胞ト同一性状ノモノ、浸潤増殖ヲ觀ル。此部ノ齒髓細胞ハ萎縮シ、網様像ヲ來セリ。

第二小白齒ニ於テモ第一小白齒ニ於ケルガ如ク退行性變化ヲ來スモ、其度稍々強度ニシテ、齒髓周邊部及ビ髓床底部ニ於テ網様萎縮ノ像特ニ著明ニシテ、且所々ニ石灰ノ沈著ヲ來ス。殊ニ齒根部齒髓ニ於テハ血管及ビ神經ノ走行ニ沿ヒテ著明ニ之ヲ認メ、其周圍ニ腫瘍細胞ノ浸潤増殖ヲ確認ス。

第一大白齒ニ於テハ齒髓ノ萎縮最も顯著ニシテ殆ド齒髓全體ニ互リテ網様像ヲ呈シ、髓室部ニ血管強ク怒張シ、大小ノ象牙質瘤トモ思ハル、石灰塊所々ニ散在シ、根管部齒髓ニ於テハ腫瘍細胞ノ浸潤増殖ニヨリテ壓迫セラレ、血管神經及ビ萎縮齒髓ガ中央ニ束狀ヲナシテ殘存スルヲ認ム。

尙ホ齒髓ハ其ノ全體ニ互リ大小種々ナル形狀ノ空洞ヲ形成シ、空胞狀ヲ呈セリ。

第二大白齒ハ横斷切片トシテ檢セシニ、其所見第一大白齒ト略々同様ナリ。所々ニ極メテ不規則ナル空洞形成ヲ觀、造齒細胞ハ著シク邊緣部ニ壓平、縮小サレ、又部位ニヨリテハソレヲ缺ギ、腫瘍細胞ノミガ浸潤充滿セルヲ見ル。又所々ニ石灰ノ沈著ヲ

來シ、象牙質瘤ヲ見ル。齒根部ニ於テハ全ク造齒細胞ヲ缺ギ、腫瘍細胞ニ充滿サレ、中央部ニ於テ石灰ノ沈著セル血管存在ス。

第三大白齒ニ於テハ、其腫瘍細胞ノ浸潤増殖ノ度各齒ヲ通ジテ最も顯著ナリ。該齒ニ於ケル腫瘍細胞ハ根端部ヨリ侵入シ、所々ニ空洞ヲ殘シテ髓室部ニマデモ蔓延増殖シ、造齒細胞ハ僅カニ髓角部及髓天蓋部ニ殘存セルノミナリ。血管ハ著シク擴張、充血シ居ルモ、前述齒牙ニ於ケルガ如キ著明ナル齒髓ノ萎縮狀態ヲ呈セズ。髓腔殊ニ根管腔ヲ腫瘍細胞殆ト充滿占有シ、本來ノ齒髓組織ノ存在不明ニ歸ス。

下顎

下顎ニ於テハ變化ヲ呈セシモノハ唯左側第二小白齒ノミナルモ、本齒ハ上顎小白齒ト等シク齒髓ハ單純性萎縮ニ陥リ、齒根端部ニ於テハ僅カニ腫瘍細胞ト思ハル、モノノ少數ガ浸潤セルヲ認メタルノミ。

第三章 總括及考按

本例ハ22歳ノ男子ノ左側上顎下眼窩部及ビ下顎小白齒部ニ互ル知覺麻痺ト輕度ノ壓迫感及ビ同部齒牙ノ挺出感及ビ左側鼻腔ノ不快感等種々ノ知覺障礙ヲ伴ヘル惡性腫瘍ニシテ、根治手術ニヨリテ得タル組織ニ就テノ病理組織學的検査ノ結果、上顎骨髓ヨリ發生セシ小圓形細胞肉腫ニシテ、之ガ周圍顎骨組織ヲ變性、壞死ニ陥ラシメ、該部齒牙周圍組織ハ腫瘍細胞ノ浸潤性増殖ニヨリテ破壊セラレ、齒牙自己ニ於テハ第一殊ニ第二第三大白齒ノ齒髓ガ腫瘍組織ノ浸潤増殖ヲ蒙リ、其齒髓組織竝ニ該部神經、血管等ハ之ニヨリテ壓迫萎縮ヲ來シ、一部崩壞、壞死ニ陥リ、空胞形成ヲ來セルモノナルコトヲ明カニシ得タルモノナリ。

元來顎骨ヨリ發生スル肉腫ハ Partsch 等ノ記載ニ據レバ一般ニ骨ニ於ケルモノト同様、表層骨膜ヨリ發生スル骨膜性肉腫 (oberflächliche periostale Sarcom) ト深部骨髓組織ヨリ發生スル骨髓性肉腫 (zentrale myelogene Kiefersarcom) トノ2種アリ。前者ハ巨大細胞ヲ含有スル紡錘形細胞ヨリ成リ一般ニ硬度鞏、下顎ニ多ク發生ス、其増殖表面性ニシテ骨ヲ圍繞セル周圍組織ニ蔓延スルヲ常トシ、非浸潤性増殖ヲ營ミ、再發ノ危險モ比較的少ク、比較的良性ノモノナルニ反シ、後者ハ主トシテ小圓形細胞ヨリ成リ、時ニ紡錘形細胞ヲモ混ズルコトアルモ、細胞間質ヲ缺グコト多シ。而シテ血管ニ富ミ、硬度軟ニシテ、“Encephaloid”ト稱セラル、モノト、反對ニ硬度硬時ニハ骨様硬固ニシテ、其剖面ニ新生骨梁ガ放線狀ニ排列スルヲ認ムルモノトアリ。其發育一般ニ迅速ニシテ、浸潤性増殖ヲ營ミ、之ニ伴ヒテ顎骨ノ膨隆、穿孔ヲ來シ、周圍組織内ニ浸潤増殖セル等一般ノ顎骨ノ骨髓性小圓形細胞ノ性狀ヲ示セルモ

ノナリ。然共本例ニ於テ特記スベキ特徴ハ、其浸潤増殖ガ獨リ顎骨及ビ其周圍軟組織内ニ止ラズ、齒髓内ニモ及ビ、其壓迫、萎縮及ビ變性、壞死ヲモ來セル點ナリトス。

元來顎骨ノ骨髓性肉腫ハ、顎骨ヲ破壞シテ周圍ニ浸潤増殖ヲ營ムコト、殊ニ上顎骨後部ニ發生セシモノハ最モ危險ニシテ翼狀口蓋溝ニ沿ヒテ進行シ、眼窩内側或ハ外側ニ増殖スルコト多シ。然レドモ齒牙ニ對シテハ齒槽突起ヲ侵スコトハ屢々ナルニ拘ラズ、齒髓内ニマデ腫瘍細胞ノ浸潤増殖ヲ來スガ如キ場合ハ前述ノ如ク甚ダ稀ニシテ余等ノ涉獵シ得タル範圍内ニ於テハ其確實ナル報告例甚ダ稀ナリ。余等ノ例ニ於テハ亦齒髓内増殖ヲ來セシ齒牙ニ於テモ、齒根膜ニ沿ヒ腫瘍組織ノ浸潤増殖アレドモ齒牙硬組織自己ニハ明カナル退行性變化ナク、殊ニ壞死、崩壞等ヲ認メズ。從ツテ腫瘍組織ノ齒髓内侵入ハ根管ヲ通ジテ其神經血管ニ沿ヒテ行ハレタルモノト認ムル外ニ道ナシ。尙ホ本例ニ於テハ齒牙ノ挺出感及ビ顔面ニ於ケル知覺麻痺等ヲ訴ヘタルハ齒髓内腫瘍ノ増殖ニヨリテ、齒髓神經ノ壓迫萎縮ニ陥リシト、齒根膜及ビ齒槽突起其他ニ於ケル腫瘍ノ浸潤増殖顯著ナリシ事實ニヨリテ容易ニ解シ得ルモノナリ。

最後ニ齒髓内増殖ハ第二及ビ第三大白齒ニ高度ニシテ第一大白齒ニ於テハ輕度ニシテ根端部ニノミ之ヲ認メタリ。而シテ斯クノ如ク齒髓内増殖ノ程度ニ相違ヲ來セシハ如何ナル原因ニ基クモノナリヤニ就テハ、大體二ツノ理由ヲ考ヘ得ベシ。即チ腫瘍組織ノ發育増殖ガ第二、第三大白齒ニ早ク第一大白齒ヘハ比較的遲レテ波及セシ爲茲ニ其増殖未ダ齒髓内深部ニ達セザルカ或ハ齒根端及ビ之ニ伴ヒ齒髓ノ發育形成ノ完了セシヤ否ヤニ關聯シテ腫瘍組織ノ侵入増殖ノ態度ノ相違ヲ來セルカノ兩場合ナリ。而シテ余等ノ例ニ就テ是等齒牙根端ノ發育狀態ノ實際ヲ比較スル「レントゲン」像ノ示ス如ク第一大白齒ニ於テハ殆ド齒根端ノ形成完了セルニ反シ第二、第三、殊ニ第三大白齒ニ於テハ全く未完成ノ狀態ヲ示シ、容易ニ腫瘍組織ノ侵入増殖ニ便ナルヲ認メ得タリ。從ツテ此點ガ其原因ノ少クトモ一部ヲ構成スルモノナルコトヲ認メ得ベシ。

第四章 結 論

敍上ヲ結論セバ左ノ諸項ニ歸納セシムルコトヲ得。

- (1) 本例ニ於テ齒牙ノ壓迫感、挺出感、及ビ鈍痛等ヲ訴ヘタルハ以上ノ如キ肉腫組織ノ齒牙周圍組織及ビ齒髓内浸潤増殖ニ因リ其神經ガ壓迫障礙セラレタル爲ト認ムベキモノナリ。
- (2) 顎骨殊ニ齒槽突起ノ骨質ト共ニ齒牙周圍組織モ亦肉腫組織ノ浸潤ノ爲破壞セラレタリ。
- (3) 齒髓ニ就テハ第三大白齒及ビ第二大白齒ニ於テ著明ニ齒髓内腫瘍細胞ノ浸潤増殖

アリ。齒髓組織ノ之レニ因スル壓迫、萎縮、空胞形成、齒髓神經ノ萎縮等ノ退行性變化ヲ認メタリ。第一大臼齒ニ於テハ根端部ニノミ同様齒髓内浸潤増殖ヲ認メタリ。

擧筆ニ臨ミ小川院長ニ敬意ヲ表シ御懇篤ナル御指導竝ニ御校閲ノ勞ヲ賜ハリシ病理科部長中院孝圓博士、恩師小野寅之助博士、黒田鶴治博士ニ對シ深謝ス。

Literatur.

- 1) Aschoff, Allgemeine Pathologie. 2) A. Denker u. O. Kahler, Handbuch d. Hals-, Nase-, u. Ohrenheilkunde. 3) Borst, Pathologische Histologie. 4) Borst, Allgemeine Pathologie d. malignen Geschwulste. 5) E. Lexer, Lehrbuch d. allgemeinen Chirurgie. 6) Euler u. Myer, Pathohistologie der Zähne. 7) 花澤鼎, 齒科病理學. 8) 速水猛, 病理學總論. 9) H. Siegmund u. R. Weber, Pathologische Histologie d. Mundhöhle. 10) Kantrowitz, Handwörterbuch d. gesamten Zahnheilkunde. 11) 河野敏之, 臨牀醫學寫真圖譜. 8 卷. 9. 10 號. 12) 河野敏之, 大日本耳鼻咽喉科科學會會誌. 35 卷. 10 號. 13) Mikulizy u. Kümmel, Krankheiten d. Mundes. 14) 入手野賢治, 日本齒科口腔科學會雜誌. 14 號. 15) 小野寅之助, 齒科病理學要綱. 16) Henke u. Lubarsch's Handbuch d. Pathohistologie. 17) 園田繁草, 京都府立醫科大學雜誌. 2 卷. 5 號. 18) Schürmann, Die Histogenese ekto-mesodermaler Mischgeschwulste d. Mundhöhle. 19) Scheff, Handbuch d. Zahnheilkunde. 20) Partsch, Handbuch d. Zahnheilkunde. 21) 都築正男, 日本齒科口腔科學會雜誌. 31 號. 22) 都築正男, 齒科學報. 33 卷. 5 號. 23) 高橋武雄, 口腔病學會雜誌. 4 卷. 2 號.

附 圖 說 明

第一圖 來院當時ノX線像

第二圖 手術時摘出セシ肉腫原發叢

第三圖 第二圖同様

第四圖 6 ノ髓腔底附近ヲ示ス。血管ノ擴張、齒髓組織ノ網様萎縮及石灰沈著、造齒細胞ノ退行性變化等顯著ナリ。

第五圖 6 ノ根端孔部齒髓ニ肉腫組織ノ浸潤シ始ノツ、アルヲ示ス。

第六圖 6 ノ根部白堊質ノ吸收ヲ示ス。

第七圖 6 ノ齒槽中隔ノ吸收ヲ示ス。及齒根膜纖維ノ破壞ヲ示ス。

第八圖 7 齒冠部ノ横斷切片。齒髓組織ノ破壞殊ニ空胞形成ノ顯著ナルヲ觀ル。

第九圖 8 齒冠部縱斷切片。

第十圖 8 根端孔部縱斷切片。

Pu 齒髓 D 根端部ノ象牙質 Pe 齒根膜

第十一圖 8 髓室天蓋部縱斷切片ノ一部ヲ擴大セシモノ。

第十二圖 第十圖ノ一部ヲ擴大セシモノ。

Pu 齒髓 D 象牙質 Pe 齒根膜

第十三圖 第八圖ノ一部ヲ擴大セシモノ。

Pu 齒髓 D 象牙質

第 一 圖 A

第 一 圖 B

第 二 圖

第 三 圖

第 四 圖

第 五 圖

第 六 圖

第 七 圖

第 八 圖

第 九 圖 A

第 九 圖 B

第 十 圖

第 十 一 圖

第 十 二 圖

第 十 三 圖