原

著

制癌剤の組織内濃度, 殊に顎口腔組織内濃度について

第 3 報 Adriamycin

秋 本 英 生

東京医科歯科大学口腔細菌学教室 (主任: 堀川高大教授)

(1976年 7 月14日受付)

Studies on Tissue Level of Anticancer Drugs with Special Reference to the Distribution into Oral Region Part III : Adriamycin

Hideo Akimoto

Department of Oral Microbiology, School of Dentistry,
Tokyo Medical and Dental University
(Director : Prof. Takahiro Horikawa)

要旨: 制癌剤 Adriamycin (ADM) の生体内動態, 殊に顎口腔組織の組織内濃度の測定を行い, 全身組織内濃度を比較検討し, ADM がいかなる動態を示すかを目的に本実験は行われた。

^3H -ADM 7.5mg/kg をウサギに静注後, 放射活性により組織内濃度を測定した。

その結果, 全身組織では血中濃度は急速に下降し, これに反し脾, 腎, 肺, 肝, 消化管等の組織内濃度は高値を示した。大部分の組織臓器では, 薬剤濃度が高値で持続する傾向がみられた。

口腔領域では, 口唇, 歯肉, 頬粘膜, 口腔底等の扁平上皮組織に中等度の薬剤分布がみられ, 分泌組織である唾液腺に著しく高濃度に, リンパ組織であるリンパ腺に比較的高濃度に分布しているのが特徴である。唾液中濃度は低値ではあるが, 長時間にわたり持続する傾向がみられた。全身組織の場合と同様に口腔組織においても薬剤濃度が持続する傾向を示した。

I. 緒 言

Adriamycin は1967年イタリアの Farmitalia 研究所の Arcamone, F.¹⁾ らにより発見された *Streptomyces Peucetius* var. *caesius* の産生する Anthracycline group に属する抗腫瘍性抗生物質である²⁾。ADM は DNA dependent の RNA および DNA 合成阻害に働く薬剤であり, 藤田³⁾ らによれば, ADM の血中濃度はきわめて低値

で速やかに下降する。排泄は主として胆汁から比較的緩慢に行われる。

急速に組織内に拡散し強い吸着が起こり, 酵素による不活性化があまり強くないため組織内濃度が高く, 長時間持続するのが特徴である。胆汁中の薬剤は吸収されにくく, 大部分はそのまま糞便中に排泄されることなどが示されている⁴⁾。一方, 顎口腔組織内分布についてはほとんど報告がない。本実験においては, ^3H -ADM (G) を用い

て全身および顎口腔組織の生体内動態につき比較検討し、本剤がいかなる動態を示すかを目的に研究を行った。

II. 実験方法

Adriamycin は、Farm Italy 社でトリチウムガス照射法により標識した ADM-³H(G) 比活性 13.64uci/mg を使用した。

使用に際して非放射性の ADM と混合し、2.74uci/mg の比活性のものを調製した。本剤をウサギ (3.3~3.9 kg) の耳静脈内に 7.5mg/kg 投与し、1時間および3時間後屠殺し、体液、組織の Radioactivity を Scintillation counter で測定する方法によった⁶⁾。

固体試料は、100~200mg と秤量し、乾燥後 oxidize 処理を行った。液体試料は、0.2~0.5ml を綿球に吸収させ、乾燥後 oxidize した。

装置は Aloka Automatic Sample Combustion system を用い、Scintillator は下記のごとくである。

Dioxane	1,000ml
Methanol	200ml
Toluene	200ml
Naphthalene	100ml
PPO : 2,5-diphenyloxazole	4g

III. 実験結果

表1、表2はトリチウムでラベルした ADM 7.5mg/kg をウサギ耳静脈に静注し、1時間および3時間後の全身各種臓器組織および口腔領域内の濃度を放射活性により測定した成績である。測定値 dpm/g とこの測定値 (dpm/g) を mcg/g に換算した表である (2匹の平均値)。

図1は、表1をグラフに示したものである。1時間値においては、血液濃度はきわめて低値である。これは本剤の組織内吸着がきわめて強くかつ速やかであることを示唆している。血中濃度の低いのに対し、組織内濃度は高値であり、特に肝、腎、脾、心、肺、消化管等に高濃度である。脳への分布は中等度に、眼球被膜、前房水は低値であ

表1 Tissue Level of ³H-Adriamycin in Rabbits Dose : 7.5mg/kg(i. v.)

Time	1 Hour		3 Hours	
	dpm/g	mcg/g	dpm/g	mcg/g
Brain	34,450	5.7	34,710	5.7
Eye {Tunics Aq. humor	9,905	1.6	9,465	1.6
	3,098	0.5	272	0.04
Heart	43,615	7.2	40,145	6.6
Lung	111,660	18.4	63,665	10.5
Thymus	18,770	3.1	27,805	4.6
Liver	75,480	12.4	25,075	4.1
Spleen	162,185	26.7	205,560	33.8
Kidney	183,080	30.1	154,785	25.4
Pancreas	75,790	12.5	68,760	11.3
Stomach	54,240	8.9	52,115	8.6
Intestine	36,520	6.0	32,805	5.4
Testis	6,385	1.0	4,120	0.7
Muscle	6,125	1.0	7,905	1.3
Skin	7,955	1.3	5,070	0.8
Serum	4,472	0.7	1,530	0.3
Urine	12,466	2.0	42,680	7.0
Bile	367,345	60.4	371,970	61.1

表2 Tissue Level of ³H-Adriamycin in the Oral Region of Rabbits Dose : 7.5mg/kg (i. v.)

Time	1 Hour		3 Hours	
	dpm/g	mcg/g	dpm/g	mcg/g
Lip	16,590	2.7	18,105	3.0
Gingiva	25,560	4.2	24,365	4.0
Tongue	27,000	4.4	26,990	4.4
Palate	16,245	2.7	15,580	2.6
B. Mucosa	23,300	3.8	26,520	4.4
Mouth floor	20,590	3.4	16,910	2.8
Submandibular gl.	114,905	18.9	95,365	15.7
Parotid gl.	53,775	8.8	60,730	10.0
Lymph gl.	28,555	4.7	42,365	7.0
Dental pulp	55,810	9.2	43,450	7.1
U. Incisor	5,920	1.0	6,580	1.1
U. Molar	7,495	1.2	4,480	0.7
L. Incisor	5,490	0.9	2,590	0.4
L. Molar	7,125	1.2	6,780	1.1
Maxilla	6,185	1.0	6,970	1.1
Mandibula	10,650	1.8	4,120	0.7

Dose: 7.5 mg/kg (i.v.)

図1 Tissue Level of ^3H -Adriamycin in Rabbits

Dose: 7.5 mg/kg (i.v.)

図2 Tissue Level of ^3H -Adriamycin in Rabbits

Dose: 7.5 mg / kg (i.v.)

図3 Tissue Level of ^3H -Adriamycin in the Oral Region of Rabbits

Dose : 7.5 mg / kg

Time : 0 - 3 Hours after i.v. Injection

図4 Salivary Level of ^3H -Adriamycin in Rabbits

った。これとは対照的に、胆汁中にきわめて高濃度に排泄されていることは、本剤の特性として注目する。

図2の3時間値で、1時間値と比較して特徴的なことは、脾、胸腺、および胆汁、尿中の薬剤濃度が逆に高くなっていることである。次いで、腎、心、消化管等に高濃度の分布が持続している。肺、肝は1時間値と比較して半値およびそれ以下となっているが、かなりの高濃度である。脳への分布は1時間値と同程度である。

図3は表2をグラフにしたものである。1時間値では口腔粘膜各部位の口唇、歯肉、舌、口蓋、頬粘膜、口腔底等ではいずれも中等度の分布を示している。唾液腺中顎下腺は著しく高濃度に、耳下腺は比較的高濃度に、リンパ組織であるリンパ腺は中等度の分布を示した。他制癌剤の場合と同様、歯髄は比較的高濃度に分布していた。硬組織の歯牙、および顎骨は低値であった。3時間値では、1時間値と比較して上欄の口腔粘膜各部位ではほとんど変化せず、薬剤濃度が持続する傾向を有し、また、唾液腺、リンパ腺に比較的高濃度に分布しているのが特徴である。このように口腔領域において ADM は、組織内で強く吸着され、長時間持続している。これは蓄積毒性および遅延毒性の強いことが予想される成績である。

図4の唾液中濃度では、血中濃度に比し低値であり、投与直後に最高濃度を示し、1時間ないし1時間30分でいったん下降するが、以後上昇、下降を繰り返す、長時間薬剤濃度が持続する傾向がみられた。

IV. 考 察

癌治療に最近用いられるようになった新抗腫瘍性抗生物質 ADM は、DNA dependent の RNA 合成の抑制作用を有する薬剤であり、白血病、悪性リンパ腫、各種固型腫瘍に有効で、構造的には Antracycline 系に属し、Daunomycin と酷似する抗腫瘍スペクトルが広く、高い治療係数を示している。腫瘍増殖抑制作用は強いが、ADM は投与後急速に組織内に取り込まれ、その後徐々に

排泄される特性を有しているため、投与量の増大により蓄積毒性による副作用が強いといわれる。そこで ADM の全身および顎口腔組織の生体内動態と比較し、制癌性および副作用との関連につき検討した。

図1、図2において血中濃度は急速に下降し、速やかに血中から臓器に移行したが、根岸はラットに ADM-³H(G) 1mg 静注後、2分で約40%が血中から消失し、10分後では90%以上が消失するが、投与後72時間においても微量の薬剤 (0.4 $\mu\text{g}/\text{ml}$) が存在していると述べている。

藤田らは Daunomycin について、投与後血中濃度は急速に下降するが、8~24時間に再上昇 (rebound curve) を報告し、この理由として、胆汁中に高濃度排泄された薬剤の再吸収と、組織に吸着された薬剤の血中への解離によることが考えられている。ADM の場合は、再上昇の値は比較的低いと述べている。

木村⁷⁾らは、ウサギを使用して抗菌活性により血中濃度の測定を行い、Benjamin⁸⁾らは、患者について蛍光分析法により測定し、ヒト、ウサギとも血中からの消失は速やかで、特に投与後数分間の血中からの消失はきわめて急速であると報告している。

尿中濃度は1~3時間値において、胆汁中濃度に比して低かったことは Bleomycin の場合と対照的である。腎への分布は高濃度であるが、清原⁹⁾らは腎機能に及ぼす影響は認められなかったことを報告している。

Franzo, D. ら¹⁰⁾は、最初の24時間値では11.5%、次の24時間では、3.5%が尿へ排泄されると述べている。

一方、ADM は優先的に胆汁から排泄され、胆汁へ排泄された薬剤は大部分糞便として排泄される。糞中排泄については、根岸は、投与後24時間で29%排泄され、その後も徐々に持続していると述べ、Benjamin ら¹¹⁾は、症例によりばらつきがみられ、肝機能と本剤の排泄に関係あることを報告している。

Bachur¹²⁾は、投与後32時間以内に50%のADM

が胆汁へ排泄されると述べている。

胆汁中に高濃度に排泄された薬剤の一部は小腸から吸収され、血中濃度の再上昇の原因となり、これがまた肝から胆汁へと排泄される。いわゆる entero-hepatic circulation である。根岸らも ADM の経口投与における実験で、小腸―門脈―肝臓経由による胆汁排泄を推測している。

各臓器内濃度は高値を示し、1～3時間値とも血中濃度の10～50倍の数値を示し、特に肝、腎、脾、心、肺、消化管に高濃度であった。

Arena¹³⁾ は、肝、腎、心、小腸に高濃度の分布を確認し、藤田らも同様の報告をしている。また、脾、リンパ節、骨髄は長時日にわたり高濃度の薬剤が保持され、蓄積することが示されている。

作用機序については、ADM は速やかに DNA と結合する。その様式は、DNA の Purine, Pyrimidine 塩基とイオン結合および水素結合にて結合し、RNA 合成および DNA 合成を抑制すると考えられている。ADM は細胞分裂周期のどの時期にも作用する。休止期の細胞にも主に核を中心として障害を来す。

Kim, S. H.¹⁴⁾ は Hela S-3 細胞を用いた実験で、S 期において DNA 合成がより強く抑制されることを明らかにしている。

Silvestrini¹⁵⁾ らは、同調培養した rat fibroblast を用いた実験で、Daunomycin は G₁ および G₂ 期に RNA 合成が S 期の終わりに DNA 合成がより強く阻害されると述べている。

下山¹⁶⁾ は、ADM の殺細胞作用は濃度依存性 (Concentration dependent) であるとし、薬剤の接触時間は短くても濃度さえ十分ならば効果を期待できると報告している。

臨床的に ADM は、急性白血病、悪性リンパ腫、肺癌、乳癌、各種肉腫、小児固型癌等に用いられ、その効果の認められることが報告されている¹⁷⁻²¹⁾。原ら²²⁾ は肺癌に対して著明な改善が認められたことを報告しているが、この成績は本実験において肺への分布が高濃度であることと関連があると推測される。

ADM の副作用の中で最も高率なのは脱毛である。Bonadonna²³⁾ は、いかなる投与法でもこの発現率を低下させることはできなかったとし、投与法に差はあるが、脱毛は85～96%、口内炎は37～79%、骨髄抑制作用は45～84%、その他の胃腸症状、発熱、血管外にもれたための局部壊死と、かなり激しい副作用を報告している。他の多くの人の臨床報告にも同様な副作用の報告がなされている²⁴⁻²⁸⁾。

心臓毒性 (心筋障害) については、Bleomycin, 5-Fu にみられない副作用である。Adamson, R. H.²⁹⁾ Lefrak, E.³⁰⁾ は、ADM の Aglycone がジギタリス配糖体と類似の作用を推定し、小林³¹⁾ も同様の報告をしている。そして Blum, R.³²⁾ は総投与量の多い場合、高齢の人、間歇大量投与の時、などに特に注意を要することを述べている。

これらの報告と本実験における心への高濃度分布との間には関連性のあることを示唆するものである。

顎口腔領域における ADM の分布に関しては、ほとんど報告がない。本実験において特徴的なことは、すべての口腔組織内濃度が Bleomycin, 5-Fu と異なり、1～3時間値で減少せず持続していることである。この事実は、ADM はいかなる組織にも吸着が速やかで強いことと、不活性化への代謝を受けにくいことを示唆させると同時に、臨床成績における副作用として口内炎の発現率が高率であることと関連があると思われる。

藤本³³⁾ は、投与法において動注、静注の両群における副作用の発現率につき、静注法が動注群の約2倍の頻度で発生したことを報告し、Bonadonnaらの提唱する E 投与法によれば、他の投与法の半分以下におさえられたとしている³⁴⁾。ADM の動脈内投与に関しては、DiPietro³⁵⁾ らの報告があり、舌癌、肝臓の細網肉腫の各1例、膀胱癌の3例に ADM 1回量 0.4mg/kg を隔日投与して著効をおさめたとし、頭頸部腫瘍や乳癌に有効であることを報告している。藤本³³⁾ は、本剤がいかなる組織にも吸着され組織特異性がないので、全身的にこれを投与すれば正常組織を強く障害する

が、これを腫瘍部位の支配動脈内に投与すれば、正常組織に対する障害を軽減できる可能性を述べている。

伊勢らは小児患者につき、全身投与法による副作用について述べ、大量 1 回投与群では、嘔吐の頻度は高く激烈であったが、口内炎の発生は認められず、中等量分割投与群では、口内炎の頻度が高いとしている。一方、木村、横山は、少量投与によっても腫瘍効果は期待でき、副作用を軽減できるとしている。

本薬剤の投与法、投与量については未だ確立していないが、過剰投与は特に注意すべきであろう。

図 3 にみられるように分泌組織、リンパ組織に比較的高濃度にみられることは、臨床における悪性リンパ腫、乳癌の治療成績から考えても本剤の特徴である。

顎骨、歯牙等の硬組織は低値を示しているが、歯髄には口腔組織中比較的高濃度に持続的に分布している。この歯髄の高値分布は、Bleomycin, 5-Fu の場合と同様であり、薬剤の特性によるものか、それとも歯髄の特性によるものか、今後検討を要する課題であろう。

歯牙に対する薬剤吸着については、ADM の構造と、Tetracycline 群のそれとは非常によく似ていることから、同じ傾向があるのではないかと考えられる。

すなわち、抗菌性抗生物質として使用される Tetracycline 類は、重金属、Cu, Ca 等と結合する性質を有し、そのためヒトや動物の歯牙や骨組織に取り込まれ、その部分は紫外線照射により蛍光性を発し、その性質は長期間保たれることが明らかにされた⁸⁶⁾。また硬組織内への取り込みの機構については、化学的、物理化学なもので、細胞の関与によるものではないといわれている⁸⁷⁾。

ADM も Tetracycline と構造上の類似から、硬組織の石灰化進行中の部位に沈着するのではないかとこの課題について、ADM 7.5mg/kg 投与後の歯牙について、石灰質薄片を作製し、蛍光顕微鏡により ADM の歯牙硬組織への沈着を観察した⁸⁸⁾。

しかし、Tetracycline にみられるような薬剤の沈着はみられなかった。

Radioactivity による ADM の歯牙硬組織内濃度もきわめて低値であった。

ADM は唾液腺にきわめて高濃度に分布したが、唾液中への分泌は少なく、濃度は約 2 桁低値であった。

以上 ADM の全身および顎口腔組織内の分布状態を述べ、制癌性と副作用の面から考察した。

謝 辞

稿を終るに臨み、終始ご懇篤なるご指導とご校閲を賜りました、本学口腔細菌学教室堀川高大教授、ならびに鶴見大学歯学部細菌学教室藤田浩教授、小川カツイ助手に深甚なる謝意を捧げるとともに、本研究にご理解とご協力を頂きました本学口腔細菌学教室、鶴見大学歯学部細菌学教室の皆様各位に感謝致します。

なお、本論文の要旨は、第 3 回鶴見歯学会において発表した。

³H-ADM をご提供戴いた協和醸酵工業に感謝致します。

文 献

- 1) Arcamone, F., et al.: Structure and Physicochemical Properties of Adriamycin. 1st International Symposium on Adriamycin, Milan Italy, 1971, Springer-Verlag, pp. 9-22.
- 2) DiMarco, A., et al.: Adriamycin (NSC-123127): A New Antibiotic with Antitumor Activity. Cancer chemo, Reports, 53: 33-37, 1969.
- 3) 藤田 浩: Bioassay 法による抗癌剤の体内分布、排泄、不活性化の特性について. 総合臨床, 20: 1350-1358, 1971.
- 4) Arena, E., et al.: Influence of Pharmacokinetic Variations on the Pharmacological Properties of Adriamycin, 1st International Symposium on Adriamycin, Milan Italy, 1971, Springer-Verlag, pp. 96-116.
- 5) 根岸嗣治, 他: The Absorption, Excretion, Distribution and Metabolism of Adriamycin. Clinical Report, 7: 73-79.
- 6) 樫田義彦, 他: Liquid Scintillation Counting の最近の進歩. Radioisotopes, 14: 152-165, 1965.

- 7) Kimura, K., et al.: Blood Levels. Tissue Distribution and Clinical Effects of Adriamycin, 1st International Symposium on Adriamycin. Milan Italy. 1971, Springer-Verlag 124-134.
- 8) Benjamin, R., et al.: Clinical Pharmacology and Therapeutics, 14: 592-600, 1973.
- 9) 清原 晃, 他: Adriamycin の一般薬理作用. 応用薬理, 6: 1075-1088, 1972.
- 10) Di Fronzo, G., et al.: Distribution and Excretion of Adriamycin in Man. Biomedicine, 19: 169-171, 1973.
- 11) Benjamin, R.: Cancer Chemotherapy Reports Part 1, 58: 271-273, 1974.
- 12) Bachur, N.: Tissue distribution and disposition of Daunomycin (NSC-82151) in mice: Fluoromeric and isotopic methods. Cancer Chemother. Rep., 54: 89, 1970.
- 13) Arena, E., et al.: Analysis of the Pharmacokinetic Characteristics. Pharmacological and Chemotherapeutic Activity of 14-Hydroxy-daunomycin (Adriamycin) Arzneimittel-Forsch (Drug Res.) Jahrgang, 21: 1258-1263, 1971.
- 14) Kim, S., et al.: Lethal Effect of Adriamycin on the Division Cycle of Hela Cells. Cancer Res., 32: 323-325, 1972.
- 15) Silvestrini, et al.: Interference of daunomycin with metabolic events of the cell in synchronized cultures of rat fibroblasts, Cancer Res, 30: 966, 1970.
- 16) 下山正徳, 他: 培養細胞を用いた癌化学療法の研究(2), L1210 mouse leukemia 培養細胞に対する各種制癌剤の殺細胞作用に就いて. 日本癌学会総会記事, 30: 178, 1971.
- 17) 小川一誠, 他: 悪性腫瘍に対する新抗癌剤. Adriamycin の臨床治験. 癌の臨床, 18: 806-812, 1972.
- 18) 牧野卓磨, 他: 白血病に対する Adriacin の効果. 血液と脈管, 4: 99-103, 1973.
- 19) 伊勢 泰, 他: 小児期悪性腫瘍の化学療法(第8報) 悪性固形腫瘍に対する Adriamycin の効果一. 小児科診療, 37: 54-62, 1974.
- 20) Frei III, E., et al.: Clinical Trials of Adriamycin, 1st International Symposium on Adriamycin. Milan Italy. 1971, Springer-Verlag, pp. 153-160.
- 21) Tan, C., et al.: Adriamycin An Antitumor Antibiotic in the Treatment of Neoplastic Diseases. Cancer, 32: 9-17, 1973.
- 22) 原 義雄, 他: Adriamycin の悪性腫瘍患者に対する臨床使用成績. 癌の臨床, 18: 336-340, 1972.
- 23) Bonadonna, G., et al.: Clinical Evaluation of Adriamycin, a New Antitumor Antibiotics. Brit. Med. J, 30: 503-506, 1969.
- 24) 横山正和, 他: Adriamycin による悪性腫瘍の治療成績. 癌の臨床, 20: 536-544, 1974.
- 25) 永松正宇, 他: Adriamycin の使用経験—末期癌, 再発癌を中心に—. 癌と化学療法, 1: 409-414, 1974.
- 26) 武正勇造: Adriamycin の臨床経験, アドリアシン文献集, 協和醸酵工業, K. K. 96-100, 1975.
- 27) 太田和雄, 他: 癌化学療法シンポジウム(4), II 癌化学療法をめぐる諸問題, 3. Adriamycin の作用機序とその臨床. 医学のあゆみ, 91: 161-166, 1974.
- 28) 山脇真也, 他: 骨肉腫肺転移に対する Adriamycin の効果. 癌の臨床, 21: 323-329, 1975.
- 29) Adamson, R. H.: Daunomycin (NSC-82151) and Adriamycin NSC-123127: A Hypothesis Concerning Antitumor and Cardiotoxicity-Letters. Cancer Chemo Reports Part1, 58: 293-294, 1974.
- 30) Lefrak, E., et al.: A Clinicopathologic Analysis of Adriamycin Cardiotoxicity. Cancer, 32: 302-304, 1973.
- 31) 小林利次: 新抗腫瘍剤 Adriamycin と Cardiotoxicity —その基礎と臨床. 医学のあゆみ, 80: 35-43, 1972.
- 32) Blum, R., et al.: Review of Adriamycin—A New Anticancer Drug with Significant Clinical Activity. Annals of Internal Medicine, 80: 249-259, 1974.
- 33) 藤本幹夫, 他: Adriamycin の臨床試用経験, 主に動注例についての検討. 癌の臨床, 19: 355-361, 1973.
- 34) Bonadonna, G.: Clinical Trials with Adriamycin in the Neoplastic Disease of Children and Adults. At the VII International Congress of Chemotherapy. Prague, 1971.
- 35) Di Pietro, S., et al.: Preliminary Trials with Adriamycin in Regional Antitumor Therapy by means of Arterial Infusion. G. Clin. Med., 50: 2182-2186, 1969.
- 36) Bevelander, G.: The effect of tetracycline on mineralization and growth, from "Advances in oral Biology, vol. 1", edited by P. H. STAPLE. Academic Press, New York, 1964, pp. 205-223.
- 37) 前田光葵: Tetracycline 投与による歯牙硬組織のラベリングと形成異常に関する実験的研究. 歯学, 57: 41-67, 1969.
- 38) 須賀昭一, 他: 歯の研究法・構造と組成. 東京, 1973, 医歯薬出版, 47-54ページ.