症	例
---	---

特発性血小板減少性紫斑病の 1 剖検例

高 木 実* 南 雲 正 男**

* 東京医科歯科大学歯学部口腔病理学教室, 検査部

** 東京医科歯科大学歯学部第 2 口腔外科学教室

(1980年 3 月19日 受付)

Idiopathic Thrombocytopenic Purpura

—Report of an Autopsy Case—

Minoru Takagi*, Masao Nagumo**

*Department of Oral Pathology, Dental Clinical Laboratory, Faculty of Dentistry,
Tokyo Medical and Dental University

**Second Department of Oral Surgery, Faculty of Dentistry,
Tokyo Medical and Dental University

I. 緒 言

紫斑とは赤血球の血管外滲出により皮膚や口腔, 鼻腔その他の粘膜が紫赤色を呈するもので, 異常出血の一症状であり, 止血機序の血管相や血小板相の種々の障害で出現する。紫斑病の口腔症状は歯肉辺縁からの自然出血や易出血性, 他の口腔粘膜の点状ないし斑状, 瀰漫性出血などであり, 口腔症状が紫斑病の初発症状となることもある。著者らは著明な歯肉出血を主徴とする特発性血小板減少性紫斑病の 1 剖検例を経験し得たので報告する。

II. 症 例

54歳家婦。既往歴に特記すべきことはない。現病歴としては昭和47年2月29日, 夫の入院付き添い中の夜間に突然激しい歯肉出血が出現し, この時の血液検査では赤血球数345万/mm³, ヘマトクリット31%, 出血時間10分であった。3月1日に本学第2口腔外科に入院したが, 血小板は 0/mm³で

あり, 骨髓穿刺所見とあわせて特発性血小板減少性紫斑病と診断された。その後皮下出血が四肢にも出現したが, 歯肉出血が経過中の主要症状であった。すなわち歯肉出血は peripack で止血処置されたが止血しにくく, 出血量は重量測定によれば3月1日 306g, 2日 467g, 3日 300g, 4日 200g, 5日 180g, 6日 150g, 8日 230g, 9日 85g, 10日 130g, 11日 240g, 12日 70g で総量 2,280g であった。治療は peripack による局所止血処置の他にプレドニン投与(総量 39g)と新鮮血輸血(総量 2,125ml)がなされた。3月11日39.2℃の発熱があり, 血液の細菌培養試験は陰性であった。12日午後多量のタール便排出後, 強度の頭痛, 嘔吐, 意識混濁から昏睡状態に陥り, 頭痛発現後約2時間で死亡した。

臨床検査所見では末梢血液像は表1にみられるように血小板数は発症2日目ですでに0/mm³で, その後増加していない。出血時間, 凝固時間は軽度延長するがプロトロンビン時間, 部分トロンボプラスチン時間, 血漿フィブリノーゲン値などに

表1 末梢血液像

	3月1日	3月4日	3月10日
血色素(g/dl)	10.1		
赤血球数(万/mm ³)	345	237	454
ヘマトクリット(%)	31	21	33
白血球数(/mm ³)	6700	4100	7300
桿状核球(%)	20		
分葉核球(%)	67		
リンパ球(%)	13		
血小板数(/mm ³)	0		0
出血時間(分)	10		
凝固時間(分)	10		
プロトロンビン時間(秒)	11.9		
部分トロンボプラスチン時間(秒)	78.5		
フィブリノーゲン(mg/dl)	406		

表2 骨髓像

	3月1日
穿刺部位	胸骨骨髓
有核細胞数	18.5×10^4
多染性正赤芽球(%)	16.4
正染性正赤芽球(%)	4.0
骨髓芽球(%)	0.4
前骨髓球(%)	4.8
後骨髓球(%)	12.8
骨髓球(%)	12.8
桿状核球(%)	16.0
分葉核球(%)	10.0
好酸球(%)	2.0
単球(%)	4.0
リンパ球(%)	16.4
形質細胞(%)	2.4
脂肪量	普通量

異常は認められなかった。赤血球数、ヘマトクリット値は出血量の増加とともに減少している。骨髓像は表2にみられるようであり、骨髓穿刺標本では骨髓巨核球の血小板形成能の著明な減退がみられた。血液化学、尿所見には著変はなかった。

剖検所見としては出血は脳、皮膚、口腔、鼻腔、咽頭、食道、胃、大腸、肛門、腎臓、膀胱、心臓、肝臓、横隔膜、腹膜、胸膜など全身性に認められ(図1)、特に脳では実質内、脳室内および

図1 舌や咽頭の粘膜下に小出血斑がみられる。

図2 小脳クモ膜下腔に瀰漫性の出血がみられる。

図3 骨髓生検の組織像で、骨髓巨核球の減少はみられない。赤芽球系細胞の軽度の増生がある。H-E染色、 $\times 300$ 。

クモ膜下腔に大量出血があり(図2)、直接死因となっている。骨髓は生検では軽度低形成性だが、巨核球数の減少はなく、赤芽球系造血能はやや亢進している(図3)。剖検では、大腿骨、脊椎骨、胸骨骨髓を検索したが、同様の所見がみられた(図

図4 剖検時骨髓の組織像で、細胞成分は豊富であり、生検とはほぼ同様の組織像を示す。H-E染色、 $\times 300$ 。

4)。すなわち巨核球数の減少はなく、むしろ増加しており、赤芽球および顆粒球系造血能は障害されていない。骨髓線維化はなく、軽度の血鉄症がみられた。巨核球の形態を①クロマチン網工が明瞭で豊富な好酸性ないし好塩基性胞体をもつもの、②核が濃縮性で豊富な好酸性胞体をもつもの、③空胞状の核と少量の胞体をもつもの、④胞体内に他の血球成分を含むもの、⑤好酸性胞体片に分類して、その出現頻度を検討すると、生検、剖検材料ともに②①④③⑤の順に多かった。

Ⅲ. 考 察

血小板減少症は病因の不明な原発性血小板減少症と明らかな症候性血小板減少症に分類され、骨髓巨核球の減少の有無により巨核球減少性血小板減少症と巨核球非減少性血小板減少症に分類される。巨核球減少性血小板減少症には 1)再生不良性貧血、放射線障害、薬物中毒、先天性血小板減少症のように巨核球の血小板産生能の低下によるもの、2)白血病や他の悪性腫瘍による骨髓の広汎な破壊によるもの、3)悪性貧血、肝疾患、壊血病などの栄養障害によるものがある。巨核球非減少性血小板減少症には 1)免疫機序に基づくと考えられるもの、2)パンチ症候群などの脾臓機能亢進によるもの、3)充血性脾腫、血管腫症など血小板の貯溜によるもの、4)多発性血管内凝固などの血小板消費によるもの、5)保存血大量輸血などによ

る血液の稀釈によるものなどがある。免疫学的機序に基づくと考えられる血小板減少症には特発性血小板減少性紫斑病、Evans症候群、全身性紅斑性狼瘡、血栓性血小板減少性紫斑病、新生児血小板減少症、薬物アレルギー性血小板減少症などがある¹⁾。血小板減少の機序が骨髓巨核球の無いし低形成や成熟障害などに起因するものを中心性血小板減少症、骨髓の血小板産生能には異常はないが末梢での血小板破壊が亢進して起こるものを末梢性血小板減少症と分類することもある。

自験例は特発性血小板減少性紫斑病の1剖検例で口腔症状を経過中の主症状とした。特発性血小板減少性紫斑病の口腔症状は出血傾向によるもので、歯肉辺縁からの自然出血、口腔粘膜の出血斑、抜歯などの手術後の止血困難、歯肉囊内凝血に起因する口臭などがある²⁻⁹⁾。歯髓内にも出血が起こるといわれる。特発性血小板減少性紫斑病に限らず出血傾向を示す血液疾患は一般にその初発症状を口腔に起こすことが少なくない。特発性血小板減少性紫斑病調査研究班の調査^{10,11)}によれば、歯肉出血の頻度は79.5%で紫斑(91.3%)に次いで多い。その内訳は急性型では男6/12(50.0%、出血程度 $\pm$ 2例、 $+$ 4例)、女22/25(88.0%、 $\pm$ 14例、 $+$ 8例)で合計28/37(75.7%)であり、慢性型では男9/22(40.9%、 $\pm$ 1例、 $+$ 8例)、女86/95(90.5%、 $\pm$ 22例、 $+$ 64例)で合計95/117(81.2%)である。型不明の8例、疑い症例の9例を含めた全体では136/171(79.6%)であり、男18/41(43.9%、 $\pm$ 3例、 $+$ 15例)、女118/130(90.8%、 $\pm$ 38例、 $+$ 80例)である。小児例では165例中の25例(15.2%)に歯肉出血がみられており、成人に比較して頻度が低い($P < 0.001$)。

自験例では突発性に起こった歯肉出血で発症し、局所の止血処置やステロイド投与による治療にもかかわらず、歯肉出血が停止せず、12日間に出血総量が2,280gになる大量出血があった。経過中に皮下出血もみられたが、症状としては口腔症状が主体であった。経過は急速であり、発症後12日で脳出血にて死亡した。

特発性血小板減少性紫斑病はその症状の経過に

より急性型と慢性型に分けられるが、自験例は急性型である。両者を比較すると血小板数は急性型で急速に著明な減少がある。血小板の形態は慢性型で大型のものをみる。巨核球は急性型では変性空胞が出現し、慢性型では数が増加する。血小板輸血の治療効果は急性型で短い。患者血清を正常人に輸注した時の血小板減少効果や血小板凝集素は慢性型によくみられる¹²⁻¹⁴⁾。

特発性血小板減少性紫斑病の病因はなお不明であるが、自己免疫の機序で生じた抗血小板抗体ないし血小板減少因子が存在し、これが血小板崩壊の原因とする証拠が増えつつある¹⁵⁻¹⁸⁾。免疫学的発生機序を示唆する所見としては 1) 本症患者の血小板は寿命が短く、循環系より速やかに消失する、2) 患者血清ないし血漿を正常人に輸注すると血小板減少が惹起される、3) 正常人の血小板を患者に輸注すると正常血小板の寿命が短縮する、4) ヒトと同種抗原性をもつウサギに患者血清を輸注するとウサギ血小板の著明な減少がみられる、5) 本症罹患妊婦からの新生児には母親が脾摘で寛解期であっても血小板減少性紫斑病をみることがある、6) 血小板減少因子と考えられるものは7S- γ グロブリンと同定されている、7) 本症は他の自己免疫性疾患である自己免疫性溶血性貧血、全身性紅斑性狼瘡、橋本甲状腺炎、Sjögren 症候群などを合併することがある、8) 本症が全身性紅斑性狼瘡の前駆症状となることがある¹⁹⁻²¹⁾、9) 本症に免疫抑制剤が有効である²²⁾、ことなどがあげられる。

血小板に抗原性のあることは抗血小板血清で実験的に血小板減少性紫斑病を惹起できることや頻回輸血時に同種抗体が認められることから示唆される。抗血小板抗体の検出法には血小板凝集試験、補体結合反応、抗グロブリン消費試験、セロトニン摂取阻止試験、セロトニン放出試験、混合培養法などがある。しかしこれらの検査法は再現性が必ずしも良好ではなく²³⁾、また特異性は完全でなく、自己血小板抗体、同種血小板抗体、HL-A 抗体やその他の抗体との非特異的反応を除外できない。現在用いることのできる検出法では抗血小板抗体を証明し得ない症例も少なくはないの

で、本症の発生機序を考えるに際しては、これらの陰性結果は必ずしも抗血小板抗体の病因的意義を否定するものではないとする意見が強い。検出反応の陰性結果を起こす原因としては血小板の免疫学的障害のための感受性の変化や抗血小板抗体の多様性などが考えられている^{24, 25)}。一方、抗血小板抗体の存在と血小板減少の程度、血小板の寿命、血小板の recovery、血小板の turnover の間に相関関係は認められておらず²⁶⁾、このように抗血小板抗体と特発性血小板減少性紫斑病の病態に相関を見いだせないことは病因として抗血小板抗体の関与する機序の存在を疑わせるものと理解することもできる。

特発性血小板減少性紫斑病の時の骨髓は自験例でもみられたように、低形成性ではなく増殖性であり、特に巨核球の増殖が特徴的である²⁷⁻³⁰⁾。巨核球の変化として Dameshek²⁷⁾ は 1) 幼若型巨核球である巨核芽球の相対的増加と前骨髓球の減少、2) 細胞質顆粒の消失、空胞の出現などの形態的变化、3) 血小板形成をする巨核球の著明な減少、4) 脾摘後これらの諸変化の改善をあげているが、他の報告者も同様の所見を述べている。これらの骨髓の増殖性変化の起こる原因については、末梢での血小板の過度の崩壊に対する代償性増殖の結果として起こるとする考えと、抗血小板抗体による巨核球の障害性変化として起こるとする考えがある。骨髓巨核球の細胞表面には血小板との共通抗原の存することは蛍光抗体法で確認されており³¹⁾、安永³²⁾は蛍光抗体法で本症患者血清中には正常血小板や巨核球原形質と特異的に反応する IgG があることを認めている。このようなことから、特発性血小板減少性紫斑病の発生様式は抗血小板抗体により流血中の血小板が破壊されるとともに、骨髓巨核球もその細胞表面に付着した抗体によって血小板産生機能が障害されるのではないかと考えられている。しかし、詳細は血小板回転に関する一般所見や免疫学的機構がさらに明確にされることによって明らかになるとと思われる。抗血小板抗体は液性抗体であるが、細胞性免疫機序の関与を示唆する所見もある³³⁻³⁵⁾。

血小板の崩壊部位は ^{51}Cr 標識赤血球輸注後の体表からの γ 線計測や脾摘後の症状の改善をみることから脾臓 および 肝臓が主体と考えられており^{36, 37)}, 脾型, 肝型, 肝脾型, 全身型に分類されている。脾臓の変化としては重量の増加, 胚中心の形成を伴うリンパ濾胞の肥大がみられ, 赤脾髄の空胞化を認める時もある³⁸⁻⁴⁰⁾。

IV. 結 語

歯肉出血を主症状とした特発性血小板減少性紫斑病の1剖検例を経験したので報告するとともに, 本症の発生機序について文献的考察を行った。

田中康一博士(東京都老人病研究所)のご指導に感謝いたします。

文 献

- 1) 脇坂行一, 安永幸二郎: 血小板産生の異常「血液の生化学—基礎と臨床」, 朝倉書店, 1969, 453-467ページ。
- 2) Thoma, K. H.: Thrombocytopenic purpura with bleeding from the gingiva. *Oral Surg.*, 1: 8-16, 1948.
- 3) Peltier, J. R. & Olivier, R. M.: Oral manifestations of idiopathic thrombocytopenic purpura. *J. Oral Surg., Anesth. & Hosp. D. Serv.*, 19: 130-135, 1961.
- 4) Lucas, O. N., Young, K., Finkelman, A. & Tocantins, L. M.: Oral surgery in thrombocytopenic patients. *Oral Surg.*, 17: 572-580, 1964.
- 5) Linenberg, W. B.: Idiopathic thrombocytopenic purpura. Report of a case. *Oral Surg.*, 17: 22-30, 1964.
- 6) 石 泰三, 石 武雄: 特発性血小板減少症の2例. *口科誌*, 19: 941-945, 1970.
- 7) Jackson, L. & Staples, A. F.: Hemorrhagic diathesis with oral symptoms. Report of case. *J. A. D. A.*, 85: 151-153, 1972.
- 8) Uhtman, A. A. & Perriman, A. O.: Oral manifestations of hematological disorders. Report of four cases. *N. Y. State D. J.*, 39: 27-28, 1973.
- 9) Weiss, J. I.: Thrombocytopenic purpura. The dentist's responsibility. *J. A. D. A.*, 87: 165-167, 1973.
- 10) 山中 学: アンケートによる成人ITPの病態調査. 厚生省特定疾患特発性血小板減少性紫斑病調査研究班, 昭和50年度研究業績報告書, 99-143ページ。
- 11) 小宮正文: 本邦に於けるITP診療の現況—第1次調査研究班の業績を中心として. 厚生省特定疾患特発性血小板減少性紫斑病研究班, 昭和51年度研究業績報告書, 219-243ページ。
- 12) Hirsch, E. O. & Dameshek, W.: "Idiopathic" thrombocytopenia. Review of eighty-nine cases with particular reference to the differentiation and treatment of acute(self-limited) and chronic types. *Arch. Intern. Med.*, 88: 701-728, 1951.
- 13) Doan, C. A., Bouroncle, B. A. & Wiseman, B. K.: Idiopathic and secondary thrombocytopenic purpura. Clinical study and evaluation of 381 cases over a period of 28 years. *Ann. Intern. Med.*, 53: 861-876, 1960.
- 14) 斎藤昌信: ITP, 「免疫血液学」, 医学書院, 1973, 170-189ページ。
- 15) Baldini, M.: Idiopathic thrombocytopenic purpura. *New Engl. J. Med.*, 274: 1360-1367, 1966.
- 16) Wakisaka, G.: Studies on platelet antibodies in idiopathic thrombocytopenic purpura and experimental thrombocytopenia. *日血会誌*, 27: 663-680, 1964.
- 17) 寺田秀夫, 風間和男, 佐野欣一: 特発性栓球減少症患者血清の家兎栓球減少効果について. *臨床血液*, 10: 444-452, 1969.
- 18) 安永幸二郎: 特発性血小板減少性紫斑病と血栓性血小板減少性紫斑病「自己免疫病のすべて」. 南江堂, 1976, 302-313ページ。
- 19) Dameshek, W. & Reeves, W. H.: Exacerbation of lupus erythematosus following splenectomy in "idiopathic" thrombocytopenic purpura and autoimmune hemolytic purpura. *Am. J. Med.*, 21: 560-566, 1960.
- 20) Rabinowitz, Y. & Dameshek, W.: Systemic lupus erythematosus after "idiopathic" thrombocytopenic purpura. A review. *Ann. Intern. Med.*, 52: 1-28, 1960.
- 21) 中沢博江, 他: 長期間, 血小板減少性紫斑病で経過した S. L. E. の1例. *臨床血液*, 11: 127-131, 1970.
- 22) Finch, S. C.: Immunosuppressive therapy of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. *Am. J. Med.*, 56: 4-12, 1974.
- 23) 安永幸二郎, 他: 特発性血小板減少性紫斑病症例における血小板抗体の検出について—血小板抗体検査方法による比較と検査施設間の比較(統報). 厚生省特定疾患特発性血小板減少性紫斑病調査研究班, 昭和50年度研究業績報告書, 144-154ページ。
- 24) Kuramoto, A.: Mechanism of thrombocytopenia in idiopathic thrombocytopenic purpura

- (ITP). IV. Evaluation of fluorescent antibody method and specific staining of platelets and megakaryocytes of ITP. *Acta Haem. Jap.*, 29: 819-830, 1966.
- 25) Karpatkin, S. & Siskind, G. W.: In vitro detection of platelet antibody in patients with idiopathic thrombocytopenic purpura and systemic lupus erythematosus. *Blood*, 33: 795-812, 1969.
 - 26) 蔵本 淳, 沖田 肇, 藤村欣吾, 井原章裕: ITPの血小板回転—とくに摘脾の適応をめぐって. 厚生省特定疾患特発性血小板減少性紫斑病調査研究班, 昭和49年度研究業績報告書, 205-228ページ.
 - 27) Dameshek, W.: Idiopathic thrombocytopenic purpura. *Ser. Haematol.*, 9: 61-75, 1965.
 - 28) Valentine, E. M.: Idiopathic thrombocytopenic purpura. A study of three cases with special reference to changes in the megakaryocytes. *Amer. J. Med. Sci.*, 214: 260-267, 1947.
 - 29) 浦野順文, 中沢正樹: 特発性血小板減少性紫斑病の病理学的考察—主に剖検例について. 厚生省特定疾患特発性血小板減少性紫斑病調査研究班, 昭和48年度研究業績報告書, 49-68ページ.
 - 30) 野村武夫, 川田健一, 長沢俊郎: 特発性血小板減少性紫斑病における骨髓巨核球の特徴について. 厚生省特定疾患特発性血小板減少性紫斑病調査研究班, 昭和51年度研究業績報告書, 77-88ページ.
 - 31) Pizzi, F., Carrara, P. M., Aldeghi, A. & Eridani, S.: Immunofluorescence of megakaryocytes in the thrombocytopenic purpuras. *Blood*, 27: 521-526, 1966.
 - 32) 安永幸二郎: 特発性血小板減少性紫斑病. *臨床血液*, 13: 504-509, 1972.
 - 33) Clancy, R.: Cellular immunity to autologous platelets and serum-blocking factors in idiopathic thrombocytopenic purpura. *Lancet*, 1: 6-9, 1972.
 - 34) Wybran, J. & Fudenberg, H. H.: Cellular immunity to platelets in idiopathic thrombocytopenic purpura. *Blood*, 40: 856-861, 1972.
 - 35) 本間光夫, 森本幾夫, 安部 達, 原まさ子: ITP及びSLEと細胞性免疫. 厚生省特定疾患特発性血小板減少性紫斑病調査研究班, 昭和51年度研究業績報告書, 181-192ページ.
 - 36) Najean, Y. & Aradillou, N.: The sequestration site of platelets in idiopathic thrombocytopenic purpura. Its correlation with the results of splenectomy. *Brit. J. Haemat.*, 21: 153-164, 1971.
 - 37) Aster, R. H.: Platelet sequestration studies in man. *Brit. J. Haemat.*, 22: 259-263, 1972.
 - 38) 網川省三, 免疫血液学疾患における脾臓の病理組織学的研究. *日血会誌*, 31: 1066-1081, 1968.
 - 39) 島峰徹郎, 網川省三: 免疫血液疾患の造血組織の変化. 「免疫の病理」. 朝倉書店, 1969, 448-460ページ.
 - 40) Ishihara, T., Matsumoto, N. & Uchino, F.: Foamy histiocytes in the spleen associated with idiopathic thrombocytopenic purpura. *Acta Path. Jap.*, 24: 273-284, 1974.