THÉORÈMES FONDAMENTAUX DE LA THÉORIE DES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES, II

Par

Masuo HUKUHARA

(Reçu le 16 janvier, 1940)

TABLE DES MATIÈRES

1. Rappel du théorème fondamental	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1
2. Notions fondamentales	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2
3. Un lemme sur la fonction de M. KAMKE	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4
4. Comparaison à l'aide de la fonction de M. KAMKE	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5
5. Comparaison d'un système différentiel avec une seule équation différentielle	...	...	...	...	...	...	...	...	...	12
6. Théorème d'unicité	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15
7. Continuité	...	...	...	...	...	...	...	...	...	16
8. Dérivabilité	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17
9. Analyticité	...	...	...	...	...	...	...	...	...	23
COMPLÉMENTS AU PREMIER MÉMOIRE	...	...	...	...	...	...	...	...	...	24

1. Rappel du théorème fondamental. Nous allons étendre, dans ce présent mémoire, les résultats du Premier Mémoire au cas d'un système d'équations différentielles à l'aide de la fonction S de M. KAMKE.

Rappelons d'abord le théorème d'existence établi par moi⁽¹⁾.

Nous désignons par $\vec{y}$ le point dont les coordonnées sont $y_1, y_2, \dots, y_n$, de sorte que le système d'équations différentielles

$$y'_j = f_j(x, y_1, \dots, y_n) \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

peut être représenté par une seule équation

(1) 福原, 常微分方程式ノ基本定理, I, 日本數學物理學會誌, 5 (1931), 331-334.

$$(1) \quad \vec{y}' = \vec{f}(x, \vec{y}).$$

Le théorème s'énonce alors comme il suit.

THÉOREME 1. Soit E un ensemble de points (dans l'espace à $n + 1$ dimensions) fermé sur un ensemble D qui le contient. Soit $\vec{f}(x, \vec{y})$ une fonction continue dans E . Nous supposons de plus les hypothèses suivantes remplies :

1° A chaque point $(x_0, \vec{y}_0)$ de E , on peut faire correspondre un nombre positif δ tel que le point $(x, \vec{y})$, satisfaisant aux relations

$$0 \leq x - x_0 < \delta, \quad \left| \frac{\vec{y} - \vec{y}_0}{x - x_0} - \vec{f}(x_0, \vec{y}_0) \right| < \delta,$$

appartient à D .

2° A chaque point $(x_0, \vec{y}_0)$ de E , on peut faire correspondre une fonction $\vec{\varphi}(x)$ continue dans l'intervalle $0 \leq x - x_0 < \delta$, contenue dans $E^{(2)}$ et satisfaisant aux relations

$$\vec{\varphi}(x_0) = \vec{y}_0, \quad \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{\vec{\varphi}(x) - \vec{y}_0}{x - x_0} = \vec{f}(x_0, \vec{y}_0).$$

Dans ces hypothèses, il existe au moins une solution de (1), continue dans un certain intervalle $x_0 \leq x < a$, contenue dans E et satisfaisant à la condition initiale $\vec{y}(x_0) = \vec{y}_0$, $(x_0, \vec{y}_0)$ désignant un point quelconque de E . Si l'on ne peut prolonger cette solution $\vec{y}(x)$ au delà de $x = a$, la suite de points $\{(a_m, \vec{y}(a_m))\}$ ne peut converger en un point de E , de quelque manière qu'on choisisse la suite croissante $\{a_m\}$ tendant vers a .

2. Notions fondamentales. Nous introduisons maintenant quelques notions très utiles dans la suite.

DÉFINITION 1. Un ensemble E , contenu dans D , est dit *majorant à droite en D* , si la propriété suivante est vérifiée :

Une solution quelconque de (1), issue d'un point $(x_0, \vec{y}_0)$ de E , continue dans un intervalle $x_0 \leq x \leq a$ et contenue dans D , est nécessairement contenue dans E .

(2) Cela veut dire que la courbe $\vec{y} = \vec{\varphi}(x)$ est contenue dans E .

On définira de la même manière ensemble *majorant à gauche* en D .

Les théorèmes suivants sont évidents.

THÉORÈME 2. Si E est majorant à droite en D , $D-E$ est majorant à gauche en D .

THÉORÈME 3. La somme et le produit d'un nombre fini ou infini d'ensembles majorants à droite en D sont aussi majorants à droite en D .

THÉORÈME 4. Pour qu'un ensemble E (contenu dans D) fermé sur D soit majorant à droite en D , il suffit qu'il soit *localement majorant à droite en D* ⁽³⁾.

DÉFINITION 2. S'il existe un nombre positif δ tel que le point $(x, \vec{y})$, satisfaisant aux relations

$$0 \leq x - x_0 < \delta, \quad \left| \frac{\vec{y} - \vec{y}_0}{x - x_0} - \vec{f}(x_0, \vec{y}_0) \right| < \delta,$$

appartient à D , l'ensemble D est dit *dominant à droite en $(x_0, \vec{y}_0)$* . Si D est dominant à droite en chaque point de E , D est dit *dominant à droite en E* .

On définira de la même manière ensemble *dominant à gauche* en un point ou en un ensemble.

DÉFINITION 3. S'il existe une fonction $\vec{\varphi}(x)$ continue dans un intervalle $0 \leq x - x_0 < \delta$, contenue dans E et satisfaisant aux relations

$$\vec{\varphi}(x_0) = \vec{y}_0, \quad \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{\vec{\varphi}(x) - \vec{y}_0}{x - x_0} = \vec{f}(x_0, \vec{y}_0),$$

D est dit *quasi dominant à droite en $(x_0, \vec{y}_0)$* . Si D est quasi dominant à droite en chaque point de E , D est dit *quasi dominant à droite en E* .

On définira de la même manière ensemble *quasi dominant à gauche* en un point ou en un ensemble.

En employant ces terminologies, nous pouvons énoncer les hypothèses 1° et 2° du théorème 1 comme il suit :

(3) Cela veut dire qu'à chaque point $(x_0, \vec{y}_0)$ de E on peut faire correspondre un nombre positif h tel qu'une solution quelconque, issue du point $(x_0, \vec{y}_0)$ et contenue dans D , est contenue dans E pour $0 \leq x - x_0 < h$.

1° D est dominant à droite en E .

2° E est quasi dominant à droite en soi.

Les théorèmes suivants sont évidents.

THÉORÈME 5. Si D_k est (quasi) dominant à droite en E_k , $\sum_k D_k$ est (quasi) dominant à droite en $\sum_k E_k$, l'indice k pouvant prendre en nombre fini ou infini de valeurs.

THÉORÈME 6. Si D_k est dominant à droite en E_k ($k = 1, 2, \dots, m$), $\prod_{k=1}^m D_k$ est dominant à droite en $\prod_{k=1}^m E_k$.

THÉORÈME 7. Si D_1 est dominant à droite en E_1 et si D_2 est quasi dominant à droite en E_2 , $D_1 D_2$ est quasi dominant à droite en $E_1 E_2$.

THÉORÈME 8. Si $E(\subset D)$ est fermé sur D et dominant à droite en soi, il est majorant à droite en D .

DÉFINITION 4. Un point $(x_0, \vec{y}_0)$ de D est dit *régulier à droite par rapport à D* si l'on peut trouver un nombre positif h tel que deux solutions, satisfaisant aux relations

$$\vec{y}(x_0) = \vec{y}_0, \quad (x, \vec{y}(x)) \in D,$$

coïncident dans l'intervalle $0 \leq x - x_0 < h$. Si l'équation (1) est régulière à droite en chaque point de E par rapport à D , l'équation est dite *régulière à droite en E par rapport à D* .

On définira de la même manière équation *régulière à gauche* en un point ou en un ensemble. Si une équation est régulière à droite et à gauche, elle est dite *régulière*.

THÉORÈME 9. Supposons remplies les hypothèses du théorème 1. Si de plus l'équation (1) est régulière à droite en E par rapport à D , E est majorant à droite en D .

En effet, soit $\vec{y}(x)$ une solution issue d'un point $(x_0, \vec{y}_0)$ de E , continue dans un intervalle $x_0 \leq x \leq a$ et contenue dans D . Le théorème 1 montre qu'il existe une telle solution $\vec{y} = \vec{\varphi}(x)$ issue du point $(x_0, \vec{y}_0)$ et contenue dans E . Puisqu'il n'existe qu'une telle solution, $\vec{y}(x)$ coïncide avec $\vec{\varphi}(x)$.

3. **Un lemme sur la fonction de M. KAMKE.** Avant d'aller plus loin, établissons un lemme concernant la fonction de M. KAMKE. Nous désignons toujours par $S(\vec{y})$ une fonction de M.

KAMKE. C'est une fonction continue dans tout l'espace (à n dimensions), s'annulant à l'origine et satisfaisant aux inégalités

$$(2) \quad D^{\pm} S(\vec{y}(x)) \leq S(D^{\pm} \vec{y}(x))$$

pour toute fonction $\vec{y}(x)$ admettant les dérivées à droite et à gauche. Remplaçons $\vec{y}(x)$ par $\vec{y}(-x)$ et puis x par $-x$. Nous obtenons alors

$$(3) \quad D^{\pm} S(\vec{y}(x)) \geq -S(-D^{\pm} \vec{y}(x)).$$

LEMME. Si $S(\vec{y})$ est une fonction de M. KAMKE, elle satisfait aux inégalités (2) et (3) pour toute fonction $\vec{y}(x)$ admettant les dérivées à droite et à gauche.

Remarquons encore qu'une fonction de M. KAMKE est positivement linéaire et convexe, et réciproquement⁽⁴⁾.

4. Comparaison à l'aide de la fonction de M. KAMKE. Soit $\varpi(x)$ une fonction continue dans l'intervalle $a \leq x < b$. Dans quel cas peut-on affirmer que l'ensemble D , défini par

$$(4) \quad a \leq x < b, \quad S(\vec{y}) \geq \varpi(x),$$

est dominant à droite en un ensemble E contenu dans D ? Nous supposons que $\vec{f}(x, \vec{y})$ est définie dans E . Il est clair que D est dominant à droite en un point de E situé à l'intérieur, par rapport à $a \leq x < b$, $|\vec{y}| < +\infty$ ⁽⁵⁾, de D . Nous considérons donc un point $(x_0, \vec{y}_0)$ de E situé sur la frontière, par rapport à $a \leq x < b$, $|\vec{y}| < +\infty$, de D . On a évidemment

$$(5) \quad a \leq x < b, \quad S(\vec{y}) = \varpi(x), \quad (x, \vec{y}) \in E$$

pour $x = x_0$, $\vec{y} = \vec{y}_0$. D'après le lemme établi au n° précédent, on a

$$D^+ S(\vec{y}_0 + \vec{z}(x - x_0)) \geq -S(-\vec{z}).$$

Supposons que $\bar{D}^+ \varpi(x)$ prend, pour $x = x_0$, une valeur γ_0 moindre

⁽⁴⁾ M. HUKUHARA, *Sur la fonction $S(x)$ de M. KAMKE*, Jap. Journ. Math. 17 (1941), 289-298.

⁽⁵⁾ $|\vec{y}|$ désigne la quantité $\sqrt{y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2}$.

que $c_0 = -S(-\vec{z}_0)$, où $\vec{z}_0 = \vec{f}(x_0, y_0)$. Si $h (> 0)$ est assez petit, on aura

$$\underline{\omega}(x) \geq \underline{\omega}(x_0) + c(x - x_0)$$

pour $0 \leq x - x_0 < h$, où c est un nombre plus grand que γ_0 et plus petit que c_0 . On choisit $\delta (> 0)$ de manière que $-S(-\vec{z}) > c$ pour $|\vec{z} - \vec{z}_0| < \delta$. On aura alors

$$S(\vec{y}_0 + \vec{z}(x - x_0)) \geq S(\vec{y}_0) + c(x - x_0)$$

pour $x \geq x_0$. Puisque $S(\vec{y}_0) = \underline{\omega}(x_0)$ par hypothèse, on a

$$S(\vec{y}_0 + \vec{z}(x - x_0)) \geq \underline{\omega}(x)$$

pour $0 \leq x - x_0 < h$. Ceci nous montre que le point $(x, \vec{y})$ tel que

$$0 \leq x - x_0 < h, \left| \frac{\vec{y} - \vec{y}_0}{x - x_0} - \vec{f}(x_0, \vec{y}_0) \right| < \delta$$

appartient à D . Nous arrivons donc au

THÉOREME 10. Soit E un ensemble contenu dans l'ensemble D défini par (4), $\underline{\omega}(x)$ étant une fonction continue dans l'intervalle $a \leq x < b$. Si l'on a

$$(6) \quad \overline{D}^+ \underline{\omega}(x) < -S(-\vec{f}(x, \vec{y}))$$

pour (5), D est dominant à droite en E .

On démontre de même le

THÉOREME 11. Soit E un ensemble contenu dans l'ensemble D défini par

$$(7) \quad a \leq x < b, \quad S(\vec{y}) \leq \overline{\omega}(x),$$

$\overline{\omega}(x)$ étant une fonction continue dans l'intervalle $a \leq x < b$. Si l'on a

$$(8) \quad \underline{D}^+ \overline{\omega}(x) > S(\vec{f}(x, \vec{y}))$$

pour

$$(9) \quad a \leq x < b, \quad S(\vec{y}) = \overline{\omega}(x), \quad (x, \vec{y}) \in E,$$

D est dominant à droite en E .

En combinant les théorèmes 6, 10 et 11, nous obtenons le

THÉORÈME 12. Soit E un ensemble contenu dans l'ensemble D défini par

$$(10) \quad a \leq x < b, \quad \underline{\omega}(x) \leq S(\vec{y}) \leq \bar{\omega}(x),$$

$\underline{\omega}(x)$ et $\bar{\omega}(x)$ étant des fonctions continues dans l'intervalle $a \leq x < b$. Si l'on a (6) pour (5) et (8) pour (9), D est dominant à droite en E .

REMARQUE 1. Plaçons-nous, par exemple, dans les hypothèses du théorème 12. Si $E=D$, D est, d'après le théorème 8, majorant à droite en $a \leq x < b$, $|\vec{y}| < +\infty$. Par suite, si une solution $\vec{y}(x)$, continue dans l'intervalle $a \leq x < b$, satisfait aux inégalités

$$\underline{\omega}(x) \leq S(\vec{y}(x)) \leq \bar{\omega}(x)$$

pour $x = a$, ces inégalités subsistent pour $a \leq x < b$.

Si l'on suppose au lieu de (6) et (8) les inégalités suivantes

$$(11) \quad \bar{D}^+ \underline{\omega}(x) \leq -S(\vec{f}(x, \vec{y})),$$

$$(12) \quad \underline{D}^+ \bar{\omega}(x) \geq S(\vec{f}(x, \vec{y})),$$

peut-on dire que D est quasi dominant à droite? La réponse est affirmative.

THÉORÈME 13. Soit E un ensemble contenu dans l'ensemble D défini par (10), $\underline{\omega}(x)$ et $\bar{\omega}(x)$ étant des fonctions continues dans l'intervalle $a \leq x < b$. Si $S(\vec{y})$ ne prend pas de valeurs négatives, nous supposons de plus

$$(13) \quad \bar{\omega}(x) \geq 0, \quad \underline{D}^+ \bar{\omega}(x) \geq 0, \quad \bar{D}^+ \underline{\omega}(x) \leq 0.$$

Si l'on a (11) pour (5) et (12) pour (9), D est quasi dominant à droite en E .

Soit $(x_0, \vec{y}_0)$ un point de E situé sur la frontière, par rapport à $a \leq x < b$, $|\vec{y}| < +\infty$, de D . Il suffit de montrer que D est quasi dominant à droite en $(x_0, \vec{y}_0)$. On aura (5) ou (9) pour $x = x_0$, $\vec{y} = \vec{y}_0$. Supposons, par exemple, que l'on a (5) pour $x = x_0$, $\vec{y} = \vec{y}_0$. Posons

$$\vec{z}_0 = \vec{f}(x_0, \vec{y}_0), \quad c_0 = -S(-\vec{z}_0), \quad c'_0 = S(\vec{z}_0).$$

Puisque

$$S(\vec{z}_0) + S(-\vec{z}_0) \geq S(0) = 0,$$

on a $c_0 \leq c'_0$. Soit c la valeur de $D^+ S(\vec{y}_0 + x\vec{z}_0)$ pour $x = 0$. Les inégalités (2) et (3) montrent que l'on a $c_0 \leq c \leq c'_0$. Nous prenons une fonction $\omega(x)$, continue dans l'intervalle $x_0 \leq x < b$ et satisfaisant aux relations

$$\underline{\omega}(x) \leq \omega(x) \leq \bar{\omega}(x)$$

pour $x_0 \leq x < b$ et

$$\omega(x) = \underline{\omega}(x), \quad D^+ \omega(x) = c$$

pour $x = x_0$. Si $c > 0$, on aura $\omega(x) > \omega(x_0)$ pour $0 < x - x_0 < h$, h désignant un nombre positif assez petit. La fonction

$$\chi(t) = S(\vec{y}_0 + t\vec{z}_0)$$

étant convexe et admettant la dérivée à droite positive pour $t = 0$, elle est croissante pour $t > 0$. On peut donc déterminer la fonction $\lambda(x) (\geq 0)$ par la relation

$$S(\vec{y}_0 + \lambda(x)\vec{z}_0) = \omega(x)$$

pour $0 \leq x - x_0 < h$. Cette fonction est continue et positive pour $0 < x - x_0 < h$ et s'annule pour $x = x_0$. En faisant $x \rightarrow x_0 + 0$ dans la relation

$$\frac{\omega(x) - \omega(x_0)}{x - x_0} = \frac{\chi(\lambda(x)) - \chi(\lambda(x_0))}{\lambda(x) - \lambda(x_0)} \cdot \frac{\lambda(x) - \lambda(x_0)}{x - x_0},$$

on voit

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{\lambda(x)}{x - x_0} = 1.$$

La courbe $\vec{y} = \vec{y}_0 + \lambda(x)\vec{z}_0$, $0 \leq x - x_0 < h$ est contenue dans D et $D^+(\vec{y}_0 + \lambda(x)\vec{z}_0)$ prend la valeur $\vec{z}_0$ pour $x = x_0$. D est donc quasi dominant à droite en $(x_0, \vec{y}_0)$. Il en sera de même si $c < 0$.

Si $c = 0$, nous distinguons deux cas suivant que $S(\vec{y})$ prend des valeurs négatives ou non.

Le cas où $S(\vec{y})$ prend des valeurs négatives. Soit $\vec{u}_0$ un point où $S(\vec{y})$ prend la valeur -1 . Puisque la somme de $S(\vec{u}_0)$ et de $S(-\vec{u}_0)$ est non négative, la valeur $S(-\vec{u}_0)$ est au moins égale à 1. Nous prenons comme plus haut une fonction $\omega(x)$ jouissant des propriétés analogues. La fonction de t : $S(\vec{y} + t\vec{u}_0)$ décroît de $+\infty$ à $-\infty$ lorsque t varie de $-\infty$ à $+\infty$. La relation

$$S(\vec{y}_0 + (x - x_0)\vec{z}_0 + \lambda(x)\vec{u}_0) = \omega(x)$$

définit donc une fonction $\lambda(x)$ continue dans l'intervalle $x_0 \leq x < b$. Il suffit de montrer que l'on a

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{\lambda(x)}{x - x_0} = 0.$$

Car alors la courbe

$$\vec{y} = \vec{y}_0 + (x - x_0)\vec{z}_0 + \lambda(x)\vec{u}_0, \quad x_0 \leq x < b$$

est contenue dans D , et la dérivée à droite de

$$\vec{y}_0 + (x - x_0)\vec{z}_0 + \lambda(x)\vec{u}_0$$

prend la valeur $\vec{z}_0$ pour $x = x_0$.

Si $\lambda(x) > 0$, on a

$$\begin{aligned} \omega(x) - \omega(x_0) &\leq S(\vec{y}_0 + (x - x_0)\vec{z}_0) + S(\lambda(x)\vec{u}_0) - S(\vec{y}_0) \\ &= S(\vec{y}_0 + (x - x_0)\vec{z}_0) - S(\vec{y}_0) - \lambda(x). \end{aligned}$$

En divisant l'inégalité ainsi obtenue par $x - x_0$ et faisant $x \rightarrow x_0 + 0$, nous obtenons

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{\lambda(x)}{x - x_0} \leq 0.$$

Si $\lambda(x) < 0$, on a

$$\begin{aligned} \omega(x) - \omega(x_0) &\geq S(\vec{y}_0 + (x - x_0)\vec{z}_0) - S(-\lambda(x)\vec{u}_0) - S(\vec{y}_0) \\ &= S(\vec{y}_0 + (x - x_0)\vec{z}_0) - S(\vec{y}_0) - \lambda(x). \end{aligned}$$

En divisant l'inégalité ainsi obtenue par $x - x_0$ et faisant $x \rightarrow x_0 + 0$, nous obtenons

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{\lambda(x)}{x - x_0} \geq 0.$$

Le cas où $S(\vec{y})$ ne prend pas de valeurs négatives. Il suffit de montrer que l'on a

$$(14) \quad \underline{\omega}(x) \leq S(\vec{y}_0 + (x - x_0)\vec{z}_0) \leq \bar{\omega}(x)$$

dans un intervalle assez petit $0 \leq x - x_0 < h$. Si $c_0 < 0$, on a $c'_0 \geq -c_0 > 0$ et ces inégalités sont évidentes. Si $c_0 = 0$, on a

$$S(\vec{y}_0 + (x - x_0)\vec{z}_0) \geq S(\vec{y}_0) - (x - x_0)S(-\vec{z}_0) = S(\vec{y}_0) \geq \underline{\omega}(x)$$

pour $x_0 \leq x < b$. Si $c'_0 > 0$, la deuxième des inégalités (14) est évidente. Si $c'_0 = 0$, on a

$$S(\vec{y}_0 + (x - x_0)\vec{z}_0) \leq S(\vec{y}_0) + (x - x_0)S(\vec{z}_0) = S(\vec{y}_0) \leq \bar{\omega}(x)$$

pour $x_0 \leq x < b$. Les inégalités (14) sont donc démontrées.

Si $E = D$, D est quasi dominant à droite en soi. L'ensemble défini par $a \leq x < b$, $|\vec{y}| < +\infty$ est évidemment dominant à droite en D . Nous arrivons donc, en appliquant le théorème 1, au

COROLLAIRE. Plaçons-nous dans les hypothèses du théorème. Supposons de plus que $E = D$ et que $\vec{f}(x, \vec{y})$ est continue dans D . Si

$$\underline{\omega}(a) \leq S(\vec{\beta}) \leq \bar{\omega}(a),$$

il existe au moins une solution $\vec{y}(x)$ continue dans un certain intervalle $a \leq x < c$, satisfaisant aux inégalités

$$\underline{\omega}(x) \leq S(\vec{y}(x)) \leq \bar{\omega}(x),$$

et prenant la valeur $\vec{\beta}$ pour $x = a$. Si l'on ne peut prolonger cette solution au delà de $x = c$, $|\vec{y}(x)|$ croît indéfiniment lorsque $x \rightarrow c - 0$.

REMARQUE 2. Si $S(\vec{y})$ est positive sauf pour $\vec{y} = \vec{0}$, $|\vec{y}(x)|$ ne peut croître indéfiniment lorsque $x \rightarrow c - 0$, car l'ensemble défini

par $S(\vec{y}) \leq M$ est borné. Par suite la solution $\vec{y}(x)$ du corollaire peut être supposée continue pour $a \leq x < b$.

REMARQUE 3. On peut remplacer, dans ces théorèmes 10-13, l'intervalle $a \leq x < b$ par l'intervalle ouvert $a < x < b$.

THÉOREME 14. Soient $S(\vec{y})$ une fonction de M. KAMKE positive sauf pour $\vec{y} = \vec{0}$, $\underline{\omega}(x)$ et $\overline{\omega}(x)$ des fonctions continues dans l'intervalle $a < x < b$ et telles que

$$\underline{\omega}(x) \leq \overline{\omega}(x), \quad \overline{\omega}(x) \geq 0,$$

et $\vec{f}(x, \vec{y})$ une fonction continue dans l'ensemble défini par

$$(15) \quad a < x < b, \quad \underline{\omega}(x) \leq S(\vec{y}) \leq \overline{\omega}(x).$$

Supposons de plus que l'on a (11) pour

$$(16) \quad a < x < b, \quad S(\vec{y}) = \underline{\omega}(x),$$

et (12) pour

$$(17) \quad a < x < b, \quad S(\vec{y}) = \overline{\omega}(x).$$

Il existe alors au moins une solution continue dans l'intervalle $a < x < b$ et contenue dans D .

$\overline{\omega}(x)$ est nécessairement non décroissante. On peut supposer que $\underline{\omega}(x)$ est non croissante, sinon, on la remplacerait par $\max\{\underline{\omega}(x), 0\}$. Les relations (13) sont alors remplies. Prenons une suite décroissante $\{a_m\}$ convergeant vers a . D'après la remarque 2, il existe une solution $\vec{y} = \vec{\varphi}_m(x)$ continue dans l'intervalle $a_m \leq x < b$. On peut extraire de la suite $\{\vec{\varphi}_m(x)\}$ une suite partielle convergente dans l'intervalle $a < x < b$. La limite de cette suite partielle répond à la question.

Nous désignerons toujours par $\mathfrak{F}$ une famille de fonctions jouissant des propriétés suivantes:

(a) Une fonction de $\mathfrak{F}$ est continue dans un intervalle ouvert, dont l'extrémité gauche est a .

(b) Si deux fonctions $f(x)$ et $g(x)$, appartenant à $\mathfrak{F}$, satisfont à l'inégalité $f(x) \leq g(x)$ dans un certain intervalle, dont l'extrémité gauche est a , toute fonction continue $h(x)$, qui satisfait aux inégalités $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ au moins dans un intervalle assez petit $0 < x - a < \delta$, appartient à $\mathfrak{F}$.

THÉOREME 15. Supposons que la famille $\mathfrak{F}$ contient la fonction identiquement nulle et que la fonction $S(\vec{y})$ est positive sauf pour $\vec{y} = \vec{0}$. Soient $\bar{\omega}(x)$ une fonction continue et non négative dans l'intervalle $a < x < b$ et appartenant à $\mathfrak{F}$ et $f(x, y)$ une fonction continue dans un ensemble D qui contient l'ensemble E défini par

$$(18) \quad a < x < b, \quad S(\vec{y}) \leq \bar{\omega}(x)$$

et telle que l'on a (12) pour (17). Si l'équation n'admet qu'une solution $\vec{y}(x)$ continue dans l'intervalle $a < x < b$ et telle que $S(\vec{y}(x))$ appartient à $\mathfrak{F}$, cette solution satisfait à l'inégalité $S(\vec{y}(x)) \leq \bar{\omega}(x)$ dans l'intervalle $a < x < b$.

Car le théorème 14 montre qu'il existe une solution $\vec{y} = \vec{\varphi}(x)$ satisfaisant à l'inégalité $S(\vec{\varphi}(x)) \leq \bar{\omega}(x)$ pour $a < x < b$ (6). $S(\vec{\varphi}(x))$ appartient à la famille $\mathfrak{F}$. Une telle solution étant unique, on a $\vec{y}(x) = \vec{\varphi}(x)$.

5. Comparaison d'un système différentiel avec une seule équation différentielle. Considérons le cas où $\underline{\omega}(x)$ est une solution de l'équation

$$(19) \quad Y' = \underline{F}(x, Y).$$

Les inégalités (6) et (11) sont respectivement les conséquences de

$$(6') \quad \underline{F}(x, S(\vec{y})) < -S(-\vec{f}(x, \vec{y}))$$

et

$$(11') \quad \underline{F}(x, S(\vec{y})) \leq -S(-\vec{f}(x, \vec{y})).$$

Si $\bar{\omega}(x)$ est une solution de l'équation

$$(19') \quad Y' = \bar{F}(x, Y),$$

les inégalités

$$(8') \quad \bar{F}(x, S(\vec{y})) > S(\vec{f}(x, \vec{y}))$$

et

$$(12') \quad \bar{F}(x, S(\vec{y})) \geq S(\vec{f}(x, \vec{y}))$$

(6) On prend, par exemple, $\omega(x) = 0$.

entraînent respectivement (8) et (12). Par suite, dans le cas où $\underline{\omega}(x)$ est une solution de (19), continue dans l'intervalle $a \leq x < b$, le théorème 10, par exemple, peut s'énoncer comme il suit :

Si l'on a (6') pour (5), l'ensemble défini par (4) est dominant à droite en E .

On peut faire des remarques analogues concernant les théorèmes 11-15.

On rencontre le plus souvent, dans les applications, le cas où l'équation auxiliaire est régulière à droite. On peut alors utiliser les deux théorèmes suivants.

THÉOREME 16. Soient $\underline{\omega}(x)$ et $\bar{\omega}(x)$ des fonctions continues dans l'intervalle $a \leq x < b$ et telles que $\underline{\omega}(x) < \bar{\omega}(x)$, et $\underline{F}(x, Y)$ une fonction continue dans l'ensemble $\mathcal{A}$ défini par

$$(20) \quad a \leq x < b, \quad \underline{\omega}(x) < Y \leq \bar{\omega}(x).$$

Supposons que l'équation (19) est régulière à droite en $\mathcal{A}$ par rapport à $\mathcal{A}$ lui-même et admet une solution $\omega(x)$ continue dans l'intervalle $a \leq x < b$ et contenue dans $\mathcal{A}$ et que l'on a (11') pour

$$(21) \quad a \leq x < b, \quad \underline{\omega}(x) < S(\vec{y}) \leq \bar{\omega}(x), \quad (x, \vec{y}) \in E,$$

E désignant l'ensemble où $\vec{f}(x, \vec{y})$ est définie. Alors l'ensemble D défini par

$$a \leq x < b, \quad S(\vec{y}) \geq \omega(x)$$

est majorant à droite en $a \leq x < b$, $|\vec{y}| < +\infty$.

Soit, en effet, $\vec{y}(x)$ une solution de (1), continue dans un intervalle $x_0 \leq x < c$ ($a \leq x_0 < c \leq b$) et satisfaisant à l'inégalité $S(\vec{y}(x_0)) \geq \omega(x_0)$. Il suffit de montrer que l'on a $S(\vec{y}(x)) \geq \omega(x)$ pour $x_0 \leq x < c$. Si l'on n'avait pas cette inégalité, on pourrait trouver deux nombres x_1 et x_2 ($x_0 \leq x_1 < x_2 \leq c$) tels que l'on a

$$\underline{\omega}(x) < S(\vec{y}(x)) < \omega(x)$$

pour $x_1 < x < x_2$ et $S(\vec{y}(x_1)) = \omega(x_1)$. Puisque l'on a

$$D^+ S(\vec{y}(x)) \geq -S(-\vec{f}(x, \vec{y}(x))) \geq \underline{F}(x, S(\vec{y}(x))),$$

la fonction $S(\vec{y}(x))$ serait, dans l'intervalle, quasi supérieure à droite pour (19). Elle serait donc, d'après l'analogie du théorème

14 du Premier Mémoire, majorante à droite pour (19). Puisque $\omega(x)$ est une solution de (19) prenant la même valeur que $S(\vec{y}(x))$ pour $x=x_1$, on aurait $S(\vec{y}(x)) \geq \omega(x)$ pour $x_1 \leq x < x_2$, ce qui est contraire à l'hypothèse.

On démontre de même le

THÉORÈME 17. Soient $\underline{\omega}(x)$ et $\bar{\omega}(x)$ des fonctions continues dans l'intervalle $a \leq x < b$ et telles que $\underline{\omega}(x) < \bar{\omega}(x)$, et $\bar{F}(x, Y)$ une fonction continue dans l'ensemble $\mathcal{A}$ défini par

$$(22) \quad a \leq x < b, \quad \underline{\omega}(x) \leq Y < \bar{\omega}(x).$$

Supposons que l'équation (19') est régulière à droite en $\mathcal{A}$ par rapport à $\mathcal{A}$ lui-même et admet une solution $\omega(x)$ continue dans l'intervalle $a \leq x < b$ et contenue dans $\mathcal{A}$ et que l'on a (12') pour

$$(23) \quad a \leq x < b, \quad \underline{\omega}(x) \leq S(\vec{y}) < \bar{\omega}(x), \quad (x, \vec{y}) \in E,$$

E désignant l'ensemble où $\vec{f}(x, \vec{y})$ est définie. Alors l'ensemble $\mathcal{D}$ défini par

$$a \leq x < b, \quad S(\vec{y}) \leq \omega(x),$$

est majorant à droite en $a \leq x < b$, $|\vec{y}| < +\infty$.

REMARQUE. On peut remplacer, dans ces deux théorèmes, l'intervalle $a \leq x < b$ par l'intervalle ouvert $a < x < b$.

THÉORÈME 18. Soient $\underline{\omega}(x)$ et $\bar{\omega}(x)$ des fonctions continues dans l'intervalle $a < x < b$ et telles que $\underline{\omega}(x) < \bar{\omega}(x)$, et $\bar{F}(x, Y)$ une fonction continue dans l'ensemble $\mathcal{A}$ défini par (20). Supposons que l'on a (11') pour (21), E désignant l'ensemble où $\vec{f}(x, \vec{y})$ est définie, et que l'équation (19) admet une solution $Y = \omega(x)$ et une seule appartenant à la famille $\mathfrak{F}$, et contenue dans $\mathcal{A}$, cette solution étant continue dans l'intervalle $a < x < b$. S'il existe une solution $\vec{y} = \vec{\varphi}(x)$ de (1), continue dans l'intervalle $a < x < b$, satisfaisant à l'inégalité $\underline{\omega}(x) < S(\vec{\varphi}(x))$ dans un intervalle assez petit $0 < x - a < h$ et telle que $S(\vec{\varphi}(x))$ appartient à $\mathfrak{F}$, on a l'inégalité $S(\vec{\varphi}(x)) \geq \omega(x)$ pour $a < x < b$.

En effet, on voit sans peine que $S(\vec{\varphi}(x))$ est quasi supérieure à droite pour (19). L'analogie du théorème 15 du Premier Mémoire,

amélioré à la fin de notre présent mémoire, montre que l'on a $S(\vec{\varphi}(x)) \geq \omega(x)$ tant que l'on a $S(\vec{\varphi}(x)) > \underline{\omega}(x)$.

Si l'on a $S(\vec{\varphi}(x)) \geq \omega(x)$ dans un intervalle $a < x < c (< b)$, l'inégalité $S(\vec{\varphi}(x)) > \underline{\omega}(x)$ subsiste au delà de $x = c$. Puisqu'on a celle-ci dans un intervalle assez petit $0 < x - a < h$ par hypothèse, celle-là subsiste dans l'intervalle $a < x < b$.

On démontre de même le

THÉORÈME 19. Soient $\underline{\omega}(x)$ et $\bar{\omega}(x)$ des fonctions continues dans l'intervalle $a < x < b$ et telles que $\underline{\omega}(x) < \bar{\omega}(x)$, et $\bar{F}(x, Y)$ une fonction continue dans l'ensemble $\mathcal{A}$ défini par (22). Supposons que l'on a (12') pour (23), E désignant l'ensemble où $\vec{f}(x, \vec{y})$ est définie, et que l'équation (19') admet une solution $Y = \omega(x)$ et une seule appartenant à la famille $\mathfrak{F}$ et contenue dans $\mathcal{A}$, cette solution étant continue dans l'intervalle $a < x < b$. S'il existe une solution de (1) continue dans l'intervalle $a < x < b$, satisfaisant à l'inégalité $S(\vec{\varphi}(x)) < \omega(x)$ dans un intervalle assez petit $0 < x - a < h$ et telle que $S(\vec{\varphi}(x))$ appartient à $\mathfrak{F}$, on a l'inégalité $S(\vec{\varphi}(x)) \leq \omega(x)$ pour $a < x < b$.

6. Théorème d'unicité. Le théorème 19 nous conduit immédiatement au théorème d'unicité suivant.

THÉORÈME 20. Soient $\omega(x)$ une fonction continue et positive dans l'intervalle $a < x < b$, $\bar{F}(x, Y)$ une fonction continue dans l'ensemble $\mathcal{A}$ défini par

$$a < x < b, \quad 0 \leq Y < \omega(x),$$

et $\vec{f}(x, \vec{y})$ une fonction définie dans un certain ensemble D et satisfaisant à l'inégalité

$$S(\vec{f}(x, \vec{y}^1) - \vec{f}(x, \vec{y}^2)) \leq \bar{F}(x, S(\vec{y}^1 - \vec{y}^2))$$

pour

$$a < x < b, \quad (x, \vec{y}^1) \in D, \quad (x, \vec{y}^2) \in D, \quad S(\vec{y}^1 - \vec{y}^2) < \omega(x),$$

$S(\vec{y})$ étant positive sauf pour $\vec{y} = \vec{0}$. Supposons de plus que la famille $\mathfrak{F}$ contient la fonction identiquement nulle, que toute fonction $f(x)$ appartenant à la famille $\mathfrak{F}$ satisfait à l'inégalité $f(x) < \omega(x)$ dans un intervalle assez petit, dont l'extrémité gauche est a , et

que la solution de l'équation (19') appartenant à $\mathfrak{F}$ est unique et identiquement nulle. Alors deux solutions $\vec{\varphi}^1(x)$ et $\vec{\varphi}^2(x)$ de l'équation (1), continues pour $a < x < b$ et telles que $S(\vec{\varphi}^1(x) - \vec{\varphi}^2(x))$ appartient à $\mathfrak{F}$, coïncident identiquement dans l'intervalle $a < x < b$.

Soit, en effet,

$$\vec{z}' = \vec{g}(x, \vec{z})$$

l'équation en $\vec{z} = \vec{y} - \vec{\varphi}^2(x)$. La fonction

$$\vec{g}(x, \vec{z}) = \vec{f}(x, \vec{z} + \vec{\varphi}^2(x)) - \vec{f}(x, \vec{\varphi}^2(x))$$

satisfait à l'inégalité

$$S(\vec{g}(x, \vec{z})) \leq \overline{F}(x, S(\vec{z}))$$

pour

$$a < x < b, \quad (x, \vec{z} + \vec{\varphi}^2(x)) \in D, \quad S(\vec{z}) < \omega(x).$$

Cette équation en $\vec{z}$ admet une solution $\vec{z} = \vec{\varphi}^1(x) - \vec{\varphi}^2(x)$ continue dans l'intervalle $a < x < b$, et telle que $S(\vec{z})$ appartient à $\mathfrak{F}$. Le théorème 19 montre donc que l'on a

$$S(\vec{\varphi}^1(x) - \vec{\varphi}^2(x)) \leq 0,$$

ce qui entraîne $\vec{\varphi}^1(x) = \vec{\varphi}^2(x)$.

7. Continuité. Nous allons considérer le système différentiel contenant des paramètres. Nous désignons par une lettre en caractère gras un point dans l'espace à m dimensions de sorte que

$$(24) \quad \vec{y}' = \vec{f}(x, \vec{y}, \mathfrak{t})$$

représente un système de n équations différentielles contenant m paramètres $t_1, t_2, \dots, t_m$. On démontre sans peine le

THÉORÈME 21. Soit $\vec{f}(x, \vec{y}, \mathfrak{t})$ une fonction continue par rapport à $(x, \vec{y}, \mathfrak{t})$ pour

$$a < x < b, \quad S(\vec{y}) \leq \omega(x), \quad \mathfrak{t} \in T,$$

$\omega(x)$ étant continue et non négative pour $a < x < b$, $S(\vec{y})$ positive sauf pour $\vec{y} = \vec{0}$ et T un ensemble dans l'espace à m dimensions. Supposons que l'équation (24) admet pour chaque valeur de $\mathfrak{t} (\in T)$

une solution et une seule $\vec{y} = \vec{\varphi}(x, t)$ telle que $S(\vec{y}) \leq \omega(x)$. Alors $\vec{\varphi}(x, t)$ est continue par rapport à (x, t) pour

$$a < x < b, \quad t \in T.$$

REMARQUE. Nous avons supposé que les variables sont réelles. Mais il est seulement essentiel que la variable x est réelle. On peut donc supposer que, dans les théorèmes établis jusqu'ici, les variables $y_1, \dots, y_n$ ainsi que $t_1, \dots, t_m$ sont complexes.

8. Dérivabilité. Démontrons maintenant le théorème de dérivabilité suivant, l'objet principal de ce mémoire.

THÉORÈME 22. Nous supposons remplies les hypothèses suivantes :

- 1° $S(\vec{y})$ est positive sauf pour $\vec{y} = \vec{0}$.
- 2° $\omega(x) (\geq 0)$, $p(x)$, $q(x)$ sont continues pour $a < x < b$.
- 3° La famille $\mathfrak{F}$ contient la fonction identiquement nulle.
- 4° Les fonctions

$$\begin{aligned} & \vec{f}(x, \vec{y}, \lambda), \vec{f}'_\lambda(x, \vec{y}, \lambda), \\ & \frac{\partial}{\partial y_j} \vec{f}(x, \vec{y}, \lambda) \quad (j = 1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

sont continues par rapport à $(x, \vec{y}, \lambda)$ pour

$$(25) \quad a < x < b, \quad S(\vec{y}) \leq \omega(x), \quad \underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda},$$

et satisfont à l'inégalité

$$(26) \quad S\left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \vec{f}}{\partial y_k} z_k + \frac{\partial \vec{f}}{\partial \lambda}\right) \leq p(x) S(\vec{z}) + q(x).$$

5° L'équation

$$(27) \quad \vec{y}' = \vec{f}(x, \vec{y}, \lambda)$$

admet, pour chaque valeur de λ dans l'intervalle $\underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}$, une solution $\vec{y} = \vec{\varphi}(x, \lambda)$ satisfaisant à l'inégalité

$$S(\vec{\varphi}(x, \lambda)) \leq \omega(x)$$

dans l'intervalle $a < x < b$ et telle que

$$S\left(\frac{\vec{\varphi}(x, \lambda_1) - \vec{\varphi}(x, \lambda_2)}{\lambda_1 - \lambda_2}\right)$$

appartient à $\mathfrak{F}$, λ_1 et λ_2 désignant des nombres quelconques dans l'intervalle $\underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}$.

6° L'équation

$$(28) \quad Y' = p(x) Y + q(x)$$

admet une solution $Y = \gamma(x)$ et une seule appartenant à $\mathfrak{F}$.

Dans ces hypothèses $\vec{\varphi}(x, \lambda)$ est continue par rapport à (x, λ) , ainsi que sa dérivée $\vec{\varphi}'_\lambda(x, \lambda)$, pour $a < x < b$, $\underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}$.

Soit λ_0 une valeur quelconque dans l'intervalle $\underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}$. Soit

$$(29) \quad \vec{z}' = \vec{g}(x, \vec{z}, \lambda)$$

l'équation en

$$(30) \quad \vec{y} = \vec{\varphi}(x, \lambda_0) + (\lambda - \lambda_0) \vec{z}.$$

Le second membre est donné par

$$\vec{g}(x, \vec{z}, \lambda) = \frac{1}{\lambda - \lambda_0} \left\{ \vec{f}(x, \vec{y}, \lambda) - \vec{f}(x, \vec{\varphi}^0, \lambda_0) \right\},$$

où $\vec{\varphi}^0 = \vec{\varphi}(x, \lambda_0)$. Cette équation admet une solution appartenant à $\mathfrak{F}$:

$$(31) \quad z = \frac{1}{\lambda - \lambda_0} \left\{ \vec{\varphi}(x, \lambda) - \vec{\varphi}(x, \lambda_0) \right\}.$$

L'inégalité (26) entraîne

$$S(\vec{g}(x, \vec{z}, \lambda)) \leq p(x) S(\vec{z}) + q(x)$$

pour (25), où l'on doit remplacer $\vec{y}$ par le second membre de (30).

En posant $\vec{z} = \vec{0}$ dans (26), nous obtenons $q(x) \geq 0$. Le théorème 20 du Premier Mémoire montre que $\eta(x) \geq 0$. Le théorème 19 est donc applicable et l'on a

$$(32) \quad S\left(\frac{\vec{\varphi}(x, \lambda) - \vec{\varphi}(x, \lambda_0)}{\lambda - \lambda_0}\right) \leq \eta(x),$$

d'où il résulte la continuité de $\vec{\varphi}(x, \lambda)$ par rapport à (x, λ) .

La dérivée $\vec{\varphi}'_\lambda(x, \lambda)$, s'il existe, doit satisfaire à l'équation en $\vec{u}$:

$$(33) \quad \vec{u}' = \sum_{k=1}^n \vec{h}_k(x, \lambda) u_k + \vec{h}(x, \lambda),$$

où $\vec{h}_k(x, \lambda)$ et $\vec{h}(x, \lambda)$ représentent les fonctions que l'on obtient en remplaçant $\vec{y}$ par $\vec{\varphi}(x, \lambda)$ dans $\frac{\partial \vec{f}}{\partial y_k}$ et $\frac{\partial \vec{f}}{\partial \lambda}$. Elles sont donc continues par rapport à (x, λ) pour $a < x < b$, $\underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}$. Puisqu'on a, d'après (26),

$$(34) \quad S\left(\sum_{k=1}^n \vec{h}_k(x, \lambda) u_k + \vec{h}(x, \lambda)\right) \leq p(x) S(\vec{u}) + q(x),$$

l'ensemble

$$a < x < b, \quad S(\vec{u}) \leq \eta(x)$$

est quasi dominant à droite. Par suite l'équation (33) admet au moins une solution continue (par rapport à x) pour $a < x < b$ ($\underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}$) et satisfaisant à l'inégalité $S(\vec{u}) \leq \eta(x)$. S'il existe deux telles solutions, leur différence $\vec{v}$ satisfait à la relation

$$S(\vec{v}) \leq (1 + K) \eta(x) = o(e^{P(x)}),$$

où

$$K = \max \left\{ S(-\vec{y}) / S(\vec{y}) \right\}, \quad P(x) = \int p(x) dx.$$

En posant $\vec{u} = M\vec{v}$ dans (34) et en divisant par $M (< 0)$, nous obtenons

$$S\left(\sum_{k=1}^n \vec{h}_k(x, \lambda) v_k + \frac{1}{M} \vec{h}(x, \lambda)\right) \leq p(x) S(\vec{v}) + \frac{1}{M} q(x).$$

En y faisant $M \rightarrow +\infty$, on obtient

$$S\left(\sum_{k=1}^n \vec{h}_k(x, \lambda) v_k\right) \leq p(x) S(\vec{v}).$$

La solution, de l'équation $Y' = p(x)Y$, telle que $Y = o(e^{P(x)})$ étant unique et identiquement nulle, le théorème 20 montre, en prenant pour $\mathfrak{F}$ la famille de fonctions $o(e^{P(x)})$, que $\vec{v}$ doit être identique-

ment nulle. La solution, de (33), telle que $S(\vec{u}) \leq \gamma(x)$ est donc unique. Nous la désignons par $\vec{u} = \vec{\psi}(x, \lambda)$. Nous obtenons

$$(35) \quad S(\vec{\psi}(x, \lambda)) \leq \gamma(x)$$

pour $a < x < b$, $\underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}$. Nous allons montrer que $\vec{\psi}(x, \lambda)$ est la dérivée de $\vec{\varphi}(x, \lambda)$ par rapport à λ .

Pour cela, prenons une valeur quelconque λ_0 dans l'intervalle $\underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}$ et posons

$$\begin{aligned} \vec{\varphi}^0(x) &= \vec{\varphi}(x, \lambda_0), \quad \vec{\psi}^0(x) = \vec{\psi}(x, \lambda_0), \\ \vec{\varphi}(x, \lambda) &= \vec{\varphi}^0(x) + (\lambda - \lambda_0) \{ \vec{\psi}^0(x) + \vec{\chi}(x, \lambda) \}. \end{aligned}$$

Il suffit de démontrer la relation

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \vec{\chi}(x, \lambda) = \vec{0} \quad (\underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}).$$

L'inégalité (32) entraîne

$$S(\vec{\psi}^0(x) + \vec{\chi}(x, \lambda)) \leq \gamma(x).$$

On en déduit, en tenant compte de (35),

$$S(\vec{\chi}(x, \lambda)) \leq (1 + K) \gamma(x).$$

$\vec{v} = \vec{\chi}(x, \lambda)$ satisfait à l'équation

$$\vec{v}' = \frac{\vec{f} - \vec{f}^0}{\lambda - \lambda_0} - \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \vec{f}^0}{\partial \varphi_k^0} \varphi_k^0 + \frac{\partial \vec{f}^0}{\partial \lambda_0} \right),$$

où

$$\begin{aligned} \vec{f}^0 &= \vec{f}(x, \vec{\varphi}^0, \lambda_0), \\ \vec{f} &= \vec{f}(x, \vec{\varphi}^0 + (\lambda - \lambda_0)(\vec{\psi}^0 + \vec{v}), \lambda). \end{aligned}$$

Posons

$$\begin{aligned} \vec{w} &= \vec{\psi}^0(x) + \vec{\chi}(x, \lambda), \\ \vec{f}(x, \vec{\varphi}^0(x) + (\lambda - \lambda_0)\vec{w}, \lambda) &= \vec{f}^0 + (\lambda - \lambda_0) \left\{ \sum_{k=1}^n \frac{\partial \vec{f}^0}{\partial \varphi_k^0} w_k \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial \vec{f}^0}{\partial \lambda_0} + \vec{J}(x, \vec{w}, \lambda) \right\}. \end{aligned}$$

On voit, en remarquant $S(\vec{w}) \leq \eta(x)$, que $\vec{J}(x, \vec{w}, \lambda)$ converge uniformément vers $\vec{0}$ pour $a \leq x \leq \beta$ ($a < a < \beta < b$) lorsque $\lambda \rightarrow \lambda_0$. On peut donc faire correspondre à un nombre positif ε un autre nombre positif δ de manière que l'on ait

$$S(\vec{J}(x, \vec{w}, \lambda)) < \varepsilon$$

pour

$$a \leq x \leq \beta, \quad |\lambda - \lambda_0| \leq \delta, \quad \underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}.$$

L'équation en $\vec{v} = \vec{\chi}(x, \lambda)$ peut s'écrire

$$\vec{v}' = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \vec{f}^0}{\partial \varphi_k^0} v_k + \vec{J}(x, \vec{w}, \lambda).$$

Le second membre satisfait à l'inégalité

$$S\left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \vec{f}^0}{\partial \varphi_k^0} v_k + \vec{J}(x, \vec{w}, \lambda)\right) \leq p(x) S(\vec{v}) + \varepsilon.$$

Par suite, on obtient, en appliquant le théorème de comparaison,

$$S(\vec{\chi}(x, \lambda)) \leq (1 + K) \eta(a) e^{P(x) - P(a)} + \varepsilon e^{P(x)} \int_a^x e^{-P(x)} dx$$

dans l'intervalle $a \leq x \leq \beta$. ε pouvant être aussi petit que l'on veut, on a

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow \lambda_0} S(\vec{\chi}(x, \lambda)) &\leq (1 + K) \eta(a) e^{P(x) - P(a)} \\ &= (1 + K) e^{P(x)} \int_a^a q(\xi) e^{-P(\xi)} d\xi. \end{aligned}$$

En y faisant $a \rightarrow a + 0$, on obtient

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} S(\vec{\chi}(x, \lambda)) = 0. \quad \text{C. Q. F. D.}$$

Si le second membre $\vec{f}(x, \vec{y}, \lambda)$ contient m paramètres $t_1, t_2, \dots, t_m$ et est continu par rapport à $(x, \vec{y}, \lambda, \mathbf{t})$ pour

$$(36) \quad a < x < b, \quad S(\vec{y}) \leq \omega(x), \quad \underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}, \quad \mathbf{t} \in T,$$

le second membre de (29) est continu par rapport à $(x, \vec{z}, \lambda, \mathbf{t})$ pour

$$a < x < b, S(\vec{\varphi}^0 + (\lambda - \lambda_0)\vec{z}) \leq \omega(x), \underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda} (\lambda \neq \lambda_0), t \in T.$$

On voit, en appliquant le théorème 21, que la solution (31) est continue par rapport à (x, λ, t) pour

$$(37) \quad a < x < b, \underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda} (\lambda \neq \lambda_0), t \in T.$$

Si donc $\vec{\varphi}(x, \lambda_0)$ est continue par rapport à (x, t) pour $a < x < b$, $t \in T$, $\vec{\varphi}(x, \lambda)$ est continue par rapport à (x, λ, t) pour (37). Prenons une valeur λ_1 appartenant à l'intervalle $\underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}$ et différente de λ_0 . $\vec{\varphi}(x, \lambda_1)$ étant continue pour $a < x < b$, $t \in T$, on voit comme plus haut que $\vec{\varphi}(x, \lambda, t)$ est continue par rapport à (x, λ, t) pour

$$a < x < b, \underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda} (\lambda \neq \lambda_1), t \in T.$$

Elle est donc continue pour

$$(38) \quad a < x < b, \underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}, t \in T.$$

Si de plus $\vec{f}(x, \vec{y}, \lambda)$ et ses dérivées partielles par rapport à $\lambda, y_1, \dots, y_n$ sont continues par rapport à $(x, \vec{y}, \lambda, t)$ pour (36), $\vec{h}_k(x, \lambda)$ et $\vec{h}(x, \lambda)$ sont continues par rapport à (x, λ, t) pour (38). On voit, en appliquant le théorème 21, que $\vec{\varphi}'_\lambda(x, \lambda)$ est aussi continue par rapport à (x, λ, t) pour (38). Nous arrivons ainsi au

THÉOREME 23. Nous supposons remplies les hypothèses suivantes :

- 1° $S(\vec{y})$ est positive sauf pour $\vec{y} = \vec{0}$.
- 2° $\omega(x) (\geq 0)$, $p(x)$, $q(x)$ sont continues pour $a < x < b$.
- 3° La famille $\mathfrak{F}$ contient la fonction identiquement nulle.
- 4° Les fonctions

$$\begin{aligned} & \vec{f}(x, \vec{y}, \lambda, t), \quad \vec{f}'_\lambda(x, \vec{y}, \lambda, t), \\ & \frac{\partial}{\partial y_j} \vec{f}(x, \vec{y}, \lambda, t) \quad (j=1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

sont continues par rapport à $(x, \vec{y}, \lambda, t)$ pour (36) et satisfont à l'inégalité (26).

- 5° L'équation

$$(39) \quad \vec{y}' = \vec{f}(x, \vec{y}, \lambda, t)$$

admet quels que soient $\lambda (\underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda})$ et $t (\in T)$, une solution $\vec{y} = \vec{\varphi}(x, \lambda, t)$ satisfaisant à l'inégalité

$$(40) \quad S(\vec{\varphi}(x, \lambda, t)) \leq \omega(x)$$

dans l'intervalle $a < x < b$ et telle que

$$S\left(\frac{\vec{\varphi}(x, \lambda_1, t) - \vec{\varphi}(x, \lambda_2, t)}{\lambda_1 - \lambda_2}\right)$$

appartient à $\mathfrak{F}$, λ_1 et λ_2 désignant des nombres quelconques dans l'intervalle $\underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}$.

6° $\vec{\varphi}(x, \lambda_0)$ est continue par rapport à (x, t) pour $a < x < b$, $t \in T$, λ_0 étant une valeur déterminée dans l'intervalle $\underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}$.

7° L'équation (28) admet une solution et une seule $Y = \gamma(x)$ appartenant à $\mathfrak{F}$.

Dans ces hypothèses, $\vec{\varphi}(x, \lambda, t)$ est continue par rapport à (x, λ, t) , ainsi que sa dérivée $\vec{\varphi}'_\lambda(x, \lambda, t)$, pour

$$a < x < b, \quad \underline{\lambda} \leq \lambda \leq \bar{\lambda}, \quad t \in T.$$

9. Analyticité. En remarquant que, si une fonction est dérivable par rapport à une variable complexe dans un certain domaine, elle est holomorphe par rapport à ce variable dans ce domaine, nous obtenons sans peine, en étendant le théorème 23 au cas de variables $y_1, \dots, y_n, \lambda$ complexes, le

THÉOREME 24. Nous supposons remplies les hypothèses suivantes :

- 1° $S(\vec{y})$ est positive sauf pour $\vec{y} = \vec{0}$.
- 2° $\omega(x) (\geq 0)$, $p(x)$, $q(x)$ sont continues pour $a < x < b$.
- 3° La famille $\mathfrak{F}$ contient la fonction identiquement nulle.
- 4° Les fonctions

$$\begin{aligned} & \vec{f}(x, \vec{y}, \lambda, t), \quad \vec{f}'_\lambda(x, \vec{y}, \lambda, t), \\ & \frac{\partial}{\partial y_j} \vec{f}(x, \vec{y}, \lambda, t) \quad (j = 1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

sont continues par rapport à $(x, \vec{y}, \lambda, t)$ pour

$$a < x < b, \quad S(\vec{y}) \leq \omega(x), \quad \lambda \in \bar{\Lambda}, \quad t \in T$$

et satisfont à l'inégalité (26), A étant un domaine dans le plan de nombres complexes et $\bar{A}$ son ensemble de fermeture.

5° L'équation (39) admet, quels que soient $\lambda (\in \bar{A})$ et $t (\in T)$ une solution $\vec{y} = \vec{\varphi}(x, \lambda, t)$ satisfaisant à l'inégalité (40) dans l'intervalle $a < x < b$ et telle que

$$S\left(\frac{\vec{\varphi}(x, \lambda_1, t) - \vec{\varphi}(x, \lambda_2, t)}{\lambda_1 - \lambda_2}\right)$$

appartient à $\mathfrak{F}$, λ_1 et λ_2 désignant des nombres quelconques dans $\bar{A}$.

6° $\vec{\varphi}(x, \lambda_0, t)$ est continue par rapport à (x, t) pour $a < x < b$, $t \in T$, λ_0 étant une valeur déterminée de $\bar{A}$.

7° L'équation (28) admet une solution et une seule $Y = \gamma(x)$ appartenant à $\mathfrak{F}$.

Dans ces hypothèses, $\vec{\varphi}(x, \lambda, t)$ est holomorphe par rapport à λ pour

$$a < x < b, \lambda \in A, t \in T$$

et continue par rapport à (x, λ, t) , ainsi que sa dérivée $\vec{\varphi}'_\lambda(x, \lambda, t)$, pour

$$a < x < b, \lambda \in \bar{A}, t \in T.$$

COMPLÉMENTS AU PREMIER MÉMOIRE

1° L'hypothèse du théorème 15 du Premier Mémoire: $\omega(x)$ est *minorante à droite*, peut être remplacée par la suivante: $\omega(x)$ est *quasi inférieure à droite*.

En effet, si l'on avait $\varphi(\xi) < \omega(\xi)$ ($a < \xi < b$), on pourrait trouver un nombre c ($a \leq c < b$) tel que⁽⁷⁾ $\varphi(x) < \omega(x)$ pour $c < x \leq \xi$ et $\varphi(c) = \omega(c)$. La fonction $\chi(x)$ définie par

$$\chi(x) = \begin{cases} \varphi(x) & \text{pour } a < x \leq c, \\ \omega(x) & \text{pour } c < x \leq \xi \end{cases}$$

serait quasi supérieure à gauche et appartiendrait à $\mathfrak{F}$. On pourrait montrer qu'il existe une solution $y(x)$ telle que $\varphi(x) \leq y(x) \leq \chi(x)$

(7) Si $\varphi(x) < \omega(x)$ pour $a < x < \xi$, on pose $c = a$.

pour $a < x < \xi$ et $\varphi(\xi) < y(\xi) < \chi(\xi)$. L'équation admettrait alors deux solutions $\varphi(x)$ et $y(x)$ appartenant à $\mathfrak{F}$, contrairement à l'hypothèse.

* 2° Quant au théorème 17, l'hypothèse suivante est inutile :
l'équation (11) est régulière à droite.

Il suffit d'appliquer le théorème amélioré ci-dessus, en posant

$$\bar{\omega}(x) = \max\{\varphi(x), \phi(x)\}.$$

3° La même hypothèse est inutile pour établir les théorèmes 18 et 19, car on les obtient en appliquant le théorème 17.

11 janvier 1941.