る。そして15分以内では0.004 ccを1度に投与した場合に等しくなる。次に投薬量を0.005~0.006 ccに増加すると、この間隔がやや長くなつても効果は得られるようになる。そこで Raxon は間隔時間が15分以上では第1回投与による中毒が第2回のそれに協力できないものと思われる。したがつて本剤ではできるだけ1回で死亡するように薬量を決定し、さらに喫食率をよくするように餌の材料を選択しなければならない。モノフロール酢酸ソーダでは0.08 mgを2回、4回、8回に分けて投与し、その間隔を長くすると効果は落ちてくる。しかし0.02 mg ずつ4回：3~4時間間隔でも、0.01 mg：4回：30分でも100%の殺虫力が認められる。そこでモノフロール酢酸ソーダでは中毒症状が長くつづき、次ぎ次ぎの投与薬の毒力が蓄積するように思われる。本剤がきわめて優秀な薬剤であることの原因もここにあると思われる。

(教育大・応用動物)

台湾の諸地点より採集せる *A. h. sinensis* 雌成虫、並びにその第1令幼虫の DDT に対する感受性について：劉肅雍 Liu, S.: On the susceptibility to DDT of adult females and the first instar larvae of *A. h. sinensis* from various localities in Taiwan

蚊の成虫の殺虫剤に対する感受性を測定する方法としては、Busvine-Nash の方法が現今広く使用されて居るが、この方法は、殺虫剤の Risella oil に対する溶解度が極めて限られて居る為、相当程度に感受性の低い蚊には不適當である。それ故近來では、最早や Busvine-Nash の方法を適用し得ぬ蚊に対しては、その幼虫を試験して得た結果で以て判断する事が一部の人達に依つて考えられて居る。然しその為には蚊の成虫の殺虫剤に対する感受性と幼虫のそれとの間に確實なる相関関係がなければならぬ。この点を明らかにする為、台湾の9地点より採集せる *A. h. sinensis* 雌成虫、及びその第1令幼虫に就き、それぞれの DDT に対する感受性を測定して見た。

その結果は、雌成虫の試験成績のみに就いて見た場合、船頭里、新厝及び万豊の3地点の *A. h. sinensis* が統計学的に有意義な、より高い LD_{50} を持つこととなり、一方第1令幼虫の試験成績のみを見た場合、吉峯、彎丘、石門、万峯及び船頭里の *A. h. sinensis* がより高い LD_{50} を持つ事となり、それぞれ相異なる結論を得る事となる。9地点の内、石門に於ける雌成虫の LD_{50} の値を1とし、他地点での LD_{50} の値を石門に於けるそれに対する比率で表わし、各地の第1令幼虫に関しても同様

な事を行つて、これを同一図表に示すと、雌成虫の DDT に対する感受性と第1令幼虫のそれとの間に相関関係の存在せざる事が察知出来る。更にこの両者間に於ける相関係数を算出すると $r = -0.1464 \pm 0.3262$ で、 $Z = -0.142 \pm 0.408$ となり、 Z の値はそれに伴う平均誤差の0.35倍にしかならぬので、両者間に相関関係の存在せざる事は至つて明白である。

以上に述べた調査結果、並びに印度、英、米等に於ける二、三のこれに関連せる調査研究の成績から推して、少くも数種の蚊に於ては、成虫及び幼虫の DDT に対する感受性は別けて考えられるべきであり、両者の何れを以てしても、他に替えてその種の感受性を論ずるのは妥当を欠くのではなからうかと思われる。

(台湾省瘧疾研究所)

✓ 澎湖島の西嶼に於ける家蚊と家蠅の習性について：劉肅雍 Liu, S.: On the behaviour of house-mosquitoes and house-flies in Hsi-yü Island of Peng-hu Archipelago

目下澎湖島に於いて進行中の蚊と蠅の防除工作に資するべく、去る1957年の5月に西嶼に於いて、主として家蚊及び家蠅を対象とし、その習性の調査を行つた。この調査に依つて明らかにされた主なる事実は以下の通りである。

A) 屋間に於ける家蚊成虫の習性：一家蚊 (*C. fatigans*) は殆んど全ての住屋に於て見出される。牛舎及び豚舎にも家蚊は見出されるが、これら畜舎に於ける家蚊の発見率並びに数は住屋に於けるその比でなく、圧倒的に大多数の蚊は住屋に見出される事が言える。そして、住屋内に於ける蚊の大多数は寝室に於て見出される。

B) 家蚊幼虫の発生習性：一西嶼に於ける家蚊の主要発生場所は、豚舎の尿溜、諸種の容器、滞流せる小川、非使用中の臼等である。そして、諸種の容器中では、特に桶、水がめ、水槽等に余計発生を見る。

C) 屋間に於ける家蠅成虫の習性：一屋間住屋内に見出される蠅の大多数は家蠅 (*M. d. vicina*) である。比較的少数乍ら、二条家蠅 (*M. sorbens*) も住屋内に侵入する。そして、これらの蠅は、住屋の外、豚舎、便所、ごみ溜、堆肥、野糞、牛舎等、極めて不潔な場所をも徘徊する。

D) 夜間に於ける家蠅成虫の習性：一大多数の家蠅は夜間台所及び餐室で休息し、極少数のみが軒下、客間及び前庭の物体等で夜を過すにすぎない。そして台所に

於ては夜間家蠅は天井及び天井よりぶら下れる諸物体等、比較的上方に止りたがる傾向を示す。

E) 家蠅幼虫の発生習性：一家蠅は主として豚舎内に於ける豚糞及びその他の汚物、ごみ及び堆肥、牛舎内に於ける牛糞及びその他の汚物、人犬糞等に、挙げた順次により良く発生し、二条家蠅は人及び犬の糞に最も繁く発生する。
(台湾省瘧疾研究所)

病原微生物媒介体としてのナメクジ：米本申一・山田源二・松本弘・戸田尚武 Yonemoto, S., Yamada G., Matsumoto, H. & Toda, N.: Studies on the medico-zoological relationship between pathogenic micro-organisms and slugs

われわれはさきに、ナメクジの体表粘液及び消化管内に於ける一般細菌の保有状態、並びに大腸菌群の検出等、2, 3の所見を報告したが、今回、大腸菌を摂食せしめ時間的経過による消化管内の感染状態、及び糞便中の供試菌の検出を行い、更らに2, 3の結果を得たのでここに報告する。

ナメクジは、大阪市及び岸和田市内より採集し、実験室にて飼育中のコウラナメクジを用いた。ナメクジに大腸菌を投与摂食せしめ、消化管各部位における時間的消長を検討した結果では、口器には30分後より2日後迄は、100%供試菌を検出したが、3日、4日の検出率は60%、20%と減少し、5日以後には検出されなかつた。胃に於ては、30分より3日後迄は、100%検出されるが、4日後は60%となり、5日以後は検出されない。腸の上部では、1時間後より5日迄は100%であるが、6日後は20%となり、7日以後には検出されない。腸の下部では、2時間後より検出され、6日迄100%を示し、7日、8日は60%、20%と減少し、9日以後には検出されなかつた。ナメクジ糞便中の供試菌の検出実験では、8時間後より検出され、4日迄100%、5, 6, 7, 8日は44.4%、30%、30%、10%と漸次減少し、9日以後は検出されなかつた。当教室の住吉(1954)及び村本(1957)は、*E. coli* 及び *Toxoplasma* を摂食せしめたゴキブリは、3日間は体内に保有すると述べ、また中条(1955)は蠅体内通過の零菌の観察に於て、4日以後は体内に供試菌を認めなかつたと報告している。之等の結果と比較すれば、ナメクジはかなりの長期間に亘つて保菌し、且つ排泄を行うものと考えられる。

(阪市大・医動物)

ナメクジ誘殺剤に関する研究 (其の1)：大串晃治 Ōgusi, K.: Studies on slug attractant (1)

野外より採集したコウラナメクジを飼育し、之を使用して、簡単なる試験枠と巣箱による試験装置で、メタアルデヒドを含有するナメクジ誘殺剤に関する基礎的な試験を行つた。一般に誘引致死に関係する要因は極めて多いため、少い回数の試験結果で直ちに結論することは危険であるが、ほぼ次のことを推定しても誤りはないものと思われる。

1) メタアルデヒドのナメクジを誘引する力は極めて強く、連続施用した時は含量0.1%で約70%、0.5%で約80%、5%前後で約90%の効果が期待できる。しかし致死力は之より相当低く、0.1%では約10%、0.5%では約30%、5%では約60%しか期待できない。2) 致死率を増加させるために殺虫剤の混入を行つた。リンデン、デイルドリン及びPCP Na 塩等の混入はナメクジの忌避するように思われる。砒酸石灰及びダイアジノンの混入も効力を上げることはできない。3) 誘殺剤とナメクジ棲息場所との距離を近くすることは、誘殺に要する時日を短縮できるが、連続施用の場合の効果に於ては差を認められない。4) 誘殺剤の形態は粉末状、錠剤及び塊状いずれも効果を期待できる。5) 匍匐面の乾湿状態はナメクジに対する誘引力そのものには影響はないが、湿潤状態の場合は麻痺したナメクジが蘇生回復する可能性があるが、これに反して乾燥状態の場合は体液の消耗により致死率を増加させる。(近藤化学)

マダニ類に対する殺虫剤の効果 (第4報) スクリーニング試験：北岡茂男・矢島朝彦 Kitaoka, S. & Yajima, A.: Effects of insecticides on ticks (4) Screening tests for tickicidal and oviposition-inhibitory activities

前報ではウシオマダニ (*Boophilus caudatus*) の幼ダニに対する殺虫剤の殺ダニ効果に関する screening 試験の結果を報告したが、今回は19種の殺虫剤の飽血成ダニに対する殺ダニ効力と産卵阻害作用にもとづき、哺乳動物に対する毒性を考慮しより望ましい殺ダニ剤を検索した。

乳剤を用いての効力比較は、濾紙上においたダニの背面に0.0001~1%(有効成分当り)の乳液を撒布した後、30°Cで斃死経過と産卵の如何を調べた。diazinonが高濃度で比較的に早い殺ダニ性を示すのを除くと、いずれの殺虫剤でも1%において100%致死に9日以上を要し、濃度-時間的死亡率の関係は甚だ不明瞭であり、時間または濃度-死亡率でその効果は不適当と考えられた。